REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Plans. III 56

INSTITUTIONS ASTRONOMIQUES,

OU

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES D'ASTRONOMIE,

Pour ſervir d'introduction à la Phyſique Céleſte, & à la Science des Longitudes,

Avec de nouvelles Tables d'Équation corrigées;

ET PARTICULIEREMENT

les Tables du Soleil, de la Lune & des Satellites;

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

PRÉCEDÉES

d'un Eſſai ſur l'Hiſtoire de l'Aſtronomie Moderne.

A PARIS,

Chez HIPPOLYTE-LOUIS GUERIN, & JACQUES GUERIN, rue Saint Jacques, à Saint Thomas d'Aquin, vis-à-vis les Mathurins.

M. DCC. XLVI.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

A MESSIRE

JEAN-BAPTISTE LANGUET DE GERGY,

CURÉ DE SAINT SULPICE,

ABBÉ DE BERNAY,

PERE DES ORPHELINS ET DES PAUVRES,

ET JUSTE ESTIMATEUR DES BEAUX ARTS;

QUI

JOIGNANT À DES CONNOISSANCES SUBLIMES
UNE GRANDE SAGESSE DANS L'ADMINISTRATION,
UNE CONSTANCE INÉBRANLABLE DANS LES ENTREPRISES,
UN AMOUR DÉCLARÉ POUR LE BIEN DE L'ÉTAT,
ET UN ZÉLE ARDENT POUR LA RELIGION,

EST PARVENU

A FAIRE ÉLEVER DANS LA CAPITALE DE CET EMPIRE,
UN TEMPLE DIGNE DE LA MAJESTÉ DU TRÈS-HAUT;

OÙ

APRÈS AVOIR CONSACRÉ
AU CULTE ET À LA GLOIRE DU SEIGNEUR
TOUT CE QU'ON PEUT RASSEMBLER DE PRÉCIEUX,

IL A FAIT PLACER

TANT POUR L'EXACTITUDE DU COMPUT ECCLÉSIASTIQUE,
QUE POUR LE PROGRÈS DE L'ASTRONOMIE,
UN GNOMON ET UN OBÉLISQUE
SUR LA LIGNE MÉRIDIENNE,

EN M. DCC. XLIV.

TABLE
DES CHAPITRES.

ESSAI sur l'hiſtoire & ſur le progrès de l'Aſtronomie, où l'on traite du mouvement de la Terre, de la Préceſſion des Equinoxes, de l'Obliquité de l'Ecliptique, & du Moyen Mouvement de Saturne. page j

REMARQUES ſur les Appulſes de la Lune & des Planetes aux Etoiles Fixes, lxiv

CHAPITRE I. *Du Mouvement Apparent,* page 1

CHAPITRE II. *Où l'on conſidere le Mouvement Apparent, lorſque l'Obſervateur change de lieu,* 15

CHAPITRE III. *Syſteme du Monde,* 21

CHAPITRE IV. *Où l'on prouve que le ſyſteme qu'on vient d'expoſer eſt vrai ſyſteme du Monde,* 33

CHAPITRE V. *Des taches du Soleil, de la Rotation du Soleil & des Planetes autour de leurs Axes, & de quelques changemens dans les Etoiles fixes,* 49

CHAPITRE VI. *De la diverſité des Grandeurs, & de la diſpoſition des Etoiles dans le Ciel; des principaux Catalogues, du nombre des Conſtellations, & de quelques changemens particuliers à certaines Etoiles fixes,* 55

CHAPITRE VII. *Du Mouvement annuel de la Terre à l'égard du Soleil, & de ſa Rotation autour de ſon axe, d'où réſulte le mouvement diurne apparent du Soleil, & de tous les autres Aſtres,* 72

CHAPITRE VIII. *De quelques autres Phénomenes qui dépendent du mouvement de la Terre,* 91

CHAPITRE IX. *De la Lune, de ſes différentes Phaſes, & de ſon mouvement,* 115

CHAPITRE X. *Des inégalités du mouvement de la Lune; de la figure de ſon Diſque apparent; des Montagnes &*

des cavités profondes que l'on y apperçoit, 129
—— *Sur la premiere équation des moyens mouvemens de la Lune*, 142
——TABLES *du Soleil & de la Lune*, 145
——*Des inégalités de la Lune au tems des Siſigies*, 188
CHAPITRE XI. *Des Eclipſes de Soleil & de Lune*, 193
CHAPITRE XII. *De la Pénombre, & du Cone qu'elle forme. La méthode d'en meſurer la hauteur, comme auſſi les diametres apparens des Ombres de la Terre & de la Lune*, 202
CHAPITRE XIII. *Où l'on conſidere la projection de l'Ombre de la Lune ſur le Diſque de la Terre*, 213
CHAPITRE XIV. *Où l'on expoſe la méthode nouvelle de calculer les Eclipſes du Soleil, qui doivent être viſibles pour un lieu donné*, 229
CHAPITRE XV. *Où l'on conſidere les différens Phénomenes qui ſont occaſionnés par le mouvement de la Terre, & par celui des deux Planetes inférieures Vénus & Mercure*, 257
CHAPITRE XVI. *Du mouvement des Planetes ſupérieures Mars, Jupiter & Saturne, & des Phénomenes qui en réſultent*, 279
——TABLES *du IVe Satellite de Saturne, & du premier Satellite de Jupiter*, 304
CHAPITRE XVII. *Des Cometes*, 321
CHAPITRE XVIII. *De la Sphere & de ſes différens Cercles*, 353
CHAPITRE XIX. *De quelques autres élémens de la Sphere*, 368
CHAPITRE XX. *Des Crépuſcules & de la Réfraction des Aſtres*, 399
CHAPITRE XXII. *Où l'on traite des Parallaxes*, 419
CHAPITRE XXIII. *La théorie du mouvement annuel de la Terre*, 464
CHAPITRE XXIV. *Du mouvement des Planetes dans une Ellipſe, & ſolution du Probleme de Képler, où l'on propoſe de couper l'aire Elliptique en raiſon donnée*, 480
CHAPITRE XXV. *Solution du Probleme de Képler, donnée par M. Newton. Hypotheſe elliptique de Wardus*, 497
CHAPITRE XXVI. *De l'Equation du Tems*, 517

CHAPITRE XXVII. *De la théorie des autres Planetes*, 535
——*De la conſtruction des Tables du mouvement des Planetes*, 559
CHAPITRE XXVIII. *Où l'on traite des ſtations des Planetes*, 577
CHAPITRE XXIX. *Des parties du Tems*, 593
CHAP. XXX. *Du Calendrier, & des Cycles ou Périodes*, 606
TABLE *des Logarithmes logiſtiques de Street*, 622
AVERTISSEMENS pour le calcul des lieux du Soleil & de la Lune, 627
CALCUL du lieu du Soleil le 4. Aouſt 1739. 630
CALCUL du vrai lieu de la Lune le 4 Aouſt 1739, 630
CALCUL de l'Immerſion du premier Satellite, arrivée le 18 Aouſt 1740, 633
FORMULES pour calculer les Aberrations des Etoiles fixes en Déclinaiſon & en Aſcenſion droite, démontrées par M. Clairaut dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, de 1737. Ibid.

Fin de la Table des Chapitres.

AVIS AU RELIEUR pour placer les Figures.

HEmiſphere Boréal, *page* 62
Hémiſphere Auſtral, *Ibid.*
PLANCHE I. 92
TABLE générale des Phaſes de la Lune ſelon la Sélénographie d'Allemagne. I. 140
TABLE pour la moyenne Libration & les pleines Lunes, &c. II. *Ibid.*
TABLE générale des Phaſes de la Lune, ſelon la Sélénographie des PP. Grimaldi & Riccioli. III. *Ibid.*
PLANCHE II. 194
PLANCHE III. 216
PLANCHE IV. 240
PLANCHE V. 278
RÉVOLUTIONS périodiques, &c. 352
PLANCHE VI. 374
PLANCHE VII. 426
PLANCHE VIII. 516
PLANCHE IX. 592

FAUTES A CORRIGER.

PAGE 13 *ligne* 21, *au lieu de* KHM, *lisez* ABD
Page 36 *ligne* 12, 1661, *lisez* 1761.
Page 37 *ligne* 28, de nous que dans, *lisez* de nous dans
Page 109 *ligne* 30, CE, *lisez* SE
Page 207, *ligne* 14, diametre, *lisez* demi-diametre.
Page 212 *ligne* 14, à la, *lisez* avec la
Page 253 *ligne* 2, CEDG; par la, *lisez* CEDG, par la 7, H, A; *lisez* H A,
Page 338 *en marge*, ſe meuvent; *lisez* ſe montrent
Page 339 *en marge* de l'Ecliptique, *lisez* de l'Ellipſe
Page 345 *ligne* 4 au plûtôt, *lisez* ou plûtôt
Page 398 *ligne* 5, 2e *colomne au lieu de* ♈, *lisez* ♉.
Page 508 *ligne pénultiéme*, *au lieu de* au tems & GC, *lisez* au tems : Et GC
Page 565, *dernieres lignes en marge*, & véritables, *lisez* aux véritables
Page 582 *en marge* A : B, *lisez* des Cosinus A : B
Page 630 *ligne* 14, le 3 Aouſt, *lisez* le 4 Aouſt

ESSAI

ESSAI SUR L'HISTOIRE ET SUR LE progrès de l'Aſtronomie ; où l'on traite du Mouvement de la Terre, de la Préceſſion des Equinoxes, de l'Obliquité de l'Ecliptique, & du Moyen Mouvement de Saturne.

LES Elémens d'Aſtronomie qui ont été publiés juſqu'à préſent, ſont en ſi petit nombre, qu'on ne doit pas être étonné de voir rappeller ici & ce qu'ils contiennent, & les additions que divers Auteurs y ont faites preſque ſucceſſivement. On ſera peut-être bien-aiſe de ſçavoir à quel point de perfection l'Aſtronomie a été portée à meſure que l'on a fait de nouvelles découvertes, ou que les Mathématiciens ont imaginé des méthodes plus ſimples, plus naturelles & moins indirectes que celles dont on étoit obligé de ſe ſervir autrefois. L'Aſtronomie ayant déja bien changé de de face, & étant devenue beaucoup plus ſimple depuis que l'on admet le Mouvement réel de la Terre autour du Soleil, il eſt à propos de commencer par déduire ici en peu de mots les preuves qu'on a données tant du mouvement annuel de la Terre, que de ſon mouvement de Rotation.

L'Aſtronomie devenue beaucoup plus ſimple depuis que l'on admet le mouvement de la Terre.

On avoit fait déja du tems de Képler assez de progrès dans la recherche du véritable Systeme du Monde ; & l'on pouvoit bien dire dès-lors que l'opinion ancienne de Philolaüs ou des Caldéens, sur le mouvement réel de la Terre autour du Soleil (introduite près de cent ans auparavant par Copernic) n'avoit plus besoin d'être défendue comme autrefois, lorsqu'elle n'étoit adoptée simplement que comme le systeme du monde le plus vraisemblable. En effet depuis la découverte du Télescope, faite en Hollande, & employé d'abord par Galilée, on a publié diverses démonstrations de ce systeme, qui ont été reçûes de tous les Mathématiciens, & généralement de tous ceux qui ont été à portée de prendre quelque connoissance de la Physique Céleste : Voici les principales preuves qu'on en donnoit, & qui ont achevé de convaincre les Philosophes.

La Terre & les Planetes tournent autour du Soleil.

Les différentes Phases de Mercure, de Vénus & de Mars vûes avec les meilleurs Télescopes prouvent déja que ces Planetes tournent autour du Soleil ; & les Eclipses des Satellites dans l'ombre des Planetes supérieures comparées aux tems de leurs conjonctions visibles, font aussi reconnoître que ces mêmes Planetes tournent autour du Soleil. D'ailleurs Képler avoit remarqué que toutes les Planetes, en faisant leur révolution, étoient assujetties à une même loi, qu'il avoit découverte : or cette loi lui avoit paru générale & toujours constante, en admettant le Soleil, & non pas la Terre, au centre du Mouve-

ment des Planetes. D'auſſi fortes preuves & l'analogie le conduiſirent donc à en conclurre le mouvement réel de la Terre autour du Soleil.

Mais on eſt parvenu à le prouver aujourd'hui d'une maniere encore plus ſimple, en y employant la découverte qu'on a faite tout récemment de l'Aberration des Etoiles fixes. L'explication ſi naturelle & ſi ingénieuſe qu'on a donnée de ce Phénomene, ſatisfait merveilleuſement & ſans aucune exception, à toutes les apparences du mouvement des Etoiles dans le cours de chaque année. Ainſi le mouvement réel de la Terre ne ſçauroit être prouvé d'une maniere plus déciſive. En effet pour bien entendre cette théorie de l'Aberration, qu'on détaillera néantmoins encore davantage au Chapitre VIII. il faut ſçavoir qu'elle eſt fondée ſur le mouvement réel de la Terre autour du Soleil, & ſur le mouvement ſucceſſif de la Lumiere. Il ne reſte plus de doute aujourd'hui ſur la propagation ou le mouvement ſucceſſif de la Lumiere; puiſque ſi cette vérité, de même que la plûpart des autres, a été combattue dès le commencement, on peut dire à cette heure que ceux mêmes qui l'ont attaquée, l'ont adoptée depuis unanimement, comme il eſt aiſé de s'en convaincre par leurs propres écrits. Il faut avouer auſſi que la découverte de l'Aberration des Etoiles fixes a paru d'abord y ajouter un nouveau poids; & que d'ailleurs l'action mutuelle des Satellites de Jupiter, les uns à l'égard des autres, auparavant inconnue, ſembloit en quelque maniere autori-

Nouvelle preuve fondée ſur la découverte de l'Aberration des Etoiles.

Elle dépend du mouvement annuel de la Terre autour du Soleil.

L'Aberration dépend auſſi du mouvement ſucceſſif de la Lumiere.

ser ceux qui ne vouloient pas adopter la démonstration du mouvement successif de la Lumiere, fondée sur les Eclipses des Satellites. Cependant il n'étoit pas impossible d'appercevoir les effets de ce mouvement successif dans les trois Satellites supérieurs, comme dans le premier; & c'est ce qu'avoit déja prouvé M. Halleï long-tems avant la découverte de l'Aberration des Etoiles.

Le mouvement successif de la Lumiere avoit déja été prouvé par les Eclipses des Satellites de Jupiter.

Quoi qu'il en soit, le mouvement successif de la Lumiere étant universellement établi, on peut bien assurer aujourd'hui que le mouvement réel de la Terre autour du Soleil est démontré par la théorie de l'Aberration, puisqu'autrement cette théorie ne pourroit plus satisfaire aux observations du mouvement apparent des Etoiles, & deviendroit fausse dans des cas particuliers. D'un autre côté les Astronomes n'ont pas hésité à publier leurs observations faites à ce sujet, qui leur ont fait également reconnoître l'excellence & la vérité de cette ingénieuse théorie.

La Rotation de la Terre & des Planetes autour de leur Axe.

Le mouvement de la Terre autour du Soleil suppose nécessairement la Rotation de la Terre autour de son Axe qui s'acheve en 24 heures. Ce mouvement diurne ou de Rotation est confirmé d'ailleurs par celui que l'on observe dans la plûpart des Planetes, sur la surface desquelles on a découvert différentes taches qui ont fait enfin reconnoître qu'elles tournoient d'Occident en Orient avec une inclinaison constante de la part de leur Axe de Rotation. Feu M. Cassini a reconnu le premier que Jupiter tournoit en 9^h $56'$

autour de son Axe, Mars en $24^h\ 40'$, & Venus en $23^h\ 20'$; que l'Axe de Jupiter & de Mars est presque perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, ou plutôt au plan de leur orbite. Enfin celui de Venus, est incliné de 15° à l'Ecliptique; de sorte que cette Planete tourne, pour ainsi dire, autour de son Axe du Midi au Septentrion.

Inclinaison l'Axe de Venus au plan de l'Ecliptique.

Au reste, une des choses qui contribue le plus à attirer l'attention de ceux qui aiment l'étude des Mathématiques, c'est de s'appercevoir que tant de vérités qu'on a successivement découvertes, & qui ont exigé bien du tems & une infinité d'expériences pour être constatées, se trouvent pour l'ordinaire intimement liées, & découlent naturellement les unes des autres. Auroit-on jamais osé soupçonner, par exemple, sans les principes qu'on vient d'établir, & qui avoient déja été reconnus, que la Terre dût avoir une forme un peu différente d'une Sphere; qu'elle fût dis-je applatie vers les Poles, & que cet Applatissement ou altération dans sa rondeur ait été de tout tems la principale cause du Mouvement Apparent de toutes les Etoiles d'Occident en Orient? Car les Etoiles, comme presque tout le monde sçait, ont changé considérablement de lieu, & se sont avancées de près d'un signe, ou 30 degrés vers l'Orient depuis environ deux mille ans. Les Etoiles du Bélier, qui du tems d'Hipparque étoient placées à l'Equinoxe du Printems, occupent actuellement le lieu où se trouvoit pour lors la Constellation du Taureau;

La figure de la Terre est la cause du mouvement apparent des Etoiles selon l'ordre des signes, dont la révolution s'acheve en 26000 ans.

les Etoiles de celle-ci ont pris la place de la Constellation des Gemeaux, & ainsi de suite; de maniere qu'il faudra vingt-six mille ans ou environ avant que toutes les Etoiles ou Constellations, après avoir parcouru les douze signes du Zodiaque parallelement à l'Ecliptique, reparoissent au même lieu & dans les mêmes points du Ciel, où le fameux Hipparque les avoit observées près de 150 ans avant l'Ere Chrétienne.

Il est difficile de s'accoutumer d'abord à comprendre ces grands mouvemens périodiques, comme aussi les causes qui ont dû les produire: on tâchera cependant d'expliquer dans la suite d'où elles dépendent; en un mot, comment doit se faire chaque année la Précession des points des Equinoxes: car les Etoiles n'ont pas en effet un mouvement propre qui les emporte vers l'Orient, mais ce sont au contraire les points des Equinoxes & des Solstices qui se meuvent contre l'ordre ou la suite des signes: & quoique la différence en soit insensible pour le commun des hommes dans l'espace de quelques années, néantmoins comme ces différences s'accumulent toujours dans le même sens, elles produisent enfin un effet qui devient dans la suite de plus en plus remarquable.

Les points des Equinoxes ont un mouvement réel contre l'ordre des signes; ce qui est la cause du mouvement apparent des Etoiles d'Occident en Orient.

Quand le feu Roi Louis XIV. envoya des ordres à l'Académie des Sciences nouvellement établie par les soins de M. Colbert, pour qu'on mesurât la grandeur d'un degré en France, & pour en conclurre la grandeur de la Terre, M.

Degré du Méridien mesuré en France.

Picard qui en fut chargé, détermina fort exactement la diſtance terreſtre; & quoiqu'il n'ait pas eu tout-à-fait le même ſuccès dans la recherche de l'Arc Céleſte*, n'ayant pu le vérifier dans la ſuite avec M. de Roemer, comme il l'avoit propoſé, cependant il eſt aiſé de voir qu'il étoit déja parvenu à conclurre à cent toiſes près la grandeur du degré de la circonférence de la Terre; d'où en ſuppoſant la Terre ronde, ſa circonférence fut établie pour lors de 9000 lieues à raiſon de 25 lieues par degré.

Grandeur de la Terre.

M. Picard avertit dans ſon Livre de la Meſure de la Terre, publié en 1671. d'une conjecture propoſée dans l'Aſſemblée de l'Académie des Sciences, & qui avoit déja fait ſoupçonner à quelques-uns que la Terre nétoit pas exactement Sphérique, mais un Sphéroïde applati par les Poles. Il dit qu'en ſuppoſant le Mouvement diurne de la Terre autour de ſon Axe, la Peſanteur devoit être (à cauſe de la force centrifuge)

L'Accourciſſement du Pendule ſous l'Equateur, & la figure de la Terre avoient d'abord été propoſés dans l'Aſſemblée de l'Académie des Sciences, comme dépendans d'une même théorie phyſique.

* Il réſulte de ſes Obſervations que l'Arc compris entre Paris & Amiens, ſeroit de $7''\frac{1}{8}$ plus grand que celui qu'on a obſervé en 1739 de 1° 1' 12"; ou plutôt de $8''\frac{1}{7}$, ſi l'on a égard à la différence des réfractions, qui avoit été négligée par M. Picard, comme n'étant pas de grande conſéquence: il eſt vrai que la différence eſt encore plus grande, ſi l'on a égard aux aberrations de l'Etoile qu'il avoit obſervée, & que cette erreur ne lui étant pas tout-à-fait inconnue, a fait enfin ſoupçonner que l'amplitude de ſon arc n'auroit pas été aſſez exactement déterminée. Mais comme il avoit recherché en même tems avec ſon Quart-de-cercle, l'amplitude du même arc par différentes Etoiles, & qu'il ne nous a donné que le réſultat des diſtances au Zénit d'une même Etoile obſervée à ſon Secteur, la correction qu'on voudroit faire à cet arc, à cauſe de l'Aberration de l'Etoile, paroît aſſez inutile.

plus grande vers les Poles que vers l'Equateur; d'où l'on avoit conclu que dans la Zone Torride les corps graves pourroient descendre moins vîte, & qu'ainsi il faudroit peut-être y accourcir sensiblement le Pendule qui bat les secondes.

L'Accourcissement du Pendule déterminé par observation en l'Isle Cayenne en l'année 1672.

Cela fut vérifié l'année suivante dans un voyage fait par Richer en l'Isle Cayenne à près de cinq degrés de la Ligne Equinoctiale ou de l'Equateur. Il remarqua d'abord que sa Pendule bien réglée en France retardoit chaque jour d'environ $2\frac{1}{2}$ minutes. Mais comme on lui avoit recommandé principalement de mesurer la longueur du Pendule simple qui bat les secondes, il en répéta l'expérience pendant 8 mois entiers; & il résultoit toujours qu'en l'Isle Cayenne, le Pendule qui bat les secondes devoit être plus court d'une ligne & un quart, qu'à la latitude de Paris.

C'est ainsi que MM. Huygens & Newton reconnurent que la Terre devoit être applatie vers les Poles, & rehaussée vers l'Equateur. Enfin après bien des recherches tant sur la longueur du Pendule, que sur la grandeur du degré en différens climats, on est parvenu aujourd'hui à conclurre la juste quantité, dont l'axe qui passe par les Poles est plus court que le diametre de l'Equateur. La différence excede une deux-centieme partie, & peut même être fixée à $\frac{1}{175}$.

L'Axe terrestre est plus court que le diametre de l'Equateur de $\frac{1}{175}$ suivant les plus récentes observations faites en Laponie & dans le Pérou.

On donnera bientôt* d'après ces résultats, la maniere de calculer la quantité de la Précession

* Cet Essai a commencé d'être dicté au Collége Royal en 1745.

de

de l'Equinoxe & la Nutation de l'axe de la Terre : cela ſuppoſe divers principes de Phyſique céleſte, qui doivent ſuivre immédiatement les Inſtitutions Aſtronomiques que l'on développe ici. La Préceſſion des Equinoxes & la nutation de l'axe de la Terre dépendent, comme on le verra, d'une même cauſe ; car la Terre n'étant pas ſphérique, l'action du Soleil & de la Lune ſur les Parties du Sphéroide, devient inégale pendant le cours de chaque révolution périodique. D'où il ſuit que l'inclinaiſon du plan de l'Equateur & par conſéquent de l'axe terreſtre, à l'égard de l'Ecliptique eſt variable, tant à chaque Lunaiſon, que dans le cours de chaque année, & cela alternativement au Nord & au Midi, ce qui fait rétrograder les points des Equinoxes. Mais pour donner ici quelque idée de cette Théorie, il nous faut parler d'une cauſe premiere, laquelle eſt univerſelle & dont nous connoiſſons les effets.

A cauſe que les Terres ſont ſenſiblement rehauſſées vers l'Equateur, l'action du Soleil & de la Lune ſur le Sphéroide terreſtre, devient inégale, à meſure que ces Aſtres s'écartent vers le Nord ou vers le Midi.

Il faut donc ſçavoir, qu'il y a dans la nature un principe que les Phyſiciens & les Aſtronomes admettent aſſez unanimement aujourd'hui, non-ſeulement parce que tous les phénomenes, même les plus rares & les plus ſinguliers, le confirment de jour en jour, mais auſſi parce qu'il a conduit juſqu'à préſent, ceux qui l'ont reconnu aux plus grandes découvertes : ceſt la loi générale de la gravitation.

L'Aſtronomie phyſique preſqu'entiérement fondée ſur la théorie de la gravitation.

C'eſt par le ſecours de cette loi qu'on a découvert le mouvement réel des Cometes, ſi longtems ignoré des Aſtronomes & des Philoſophes,

Cette théorie a fait enfin découvrir les regles du mouvement des Cometes.

même dans les deux siecles éclairés qui ont précédé celui-ci. Nous sçavons aujourd'hui que ces corps sont de vraies Planetes qui tournent autour du Soleil, en parcourant des Ellipses presque immenses.

On répond à l'objection qui a été proposée depuis Tycho jusqu'en ces derniers tems, contre le mouvement annuel de la Terre autour du Soleil, & la distance presque immense des Etoiles, qui résulte du défaut de la parallaxe du grand orbe.

D'un autre coté, comme il a fallu reconnoître il y a déja long-tems que la distance des Etoiles étoit prodigieuse, puisqu'elle surpasse infiniment les plus grands espaces compris entre le Soleil & les orbites de la Terre ou des Planetes, on est à portée d'assigner aujourd'hui à quoi doit être destinée cette vaste étendue comprise entre Saturne & les plus proches Etoiles. On sçait, dis-je, que les Cometes y achevent leurs révolutions périodiques autour du Soleil, & de plus, il paroît assez vraisemblable, que d'autres Cometes les achevent pareillement autour des Etoiles, en y parcourant de très-grandes orbites & les plus excentriques qu'il soit possible d'imaginer.

La précession de l'Equinoxe.

Pour revenir à ce qui concerne la nutation de l'axe terrestre & la Précession des Equinoxes*, il

* Soit le Soleil ou la Lune en S, DC le plan du disque terrestre auquel la ligne ST est perpendiculaire, le centre de la Terre étant en T; soit aussi supposée avec M. Newton la gravitation moyenne de la Terre vers le Soleil représentée par ST; ou ce qui revient au même, la gravitation vers le Soleil de toute la matiere réunie au centre du globe terrestre T. Pour trouver la gravitation vers le Soleil d'une montagne ou masse quelconque P, prise sur l'Equateur Terrestre, on prendra sur SP (à cause que la gravitation croît ou diminue en raison renversée du quarré de la distance) la ligne SL qui soit à ST, comme ST^2 est à SP^2; d'où il est évident que la ligne SL représentera la gravitation de la particule ou masse P vers le Soleil. Ayant mené LM parallele à PT, qui rencontrera ST prolongée au point M, la gravitation SL se trouve composée des deux forces LM, SM, dont l'une qui est

eſt à propos de conſidérer, que ſi l'axe de la Terre n'étoit pas incliné ſur le plan de l'orbe qu'elle



parallele & ſenſiblement égale à *PT*, agit directement vers le centre de la Terre : quant à l'autre *SM*, comme une de ſes parties *ST* eſt toujours commune à toutes les autres parties de la Terre, elle ne ſçauroit non plus cauſer de changement dans le mouvement de l'Axe Terreſtre. Il n'en eſt pas de même de l'autre partie *TM* de la ligne *SM* ; car outre qu'elle eſt variable (étant à très-peu près égale à trois fois *PK* cosinus de l'angle *PTS*) elle agit conſtamment ſuivant une direction *Pm* parallele au plan de l'Ecliptique. C'eſt pourquoi ſi la ligne *CTD* repréſente l'interſection commune de l'Equateur Terreſtre avec le plan de l'Ecliptique, & ſi l'on imagine que la moitié *CPAD* de l'Equateur ſoit élevée au-deſſus du plan *STC* pendant que l'autre moitié *DBC* eſt abaiſſée au-deſſous du même plan, alors la particule ou maſſe placée en *P* ſur la circonférence de l'Equateur Terreſtre, eſt agitée comme ci-deſſus par deux forces, dont l'une étant toujours dirigée vers le centre de la Terre ne ſçauroit changer la ſituation de l'Axe du Globe : mais l'autre au contraire agiſſant ſuivant une direction parallele à *TS*, tend à ramener le plan de l'Equateur vers le plan de l'Ecliptique *CTS*.

Après avoir conſidéré ce qui doit arriver au Globe Terreſtre par l'effet de la gravitation de la montagne ou particule *P* qui ſeroit continuellement attirée vers le plan de l'Ecliptique, ſuppoſons que toutes les particules qui excedent le Globe Terreſtre depuis l'Equateur juſqu'au Pole (ou ſimplement les terres qui ſont rehauſſées vers l'Equateur) ſe réuniſſent dans le plan même de l'Equateur, & y forment un large Anneau fort mince, & dont le plan paſſeroit néceſſairement par le centre de la Terre : à ne conſidérer uniquement que cet Anneau, il eſt aiſé de s'appercevoir que chaque fois que ſon plan paſſera par le Soleil (ce qui doit arriver au tems des Equinoxes) ſes nœuds ou interſections avec le plan de l'Ecliptique doivent être pour lors immobiles, l'action du Soleil qui eſt repréſentée par *Pm* ſe faiſant alors dans le plan même de l'Anneau qu'on ſuppoſe paſſer en ce moment-là par le centre du Soleil : mais dans toute autre ſituation des nœuds de l'Anneau depuis l'Equinoxe juſqu'aux Solſtices, ſon inclinaiſon

décrit chaque année autour du Soleil ; ſi cet axe étoit diſpoſé à peu-près comme celui de Jupiter (lequel eſt preſque perpendiculaire au plan de l'Ecliptique) le Soleil nous paroîtroit en ce cas continuellement dans le plan de l'Equateur,

au plan de l'Ecliptique doit augmenter ou diminuer, & cela de la maniere qu'on va l'expliquer par le moyen de la figure ſuivante.



* *Voyez le I. Lemme de la prop. 39. du 3e. Livre de la Philoſophie de M. Newton.*

Car pour revenir à la particule *P*, quel que ſoit l'effort * qui doit ſe faire, ſoit ſur cette particule, ſoit ſur la matiere de l'Anneau qui excede le Globe Terreſtre, & qui ſeroit réunie en ce ſeul point *P*, il s'agit de prouver que dans l'un ou l'autre cas l'angle de l'inclinaiſon de l'Anneau ſur le plan de l'Ecliptique *STC* doit toujours diminuer depuis l'inſtant que le point *P* quitte les points *C* ou *D* des Equinoxes, juſqu'au tems de ſon arrivée aux points des Solſtices *A* ou *B* ; qu'au-contraire cet angle augmentera depuis les Solſtices juſqu'au tems des Equinoxes, c'eſt-à-dire, depuis le paſſage du point *P* de *A* ou *B*, juſqu'en *D* ou *C* ; qu'enfin dans l'un ou l'autre cas les points Equinoctiaux ou les Nœuds de l'Anneau doivent avoir un mouvement rétrograde ſur le plan de l'Ecliptique : qu'on ſuppoſe *P* fort proche de *A*.

Dans le premier cas, *P* eſt emporté par le mouvement annuel de la Terre d'Occident en Orient, & s'éloigne du point de l'Equinoxe *C*, en s'avançant vers *A* qui répond au Solſtice. Suppoſant donc que dans un inſtant donné il parcourre l'arc *Pp*, l'effort qui ſe fait pendant le même inſtant ſur le point *P* parallelement à l'Ecliptique ſelon la direction *Pm*, lui fera donc parcourir par un mouvement compoſé la ligne droite *Pπ*. Ainſi ſon mouvement ne ſe fait point ſelon la premiere direction du plan de l'Equateur *CTP*, & l'Axe terreſtre ne doit

& quelque applatiſſement qu'eût la Terre vers les Poles, pourvû qu'on l'admette uniformément denſe ou homogene, le premier point d'♈ ou de l'Equinoxe répondroit conſtamment au même lieu dans le Ciel étoilé. En un mot, toutes les

pas s'avancer parallelement à lui-même : mais le mouvement du point *P* ou de l'Anneau ſe fera dans un nouveau plan $\Upsilon P \pi$, lequel étant prolongé rencontrera celui de l'Ecliptique au-delà du point *C*, c'eſt-à dire, en *c*. Conſidérant auſſi que l'effort qui ſe fait ſuivant *Pm* eſt très-petit, en comparaiſon de celui qui eſt produit par le mouvement annuel, & qui tranſporte le point *P* en *p*; il s'enſuit que l'angle *CPc* qui meſure la différence d'inclinaiſon des deux plans *CPT*, *cPT*, eſt très-petit, & qu'ainſi l'arc *Pc* differe à peine de l'arc *PC*. Ainſi comme depuis le tems des Equinoxes juſqu'au tems des Solſtices, l'Arc *PC* eſt toujours moindre que le quart de cercle *CA*, d'une quantité finie *PA*, il s'enſuit que la ſomme des deux arcs *PC*, *Pc* eſt moindre que le demi-cercle; partant dans le triangle ſphérique *CPc*, l'angle extérieur *PCa* ſera plus grand que l'intérieur ou oppoſé *PcC*. L'inclinaiſon du plan de l'Anneau ou de l'Equateur doit donc diminuer continuellement depuis le paſſage du point *P* de *C* en *A*. Mais l'interſection ou le nœud *C* étant alors tranſporté de *C* en *c*, il eſt évident que ſon mouvement ſe fait dans le ſens contraire au mouvement périodique du point *P*, & qu'ainſi le nœud ou point de l'Equinoxe *C* rétrograde, & ſe meut contre la ſuite des ſignes.

En ſecond lieu, ſi le point *P* eſt tranſporté depuis le Solſtice qui ſe fait en *A* juſqu'à l'Equinoxe en *D*, en quelque lieu qu'il ſe trouve alors, comme il eſt agité par deux forces, ſçavoir, ſuivant la direction *Pp*, & ſuivant la direction *Pm*, il décrira par conſéquent par un mouvement compoſé la ligne $P\pi$: ainſi le mouvement de l'Equateur ſe fera donc ſuivant cette derniere direction, & le plan de l'Equateur prolongé rencontrera celui de l'Ecliptique en *d*; d'où il ſuit que l'Equinoxe ou Nœud *D* doit rétrograder vers le point *d*, & l'angle extérieur *Pda* étant plus grand que ſon intérieur ou oppoſé *PDd*, il ſera vrai de dire que l'inclinaiſon du plan de l'Anneau doit augmenter depuis le Solſtice juſqu'à l'Equinoxe.

On démontrera de la même maniere le mouvement rétrograde des points des Equinoxes & la diminution ou l'augmentation qui doit arriver dans l'inclinaiſon de l'Anneau ſur le plan de l'Ecliptique, pendant que le point *P* de cet Anneau (qui eſt oppoſé le plus directement au Soleil) parcourt les deux arcs *DB*, *BC*.

Conſtellations ne ſe ſeroient point avancées de près d'un ſigne depuis environ deux mille ans, & l'action du Soleil ou de la Lune ne cauſeroit pas deux fois, à chaque révolution périodique, la nutation de l'Axe terreſtre.

Mais comme cet Axe fait un angle de $66^{\circ}\frac{1}{2}$ avec le plan de l'Ecliptique, ou que l'Equateur forme avec le plan de l'orbe annuel un angle de $23^{\circ}\frac{1}{2}$, il s'enſuit qu'à chaque fois que le Soleil ou la Lune nous paroiſſent s'écarter vers l'un ou l'autre Tropique, leur action étant inégale ſur le Sphéroïde (à cauſe que les Terres ſont ſenſiblement rehauſſées vers l'Equateur), non-ſeulement la nutation de l'Axe terreſtre doit avoir lieu, mais auſſi la commune ſection du plan de l'Equateur avec celui de l'orbe annuel doit peu à peu changer de place par un mouvement continuel contre l'ordre des ſignes, ce qui fera paroître rétrograder les points des Equinoxes.

Origine des diſtérens traités d'Aſtronomie, publiés dès le commencement du renouvellement des Lettres en Europe.

Il n'eſt pas néceſſaire de s'arrêter long-tems ici aux divers Traités d'Aſtronomie qui ont été publiés ſous les regnes de François I & de ſes Succeſſeurs: la plûpart de ces Ouvrages n'étoient que des Extraits de l'Almageſte de Ptolomée, traduit de l'Arabe ou ſur les manuſcrits Grecs: ceux-ci furent recueillis & les paſſages reſtitués dans cette belle édition de Bâle de l'année 1538.

L'Almageſte de Ptolomée.

L'Almageſte étoit alors regardé comme une des plus importantes collections qui eût été faite de toute l'Aſtronomie ancienne. Cet Ouvrage

avoit été publié sous l'empire d'Antonin, & il ne restoit gueres que ce seul Livre d'Astronomie qui eût échappé à la fureur des Barbares. On s'y étoit donc attaché d'autant plus volontiers, qu'il renferme non seulement les hypotheses, les méthodes pratiques & les théories des Anciens, mais encore plusieurs observations Astronomiques faites en Orient & à Alexandrie depuis la vingt-septieme année de Nabonassar, (qui est le tems de la plus ancienne Eclipse qu'on sçache avoir été observée à Babylone) jusques vers l'an 887, qui répond, selon nos Chronologistes, à l'année 140 de l'Ere Chrétienne. Les autres Livres qui s'étoient sans doute bien moins multipliés, avoient été détruits pendant les ravages presque continuels qui se firent durant cinq cens ans dans toutes les provinces Romaines.

Ce qu'en ont pensé les Mathématiciens.

Les plus anciennes observations Astronomiques qui nous soient restées, se trouvent dans ce Livre.

L'empire Romain, comme l'on sçait, ayant fini en Occident en l'année 476 de l'Ere Chrétienne, & les nations Gothiques qui en avoient conquis les provinces, s'y étant pour lors établies, une longue barbarie succéda tout-à-coup aux siecles éclairés de Rome : & cette grande ville, de même que celles de la Gaule, des Espagnes & de l'Afrique, ayant été plusieurs fois prise & saccagée, il n'est pas étonnant si les manuscrits furent détruits & dissipés ; l'ignorance étant tout-à-coup devenue si grande que même les Princes Conquérans connoissoient à peine l'usage des livres. Comme ces nations ne songeoient qu'à exterminer le nom Romain, leur

Les autres ouvrages d'Astronomie ancienne ont été détruits pendant les ravages des Barbares.

fureur s'étoit allumée à tel point, qu'ils prirent à tâche d'anéantir tous les écrits, & de détruire les monumens que la puissance Romaine avoit élevés dans les Gaules & dans l'Italie.

Omar fait brûler tous les Livres en Orient.

Cette perte eût été en quelque façon réparable, si vers le milieu du septieme siecle Omar, IIIe Calife des Sarrasins, n'eût fait brûler tous les livres en Orient. Le nombre de ceux qui se trouvoient à Alexandrie étoit immense : comme il fallut employer plus de six mois pour exécuter l'ordre du Calife qui achevoit pour lors la conquête de la Perse, les ordres qu'il avoit envoyés ne furent pas si rigoureusement exécutés en Egypte, qu'il n'échappât quelques manuscrits. Enfin la persécution que les différentes Sectes qui s'étoient élevées parmi les Mahométans avoient fait naître tant en Afrique que dans l'Asie, ayant cessé presqu'entierement, les mêmes Arabes ou Sarrasins recueillirent bientôt après un grand nombre d'Ecrits que les premiers Califes Abbasides firent traduire d'après les Versions Syriaques, & ensuite du Grec en leur Langue, laquelle est devenue depuis ce tems la langue sçavante de tout l'Orient.

Ce qui n'empêche pourtant pas les Sectes de se multiplier parmi les Mahométans.

Versions Arabes faites par ordre des Califes de la seconde race.

Or, soit que l'Almageste nous ait d'abord été apporté par les Sarrasins d'Espagne, le nombre des Astronomes s'étant multiplié d'abord sous la protection des Califes de Bagdad; soit qu'on en eût enlevé diverses copies du tems des Croisades lorsqu'on fit la conquête de la Palestine sur les Sarrasins d'Egypte; il est certain que ce livre a été

été d'abord traduit d'Arabe en Latin par ordre de l'Empereur Frederic II. vers l'an 1230 de l'Ere Chrétienne.

Cette traduction étoit informe, & celles qu'on a faites depuis, ne ſont pas non plus trop exactes : on eſt ſouvent obligé d'avoir recours au texte original. Iſmaël Bouillaud en a cependant rétabli divers paſſages dont il a fait uſage dans ſon Aſtronomie Philolaïque, s'étant ſervi pour cet effet du manuſcrit Grec que l'on conſerve à la Bibliotheque du Roi.

Quel étoit l'état de l'Aſtronomie ſous les rois d'Egypte ſucceſſeurs d'Alexandre.

Le grand objet des Aſtronomes d'Alexandrie avoit été dans l'eſpace d'environ 200 ans de recueillir aſſez d'obſervations pour ſe mettre en état de fonder quelque théorie, & repréſenter enſuite par leurs calculs les mouvemens céleſtes. La protection que leur accorderent les Rois Grecs ſucceſſeurs d'Alexandre (qui firent en effet fleurir les ſciences & les arts parmi les Egyptiens infiniment plus que n'avoient fait les Rois naturels de cette nation) le grand nombre de Philoſophes & de Sçavans en tout genre qu'ils attirerent par leurs bienfaits dans la capitale de leur royaume, ne contribua pas peu à faire ſurmonter les grands obſtacles qui pouvoient retarder l'exécution de ce projet. En effet Pline qui a vécu ſous l'empire de Trajan, c'eſt-à-dire, peu de tems avant Ptolomée l'auteur de l'Almageſte, nous apprend qu'Hipparque avoit déja entrepris le Catalogue général des Etoiles, & qu'il exécuta un ſi grand ouvrage principalement à l'occaſion

d'une nouvelle Etoile qui parut tout-à-coup; que pour cet effet il avoit fait forger un très-grand nombre d'instrumens: environ cent ans auparavant Eratosthenes avoit déja placé par ordre de Ptolomée Evergetes de grandes Armilles dans l'un des portiques d'Alexandrie, & avoit commencé à s'en servir pour observer les mouvemens du Soleil & des Planetes.

Les Astronomes ont dû ébaucher dès le commencement, différentes Tables Astronomiques.

Il est évident dé-là que les observations Astronomiques faites à Alexandrie s'étoient déja multipliées dans l'espace de plus de deux cens ans sous Tymocharis, Aristille, Erathostenes & Hipparque: mais dans la suite sous un foible gouvernement les Rois étant déchus de ce haut degré de puissance, & l'Egypte ayant été bientôt après réduite en province Romaine, le nombre des Observateurs qui travailloient à l'avancement de l'Astronomie, & qui s'éclairoient mutuellément, diminua tout-à-coup; & la construction des Tables Astronomiques qu'on avoit entreprise, mais qu'on n'avoit pas encore jugé à propos de publier, étant devenue pour lors l'objet d'un seul homme, ce dernier moins occupé de l'histoire générale des Observations, que de ses hypotheses & de ses Tables, nous a causé en les publiant, une perte irréparable.

Ces Tables sont devenues d'autant plus nécessaires, qu'elles se sont perfectionnées de jour en jour.

L'idée de construire ces sortes de Tables Astronomiques est assez naturelle, mais étant une fois publiées, on ne doit songer d'abord qu'à les corriger, de même qu'on le pratique à l'égard des Tables Géographiques, qu'on ne cesse

de réformer, comme l'on ſçait, à chaque ſiecle. Il n'y a donc pas lieu de croire qu'aucun Aſtronome juſqu'à ce jour, ait jamais prétendu ſérieuſement en conſtruire de perpétuelles.

Les obſervations des Equinoxes ſervent à déterminer la grandeur l'année Solaire.

Ce fut dans cette vue qu'Hipparque avoit commencé d'abord par obſerver les momens des Equinoxes, ce qui devoit fixer la grandeur de l'année ſolaire : il avoit découvert auſſi la premiere inégalité de la Lune & quelques-unes de celles des Planetes, en même tems qu'il recherchoit leurs révolutions périodiques. De plus, en conſtruiſant ſon Catalogue, il s'étoit apperçû par les déclinaiſons de l'Epi de la Vierge & de quelques Etoiles, comparées à celles qu'Eudoxe & Tymocharis avoient obſervées avant lui, que ces Etoiles, de même que les Planetes, étoient aſſujetties à un mouvement propre ou apparent d'Occident en Orient, qui, quoique très-lent, étoit néantmoins devenu aſſez ſenſible.

L'année Solaire plus courte que l'année Sydéréale.

Si Ptolomée * en continuant les mêmes obſervations près de trois cens ans après Hipparque,

* Quòd autem tamdiu latuerit veritas Aſtronomica ex eo factum eſt quod veteres Artifices & imprimis *Ptolemeus* nulla omnino nobis tradiderint obſervata, præter ea quibus ad ſtabiliendas hypotheſes tabulaſque ſuas principiis uſi ſunt, cùm tamen multo magis ex re fuiſſet *Tymocharidis*, *Ariſtilli*, *Hipparchi*, ſuaſque *Ptolemæi* τηρήσεις debitâ fide ad nos transmiſiſſe & numerorum ſuorum à cœlo diſſenſus ingenuè adnotaſſe, (ad exemplum magni *Hyppocratis* cui minimè pudori fuit ſub curâ ſuâ mortuos æquè ac ſanitati reſtitutos poſteritati conſignaſſe) potiùs quàm vanâ quâdam gloriolæ ſpecie ſphalmata ſibi ipſis perſpecta tacuiſſe, celatis ſcilicet obſervationibus iis quibus tabulas ſuas malè reſpondentes experti ſunt. Hoc autem ante *Tychonem-Braheum* omnium penè gentium Aſtronomis commune vitium. *Halleïus*, *Præf. ad Obſervat. D. Jac. Pound.*

Si Ptolomée avoit publié dans son Almageste, toutes les observations anciennes, l'Astronomie seroit aujourd'hui beaucoup plus avancée.

s'étoit contenté d'en publier une histoire générale; s'il n'eût pas d'ailleurs changé les positions des Etoiles du Catalogue, & qu'au lieu d'établir à l'aide des hypotheses par un petit nombre d'observations les Elémens du mouvement des Planetes, il eût discuté & recueilli fidelement tout ce qui pouvoit concourir à constater les moyens Mouvemens, les Nœuds, l'Inclinaison, l'Aphélie, l'Excentricité ou les plus grandes Equations des orbites des Planetes; il est certain que l'Astronomie seroit beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui, & qu'on connoîtroit bien mieux à présent les regles des Mouvemens célestes. Mais il a moins songé à rendre son Almageste ou Syntaxe utile aux Astronomes, que de le mettre à la portée du commun des hommes & des Calculateurs. Et comme le vrai moyen de perpétuer ces sortes d'ouvrages est d'anéantir toutes les observations qui peuvent y être contraires, il est arrivé de-là qu'à l'exception de celles qu'il fut obligé d'employer à la construction de ses Tables, les autres observations Astronomiques ont été perdues, le seul Almageste s'étant alors répandu, & la lecture des anciens Auteurs, qui étoient d'un plus difficile accès, ayant été presqu'entierement négligée.

Les Tables Alphonsines & Ilchaniques vicieuses, de même que celles de Ptolomée.

Voilà en peu de mots ce qui nous restoit à dire sur l'Astronomie ancienne. Les Mathématiciens du Roi Alphonse & ceux du Can des Tartares Houlacou, ayant suivi à peu-près le même plan que Ptolomée, nous ne parlerons point ici

de leurs ouvrages, non plus que des Tables Aſtronomiques conſtruites par les Mathématiciens d'Ulug-Beigh, dont les obſervations ne ſont pas encore aſſez connues. Mais nous trouvons dans le 9e & dans le 12e ſiecle Albategnius & quelques autres Aſtronomes Arabes qui ont en effet travaillé utilement; & il ſeroit à ſouhaiter qu'on achevât la traduction de leurs ouvrages. Enfin au commencement du 16e ſiecle lorſque Copernic a renouvellé l'ancien ſyſteme du mouvement de la Terre autour du Soleil, l'Aſtronomie avoit déja commencé à être cultivée en Europe. Les Aſtronomes qui nous ont laiſſé le plus d'obſervations dans ces tems-là, ſont Regiomontanus & Bernard Walterus, l'un & l'autre ayant obſervé pluſieurs années de ſuite les mouvemens du Soleil & des Planetes dans la ville de Nuremberg.

Auſſi tôt après le renouvellement des Lettres en Europe, Regiomontanus & Walterus ont commencé à faire diverſes obſervations du Soleil & des Planetes.

On trouvera dans les différentes parties de l'ouvrage ſuivant, une hiſtoire abrégée de l'Aſtronomie ancienne & moderne, les découvertes & le progrès qu'on a fait dans cette ſcience, y ayant été expoſées, autant qu'il a été poſſible, ſoit par occaſion (à meſure qu'on a traité chaque matiere dans la plûpart des Chapitres) ſoit en reprenant quelquefois le fil des faits hiſtoriques. A la vérité, il eſt impoſſible qu'il n'échappe toujours un certain nombre de faits: mais on ne ſera peut-être pas fâché d'y en retrouver pluſieurs qui n'avoient point été rapportés par Bouillaud ni par Flamſteed, qui les premiers ont écrit l'hiſtoire de l'Aſtronomie ancienne & moderne.

Bouillaud & Flamſteed ont commencé à écrire l'hiſtoire de l'Aſtronomie ancienne & moderne.

Ceux qui voudront étudier cette hiſtoire d'une maniere plus particuliere, doivent néceſſairement conſulter les divers Auteurs qui en ont écrit, parmi leſquels nous trouvons d'abord les vies de Regiomontanus, de Copernic & de Tycho, compoſées par Gaſſendi. Feu M. Caſſini a compoſé auſſi une hiſtoire de l'Aſtronomie ancienne, qu'il a fait imprimer à la tête du Recueil des Voyages de l'Acad. des Sciences, qui a paru en 1693. & dans le I. Volume des Mémoires de l'Académie des Belles Lettres, on en trouve une autre de M. l'Abbé Renaudot qui a conduit l'Aſtronomie ancienne juſqu'en ces derniers ſiecles, s'étant un peu étendu ſur le progrès de cette ſcience chez les Arabes & dans preſque tout l'Orient. Enfin il y a environ deux ans qu'un Auteur moderne a fait quelques extraits de pluſieurs Mémoires que j'en avois recueillis, & les a bientôt après publiés à la tête de ſon Livre. On pourra conſulter encore, ſi l'on veut, les Préfaces des nouvelles éditions faites en Angleterre de Manilius & d'Héſiode.

Diverſes autres hiſtoires abrégées de l'Aſtronomie ancienne.

Parmi les Traités Elémentaires qui ont paru dans le ſiecle précédent & au commencement de celui-ci, on compte principalement les Inſtitutions Aſtronomiques de Gaſſendi* & de Mercator, l'Aſtronomie Géométrique & Phyſique de Grégori, les Prélections Aſtronomiques de Whiſton, & l'Introduction à l'Aſtronomie de Keill. Celui-ci s'étoit propoſé de compoſer des Leçons qui fuſſent à la portée de ceux qui ne

Auteurs modernes.

** Ces Inſtitutions dictées au Collége Royal, ont été réimprimées avec toutes ſes obſervations, dans le IVe. Tome du Recueil de ſes Ouvrages.*

sçavent encore que les premiers élémens des Mathématiques, tel que pourroit être un abrégé de l'Astronomie de Gregori, dépouillé de toute théorie physique, & ces mêmes Leçons pouvoient servir d'introduction au 3e Livre des Principes de la Philos. de Newton. Comme Keill les a long-tems travaillées, soit à mesure qu'il les dictoit dans l'Université d'Oxfort, soit dans les différentes éditions qu'il en a publiées; que d'ailleurs elles ont été traduites en Latin à l'usage des Universités d'Angleterre, on avoit pris le parti d'en donner aussi une Version Françoise, & cela principalement afin que les Officiers de la Marine pussent y prendre les notions nécessaires pour rechercher les Longitudes soit sur terre, soit dans nos Isles, & sur-tout dans les principaux ports de mer, en y employant les observations de la Lune. Ç'a été d'abord dans ce dessein, & pour diverses autres considérations qu'on a été obligé d'y faire plusieurs additions; ce qui en a bientôt occasionné beaucoup d'autres qu'on croit plus utiles & plus convenables à une Astronomie Élémentaire, que la plûpart des Problemes ou Constructions Géométriques que Keill avoit recueillies dans ses dernieres éditions : on y a donc enfin inséré les Élémens du Mouvement des Planetes, qui méritoient bien assurément de trouver place à la fin du XXVIIe Chapitre.

Les Leçons Astronomiques de Keill sont les plus à la portée des Commençans.

Dans quelle vue on s'étoit proposé d'abord de les traduire.

Outre les diverses additions qu'on y avoit faites, on a pris le parti d'y inférer les principaux Elémens du mouvement des Planetes.

Les Elémens d'Astronomie supposent que l'on ait traité

Les Astronomes entendent communément par le mot d'Élémens, les principaux résultats des Observations Astronomiques, & généralement

chaque matiere d'une maniere beaucoup plus étendue & même plus détaillée, qu'il n'a été possible de le faire jusqu'ici.

tous les nombres essentiels qu'ils employent à la construction des Tables du Mouvement des Planetes ; c'est peut-être-là ce qui a pu rendre ce mot d'Élémens équivoque, les Ouvrages qu'on a publiés sous ce titre n'étant pas toujours à la portée des Commençans, à moins qu'ils ne soient précédés d'un grand nombre de propositions préliminaires. D'un autre côté, ayant considéré qu'il étoit nécessaire que l'on apprît la maniere de calculer sur les Tables Astronomiques ; ou du moins que le Lecteur n'ignorât pas à quel point de perfection elles avoient été portées ; dans quel cas elles sont défectueuses & par quels moyens on peut parvenir à les perfectionner, (ce qui n'avoit été traité jusqu'ici qu'assez imparfaitement) on s'est étendu un peu sur cet article, les Auteurs dont nous avons parlé ci-dessus ayant négligé cette partie, comme étant peut-être susceptible d'un trop grand détail. Les additions faites à la fin des Chapitres, avoient été pour la plûpart composées il y a déja long-tems, & l'on étoit même dans le dessein de les publier en 1739. Mais quoique ce projet ait été mis enfin en exécution, il n'a pas cependant été possible d'y ajouter un Chapitre entier sur les Réfractions, faute d'un nombre suffisant d'observations Astronomiques. On s'est donc appliqué uniquement à achever les Tables de la Lune de M. Flamsteed & à rectifier celles du premier Satellite de Jupiter, publiées il y a plus de vingt ans par M. Pound, & l'on donne ici les unes & les autres

Nouvelles Tables de la Lune.

Tables du I. Satellite de Jupiter, corri-

sous

ſous la forme la plus commode que les Aſtronomes ayent pu imaginer juſqu'à ce jour. Il ſeroit fort à ſouhaiter qu'en Angleterre on entreprît de publier auſſi les Tables du Mouvement des Planetes, que Flamſteed avoit ébauchées; car quoique la théorie des Planetes ſoit encore très-imparfaite, on retireroit néantmoins quelques lumieres de ſon travail. On remarquera cependant que les obſervations de cet Auteur & celles de Tycho ayant été publiées dans le plus grand détail, on eſt toujours à portée d'en faire uſage, & même avec beaucoup plus d'avantage qu'autrefois, ſur-tout ſi l'on veut calculer exactement les Elémens du mouvement des Planetes : en effet, nous connoiſſons déja pluſieurs équations nouvelles dans la poſition des Etoiles qui ont été comparées aux Planetes, leſquelles étoient totalement négligées dans le dernier ſiecle; & c'eſt ce qu'on fera voir dans la ſuite de cet Eſſai. Enfin ſans trop parler des méthodes nouvelles que l'on emploie à préſent, & qui étant plus directes, abregent aſſez le travail pour que les Aſtronomes ayent égard juſqu'aux moindres circonſtances dans le calcul des obſervations; nous avertirons ſeulement qu'afin de ne pas négliger l'accourciſſement que les réfractions ont dû cauſer dans les diſtances des Aſtres, obſervées par Tycho & par Flamſteed, on peut par les formules de M. Côtes *, & le globe de Blaeu qui donne aſſez

gées ſur les découvertes les plus récentes du mouvement ſucceſſif de la Lumiere.

Les obſervations de Tycho & de Flamſteed ayant été publiées, on a quelque avantage aujourd'hui ſur ces Aſtronomes, dans l'uſage qu'on en pourra faire, pour reſtituer les mouvemens des Planetes.

De quelle maniere doivent être corrigées les diſtances des Planetes aux Etoiles, lorſqu'elles ſont accourcies par les Réfractions.

* Voyez le Traité *Æſtimatio Errorum in mixta Matheſi*, dans le Livre qui a pour titre *Harmonia Menſurarum.*

bien les hauteurs des Astres sur l'horison, rectifier les distances apparentes des Planetes aux Etoiles fixes. Il est vrai que Tycho n'employoit que des pinnules pour déterminer ces distances, mais cela n'empêche pas qu'elles n'ayent souvent été prises avec beaucoup de justesse : on peut même en être assuré quelquefois à moins d'une minute, sur-tout si les observations de ces distances ont été réitérées. Blaeu, bien instruit de ce qu'avoit fait Tycho, & qui a même publié un Traité où il explique l'usage des globes avec beaucoup de clarté, a construit pour l'année 1640 des globes célestes si parfaits, qu'il est difficile de trouver rien de plus précis en ce genre ; & d'autant que le Catalogue des principales Etoiles venoit d'être tout récemment restitué par Tycho, l'erreur de deux à trois minutes qui auroit pu se glisser dans la longitude de quelques Etoiles de ce Catalogue, ne sçauroit être aucunement sensible sur des globes de trente pouces. Ainsi l'on pourra s'en servir pour connoître les hauteurs des Astres sur l'horison, & par conséquent leurs réfractions dans le cercle vertical.

Le globe de Blaeu est d'autant plus exact qu'il contient les positions des Etoiles du Catalogue de Tycho.

Pour déterminer l'élévation de l'Equateur, & les Latitudes de Villes, les Anciens se sont d'abord servis de Gnomons ou Obéliſques plantés perpendiculairement à l'horison, & ils examinoient ensuite à Midi, aux tems des Solstices & des Equinoxes, dans quelle proportion se trouvoit l'ombre jettée sur le plan horisontal, relativement à la hauteur verticale de leurs Obéliſ-

Les Gnomons ou Obéliſques avoient d'abord été employés par les anciens, pour déterminer les Solstices, les Equinoxes & les Latitudes des Villes.

ques. C'est ainsi que Pytheas qui vivoit du tems d'Alexandre, & dans la suite Hipparque déterminerent l'un à Marseille, & l'autre à Byzance les hauteurs Méridiennes du Soleil, ce qui leur en a fait conclurre la Latitude ou le Climat : mais suivant les observations du premier, l'obliquité de l'Ecliptique auroit-elle été de $23^{\circ}\frac{7}{8}$, environ 300 ans avant l'Ere Chrétienne ? On ne sçait trop quel fond il faut faire sur ce résultat ; car Pytheas n'avoit pas conclu cette obliquité, * mais avoit seulement mesuré l'ombre la plus courte. Si l'on désire un plus grand détail, & qu'on veuille juger avec plus d'avantage du degré de précision qui convient à cette observation de Pytheas, on doit consulter la seconde Lettre de Gassendi à Wendelin, imprimée dans le IVe tome du Recueil des ouvrages de ce Philosophe. On verra par-là qu'après avoir considéré tant cette observation, que la plûpart des autres faites par les Anciens, on peut bien assurer que nous en ignorons les principales circonstances. En effet, ils ne nous ont gueres laissé par écrit que des rapports, tels que celui de la distance des Tropiques à la circonférence de la Sphere, (qu'Eratosthenes & Hypparque faisoient comme 11 à 83) & cela le plus souvent en nombres ronds, en sorte qu'il est assez difficile de reconnoître par-là si l'obliquité de l'Ecliptique a été la même autrefois que celle qu'on observe à présent. Ceux qui prétendent que cette obliquité auroit diminué d'environ 20′ en deux mille ans, ne manquent pas de faire usage & d'opposer aux

**Strabon au 2^d^ Livre de sa Géographie, dit qu'Eratosthenes avoit établi Marseille sous le parallele de Byzance, à cause que Pytheas y avoit observé la même proportion de l'ombre à la hauteur du Gnomon, laquelle, selon Hipparque, étoit de 120 à 42 moins $\frac{1}{7}$. Il ne s'ensuit donc pas de-là, que Pytheas ait cherché à déterminer l'obliquité de l'Ecliptique.*

Les observations de Ptolomée sont trop incertaines pour qu'on en puisse conclurre, quelle étoit de son tems l'obliquité de l'Ecliptique.

Astronomes du sentiment contraire, les observations de Ptolomée; mais outre qu'elles ont été faites avec un trop petit Quart-de-cercle aux solstices d'Hiver & d'Eté, comment peuvent-ils tirer quelque éclaircissement d'un Observateur aussi peu exact qu'étoit Ptolomée; puisqu'on sçait, à n'en pouvoir douter, qu'il n'a jamais pu parvenir à bien déterminer la Parallaxe de la Lune, ni découvrir la position d'aucune Etoile fixe?

Albategnius qui est venu 750 ans après, & qui vraisemblablement n'ignoroit pas les plus récentes observations de l'obliquité de l'Ecliptique, faites par ordre du Calife Almamoun, tant à Bagdad qu'à Damas, résolut de vérifier par lui-même, s'il étoit bien certain que cette obliquité fût si différente de celle qui est rapportée dans Ptolomée, sçavoir de 23° 51′ $\frac{1}{3}$. Ayant donc construit un grand Instrument suivant la description qui en a été donnée dans l'Almageste, & qui est connu sous le nom de Regles Parallactiques, Albategnius * trouva la distance des Tropiques (dans la ville de Racca en Mésopotamie sous la Latitude de 36°) de 47° 10′, c'est-à-dire, l'obliquité de l'Ecliptique 16′ plus petite que selon

Albategnius détermine l'obliquité de l'Ecliptique 16′ plus petite que ne l'avoit observé Ptolomée.

* « Pour nous, dans ce siecle-ci ayant employé une très-longue » Alidade ajustée à une Regle à plomb, dont la construction & l'usage » sont expliqués dans l'Almageste; après avoir fait la Réduction (*post* » *partium diminutionem*), & après avoir vérifié la position de l'Instru- » ment, aussi exactement qu'il nous a été possible, nous avons fré- » quemment observé dans le Méridien la distance du Soleil au Zénit, » &c. Or il est prouvé par-là que la quantité de l'arc compris entre » les deux Solstices est de 47° 10′, & que la déclinaison du Cercle

Ptolomée : l'observation de l'Astronome Arabe ne s'éloignant pas sensiblement de celles qui furent faites ensuite par Mousaïdes sur le pont de Bagdad, ni de ce qui avoit été déterminé auparavant par les Mathématiciens du Calife.

Les Arabes ayant plusieurs fois déterminé la distance des Tropiques dans le 9e siecle, & l'ayant toujours trouvée en nombres ronds, de 47° 10′, il est assez difficile de s'assurer s'ils ont pu éviter l'erreur de quelques minutes dans cette détermination ; d'autant que les armilles & autres semblables instrumens qu'ils employerent d'abord à cette recherche, ne sçauroient gueres donner distinctement jusqu'aux minutes, mais seulement jusqu'à une cinquieme ou sixieme partie de degré, selon la maniere de compter de ces tems-là. D'un autre côté, s'ils ont eu égard à la Parallaxe * du Soleil (qu'ils supposoient de 3′ à l'horison, de même que Ptolomée), & s'ils ne nous ont donné que des observations toutes corrigées, l'obliquité de l'Ecliptique auroit été véritablement pour lors d'une minute plus grande, c'est-à-dire, de 23°36′ ; de maniere que si l'on ne vouloit pas regarder leurs observations comme défectueuses, il ne seroit que trop prouvé par-

* *Remarquez que Ptolomée n'a point eu égard à la Parallaxe lorsqu'il a observé la distance des Tropiques.*

» des Signes à l'égard du Cercle Equinoctial (qui est la moitié de ce » nombre) n'est que de 23°35′, ce qui est la même chose que l'espace » compris entre les deux Poles. C'est pourquoi nous employerons » dans notre Livre, non pas le résultat que donne Ptolomée d'après » Hipparque, mais celui que nous venons de rapporter, puisque ce- » lui-ci est fondé sur ce que nous avons vû par nous-même, & celui- » là simplement sur un simple récit. (*Eo quod hoc oculo, id autem* » *auditu accepimus.*) Albategnius, *de scient. Stellarum*, *cap. IV.*

là que l'obliquité de l'Ecliptique auroit diminué sensiblement, les Astronomes d'aujourd'hui l'aïant déterminée seulement de $23^{\circ}\ 28'\frac{1}{2}$. Mais comme l'on n'ignore pas d'ailleurs que peu tems après, sçavoir, l'an 901 de l'Ere Chrétienne, Thébit fils de Corra, célebre Philosophe, l'avoit déterminée de $23^{\circ}\ 33'\frac{1}{2}$, & que vers l'année 992 Mahmud qui étoit de la ville de Cogende dans la Coraſſane (province d'où sortoient continuellement les plus grands Mathématiciens, Philosophes, Poëtes & Médecins) ayant employé à cette recherche un Sextans d'une grandeur immense, & dont le limbe étoit divisé en minutes & secondes, ne trouva l'obliquité que de $23^{\circ}\ 32'\frac{1}{3}$; il doit s'ensuivre, sur-tout si ces derniers n'ont pas corrigé leurs observations par la Parallaxe, que l'obliquité de l'Ecliptique n'auroit diminué qu'insensiblement, puisqu'on trouveroit à peine 4′ dans l'espace de 800 ans. Ce résultat ne s'accorde donc plus avec les observations de Ptolomée*, comparées à celles d'Albategnius, puisqu'elles donnoient 16′, comme nous l'avons rapporté, dans un pareil intervalle de tems.

Obliquité de l'Ecliptique, observée par Thébit & Mahmud pendant le 10e siecle.

* *Entre Ptolomée & Mahmud on auroit 19′ dans l'espace de 850 ans.*

De tout ce que nous venons de dire, on peut conclurre qu'il s'en faut bien qu'on prouve aujourd'hui que l'obliquité de l'Ecliptique ait sensiblement diminué, les observations anciennes s'accordant d'une part si peu les unes avec les autres, & celles qui ont été faites en Europe depuis le 15e siecle par Walterus & par Tycho, Picard, Richer, Flamsteed & quelques Modernes,

nous donnant toutes à peu près la même obliquité. Dans le ſiecle précédent, les Aſtronomes s'étoient trouvés partagés touchant cette queſtion, de maniere que Gaſſendi après avoir fait toutes les recherches néceſſaires à ce ſujet, n'a point fait difficulté d'aſſurer que l'obliquité paroiſſoit conſtante ; Riccioli s'eſt ſervi à peu-près des mêmes argumens, mais l'un & l'autre n'ont gueres connu que les obſervations les plus anciennes : d'un autre côté Wendelin, & ſur-tout Bouillaud qui étoit fort attaché à l'Almageſte, leur avoient été fort oppoſés. Cependant Gravius & enſuite M. Bernard Profeſſeur d'Aſtronomie, très-verſé dans les Langues Orientales, ayant parcouru divers manuſcrits Arabes dont la plus grande partie ſe trouve à la Bibliotheque d'Oxfort, il eſt arrivé que par les réſultats qu'ils nous en ont communiqués, on a encore douté davantage ſi la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique pouvoit avoir lieu. Or c'eſt, à ce qu'il ſemble, à quoi le Chevalier de Louville auroit dû avoir égard, & dont il n'a cependant aucunement parlé lorſqu'il a publié ſon hypotheſe en 1719, où il prétend prouver que l'obliquité de l'Ecliptique diminue à raiſon d'une minute en 100 ans.

La queſtion touchant la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique, avoit été déja pluſieurs fois agitée, principalement dans le dernier ſiecle.

Le Chevalier de Louville n'a point fait uſage des obſervations qui lui étoient contraires, quoiqu'il s'en trouvât pluſieurs incomparablement plus exactes que celles de Mouſaïdes qu'il employe.

Parmi les diverſes nations où l'on a cultivé l'Aſtronomie, il n'y en a certainement aucune où l'on ait entrepris avec le plus de ſoin, ni un plus grand nombre de fois, de déterminer l'obliquité de l'Ecliptique, que chez les Arabes & les Perſans ; car ils ont réitéré leurs obſervations à ce

sujet pendant près de six cens ans, soit parce qu'ils avoient d'abord reconnu que c'étoit-là le fondement des Tables du Soleil, sans lesquelles il leur étoit impossible de restituer les lieux des Etoiles fixes, soit parce que l'obliquité ayant déja paru si différente de celle qui est rapportée dans l'Almageste, ils étoient peut-être bien-aises de s'assurer par eux-mêmes si elle alloit en diminuant. C'est ainsi que Nassir Oddin la trouva de 23° 30′ 00″, l'ayant observée, à ce qu'il assure, avec la plus grande exactitude à Maraga proche Tauris, peu de tems après la destruction de l'empire des Sarrazins, lorsque les Tartares, après plusieurs irruptions, ayant enfin pris Bagdad, & fait mourir le dernier Calife, s'établirent pour quelque tems dans la Perse, n'ayant pas encore entrepris la conquête de l'Inde. Ensuite les Mathématiciens d'Ulug-Beigh Prince Tartare, petit-fils de Tamerlan, lequel commandoit des deux côtés du Gange, déterminerent encore l'obliquité de l'Ecliptique de 23° 30′ $\frac{1}{3}$ sous la Latitude de 39° 37′ dans la ville de Samarkand. Gravius assure avoir appris de Turcs dignes de foi, que le Rayon de l'instrument que ce Prince Mogol fit construire pour cette recherche, égaloit à très-peu de chose près la hauteur du Temple de sainte Sophie de Constantinople. Ces mêmes Mathématiciens publierent aussi le second Catalogue général des Etoiles, dont Gravius a ébauché la traduction, mais que Thomas Hyde a achevée il y a environ 80 ans; c'est cette derniere Traduction qui

Obliquité de l'Ecliptique, observée en Asie vers le milieu du 13e & 15e siecle.

a été réimprimée dans le troisieme volume de l'histoire céleste de Flamsteed, avec assez de soin & d'exactitude : on a cependant oublié d'avertir que l'époque de ce Catalogue commence à l'année 1437.

Les observations faites par ordre d'Ulug Beigh sont trop récentes & trop inconnues (les détails qui s'en trouvent parmi les Manuscrits de la Bibliotheque du Roi, & qui sont en Langue Persane, n'ayant pas encore été traduits) pour qu'on en puisse retirer quelqu'éclaircissement touchant la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique : c'est pourquoi sans trop nous y attacher, il reste à examiner ce que l'on a fait de plus particulier à ce sujet, en France & en Angleterre depuis l'application des Lunettes d'Approche aux Quarts-de-cercles.

Les observations du dernier siecle, sçavoir, depuis l'application des Lunettes d'Approche aux Quarts-de-cercle, doivent être préférées, à celles qui ont été faites depuis le 15e siecle.

Ce seroit ici le lieu de faire quelque digression, pour examiner si l'on a effectivement éclairci cette question par le moyen des Gnomons, tels que celui de Gassendi élevé à Marseille en 1636, lequel avoit 52 pieds de hauteur, ou celui que feu M. Cassini a construit de nouveau à Boulogne dans l'Eglise de Ste Pétrone, & dont la hauteur étoit de 80 pieds; mais il semble qu'on ne doit pas s'y arrêter, à moins qu'on n'entreprenne de faire voir la raison pourquoi le résultat de ces observations anciennes s'éloigne un peu trop de ce qui a été trouvé depuis avec plus d'exactitude & avec de meilleurs instrumens. Car les Quarts-de-cercle ayant été dès l'année

Elles doivent encore être préférées, principalement vers le solstice d'Eté, à celles que l'on a déterminées par le moyen des Gnomons.

1667 garnis de Lunettes, il n'y a pas lieu de douter, à ce qu'il semble, que ce n'ait été depuis ce tems-là, c'est-à-dire, depuis 70 à 80 ans que les Astronomes sont enfin parvenus à s'accorder touchant l'obliquité de l'Ecliptique.

L'image du Soleil est distincte & terminée dans la Lunette des Quarts-de-Cercle : mais elle est fort confuse vers les bords, lorsqu'on l'observe aux Gnomons.

On ne sçauroit nier non plus, que dans les Quarts-de-cercle garnis de Lunettes, l'image du Soleil ne soit parfaitement terminée & si distincte, qu'on peut pointer à cet astre à $2''\frac{1}{2}$, ou $5''$ tout au plus ; au lieu que dans les Gnomons, outre que l'image du Soleil est confuse vers les bords, & environnée de Pénombre, il y a d'ailleurs un autre inconvénient bien plus considérable, sçavoir, qu'au solstice d'Eté les divisions sont tellement rétrécies, en comparaison de celles dont on se sert pour déterminer l'Equinoxe ou le solstice d'Hiver, qu'à peine un tiers de minute ou 20″ occupe-t-il alors sur la ligne Méridienne un espace d'une ligne, lorsqu'on se sert d'un Gnomon de 80 pieds de hauteur.

Le Verre objectif de 80 pieds de foyer, placé nouvellement au Gnomon de l'Eglise de St Sulpice, paroit remédier au défaut principal des Gnomons.

Pour remédier au défaut principal des Gnomons, & réparer en quelque maniere le peu de justesse que doit donner une distance devenue trop petite, dans la projection qui se fait des rayons du Soleil sur la ligne méridienne au tems du solstice d'Eté, on a placé en l'année 1744 dans le plan même du Gnomon de l'Eglise de St Sulpice, un peu au-dessous de l'ouverture du Trou par où passent les rayons du Soleil, un Verre objectif de 80 pieds de foyer. Cet Objectif étant exposé directement au Soleil lorsque

cet Astre parvient au Tropique du Cancer, on a eu soin de lui ménager une ouverture particuliere pour le moment de Midi; en sorte que les rayons du Soleil tombant sur le Verre (qui d'ailleurs est bien centré) & n'y occupant qu'un espace de 3 pouces de diametre, se réunissent si distinctement sur une grande surface de Marbre qui est parfaitement horisontale, & que l'on découvre alors, qu'on peut être assuré de déterminer par l'observation des deux bords sur la ligne Méridienne, le lieu du centre de cette image à un quart & souvent à un sixieme de ligne près: il n'est pas même nécessaire que le Ciel soit chaque jour parfaitement serein, comme cela est requis à l'égard des Gnomons ordinaires. Or puisqu'à un quart de ligne répondent 5″, il est évident que l'erreur qu'on peut commettre dans une seule observation, ne doit gueres différer de celle que les Astronomes s'efforcent d'éviter aujourd'hui avec leurs meilleurs Quarts-de-cercle.

Ce Verre dont on ne fait usage que vers le tems du Solstice d'Eté, semble donner une précision suffisante aux Astronomes, pour reconnoître les variations qui peuvent arriver dans les hauteurs solstitiales.

Car il ne suffit pas de considérer uniquement dans les Quarts-de-cercle la précision avec laquelle on peut pointer, & dont les limites s'étendent à 2″ ou 3″, si l'on se sert d'un Quart-de-cercle de six pieds de rayon: il faut encore considérer, non seulement les petites erreurs qui sont à craindre dans la maniere dont on estime les divisions sur le limbe, mais principalement celles qui peuvent résulter des diverses vérifications qu'on est obligé de faire au Zénit ou à l'Horison. Ainsi au lieu de déterminer la quantité absolue de l'Obli-

Quelles sont les erreurs que l'on doit craindre dans l'observation des hauteurs solstitiales faites avec les meilleurs Quarts-de-cercle.

quité de l'Ecliptique, il est à propos de changer d'objet; ou plutôt pour s'assurer de la diminution de cette obliquité, il est plus simple de se proposer, de reconnoître les variations qui arriveront dans les hauteurs solstitiales pendant un intervalle de dix ou vingt ans. Il est évident qu'on ne peut se dispenser d'abord de réitérer plusieurs fois la vérification du Quart-de-cercle avant & après chaque solstice, n'étant pas possible qu'un Instrument qu'on remue continuellement, & qui d'ailleurs est sujet à de légeres altérations causées par le chaud ou le froid, donne toujours parfaitement les hauteurs absolues, sans qu'il soit besoin d'avoir égard à quelques corrections, légeres à la vérité, mais qui peuvent devenir quelquefois assez sensibles. Or quand les plus petites erreurs s'accumulent toutes d'un même côté, il sera vrai de dire que la précision qu'on se flate d'obtenir avec les Quarts-de-cercle dans les hauteurs solstitiales, pourroit ne pas être absolument bien fondée, & qu'ainsi quoique l'obliquité de l'Ecliptique ne varie gueres d'une année à l'autre, il n'est pourtant pas impossible qu'on n'apperçoive un changement notable dans la hauteur solstitiale, de même qu'il doit arriver aussi qu'avec un semblable instrument on pourroit ne pas remarquer de différence sensible, quand même l'obliquité de l'Ecliptique varieroit de 5″ dans l'espace de quelques années.

Pour peu que l'on réitere la vérification des Quarts-de-cercle, on s'appercevra facilement, que l'axe de la Lunette ne fait pas toujours le même angle de 90 degrés, avec le premier point de la division.

Il n'en sera pas de même des observations faites au foyer du Verre objectif, si ce Verre &

le lieu où son image est projettée, sont à l'abri de toute insulte, & si le mur qui soutient l'équipage du Verre objectif, aussi bien que le pilier sur lequel est posé le Marbre du solstice d'Eté, ont une bonne fondation, & sont inébranlables. C'est ce que l'on peut dire avec assez de certitude du Portail Méridional de l'Eglise de Saint Sulpice, lequel a été fondé sur le roc il y a plus de vingt ans : & comme le lieu où tombe l'image du Soleil au solstice d'Eté, n'est pas sujet à s'affaisser comme il arrive à tous les planchers qui sont sur des voutes ; que le Marbre qu'on découvre seulement à Midi pendant le mois de Juin a été placé sur un très-gros pilier, & ne sçauroit tasser ayant été fondé en même tems que le Portail ; il est évident de-là que cet Instrument sera également propre à donner les Ascensions droites du Soleil à la fin du mois de Juin, qu'à indiquer sans erreur sensible les plus petites variations qui pourront arriver dans les hauteurs solstitiales du Soleil. On y a donc marqué soigneusement les termes de l'image au solstice d'Eté de l'année 1745 ; c'est-à-dire, qu'après avoir eu égard à la petite correction pour le mouvement du Soleil en déclinaison d'un jour à l'autre, on a déterminé avec le plus grand soin, le lieu où chaque bord du Soleil seroit parvenu, si le Soleil étant plusieurs jours de suite immobile au Tropique, son image eût été observée chaque fois sur la ligne Méridienne. Cela peut s'éxecuter d'une maniere si simple, que je n'en parlerai pas davantage.

Si le Gnomon de S. Sulpice n'avoit été extraordinairement solide, en vain auroit-on tenté d'y fixer un Verre objectif ?

En comparant dans la suite le lieu de l'image du Soleil, au terme fixe auquel cette image est parvenue au solstice d'Eté de l'année 1745, on pourra reconnoître par-là les variations qui ont dû arriver dans l'obliquité de l'Ecliptique.

j'avertirai seulement que le terme où le Soleil étoit parvenu l'année précédente, a paru le même que celui qu'on a fait enfin graver sur le Marbre au mois de Juin de l'année 1745.

Les Gnomons ne doivent pas être employés par les Astronomes, pour déterminer les hauteurs absolues, mais seulement des différences de hauteurs.

Voilà, ce me semble, l'utilité principale qu'on peut retirer des Gnomons perfectionnés de la maniere dont je viens de le décrire. C'est ainsi qu'on peut espérer d'en retirer quelqu'avantage dans la suite, sur-tout si l'on s'est proposé de reconnoître les variations auxquelles sont sujettes les hauteurs solstitiales. Car de vouloir employer les Gnomons pour déterminer exactement les hauteurs absolues*, cela paroît impraticable. Il faut dire cependant à l'avantage des Gnomons, que comme ces Instrumens peuvent se construire assez facilement dans chaque ville, rien ne paroît plus propre aux usages Géographiques, puisque le plus souvent celui qu'on aura élevé dans quelque grande salle ou dans son propre logis, & à la construction duquel on aura apporté tous les soins nécessaires, peut donner, à une minute ou demi-minute près, la Latitude du lieu, ce qui semble mériter l'attention des Voyageurs.

* *Voyez les Mém. de l'Ac. année 1703.*

Les hauteurs absolues qu'on voudroit conclurre par le moyen des Gnomons, peuvent servir néantmoins aux usages géographiques.

Il y a encore ceci à remarquer dans l'usage de ces sortes d'Instrumens, sçavoir, que si l'on avoit observé à un même Gnomon inébranlable, les termes de l'image, non pas du solstice d'Eté, mais du solstice d'Hiver, pendant un intervalle d'environ trente ans, comme l'image du Soleil est en ce cas jettée à une très-grande distance, & que les divisions sont pour lors très-distinctes

& beaucoup plus sensibles, on pourroit parvenir peut-être à découvrir par ce moyen si l'obliquité de l'Ecliptique a diminué réellement ; mais sans discuter ici si les deux derniers qu'on a construits, sçavoir, celui de S. Sulpice & celui de l'Eglise des Chartreux de Rome, sont plus propres à cette recherche que les autres, à cause de leur grande solidité, il y a une autre remarque plus importante à faire au sujet des observations du solstice d'Hiver, & à laquelle on n'avoit point encore eu égard. C'est que les réfractions paroissent fort inconstantes chaque année dans le mois de Décembre, même à l'instant du Midi, & cela à cause des variations subites où l'on passe du chaud au froid. Or, puisqu'il est nécessaire de reconnoître ces sortes d'inégalités dans les hauteurs Méridiennes, on doit donc conclurre que toutes les fois, qu'après avoir observé le solstice d'Hiver aux Gnomons ou avec des Quarts-de-cercle, on n'aura pas fait attention à l'état de l'air ou plutôt à l'inconstance des réfractions, la plûpart des observations, bien loin d'être décisives, ne sçauroient qu'à peine être de quelqu'usage. En 1743 à la fin du mois de Décembre l'air n'étant pas encore devenu sensiblement froid, & les nuages s'avançant le 28 à midi fort lentement par un vent de Sud-oüest, parce qu'un autre vent les poussoit en même tems au Sud-est, la réfraction parut changer tout-à-coup de 10″ à 12″ ; ce qui fut d'autant plus facile à reconnoître que le bord du Soleil étant placé sur le fil horisontal

Malgré la Pénombre, les Gnomons de St Sulpice & de Rome, peuvent être employés au solstice d'Hiver, à cause que l'image du Soleil est jettée à une très-grande distance, & que les divisions deviennent bien plus distinctes & plus sensibles.

Avant que de faire usage des observations faites au solstice d'Hiver, il faut faire attention à l'inconstance des Réfractions.

En France à l'inſtant du midi, on a vu quelquefois l'hiver, la Réfraction changer d'une maniere ſenſible.

de la Lunette, ce même bord s'en détacha tout-à-coup très-ſenſiblement, au lieu de le parcourir, comme cela doit arriver à l'ordinaire. Il ne paroît pas néceſſaire d'expliquer ici pourquoi dans l'eſpace d'une minute de tems le bord du Soleil ne ſçauroit quitter ce fil, ſi la réfraction eſt conſtante: cela ſe voit aſſez, étant facile à déduire des premiers principes de la Sphere, ſur-tout ſi l'on ſuppoſe que le plan du Quart-de-cercle, & par conſéquent ſa Lunette ſoit placée bien à plomb ſur la ligne Méridienne. Mais la différence ou eſpece de ſaut qu'on vit faire au bord du Soleil, parut alors ſi ſenſible, & même ſi extraordinaire, qu'on ne put s'empêcher d'aller promptement reconnoître ſi le fil à plomb qui pend du centre du Quart-de-cercle ne ſe ſeroit point dérangé du milieu d'un des points de la diviſion du Limbe où on avoit eu ſoin de le faire convenir d'abord. On trouva qu'il y répondoit encore de la même maniere qu'il y avoit été placé environ 7′ ou 8′ avant midi.

Ce phénomene avoit d'abord été remarqué dans les pays Septentrionaux.

Le même phénomene avoit été déja remarqué pendant le Voyage de Lapponie: mais il eſt à remarquer que le Soleil eſt ſi peu élevé l'Hiver dans ce climat à l'inſtant de Midi, & que les variations dans le froid paroiſſoient quelquefois ſi ſubites d'un inſtant à l'autre, qu'on en fut pour lors moins étonné; car le Soleil pendant l'Hiver eſt élevé à Paris d'environ 18 degrés à l'inſtant de midi. On avoit remarqué auſſi en Lapponie que le diametre apparent du Soleil s'enfloit,

pour

pour ainsi dire, & diminuoit ensuite assez subitement. Quand le vent est d'un seul côté, & que le Ciel se trouve fort serein, ces variations n'ont pas lieu: ainsi ces jours là doivent toujours être préférés, si l'on veut déterminer les hauteurs solstitiales. Les autres observations ne peuvent gueres être employées que pour la Géographie, sur-tout, si dans les voyages, en traversant les pays froids, le Soleil paroît quitter à midi le fil horisontal du Micrometre de la Lunette du Quart-de-cercle. Il n'y a pour lors d'autre moyen d'établir à peu-près la hauteur Méridienne du Soleil, que de prendre la quantité moyenne des différens résultats qu'on aura recueillis à midi, chaque fois que le bord du Soleil aura paru varier en traversant la Lunette immobile: il n'est pas moins évident qu'on doit dire la même chose des observations faites aux Gnomons.

Le diametre apparent du Soleil, lorsque cet astre est peu élevé sur l'horison, n'est pas également accourci à même degré de hauteur, par les réfractions.

Ces circonstances qu'on vient de rapporter semblent mériter tellement l'attention des Astronomes, qu'on ne doute pas qu'ils n'apportent désormais une attention particuliere au changement des réfractions. Il reste présentement à considérer les hauteurs solstitiales du Soleil observées à Paris depuis l'établissement de l'Académie des Sciences & de l'Observatoire, auquel tems on a commencé à appliquer les Lunettes d'Approche aux Quarts-de-cercle.

Je commencerai donc par exposer ici en peu de mots ce qui résulte de la comparaison des plus récentes & des plus anciennes observations.

Hauteurs méridiennes du bord supérieur du Soleil observées pour la premiere fois avec exactitude au solstice d'Été.

Si l'on prend un milieu entre celles que M. Picard a faites en 1675 & 1676, on trouve pour la hauteur du bord supérieur du Soleil au solstice d'Été 64° 55′ 15″ ou 10″ : elle a été établie dix ans après avec le même Quart-de-cercle par M. de la Hire de 64° 55′ 24″; mais il paroît par un examen plus particulier de l'état du Quart-de-cercle & par les observations de la hauteur du Pole, faites du côté du Nord, que l'erreur de cet Instrument n'avoit pas été tellement corrigée à l'horison, qu'on ne puisse supposer que sa Lunette n'y ait baissé d'environ 5″ du tems de M. Picard: au contraire il semble qu'elle y haussoit de quelques secondes en 1686, lorsque M. de la Hire a observé les plus grandes hauteurs Méridiennes au solstice d'Été. On pourroit donc établir la plus grande hauteur Méridienne apparente du bord supérieur du Soleil en 1675 de 64° 55′ 17″½ ou 20″, c'est-à-dire (à cause de l'erreur des divisions, de 25″ à 30″, dont il est parlé dans l'histoire céleste) de 64° 54′ 50″.

Hauteurs du même bord, observées au solstice d'Hiver.

Au solstice d'Hiver de la même année 1675 & de la précédente, le bord supérieur du Soleil (en prenant un milieu entre les observations) a paru élevé de 18° 00′ 05″ ou 15″; & en 1676, de trois observations faites au mois de Décembre, il y en a deux qui s'accordent à donner 18° 0′ 15″; mais la 3e ne paroît pas assez exacte, puisqu'elle donne la hauteur 30″ plus petite. On remarquera qu'il n'y a pas de correction bien sensible à faire ici, à cause de l'erreur des divisions, comme cela

ſe verra ci-après, lorſqu'il s'agira de comparer les obſervations de MM. de la Hire & de Louville, faites en 1715 : mais il ſemble d'ailleurs qu'on pourroit adopter 17° 00′ 15″ pour la hauteur apparente du bord ſupérieur du Soleil au tems du ſolſtice d'Hiver, puiſque ſi le Quart-de-cercle baiſſoit un peu, on a d'un autre côté la plûpart des hauteurs ſolſtitiales des deux premieres années plus foibles que celles de l'année 1676. De plus, en même tems qu'on voudroit diminuer la hauteur établie ci-deſſus, il faudroit par une autre raiſon l'augmenter, puiſque ſi l'on fait uſage des obſervations de M. de la Hire, ou de ce qui eſt rapporté au commencement de ſes Tables Aſtronomiques, la hauteur méridienne du Soleil ſeroit d'environ 10″ plus grande que celle qu'on vient d'établir ci-deſſus, ſçavoir, 18° 00′ 15″.

Hauteurs méridiennes obſervées en l'année 1741.

La hauteur du bord ſupérieur du Soleil au ſolſtice d'Été de l'année 1741 a été déterminée de 64° 54′ 30″, & au ſolſtice d'Hiver de 18° 00′ 35″. Quant à l'erreur, s'il y en a, elle ne va pas certainement à 5″, puiſqu'on a vérifié avec un ſoin tout particulier le Quart-de-cercle dont on s'eſt ſervi, & que l'une & l'autre de ces hauteurs s'accorde aſſez avec ce qui a été conſtaté par pluſieurs Aſtronomes de l'Académie des Sciences. Conſidérant donc que ces deux hauteurs ne different que très-peu, quoique aſſez également, de ce qui a été obſervé autrefois, il s'enſuit que l'obliquité de l'Ecliptique n'a pas varié à beaucoup près auſſi ſenſiblement qu'on l'a prétendu

Il ſembleroit que la diſtance des Tropiques auroit un peu diminué dans un intervalle de plus de 60 ans.

jusqu'ici, puisque dans un intervalle de tems, qu'on peut regarder comme les deux tiers d'un siecle, à peine trouve-t-on 20″ de différence, lorsque selon l'opinion vulgaire l'obliquité de l'Ecliptique auroit dû diminuer deux fois autant, c'est-à-dire, de 40″ au moins.

Des différences plus petites, qui auroient été remarquées dans un moindre intervalle de tems, peuvent être facilement attribuées au défaut des instrumens.

On objectera peut-être ici à peu-près la même chose qu'on a alléguée ci-dessus, lorsqu'il a été question des avantages qu'on doit retirer du Verre objectif fixé à un Gnomon solide & inébranlable, sçavoir que pour parvenir à décider, s'il est arrivé quelque variation dans les hauteurs solstitiales, il vaudroit mieux n'y employer que des différences observées à un même Instrument, & non pas rechercher les véritables hauteurs, qui sont des quantités absolues qu'il est toujours difficile d'obtenir, si ce n'est après bien des réductions. Mais il est aisé de répondre à cette difficulté, puisque les observations dont on vient de faire usage, sont des plus éloignées; en sorte que l'objection n'a plus la même force ici, que s'il s'agissoit de petits intervalles de tems, pendant lesquels il ne paroît pas possible de pouvoir distinguer les différences réelles, d'avec les plus petites erreurs accumulées, tant de la part des observations, que des vérifications qu'il faut faire des Instrumens dont on s'est servi.

Cependant comme il pourroit rester encore quelque scrupule, tant sur les erreurs des divisions des Instrumens, que sur les corrections qu'on a été obligé d'employer, j'examinerai ici ce qui

résulte des observations faites au solstice d'Eté avec un seul & même Instrument, & cela dans l'intervalle de tems rapporté ci-dessus, auquel cas les mêmes erreurs ne seront plus tant à craindre. On en exceptera tout au plus celles qui ont dû provenir de la négligence de l'Observateur, lorsqu'il a fallu vérifier son Quart-de-cercle à l'horison: mais comme cette vérification a été faite de la même maniere & à un même objet, il semble qu'on peut répondre de 5″ sur toute la différence des hauteurs solstitiales, d'autant mieux qu'il ne s'agit plus ici de hauteurs absolues. En 1739 la hauteur apparente du bord du Soleil a paru avec l'ancien Quart-de-cercle au solstice d'Eté de 64° 55′ 00″, ou 64° 54′ 55″: & parce qu'elle avoit été observée en 1675 de 64° 55′ 17″½, ou 20″, la différence est donc de 20″ dans un intervalle de 64 ans. Nous n'insisterons pas sur les hauteurs observées vers le solstice d'Hiver, puisqu'elles pourroient paroître à quelques-uns trop peu exactes: mais il convient de rapporter celles que MM. de la Hire & de Louville ont faites aux solstices d'Hiver & d'Eté de l'année 1715, c'est-à-dire, lorsque la dispute commençoit à s'élever entr'eux touchant la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique. Or, on peut conclurre d'abord des observations faites avec l'ancien Quart-de-cercle au mois de Décembre par M. de la Hire, la hauteur solstitiale du bord supérieur du Soleil de 17° 00′ 35″, ou 45″: elle avoit été établie en même tems par M. de

Variations dans les hauteurs du solstice d'Eté observées depuis plus de 60 ans avec un seul & même instrument.

Les Quarts-de-cercle de MM. de la Hire & de Louville s'accordoient assez à donner une même hauteur au tems du solstice d'Hiver.

Louville de 17° 00′ 43″, en prenant un milieu entre ses observations. Ainsi les deux Quarts-de-cercle s'accordoient assez à ce degré de hauteur: mais au solstice d'Eté de la même année M. de Louville avoit déterminé la hauteur du bord inférieur du Soleil de 64° 22′ 53″; ce qui donne, en y ajoutant le diametre du Soleil 31′ 40″, la hauteur du bord supérieur de 64° 54′ 33″, conformément aux observations de l'année suivante 1716, lorsque par des observations immédiates du bord supérieur, la plus grande hauteur solstitiale a été déterminée de 64° 54′ 34″. Comme l'erreur des divisions ne paroît pas tout-à-fait proportionnelle sur le Quart-de-cercle de M. de la Hire (ainsi qu'on l'a reconnu après avoir corrigé, comme il est rapporté dans l'Histoire Céleste, les différentes hauteurs observées, selon que cet Instrument s'est trouvé hausser plus ou moins à l'horison) nous croyons devoir supposer qu'à 18° l'erreur n'est qu'insensible, & qu'à peine en faudra-t-il retrancher quelques secondes; qu'à 65° la correction soustractive est de 25″ à 30″; & qu'enfin au zénit elle se trouve assez exactement d'une minute. Corrigeant donc suivant cette supposition la hauteur du bord supérieur du Soleil, déterminée par M. de la Hire au solstice d'Eté 1715 de 64° 55′ 15″, ou 5″; il s'ensuit que le même bord auroit paru élevé de 64° 54′ 42″½ tout au plus; ce qui s'accorde assez avec les observations de M. de Louville.

En corrigeant les erreurs des divisions du Quart-de-cercle de M. de la Hire, on trouve au solstice d'Eté 1715 la même hauteur que celle qui a été déterminée par M. de Louville.

Cependant, comme par un examen particulier

des diverſes circonſtances auxquelles on ne ſçauroit ſe diſpenſer d'avoir égard dans la recherche de ces ſortes d'obſervations, il m'a paru que M. de Louville, dont j'ai conſulté les Regiſtres, n'avoit pas aſſez vérifié ſon Quart-de-cercle à l'horiſon; & comme il s'en faut bien d'ailleurs que nous n'ayons une certitude complete de la juſteſſe des diviſions de cet Inſtrument, je ſerois porté à croire (malgré l'obſervation du ſolſtice d'Eté) que la hauteur du Soleil, obſervée en Hiver par cet Aſtronome, eſt un peu trop grande, autrement l'obliquité de l'Ecliptique auroit augmenté depuis l'année 1715, ce qui n'eſt pas vraiſemblable.

La hauteur méridienne du Soleil déterminée par M. de Louville au ſolſtice d'Hiver, paroît un peu trop grande.

On a bien remarqué annuellement depuis l'année 1738* quelques inégalités dans les hauteurs ſolſtitiales: mais quoique ces inégalités paroiſſent dépendre de pluſieurs cauſes, on peut dire cependant que celle qui eſt la plus conſidérable, & qui eſt périodique, n'a dû influer qu'inſenſiblement ſur les hauteurs dont on a fait uſage ci-deſſus. Quant aux deux autres inégalités qu'on y ſoupçonne, & qui peut-être n'ont pas encore été aſſez reconnues pour paroître évidentes à tous

Il y a diverſes inégalités dans les hauteurs ſolſticiales, & que l'on ſçait ne devoir point être attribuées aux erreurs des obſervations.

* Dans le diſcours de M. de Maupertuis ſur la Meſure du Degré du Méridien au Cercle Polaire, & qui eſt à la tête du Livre de la Figure de la Terre déterminée, &c. Il eſt dit page 44. qu'outre l'Aberration, M. Bradley a obſervé un autre mouvement particulier dans les Etoiles fixes; & l'on ſçait aujourd'hui que cela dépend de quelques inégalités dans la Préceſſion de l'Equinoxe. Mais M. Bradley a obſervé auſſi un autre mouvement apparent, plus extraordinaire, & qui paroît périodique: on le remarque principalement dans les déclinaiſons des Etoiles ſituées vers le colure des Solſtices.

les Aſtronomes, il eſt certain que ſi elles ont lieu dans la nature, il s'en faut bien qu'elles ſoient aſſez conſidérables pour que la premiere dégagée de la ſeconde *, nous faſſe appercevoir dans l'eſpace de trente ans quelque diminution ſenſible dans l'obliquité de l'Ecliptique. C'eſt pourquoi l'augmentation apparente dans la hauteur ſolſtitiale du mois de Décembre de l'année 1715, laquelle ſe remarque principalement dans l'obſervation de M. de Louville, ſemble devoir être plutôt attribuée à l'erreur des obſervations, qu'à quelque cauſe inconnue : enfin on ne peut pas ſoupçonner qu'elle ait été produite par une trop grande réfraction, puiſque les obſervations des années 1716 & 1717 s'accordent avec celles de l'année 1715, & qu'il s'en trouve même qui donneroient la hauteur ſolſtitiale un peu plus grande.

* *Prix de l'Acad. Année 1740. page 200.*

L'obliquité de l'Ecliptique a été établie un peu trop petite par M. de Louville.

Il eſt aiſé d'appercevoir par-là la vraie raiſon pourquoi M. de Louville avoit établi l'obliquité de l'Ecliptique ſi petite, ſçavoir de 23° 28′ 24″.

C'eſt une choſe remarquable que la plûpart des Aſtronomes qui ont adopté après M. de Louville l'opinion ancienne touchant la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique, ayent tenté juſqu'ici de prouver la diminution de cette obliquité, à raiſon d'une minute, & même 1′ 10″ en cent ans ; tandis que ni l'obliquité apparente, ni même la diſtance des Tropiques (qui en eſt le double) & qui a été obſervée par M. de Louville, n'auroit aucunement changé depuis 1715 juſqu'en 1739. Car on eſt aſſez porté à en tirer cette concluſion, ſi l'on

ſi l'on vient à ſuppoſer que les obſervations faites de part & d'autre ſont aſſez certaines. Mais ſelon M. de Louville la diſtance des Tropiques auroit dû diminuer au moins de 25″.

L'hypotheſe de la diminution de l'obliquité de l'Ecliptique, à raiſon d'une minute en 100 ans, doit donc être rejettée, puiſqu'en effet s'il y a quelque diminution, il s'en faut bien qu'elle ſoit auſſi ſenſible qu'on l'a prétendu juſqu'ici, les plus anciennes obſervations étant trop défectueuſes pour être comparées aux plus récentes. Il ſuffit donc d'avoir expoſé le moyen le plus avantageux de retirer quelque lumiere des obſervations modernes comparées les unes avec les autres, & d'avoir expoſé en même tems ce que l'on doit attendre des obſervations faites en Orient par les Arabes.

Les obſervations faites au ſolſtice d'Hiver par Tycho, ne ſçauroient gueres être employées à déterminer la diſtance des Tropiques.

Il n'eſt pas moins évident, après ce qui vient d'être remarqué ci-deſſus, que les obſervations de Copernic & de Tycho faites au ſolſtice d'Hiver, ne ſçauroient être employées à cette recherche, puiſque ſans trop inſiſter ſur ce qu'elles ont été faites avec des pinnules, ou qu'elles ne ſont pas aſſez anciennes relativement aux nôtres, on doit d'abord conſidérer non-ſeulement que les réfractions ont pu être variables, lorſqu'on a obſervé le Soleil à midi au mois de Décembre dans les pays ſeptentrionaux, mais principalement que la quantité de la réfraction n'eſt pas aſſez connue dans ces climats. En effet, ſuivant les obſervations faites à Upſal en 1739, la réfrac-

tion paroît beaucoup plus grande dans cette ville qu'en France à l'Observatoire Royal.

Outre les observations de la distance des Tropiques, déterminée par les Arabes, dont nous avons assez parlé ci-dessus, & qui pourroient faire soupçonner quelque diminution assez lente dans l'obliquité de l'Ecliptique, il nous reste à examiner le changement de Latitude des Etoiles situées proche le colure des solstices. Les Anciens ont supposé ces Latitudes invariables: mais Tycho ayant reconnu le contraire, s'étoit d'abord imaginé que leur variation étoit conforme au sentiment de ceux qui admettent la diminution de l'angle ou obliquité de l'Ecliptique à l'Equateur. Cependant il paroît qu'on ignore la cause générale du mouvement de ces Etoiles en Latitude, & M. Halleï a fait voir en 1718 que l'opinion de Tycho sur la cause de ce changement, n'étoit pas assez bien fondée, puisque la Latitude de Syrius, par exemple, au lieu d'avoir diminué depuis Hipparque ou depuis Tycho jusqu'à présent, a augmenté * au contraire d'une quantité assez sensible pour devoir être remarquée de tous les Astronomes.

Les changemens qu'on a déja remarqués dans les Latitudes des Etoiles ne prouvent aucunement que l'obliquité de l'Ecliptique ait diminué.

Si l'on suppose d'après les observations, que

* Cette augmentation dans la Latitude de Syrius, bien loin d'être contestée, se trouve aujourd'hui d'autant mieux établie, qu'il est aisé de la déduire de la comparaison immédiate des plus anciennes observations de MM. Picard & de la Hire, rapportées dans l'Histoire Céleste, avec celles de M. de Louville & des autres Astronomes qui se trouvent répandus dans presque toute l'Europe. Voyez ce changement de Latitude de Syrius dans la Table ci-après pag. 398. & ce qui a été dit par M. Halleï, *Transact. Philos.* n° 355.

la variation des Etoiles en Latitude ait été uniforme & d'un même sens pour certaines Etoiles, à chaque siecle depuis Hipparque jusqu'à ce jour, en vain expliquera-t-on ce phénomene par l'action de très-grosses Planetes sur chacun de ces Soleils, autour desquels on les supposeroit tourner. Nos deux grosses Planetes Jupiter & Saturne peuvent bien déplacer le Soleil de son diametre, lorsqu'elles se trouvent en conjonction : mais notre Soleil vû d'une Etoile fixe, n'ayant aucun diametre apparent, son mouvement autour du centre commun de gravité, ne seroit aucunement sensible. Cependant quand même il seroit de quelques secondes, la conjonction de Saturne à Jupiter s'achevant tous les vingt ans, il s'ensuivroit que le déplacement apparent du Soleil vû des Etoiles, seroit périodique; en sorte que se faisant alternativement en sens contraires, il ne seroit pas nécessaire d'attendre dans le cas de notre système solaire un peu plus de 59 ans, ou bien la 43e conjonction, c'est-à-dire, lorsqu'après 853 ans Saturne doit se retrouver en conjonction avec Jupiter aux mêmes points du Zodiaque.

Selon la théorie de la Gravitation, Saturne & Jupiter ne peuvent déplacer le Soleil que d'environ son diametre.

Ces considérations suffisent pour nous faire comprendre combien il est difficile d'expliquer les mouvemens particuliers & sensiblement uniformes des Etoiles, soit en Latitude, soit en Longitude; comme aussi d'assigner la raison pourquoi ces mouvemens sont extraordinairement lents, & pourquoi Arcturus a changé sa Latitude d'une quantité aussi considérable depuis

près de deux mille ans, puiſque la différence monte à plus d'un demi-degré.

Après avoir établi les principaux Elémens de de l'Aſtronomie moderne, je pourrois m'étendre préſentement ſur ce qui regarde les effets de l'Aberration dans les lieux apparens des Planetes*, comme auſſi ſur les divers mouvemens que l'on découvre annuellement dans la poſition des Etoiles : mais cette matiere exigeroit un trop long détail. D'ailleurs les principaux faits n'étant pas aſſez généralement connus de tous les Aſtronomes, il faudroit de néceſſité commencer par les bien établir ; car ſans cela ceux qui voudroient entreprendre de les conteſter, répandroient infailliblement pluſieurs doutes, & enfin beaucoup d'obſcurité ſur la matiere. C'eſt pourquoi nous nous bornerons au changement de Latitude des Etoiles, lequel après une longue ſuite d'années devient beaucoup plus ſenſible. Sans donc nous trop attacher aux cauſes particulieres qui le produiſent & qui nous ſont encore inconnues, ſi l'on veut y avoir égard, il faut obſerver que l'obliquité de l'Ecliptique venant à diminuer, doit y apporter auſſi une autre ſorte de mouvement apparent ; de maniere que pour décompoſer, pour ainſi dire, ces variations en Latitude, il faudra tenir compte du changement de l'obliquité de l'Ecliptique, ou bien choiſir, pour l'éviter (ce qui eſt le cas le plus ſimple) les Etoiles ſituées proche le colure des Equinoxes, ainſi qu'on l'a pratiqué à peu-près, lorſqu'on a examiné les variations dans la Latitude d'Arcturus.

* *En attribuant à la Terre le mouvement horaire de la Planete, réduit à l'Ecliptique.*

On explique ici les moyens de découvrir les mouvemens qui ſont propres ou particuliers aux Etoiles.

Les longitudes & Latitudes des Etoiles rapportées ci-après pag. 398 ont été restituées nouvellement avec tant de soin & d'exactitude, (comme cela se voit dans l'Histoire Céleste) qu'à peine l'erreur peut-elle monter à quelques secondes, au lieu que dans les Catalogues de Flamsteed & de M. de la Hire il y a quelques-unes de ces mêmes Etoiles de la 1re ou 2e grandeur dont les ascensions droites & déclinaisons ont été trop peu soigneusement recherchées, & qui different quelquefois de 2′ ou 3′ d'avec les véritables. La raison n'en est pas fort difficile à découvrir.

Erreurs dans la position de quelques-unes des Etoiles de de la 1ere & 2e grandeur.

D'aussi grandes différences dans la position de quelques Etoiles de ces Catalogues auroient pu influer dans la position des Planetes qui leur ont été comparées, si l'on n'avoit eu soin de se précautionner contre ces positions douteuses. Mais quelles que soient les erreurs des Catalogues, il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de deux ou trois minutes dans les longitudes des Planetes supérieures qui ont été comparées aux Etoiles, mais de quarts ou tiers de degré, dont les Tables les plus récentes s'écartent des observations, ce qui s'observe principalement dans la Planete de Saturne.

Ces erreurs n'ont influé qu'insensiblement sur les différences excessives qu'on trouve entre les Tables & l'observation du lieu de Saturne.

Cela vient de l'action mutuelle des deux Planetes Jupiter & Saturne, laquelle a été enfin reconnue; en sorte que la théorie de ces deux Planetes est devenue aussi difficile que celle de la Lune, & se trouve en effet bien moins avancée; car d'après les Elémens donnés par M. Newton

les nouvelles Tables de la Lune que l'on a construites, représentent communément à une ou deux minutes près, le vrai lieu de la Lune ; & la plus grande erreur de ces Tables ne sçauroit excéder 5 minutes. Mais on n'a pas encore construit pour Saturne & Jupiter les différentes Tables, où se trouvent la plûpart des équations qui dépendent (comme cela se voit dans celles de la Lune) de la théorie de la gravitation.

L'Astronomie Planétaire n'est pas encore fort avancée.

Les Astronomes ayant déja remarqué vers la fin du dernier siecle & au commencement de celui-ci un rallentissement apparent dans le moyen mouvement de Saturne, & les époques des moyens mouvemens de toutes les Tables Astronomiques étant devenues par-là trop peu exactes, il est à propos d'examiner ici avec le plus grand soin la quantité du moyen mouvement qui répond aux derniers siecles ou demi-siecles écoulés ; ce qui est absolument nécessaire si l'on veut entreprendre de restituer ces époques & déterminer enfin les Longitudes de Saturne, de maniere qu'elles ne different plus des observations d'une quantité si énorme, que celle qu'on remarque actuellement dans les calculs ordinaires ou dans les Ephémérides.

Les Tables Astronomiques & les Ephémérides donnent fort imparfaitement le lieu des Planetes supérieures.

Il est donc à propos de commencer par vérifier le moyen mouvement de Saturne, en se servant des observations qui ont été faites lorsque cette Planete s'est trouvée à même configuration avec le Soleil & Jupiter, au tems de son opposition, & qu'elle paroissoit en même tems dans

Circonstances essentielles à la recherche

ſes moyennes diſtances du même côté de l'Aphélie : on verra par-là que Saturne acheve ſa révolution quelques jours plus tard que ſelon les Tables Rudolphines de Képler. Comme cette Période du retour de Saturne vers les mêmes points du Zodiaque, au tems de ſon oppoſition au Soleil s'acheve en 59 ans, nous conſidérerons d'abord les obſervations faites à Dantzic par Hévélius, l'unique Aſtronome de ce tems-là qui ait publié ſes obſervations ſur Saturne, ayant meſuré pluſieurs fois les diſtances de cette Planete aux Etoiles depuis le 14 Septembre juſqu'au 25 du même mois.

du moyen mouvement de Saturne.

Le 21 Septembre à $8^h\ 48'\frac{1}{2}$ de tems vrai, la diſtance de Saturne * à la Luiſante du Bélier étoit de $36°\ 31'\ 30''$, & à $9^h\ 54'$ ſa diſtance à Markab ou α de Pégaſe, étoit de $23°\ 59'\ 10''$: mais à cauſe de l'accourciſſement cauſé par les réfractions, ſuppoſons que les diſtances apparentes ſoient changées en véritables, ſçavoir $36°\ 32'\ 02''\frac{1}{2}$, $24°\ 00'\ 05''$; & ayant égard au mouvement de Saturne dans l'eſpace de $1^h\ 5'\frac{1}{2}$, ſa vraie diſtance à la Luiſante du Bélier, auroit été à $9^h\ 54'$ de $36°\ 32'\ 12''\frac{1}{2}$. Partant on a la Longitude Géocentrique de Saturne ♑ $28°\ 38'\ 09''\frac{1}{2}$, avec une Latitude Méridionale de $2°\ 36'\ 22''\frac{1}{2}$. On s'eſt ſervi pour faire ce calcul, des poſitions rectifiées des Etoiles qu'on trouve ci-après, pag. 398 : on a ſuppoſé auſſi la préceſſion annuelle de l'Equinoxe de $0'\ 50''$, l'obliquité de l'Ecliptique de $23°\ 28'\ 50''$, & même on a jugé à propos de te-

* *Machina Cœleſtis, lib. II. & III. pag. 608. & 96.*

Calcul des obſervations faites à Dantzic par Hévélius en 1672.

nir compte de l'Aberration de ces Etoiles. Ainsi la Longitude Apparente de α du Bélier étoit alors ♉ 3° 05′ 17″, & sa Latitude Boréale 9° 57′ 25″ : celle de Markab ou α de Pégase ♐ 18° 55′ 11″½, & sa Latitude Boréale 19° 24′ 52″½. Enfin supposant le lieu de la Terre qui est opposé au vrai lieu du Soleil ♐ 29° 33′ 08″, & les distances au Soleil connues de la Terre & du lieu de Saturne réduit au plan de l'Ecliptique, on en a déduit la Parallaxe du grand orbe de 5′ 48″ ; d'où l'on a conclu la Longitude Héliocentrique de Saturne ♐ 28° 43′ 57″½ le 21 Septembre 1672 à 8ʰ 40′½ de tems moyen au Méridien de Paris.

Observations correspondantes dans les moyennes distances de Saturne, faites à Paris en 1731.

En 1731 le 23 Septembre Saturne observé à Paris étoit en opposition au Soleil à 14ʰ 45′, de tems moyen ♈ 0° 29′ 35″ ; ce qui a été conclu de diverses observations faites à 10ʰ du soir, en le comparant à quelques Etoiles du Zodiaque de Senex dont on a restitué peu de tems après l'Ascension droite & la Déclinaison. Mais faisant les réductions nécessaires, & ayant calculé avec le plus grand soin toutes les observations, comme aussi ayant égard à l'Aberration & à la Précession des Equinoxes, je trouve que le même jour à 8ʰ 40′½ de tems moyen (le lieu du Soleil étant selon les Tables de Flamsteed corrigées ♈ 0° 14′ 40″) la Longitude Héliocentrique de Saturne étoit ♈ 0° 29′ 5″, & sa Latitude au même instant vue de la Terre 2° 36′ 05″ Méridionale. Il est aisé de reconnoître par-là que Saturne dans l'espace de 59 années Juliennes & un jour a parcouru

parcouru outre deux révolutions entieres 1° 45′ 07″½, ou plus exactement 1° 44′ 50″ par son moyen mouvement, si l'on a égard à la réduction & à quelques petites différences entre le moyen & le vrai mouvement de la Planete, comme n'étant pas alors précisément dans ses moyennes distances.

Le moyen mouvement de Saturne est trop rapide selon les Tables de Képler & de Street.

Les Tables Rudolphines & Carolines donnent pendant le même intervalle de tems (lequel excede à peine deux révolutions entieres) le mouvement de Saturne plus rapide de 7′½; c'est-à-dire, qu'il s'ensuivroit des observations qu'on vient de rapporter, que la révolution de Saturne sur son orbite a dû s'achever près de deux jours plus tard que selon les Tables de Képler & de Street.

Il s'en faut bien qu'on parvienne à conclurre un même moyen mouvement de Saturne, ou le même tems de sa révolution, par les observations faites dans l'autre demi-cercle d'anomalie, lorsque Saturne s'est trouvé dans ses moyennes distances en 1686 & en 1745; car dans le tems des observations ci-dessus, Jupiter se trouvoit fort éloigné, étant presque en opposition avec Saturne, & au contraire à peine en étoit-il distant d'un signe & demi au tems des observations que nous allons rapporter. On peut remarquer aussi que la distance de ces deux Planetes, vue du Soleil dans le dernier cas, n'a pas été sensiblement la même, puisqu'en 1686 Jupiter étoit plus avancé en longitude d'environ 47°½, mais seulement de 40° au mois de Mars de l'année derniere.

Autres observations de Saturne dans ses moyennes distances.

Le 9 Mars 1686 à $12^h\ 31'\frac{1}{3}$ de tems moyen la longitude géocentrique de Saturne, déduite des observations de M. de la Hire étoit ♍ 27° 18′ 37″ avec une latitude boréale de 2° 37′ 06″. Si l'on suppose le lieu du Soleil selon les Tables de Flamsteed corrigées, & par conséquent le lieu de la Terre qui lui est opposé ♍ 19° 52′ 50″, on aura la longitude héliocentrique ♍ 26° 32′ $04''\frac{1}{2}$: de même le 18 Mars la longitude géocentrique de Saturne étoit à $12^h\ 4'\ 07''$ de tems moyen ♍ 26° 37′ $12''\frac{1}{2}$ & partant la longitude héliocentrique ♍ 26° 50′ 55″. On peut donc conclurre de ces observations le tems de l'opposition de Saturne au Soleil le 16 Mars 1686 à $11^h\ 10'\frac{1}{2}$ de tems moyen, sçavoir ♍ 26° 46′ $38''\frac{1}{2}$.

En 1745 le 18 & 21 Mars ayant observé Saturne à son passage au méridien, & l'ayant comparé à Arcturus & à l'Etoile η de la Vierge, j'ai déterminé le tems de son opposition le 18 à $10^h\ 37'\frac{1}{2}$ de tems moyen, le lieu de la Terre & de cette Planete étant ♍ 28° 26′ 10″.

Grandes inégalités dans les révolutions de Saturne sur son orbite.

Or, il est visible par-là que les révolutions de Saturne sur son orbite sont très-inégales, puisque dans le dernier intervalle de 59 années Juliennes & un jour, cette Planete par son moyen mouvement auroit parcouru outre deux révolutions entieres 1° 39′ $02''\frac{1}{2}$, au lieu de 1° 44′ 50″ qu'on a trouvés ci-dessus; c'est-à-dire, environ 15′ de moins que selon les Tables de Kepler & de Street, & le double du résultat précédent.

Voyant donc que les révolutions de Saturne sur

ſon orbite étoient trop ſenſiblement inégales, & qu'il étoit comme impoſſible d'en fixer le moyen mouvement à la maniere des anciens Aſtronomes, je me ſuis propoſé, pour parvenir à la conſtruction des nouvelles Tables de Saturne, de l'établir d'abord d'une maniere plus générale, en prenant pour moyen mouvement celui qui doit tenir à peu près un milieu entre les moyens mouvemens les plus lents & les plus accélérés ; d'où il réſulte que le moyen mouvement de Saturne demande à être corrigé par différentes Tables d'équations, de même qu'il a fallu le pratiquer à l'égard de la Lune. Cette théorie qui n'eſt encore qu'ébauchée, ſera facile à déduire des obſervations que nous allons rapporter.

Le moyen mouvement de Saturne doit être conſidéré d'abord d'une maniere générale.

Il reſte auſſi à développer de quelle maniere je ſuis parvenu à reconnoître les retours des inégalités de Saturne ſur ſon orbite, & comment à l'aide des obſervations & d'un même aſpect de Saturne à l'égard de Jupiter aux mêmes points de ſon orbite, on peut prédire aſſez juſte l'erreur des Tables, qui ſans cela ſeroit exceſſive dans bien des cas particuliers.

Comment on peut connoître les retours des inégalités du vrai mouvement de Saturne.

Si l'on conſidere ici les obſervations que ſont obligés de faire les Aſtronomes ou les Navigateurs, on conviendra bientôt que faute d'un tems aſſez ſerein, ils n'ont quelquefois d'autre reſſource pour connoître le lieu de la Lune, que de meſurer ſa diſtance à Saturne ou à Jupiter. Mais cela ſuppoſe, comme l'on voit, que le lieu de ces Planetes calculé par les Tables, ſoit donné auſſi

Utilité de cette recherche pour la ſcience des longitudes.

exactement que celui des Etoiles fixes; ou du moins, que l'erreur ne surpasse jamais une minute, comme il arrive lorsqu'on fait usage des Tables du Soleil. Cependant comme il est certain que non-seulement il s'en faut bien qu'on soit parvenu à perfectionner les Tables des Planetes autant que celles du Soleil, mais même que celles de Saturne pendant des années entieres, sont beaucoup plus défectueuses que les Tables de la Lune; qu'en un mot, de tous les mouvemens des Planetes ceux de Saturne & de Jupiter sont encore aujourd'hui les moins connus; envain recherchera-t-on le lieu de la Lune en mer, en le comparant à ces Planetes, tant que nous en ignorerons les inégalités & les regles de leur mouvement.

Le lieu des Planetes n'est pas à beaucoup près aussi exactement connu que celui des Etoiles ou du Soleil.

Voici d'abord ce qui s'est présenté à mes recherches au sujet de ces erreurs du mouvement de Saturne: en 1686 on trouve, comme il a été déja dit, que la longitude héliocentrique de Saturne étoit ♍ 26° 46′ 38″½ & que les Tables Caroline la donnoient plus avancée de 0° 21′ 09″. De même en 1745 la longit. de Saturne étoit ♍ 28° 26′ 10″, & les Tables la donnent plus avancée de 0° 36′ 12″½. Dans l'un & l'autre cas, la Planete se trouvant dans ses moyennes distances, auxquels points l'équation de son orbite a été la plus grande, ou à très-peu-près, il n'y a point d'erreur sensible à craindre dans la recherche de son moyen mouvement, quand même on ignoreroit & le mouvement & la situation de son Aphélie. Mais il suit de-là qu'en l'année 1716 lorsque Saturne a

Il importe peu que l'Aphélie ait un mouvement réel ou qu'il soit fixe dans le Ciel étoilé, lorsqu'on recher-

passé semblablement dans les mêmes points de son orbite, l'erreur des Tables auroit dû se trouver moyenne entre les deux résultats rapportés ci-dessus; c'est-à-dire qu'on la devoit trouver d'environ $28'\frac{1}{2}$; car à moins que l'action de Jupiter sur Saturne n'ait troublé le mouvement de celui-ci, il n'y a pas de raison pour que l'erreur des Tables soit plus ou moins grande que les $28'\frac{1}{2}$ qu'on vient de conclurre pour l'année 1716. Cependant on trouve que Flamsteed dans son Histoire Céleste établit la longitude géocentrique de $\flat \simeq 4° 15' 06''$ le 6 Mars à $12^h 28'$ de tems vrai; & supposant le lieu du Soleil corrigé pour le même instant $\curlyvee 27° 33' 01''$, & par conséquent la parallaxe du grand orbe de $41' 50''$, on en déduit la longitude héliocentrique de Saturne $\simeq 3° 33' 15''$ plus avancée de $36'\frac{1}{3}$ que selon les Tables Carolines.

che le moyen mouvement d'une Planete par des observations faites dans ses moyennes distances, vers les mêmes points de son orbite.

Il est donc certain que c'est en vain qu'on voudroit conclurre le vrai lieu de Saturne, des observations faites 29 à 30 ans auparavant dans les mêmes points de son orbite, & qu'on ne peut se dispenser de reconnoître une inégalité dans son moyen mouvement, laquelle dépend de l'action de Jupiter sur cette Planete; car comment expliquer sans cela l'erreur de $8'$ dans son moyen mouvement, c'est-à-dire la différence de $28'\frac{1}{2}$ à $36'\frac{1}{3}$ qu'on vient de trouver en comparant les trois observations ci-dessus, sçavoir lorsque Saturne s'est trouvé à chaque période vers les mêmes points de son orbite?

On prouve ici par les observations que l'action de Jupiter sur Saturne est très-sensible.

En vain conclurroit-on l'erreur des Tables des observations de Saturne, faites aux mêmes points de son orbite, pendant la révolution précédente.

Une preuve qui peut-être achevera de convaincre que cette inégalité a dû provenir de l'action de Jupiter sur Saturne, c'est qu'en comparant alternativement trois positions semblables de Saturne aux mêmes points de son orbite, lorsque cette Planete s'est trouvée à même configuration avec Jupiter, le moyen mouvement de Saturne n'est plus sujet à ces sortes d'inégalités, mais paroît uniforme ou proportionnel. Cela est facile à prouver si l'on se donne la peine de calculer les observations des années 1598 & 1657 où l'on trouve selon les observations de Tycho faites le 13 Mars v. st. à $11^h\frac{1}{2}$ à Wandesbourg*, c'est-à-dire, à $11^h\,01'$ de tems vrai au Méridien de Paris la longitude héliocentrique de Saturne ♎ 0° 39′ 35″ mais selon les Tables Carolines 2′ 00″ plus avancée : semblablement, ayant restitué les lieux des Etoiles fixes, je trouve, par les observations de Riccioli, qui répondent au 22 Mars 1657 à 9^h $22'\frac{1}{2}$ de tems vrai au Méridien de Paris, la longitude héliocentrique de Saturne ♎ 2° 11′ 05″, & l'erreur dont les Tables Carolines donnent le lieu trop avancé de 20′, ce qui s'accorde assez à donner le moyen mouvement proportionnel, si on le compare aux observations de l'année 1716, l'erreur des Tables ayant été conclue, comme nous l'avons déja dit, de $36'\frac{1}{3}$.

L'action de Jupiter sur Saturne est prouvée d'une maniere encore plus générale.

* *Le 15 à $10^h\,59'$ du soir la vraie distance de ☿ à ♃ étoit 18° 37′ 10″, & sa Décl. Bor. 2° 19′ 30″.*

Enfin, pour confirmer de plus en plus ce que nous venons d'établir jusqu'ici, & constater en même tems ce qui doit nous conduire à la recherche du moyen mouvement de Saturne ; pour con-

En corrigeant le moien mouvement des Tables, les mêmes erreurs du mouvement vrai de

noître, dis-je, quel a été ce moyen mouvement dans l'espace de près de deux siecles, & prédire, par exemple, les erreurs des Tables pour l'année 1762, je donnerai les longitudes de Saturne, restituées comme ci-dessus d'après les observations immédiates & les nouvelles positions du lieu des Etoiles (c'est-à-dire, plus exactement que n'ont pu le pratiquer Tycho & ceux qui l'ont suivi) en choisissant pour cet effet trois positions semblables de Saturne sur son orbite vers le tems de sa conjonction à Jupiter.

Saturne, ne se répetent aux mêmes points de son orbite, que quand cette Planete reparoît à même configuration avec Jupiter.

En 1583 le 4 Septembre au soir à $9^h\,25'$ de tems vrai à Uranibourg la longitude héliocentrique de Saturne étoit $\leftmoon\,19°\,55'\,09''$, les Tables Caroline la donnent moins avancée de $3'\,10''$.

En 1642 le 13 Septembre à $11^h\,25'$ de tems vrai, réduisant au Méridien de Paris, je trouve la longitude héliocentrique de Saturne $\leftmoon\,21°\,37'\,17''\frac{1}{2}$. Mais le 28 au soir à $8^h\,45'\leftmoon\,22°\,01'\,50''$. Ces observations faites par Riccioli ne sont pas des plus exactes, on y apperçoit même des fautes de copiste: prenant un milieu, on trouve que les Tables Caroline ont donné le lieu trop avancé de $7'\frac{1}{2}$.

En 1702* M. de la Hire ayant observé les passages du Soleil & de Saturne par son Quart-de-Cercle Mural, je trouve qu'à $11^h\,40'\,12''$ de tems vrai le 5 Octobre, la longitude héliocentrique étoit $\curlyvee\,6°\,21'\,30''$, & que les Tables la donnent plus avancée de $16'\frac{1}{3}$.

* La conjonction de Jupiter à Saturne s'est faite en 1583 au $17°\frac{1}{2}$ de $\leftmoon$ & celle de 1702 à 4° d'$\curlyvee$, l'Anomalie moyenne de Saturne étant $3^s\,0°\frac{1}{2}$ & $3^s\,15°$.

Remarques sur les Appulses de la Lune & des Planetes aux Etoiles Fixes.

La Phase générale de la Lune, insérée pag. 140, & qui a été tirée du Traité *de Motu Lunæ Libratorio*, publié par Hévélius, est d'autant plus nécessaire, qu'on trouve dans le Recueil des Observations de cet Auteur, intitulé *Machina Cœlestis*, & dans celles de Flamsteed & de M. Kirch, un grand nombre d'Appulses de la Lune aux Etoiles.

Quand on compare la Lune à une seule Etoile, il n'est pas toujours facile d'en déduire le lieu de cette Planete; on est quelquefois obligé de prendre quelques alignemens de l'Etoile aux principales taches: mais cela suppose qu'on connoisse la Libration de la Lune & le Lieu Apparent de l'Etoile. M. Newton a achevé la théorie de la Libration, ayant suppléé à ce qui manquoit à l'explication qu'en a donnée Hévélius. Celui-ci avoit déja tenté de représenter la circonférence du Disque Apparent pour chaque jour, par le moyen du Réticule qu'on voit au centre de la figure. Il est certain que si l'excentricité de l'orbite de la Lune étoit constante, si l'Axe de Rotation de cette Planete étoit Perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, & si la plus grande Latitude de la Lune étoit constamment de 5°, cette méthode d'Hévélius seroit beaucoup plus exacte; car en posant, par exemple, la pointe du Compas au centre du Réticule, & prenant pour Rayon l'intervalle compris jusqu'au milieu de l'espace où se fait la plus grande Libration, soit en Longitude, soit en Latitude, on a d'abord la Libration moyenne; c'est-à-dire, pour toutes les fois que la Lune est Apogée ou Périgée, & en même tems dans l'un ou l'autre de ses nœuds: ensuite on peut trouver la Libration pour chaque degré d'Anomalie, quelle que soit la Latitude de la Lune. Pour cet effet Hévélius divise en six parties la Libration qui doit se faire en Longitude, & dont la plus grande arrive au *Palus Mœotis*, lorsque la Lune est dans les moyennes distances, c'est-à-dire, à 9 signes ou environ de son Aphélie. De même en montant jusqu'à cinq divisions, on détermine (selon les différens cas) le centre du Disque, & par conséquent la Libration, à mesure que la Lune approche de sa plus grande Latitude ou Limite Australe; & au contraire en descendant jusqu'à cinq divisions, lorsque la Latitude augmente dans l'autre sens, & se trouve Boréale. Mais si l'on désire une plus grande exactitude, il faut avoir recours à la théorie qu'en a donnée M. Newton, & que Mercator a insérée à la fin de ses Institutions Astronomiques.

Pour connoître maintenant la Longitude Apparente d'une Etoile, il faut avoir égard à son Aberration: or il est à remarquer qu'au tems de la conjonction de l'Etoile au Soleil, son Aberration est alors la plus occidentale, & sa longitude la plus petite; & que trois signes après, l'Aberration en longitude est nulle, lorsqu'au même tems l'Aberration en Latitude est la plus grande vers le Midi. Cette Regle est générale, de même que les deux suivantes; sçavoir, que la plus grande Aberration en longitude, est à 20", comme le cosinus de la latitude de l'Etoile, est au sinus total; & que la plus grande Aberration en latitude, est à 20", comme le sinus total, est au sinus de la Latitude de l'Etoile. La plus grande Aberration étant une fois connue pour chaque Etoile, de même que le point de l'Ecliptique, où elle devient nulle, on trouvera l'Aberration qui convient à chaque jour, en faisant comme le sinus total, est au sinus de l'élongation ou distance du Soleil à ce point, ainsi la plus grande Aberration soit en longitude soit en latitude déja trouvée pour chaque Etoile, à un 4e terme.

Ces corrections pour l'Aberration, paroissent d'autant plus nécessaires, qu'on a déja rétabli les lieux d'un très-grand nombre d'Etoiles du Zodiaque.

INSTITUTIONS

INSTITUTIONS ASTRONOMIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

Du Mouvement apparent.

LEs Elémens d'Aſtronomie qu'on ſe propoſe de donner, ſemblent exiger du Lecteur qu'il ait quelques principes ſur le mouvement viſible ou apparent des corps en général : c'eſt pourquoi nous commencerons par traiter cette matiere, avant que d'expliquer les mouvemens des corps céleſtes ; de ces corps, dis-je, ſi éloignés de nous, & dont il eſt queſtion d'expliquer ici les principaux phénomenes.

Des corps à qui nous n'attribuons aucun mouvement, & de ceux à qui on a coutume d'en attribuer.

Nous établirons premierement cette propoſition générale & qui eſt ſi évidente ; ſçavoir, que l'œil étant accoutumé de conſidérer comme en repos, les corps qui lui paroiſſent conſerver la même diſtance apparente, les uns à l'égard des autres ; qui lui ſemblent garder entr'eux une même ſituation, en un mot qui paroiſſent conſtamment

dans un même lieu; il doit au contraire juger de leur mouvement toutes les fois que ces corps changeront leurs situations & leurs distances, soit entr'eux, soit par rapport au lieu d'où il les regarde;

Mais pour éclaircir encore davantage cette proposition, nous remonterons pour un moment aux premiers principes de l'Optique: car il n'est peut-être pas inutile de rappeller ici ce que l'on y démontre; sçavoir, que tout corps lumineux forme nécessairement sa propre image dans le fond de l'œil qui le regarde, & cela sur la rétine, dont la surface est semblable à celle d'une Sphere concave: cette apparence, comme l'on voit, ne se peut faire que par les rayons qui émanent de l'objet lumineux. Or le lieu qu'occupe dans l'œil l'image de chaque point de l'objet, est toujours celui où les rayons qui partent d'un semblable point de l'objet, se réunissent apres s'être brisés en passant à travers de l'œil.

Maniere dont se fait la vision.

PLANCHE I. *Figure 1.*

Supposons, par exemple, que l'arc *AB* soit la surface antérieure de l'œil, dont le fond ou plutôt la rétine, qui est une membrane formée par l'expansion du nerf optique, soit représenté par *DG*; soit aussi le centre de l'œil *C*, je dis que l'image d'un point *F* sera dans la ligne *FCH*, & par conséquent en *H*, de même que l'image d'un point *E* se formera au point *L*; car les rayons de lumiere sont tellement rompus par les membranes transparentes & par les humeurs de l'œil, que de cette quantité prodigieuse de rayons qui émanent du point *F*, & qui tombent sur notre œil, il n'y en a pas un seul qui puisse tomber ailleurs, qu'au point où ils doivent tous se réunir dans l'œil; c'est-à-dire, qui puisse s'écarter du point *H*. Il en est de même de ceux qui partent du point *E*, & dont la réunion doit se faire au point *L*. C'est pourquoi ces rayons causent dans chaque lieu où ils se réunissent, un ébranlement aux nerfs optiques: & c'est là précisément ce qui occasionne la sensation de la vûe.

Il eſt aiſé de confirmer ce que nous venons de dire, par une expérience fort ſimple : ſi l'on détache pour cet effet l'œil d'un homme qui vient de mourir, ou à ſon défaut, ſi l'on prend un œil de bœuf dont on aura enlevé légerement la membrane opaque que l'on nomme la Choroïde, ou ſeulement la partie de la Choroïde qui étoit du côté du cerveau, afin qu'il ne reſte plus que cette membrane mince & tranſparente que l'on nomme la Rétine ; alors l'on pourra procéder à l'expérience comme il ſuit. On choiſira une chambre un peu obſcure, & l'on ſe placera dans le fond, pour y expoſer cet œil vers une fenêtre, ou vers quelque objet dont la lumiere ſoit fort vive ; & l'on appercevra auſſi-tôt, même avec quelque étonnement, la peinture de la fenêtre ou de l'objet très-exactement deſſinée ſur la rétine de cet œil. On peut encore, au lieu d'un œil, employer un verre convexe ou une lentille, qui étant expoſée, comme on l'a dit ci-deſſus, à quelque objet dont la lumiere ſoit éclatante, ſervira de même à former l'image de cet objet ; pourvû que l'on ait attention d'écarter peu à peu de l'autre côté du verre convexe, un papier blanc, ſur lequel cette peinture doit enfin paroître avec beaucoup de netteté.

Comment l'œil peut juger du mouvement.

Il ſuit de-là, que ſi l'image du point *F* demeure toujours au même endroit *H* de la rétine, & que l'œil demeure en même tems fixe & immobile, l'Obſervateur jugera pour lors que le point *F* ne change point de place ; que ſi ce point *F* ſe meut vers *E*, alors ſon image parcourant ſucceſſivement dans le fond de l'œil, diverſes parties de la rétine, c'eſt-à-dire, l'eſpace *HL*, l'Obſervateur doit néceſſairement avoir les différentes ſenſations cauſées par ce mouvement : & ſi ce point eſt fort éloigné, & que ſon mouvement ſe faſſe dans le plan du triangle *FCE*, alors l'Obſervateur eſtimera le mouvement apparent du point *F* par la grandeur de l'angle *FCE*.

Mais si l'on suppose que dans la ligne *CF* il y ait un autre point visible *M* à une distance encore assez grande de l'œil, & dont le mouvement se fasse de *M* en *N*, l'œil jugera pour lors que son mouvement apparent est le même que celui du point *F*: car puisque l'un & l'autre objet *MF* parcourent précisément un même angle, leur mouvement ne sçauroit produire qu'une même trace, & par conséquent une même sensation dans le fond de l'œil. Il n'est pas moins évident, que lorsque l'objet *M* sera mû selon la ligne *MF*, depuis *M* jusqu'en *F*, son mouvement ne sçauroit jamais être connu de l'Observateur, parce que son image demeure constamment immobile en *H*, c'est-à-dire, au même point de la rétine. Ainsi toutes les fois que les objets qui sont fort éloignés de nous, n'auront d'autre mouvement que selon la ligne droite qui passe par le centre de notre œil, il est certain qu'on ne pourra juger de leur mouvement, à moins que l'on ne fasse attention à leur lumiere, qui peut-être paroîtra plus ou moins vive, ou bien à leurs grandeurs; c'est-à-dire, à quelque augmentation ou diminution dans leurs diametres apparens. Il faut bien remarquer, que nous ne parlons ici que des objets qui sont fort éloignés: car quant aux objets qui sont fort proches de notre œil, on ne manque pas de moyens assez sûrs pour reconnoître leurs mouvemens, quand ils se font dans la ligne droite qui passe par le centre de l'œil, & qui consistent à le comparer à d'autres objets, dont la situation & la distance sont connues, & par rapport ausquels ils changent bientôt de position. Enfin quelque soit la route d'un objet dans le plan *ECF*, soit qu'il se meuve dans la ligne *FE*, soit dans l'arc du cercle *FPE*, soit dans une courbe quelconque *FGE*, je dis que si l'angle *FCE* qui mesure l'espace parcouru, est toujours le même, l'œil attribuera chaque fois à cet objet le même mouvement apparent: mais si l'on augmente ou

ſi l'on diminue cet angle, le mouvement apparent doit néceſſairement paroître plus ou moins grand ; d'où il ſuit, que ce n'eſt que par le moyen des angles, dont il eſt aiſé de connoître l'ouverture, qu'on peut juger du mouvement apparent des objets, ou des corps céleſtes.

Voici donc la méthode dont les Géometres & les Aſtronomes ſe ſervent ordinairement pour meſurer le mouvement apparent des corps, laquelle, quoique vulgairement connue, mérite cependant d'être rapportée ici, pour ne rien obmettre de tout ce qui peut contribuer à rendre ces Elémens faciles, & à la portée des commençans.

Euclide ayant démontré que tous les angles, dont le ſommet ſe trouve placé au centre d'un même cercle, ſont toujours proportionnels aux arcs des circonférences, ſur leſquels ils ſont appuyés, il ſuit néceſſairement qu'il n'y a point de moyen plus ſimple pour meſurer l'ouverture des angles, que de ſe ſervir des arcs de cercles compris entre leurs côtés. Or les Aſtronomes ayant diviſé la circonférence du cercle en 360 parties égales, que l'on appelle degrés ; chaque arc d'un degré en 60. parties égales, que l'on nomme minutes ; chaque minute en 60. autres parties égales, que l'on nomme ſecondes ; chaque ſeconde en 60. tierces ; chaque tierce en 60. quartes & ainſi de ſuite ; ils ſont tous convenus, que le nombre des degrés, minutes, ſecondes, &c. compris dans l'arc ſur lequel ſont appuyés les côtés d'un angle ; que ce nombre, dis-je, en ſeroit la meſure, & en déſigneroit la grandeur. C'eſt pourquoi ſi l'on décrit du ſommet de cet angle, un cercle tel que l'on voudra, ſoit grand, ſoit petit, il n'y a jamais plus de degrés dans la circonférence de l'un, que dans la circonférence de l'autre, les degrés dans les moindres cercles étant à proportion plus petits : en un mot, le même angle ne peut s'appuyer que ſur des arcs d'un même nom-

Ce que c'eſt que degrés, minutes, ſecondes, &c.

bre de degrés dans l'une & dans l'autre circonférence ; puiſque chacun de ces arcs a toujours un même rapport à la circonférence entiere de ſon cercle. Soit, par exemple, l'angle propoſé *ACB*, & que du centre *C* on ait décrit deux arcs *AB*, *DE* : je dis, qu'il y aura autant de degrés, minutes, &c. dans l'arc *AB*, qu'il y en aura dans l'arc *DE*, & cela en général ou ſans exception, quelle que ſoit la grandeur du rayon. Car quand même le rayon de l'arc *AB*, n'auroit ſeulement qu'un pied de long, & que le rayon de l'autre arc *DE* ſeroit infiniment plus grand, comme s'il étoit, par exemple, prolongé juſqu'aux étoiles fixes, le degré de la circonférence *AB*, quoiqu'il paroiſſe infiniment petit par rapport au degré de la circonférence *DE* ; ces degrés, dis-je, auront néantmoins un même rapport entr'eux, que celui du rayon *CB* au rayon *CE*, & ce rapport ſera le même que celui des circonférences.

PLANCHE I. *Figure 2.*

La valeur de l'angle *C* eſt donc toujours d'autant de degrés minutes, &c. que les arcs *AB* ou *CD* en contiennent : & c'eſt ſans doute après toutes ces réflexions qu'on a imaginé un inſtrument dont on ſe ſert communément pour meſurer les Angles, qui conſiſte en une portion de cercle diviſée en degrés & minutes, laquelle contient ordinairement le quart, la ſixieme ou la huitieme partie d'un cercle. On a donné à ces inſtrumens différens noms. Lorſque c'eſt un Quart-de-cercle, l'arc eſt diviſé en 90. degrés ; ſi c'eſt un *Sextans*, l'arc contient 60. degrés ; ſi c'eſt un *Octans*, ſon arc eſt de 45. degrés. Ils peuvent être de différentes grandeurs, mais il eſt néceſſaire qu'ils ayent au moins un pied de rayon pour y diſtinguer les *degrés* & *les minutes* : on pourroit en augmentant conſidérablement le rayon, en le faiſant, par exemple, de 15. ou 20. pieds, y faire encore une troiſieme diviſion, qui ſeroit celle des ſecondes : mais il y

a diverſes autres méthodes pour les trouver, & dont on aura occaſion de parler dans la ſuite. On a coutume de placer ſur l'un des côtés de cet angle, ou bien ſur une ligne parallele à ce côté, deux pinnules, ou plutôt une lunette d'approche : on place auſſi d'autres pinnules ou une autre lunette à deux verres convexes (au foyer commun deſquels ſont fixés à angles droits deux filets d'argent ou de ſoie) ſur l'alidade ou regle mobile à l'entour du centre du cercle dont on a diviſé la circonférence ; or l'on obſerve avec cet inſtrument, les angles de la maniere ſuivante.

Soient deux objets *A* & *B*, que je ſuppoſe fort éloignés de l'œil placé en *C*. On propoſe de meſurer l'angle *ACB* ; pour cet effet il faut diſpoſer l'inſtrument en ſorte qu'on apperçoive le point *A* ſur la croiſée des filets, ſi c'eſt une lunette ; ou au milieu des fentes des deux pinnules placées ſur la ligne *CD*. Enſuite on fera mouvoir l'alidade *CE*, juſqu'à ce qu'on obſerve auſſi le point *B* ſur la croiſée des filets de la lunette, ou bien dans le milieu de chaque fente des deux pinnules attachées perpendiculairement ſur cette alidade. Il eſt évident, après ce que nous avons expliqué ci-deſſus, que l'arc *DE* ſera la meſure de l'angle *ACB*, & par conſéquent de l'arc *AB* ; c'eſt-à-dire, que l'angle *ACB*, & l'arc *AB* contiendront autant de degrés qu'il s'en trouve dans l'arc *DE*, parcouru par l'alidade ou regle mobile, depuis le point *D* de ſon paralléliſme avec la lunette ou les pinnules fixes, juſqu'au point *E*, où elle doit parvenir pour appercevoir l'objet *B*. PLANCHE I. *Figure 3.*

Les Aſtronomes ſont encore convenus de différens autres termes ou regles générales, leſquelles ont été adoptées depuis un grand nombre de ſiecles. Ils ont, par exemple, établi pluſieurs points où ils ont coutume de rapporter les arcs de diſtances des étoiles obſervées avec les

instrumens dont nous venons de parler. On compte parmi ces points l'*Horizon*, qui n'est autre chose que le plan qui touche en chaque lieu le Globe de la Terre, & qu'on suppose prolongé à l'infini dans le Ciel. Cet Horizon divise sensiblement la Sphere du monde en deux parties égales : de plus si l'on conçoit un arc ou cercle perpendiculaire à l'Horizon (qu'on nomme *Cercle vertical*) compris entre l'horizon d'un lieu, & tel Astre qu'on voudra ; cet arc compris sera ce que l'on appelle *Hauteur* de l'Astre. On nomme encore *Zénit*, ou *Pole* de l'Horizon le point du Ciel qui est directement à plomb sur un lieu donné, ou bien qui est perpendiculaire au plan de l'horizon : car la Terre étant à peu près de figure Sphérique, le plan de l'Horizon de chaque lieu ne doit toucher sa surface que dans un point. Or c'est sur ce point qu'on doit concevoir une ligne élevée perpendiculairement & qui prolongée dans le Ciel, passera par le Zénit : en un mot le Zénit est le point du Ciel, où se trouve terminée la ligne à plomb, ou la ligne que décrivent tous les corps qui tombent, lorsque leur chûte, causée par la pesanteur, se fait librement, soit dans l'air, soit dans le vuide. On sçait assez que selon les loix de l'Hydrostatique, la chûte des graves se fait selon une ligne perpendiculaire à la surface des Mers, des Lacs, en un mot des liquides, qui sont répandus sur la surface de la terre, ou qu'on suppose répandus dans le lieu dont on vient de considérer l'horizon.

De l'Horizon.

Ce que c'est que la hauteur d'un Astre & le Pole de l'Horizon.

Ainsi les Pilotes qui ont toujours besoin, pour connoître la latitude du lieu où ils sont, de prendre la hauteur du Soleil, ne mesurent par conséquent autre chose que l'arc, ou plutôt l'angle que forment dans leur œil les rayons visuels, qui viennent du Soleil & des extrémités de l'Horizon. Il est à remarquer que cet Horizon leur est toujours determiné par la surface de la Mer. Mais les Astronomes n'ayant pas un Horizon visible, ou qui puisse

être

être déterminé avec assez d'exactitude, à cause des montagnes, des inégalités de la terre, ou des réfractions le plus souvent trop inconstantes; ils ont coûtume d'observer l'angle que forme le rayon du Soleil ou d'une Etoile, avec la ligne qui passe par leur Zénit.

Ils se servent pour cet effet de quarts de cercle ou secteurs de cercle, dont le rayon est ordinairement de 2 à 3 pieds, & dans des cas extraordinaires, de 9, 12, & 15 pieds de rayon. Tous ces instrumens sont garnis de lunettes que l'on a substituées aux Pinnules des Anciens. [C'est par le secours de ces lunettes que l'on distingue les objets, & que l'on y pointe avec une exactitude bien plus grande qu'avec les Pinnules les plus parfaites. On a de plus l'avantage d'appercevoir les Etoiles fixes à toutes les heures du jour; & même en plein midi, lorsque le ciel est bien serein. Mais il n'est pas nécessaire de nous arrêter à expliquer la construction des quarts de cercle garnis de Lunettes & de Micrometres; la maniere de les vérifier à l'horizon par le Renversement, ou au Zénit par le Retournement. Ces détails sont expliqués fort au long dans le Livre, qui a pour titre Degré du Méridien entre Paris & Amiens, ou dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, de l'année 1714.]

Des Diametres apparens.

La Mesure des Angles sert principalement à nous faire connoître les Diametres apparens des corps qui sont éloignés de nous. Car soit supposée une ligne AB, apperçue directement par l'œil placé au point C, si l'on imagine les droites AC, BC, tirées de chacune de ses extrémités jusqu'à l'œil qu'on suppose en C, elle sera apperçue sous l'angle ACB; & si cette ligne est le Diametre d'un Globe ou d'une Sphere, cet angle ACB sera ce que l'on nomme son Diametre apparent. Il contiendra autant de degrés, minutes, secondes, &c. qu'il s'en trouvera dans l'arc compris entre les deux lunettes de l'instrument dont

Figure 4.

on s'eſt ſervi pour faire cette obſervation. De la même
Figure 5. maniere on doit dire, que tout autre objet comme *DE*, apperçu par l'œil que je ſuppoſe en *F*, y eſt vû ſous l'angle *DFE* : or il ſuit de-là que les grandeurs apparentes des objets *AB*,*DE* ſeront entr'elles comme les angles *ACB*,*DFE*.

Si l'on imagine encore que l'œil ſoit plus proche de l'objet *AB* ; ſi on le ſuppoſe, par exemple, au point *G*, c'eſt-à-dire à une diſtance de la moitié moins grande, il eſt évident que l'objet paroîtra pour lors ſous un angle environ deux fois plus grand qu'auparavant. Si l'œil s'approche de l'objet trois fois plus près que la premiere fois lorſqu'on l'a ſuppoſé en *C*, l'angle ſous lequel paroîtra l'objet, ſera d'environ trois fois plus grand ; & par conſéquent ſon Diametre apparent ſera le triple du premier Diametre obſervé. Il faut bien remarquer néantmoins que nous ne parlons que d'angles fort petits, comme d'un ou deux dégrés ; & que c'eſt là ſeulement le cas où les Diametres apparens d'un même objet ſont à très-peu près proportionels aux diſtances de l'œil.

De cette maniere ſi l'on connoit par obſervation les Diametres apparens de deux corps céleſtes avec le rapport de leurs diſtances, on en déduira facilement le rapport exact de leurs Diametres, puiſqu'il eſt certain que les diſtances de l'un & l'autre objet étant égales, leurs vrais Diametres ſeront entr'eux, comme leurs Diametres apparens ; & reciproquement ſi leurs Diametres apparens ſont égaux, leurs vrais Diametres ſeront entr'eux, comme
Fig. 4. 5. & 6. leurs diſtances à l'œil : par exemple, ſi l'angle *ACB* eſt égal à l'angle *DFE*, & ſi la diſtance *CB* eſt triple de la diſtance *FE*, il eſt clair que la droite *AB* ſera trois fois plus grande que la droite *DE* ; en un mot, ſi la diſtance *CB* eſt non-ſeulement triple de la diſtance *fe* ; mais ſi l'angle *ACB* eſt encore double de l'angle *dfe*, alors *AB* ſurpaſſera ſix fois *de* : car prenant *CM* égal à *fe*, & ſuppoſant

un objet *MN*, vû sous un angle *MCN* ou *ACB* double de l'angle *dfe*; il est clair que la ligne *MN* sera deux fois plus grande que la ligne *de*: mais puisque *BC* contient trois fois *CM*, *AB* sera donc triple de *MN*, & par conséquent il sera six fois plus grand que *de*; d'où il suit que si les Diametres apparens du Soleil & de la Lune étoient égaux, & si l'on supposoit que la distance du Soleil à la Terre, fût cent fois plus grande que celle de la Lune, le vrai Diametre du Soleil seroit cent fois plus grand que celui de la Lune: & parce que la distance du Soleil à la Terre est bien au-delà plus de cent fois plus grande que celle de la Lune, comme nous le ferons voir ci-après, il suit de là que le Diametre du Soleil doit excéder beaucoup plus de cent fois le Diametre de la Lune.

Les Diametres apparens des objets augmentent à mesure qu'on s'en approche.

Il est donc aisé de concevoir, après ce que nous venons de dire, que le Diametre apparent d'un objet augmente toujours à mesure qu'on en approche, & cela à peu près dans le rapport des distances de l'œil au même objet. Par exemple, si un spectateur étoit placé dix fois plus près de la Lune que nous ne sommes, sans compter qu'il appercevroit la Lune bien plus éclatante qu'elle ne nous paroît, il observeroit aussi son Diametre environ dix fois plus grand. Donc lorsque nous venons à la regarder avec un Telescope qui augmente dix fois les Diametres apparens des objets, c'est precisément la même chose que si l'on étoit placé dix fois plus près de la Lune; & par conséquent si l'on regarde la Lune en se servant de Telescopes qui augmentent cent fois ou deux cens fois les Diametres apparens des objets, assurément on doit appercevoir l'Astre à peu près de la même maniere que si l'on en étoit cent fois, ou deux cens fois plus proche. Il est donc aisé de concevoir, que nous pouvons connoître par-là certainement quelle seroit la grandeur apparente des objets, & ce que l'on pourroit remarquer

Avantages des Telescopes ou lunettes d'approche.

sur la surface de la Lune, si nous n'en étions éloignés seulement, que d'environ dix mille lieues, ou trois Diametres de la terre; en un mot, ce qu'on y pourroit découvrir, si l'on en approchoit encore plus près, de maniere que notre œil n'en fût éloigné, par exemple, que de huit mille stades; car à cette distance on y distingueroit facilement ces longues chaînes de montagnes, ces vallées si profondes, & ces vastes plaines, qui comprennent une si grande étendue. Les lunettes d'approche nous donnent encore un très-grand avantage pour pénétrer à d'autres corps célestes, & qui sont beaucoup plus éloignés, comme à Jupiter, par exemple, à Saturne, & aux Cometes, &c. tellement que par leur secours nous voyons toutes les étoiles du ciel, avec autant d'avantage, que s'il nous étoit possible d'en approcher continuellement, enforte qu'il ne nous restât gueres que la centieme ou deux centieme partie de leurs distances à la terre. Aussi depuis que l'on a commencé à s'en servir, a-t-on fait une infinité de belles découvertes, telles que la Rotation des Planetes autour de leur axe, les satellites de Jupiter & de Saturne, leurs éclipses, l'Anneau de Saturne, & généralement les différentes Phases de toutes nos planetes. Cette digression que nous venons de faire, au sujet des lunettes d'approche, nous a semblé d'autant plus nécessaire, qu'il étoit à propos de donner ici quelque idée de l'instrument que l'on emploie aujourd'hui pour observer les principales dimensions, & les mouvemens apparens des corps célestes. Revenons maintenant au discours que nous avons interrompu sur le mouvement apparent des corps en général.

De quelques cas particuliers où un corps céleste auroit ses mouvemens égaux, ou

Comme il n'y a donc qu'un seul & unique moyen de juger pour l'ordinaire du mouvement d'un objet qui est éloigné de nous; sçavoir, d'observer les différens angles qu'il fait par rapport à l'œil; il faut bien prendre garde à ce qui peut

arriver lorſqu'un corps céleſte, par exemple, parcourt d'un mouvement égal ou uniforme des eſpaces qui ſont égaux entr'eux; car à n'en juger uniquement que par les obſervations on ſeroit porté à croire tout le contraire & que ſon mouvement eſt irrégulier ou inégal: en voici un exemple. uniformes, & paroîtroit néantmoins avoir des mouvemens fort irréguliers.

Suppoſons qu'une Planete parcourre la circonférence *ABDEGQ*, d'un cercle, avec un mouvement uniforme; c'eſt-à-dire, qu'elle emploie des tems égaux à décrire les arcs égaux *AB*, *BD*, *DE*, &c. ſoit auſſi l'œil de l'Obſervateur placé à une grande diſtance au point *O*, dans le même plan que le cercle décrit par la planete; lorſque cette planete parcourra l'eſpace *AB*, ſon mouvement apparent ſera obſervé ſous l'angle *AOB*; c'eſt-à-dire que la planete paroîtra décrire l'arc *HL*. Secondement lorſque dans un eſpace de tems égal au premier, la planete décrira l'arc *BD*, ſon mouvement apparent ſe fera ſous l'angle *BOD*, enſorte que l'Obſervateur l'aura vûe paſſer de *L* en *M*; d'où il faut conclure que cette planete ne lui aura paru décrire que l'arc *LM*, lequel eſt beaucoup plus petit que l'autre arc *HL*: en un mot lorſqu'elle ſera au point *D* de la circonférence *KHM*, elle paroîtra répondre au point *M*, de la Sphere des étoiles fixes. Troiſiemement, lorſque la planete décrira l'arc *DE*, égal à l'un des deux premiers *BD*, *AB*, & qu'elle ſera parvenue au point *E*, l'Obſervateur doit l'appercevoir encore au point *M*, enſorte qu'elle lui ſemblera comme ſtationaire pendant tout l'eſpace de tems qu'elle aura employé à décrire l'arc *DE*. En quatrieme lieu elle paroîtra rétrograder ou retourner de *M* en *L*, lorſqu'elle parcourra l'arc *EF*: enfin lorſqu'elle ira de *F* en *G*, l'Obſervateur l'aura vue ſucceſſivement rétrograder, & arriver à ce même point *H*, d'où elle lui avoit paru d'abord partir lorſqu'elle alloit de *A* en *B*. Quand elle ira du point *G* par le point *I* juſqu'en *Q*, l'Obſervateur lui verra décrire l'arc *HKN*, & elle paroîtra *Figure 7.*

pour la ſeconde fois immobile ou ſtationaire au point *N*, c'eſt-à-dire pendant le tems qu'elle employera à parcourir l'arc *QP*. Enfin après ſa plus grande digreſſion au point *P*, elle doit retourner, ou paroître ſe mouvoir comme auparavant, c'eſt-à-dire avec des mouvemens apparens, fort inégaux ſelon l'arc *NKHLM*.

Ce que l'on entend par inégalité optique.

Les Aſtronomes ont appellé *inégalité optique*, cette ſorte d'inégalité dans les mouvemens apparens; ainſi elle n'eſt pas *réelle* dans les corps céleſtes, mais c'eſt une inégalité qui dépend de la ſituation de l'œil, qui n'eſt point au centre du mouvement de la planete: car ſi l'œil au lieu d'être en *O*, eſt tranſporté au point *C*, & qu'il y demeure pendant tout le tems d'une révolution de la planete, il eſt évident que puiſque la planete parcourt ſelon notre ſuppoſition des arcs de cercle égaux dans des tems égaux, le Spectateur n'appercevra du point *C*, que des mouvemens parfaitement égaux entr'eux.

Figure 8.

Si l'on prenoit dans le cercle tout autre point que le centre, & que l'Obſervateur fût, par exemple, ſitué au point *O*, entre le centre & la circonférence; alors quoique la même planete parcourût des arcs égaux dans des tems égaux, ſon mouvement paroîtroit néantmoins fort inégal vû du point *O*: car lorſque la planete ſera dans ſa plus grande diſtance du point *A*, ſon mouvement paroîtra fort lent; au contraire il paroîtra très-rapide lorſqu'elle ſe ſera approchée du point *C*, le plus près qu'il eſt poſſible; ce qui eſt évident, puiſque l'angle *COD* eſt beaucoup plus grand que l'angle *AOB*, quoique les arcs *AB*, *CD* ſoient égaux entr'eux. Cependant il faut bien remarquer, que dans cette ſuppoſition de l'œil placé entre le centre & la circonférence, jamais la planete ne ſçauroit paroître ſtationaire, ni rétrograder; d'où il ſuit, que s'il arrivoit que l'Obſervateur vînt à découvrir la Planete, tantôt directe, tantôt ſtationaire, & tantôt rétrograde, il faudroit

conclurre, qu'il auroit lui-même un mouvement particulier, & que son œil ne seroit plus situé dans un point fixe ou immobile, comme on l'a supposé jusqu'ici.

CHAPITRE SECOND.

Où l'on considere le mouvement apparent, lorsque l'Observateur change de lieu.

APrès avoir expliqué les différens cas où l'on observeroit les principaux phénomenes du mouvement apparent, dans la supposition que l'œil soit constamment dans un même lieu ; il reste à exposer ceux où l'œil, ou plutôt le lieu où il se trouve, sont emportés d'un même mouvement. Car il est aisé de concevoir que les objets paroîtront pour lors se mouvoir d'une maniere tout-à-fait différente de ce qui vient d'être établi ci-dessus, puisque l'œil jugera quelquefois en repos ce qui est emporté d'un mouvement très-rapide ; & qu'au contraire il attribuera divers mouvemens à certains objets fixes, ou qui seront dans un repos parfait. Il peut même arriver que les mouvemens observés d'un même objet seront tout-à-fait contraires, ou même directement opposés à ceux qu'il a réellement ; que les objets, dis-je, qui se meuvent vers l'Orient, paroîtront à l'Observateur emportés vers l'Occident ; ce que l'on peut expliquer d'une maniere plus simple, en prenant pour exemple les mouvemens que l'on observe si souvent dans une barque sur une riviere ou dans un vaisseau, lorsqu'il s'éloigne du port.

Ceux qui navigent sur une mer peu agitée ne s'apperçoivent pas du mouvement de leur vaisseau.

L'expérience nous apprend que ceux qui sont poussés par les vents d'un mouvement à peu près égal & uniforme, ne peuvent gueres s'appercevoir du mouvement de leur vaisseau ; qu'ils s'apperçoivent bien moins encore de

celui de tous les objets fixes qui y ſont renfermés avec eux : cela vient uniquement de ce que toutes les parties du vaiſſeau gardant entr'elles la même ſituation & la même diſtance à l'égard de l'œil, l'image de tous ces objets ſe trouve toujours peinte dans le fond de l'œil au même endroit de la rétine, & par conſéquent l'image de chacun de ces objets doit y demeurer fixe & immobile. Ainſi quoique ces mêmes objets fixes qui ſont renfermés dans le vaiſſeau, ſoient emportés avec l'Obſervateur d'un même mouvement, & d'une viteſſe préciſément égale à celle de l'œil ; quelque grande que puiſſe être cette viteſſe, il eſt cependant très-certain que l'Obſervateur ne ſçauroit s'en appercevoir, parce qu'il eſt emporté d'un même mouvement, d'un mouvement qui leur eſt commun. Mais enfin ſi l'Obſervateur vient à jetter les yeux ſur le rivage, il lui attribuera ſur le champ, auſſi-bien qu'aux arbres & à toutes les maiſons qu'il découvrira ſur la terre, un mouvement plus ou moins rapide, ſelon que ſon vaiſſeau ſera emporté d'une viteſſe plus ou moins grande. La raiſon eſt, que le vaiſſeau conjointement avec l'Obſervateur, change continuellement de lieu, & partant l'image des objets extérieurs venant à ſe placer ſucceſſivement dans les différentes parties de la rétine, ces mêmes objets quoiqu'immobiles & ſitués en terre ferme, lui paroîtront néceſſairement ſe mouvoir ; au lieu que l'image des objets qui ſont dans le vaiſſeau occupera toujours la même place ſur la rétine dans le fond de ſon œil ; & par conſéquent le ſpectateur ne leur ſçauroit attribuer aucun mouvement réel.

Ils s'imaginent au contraire que les objets fixes ſitués ſur le rivage ont un mouvement réel.

Si l'on conſidere auſſi ce qui doit arriver lorſqu'on laiſſe tomber un boulet du haut du mât d'un vaiſſeau qui fait voile le long des côtes de la mer, on conviendra, ce me ſemble, que ce même boulet y paroîtra tomber ſuivant une ligne à plomb, c'eſt-à-dire, de la même maniere que

ſi le vaiſſeau étoit en repos dans le port ou dans un calme; ainſi le boulet tombera néceſſairement au pied du mât. Mais il eſt à remarquer qu'il ne ſera réellement point tombé ſuivant la vraie ligne à plomb, c'eſt-à-dire, ſuivant une ligne perpendiculaire à la ſurface de l'eau, ou du globe terreſtre, mais par une ligne oblique à cette ſurface. Auſſi ceux qui ſe trouveront en même tems ſur le rivage lui verront-ils décrire cette ligne oblique; c'eſt-à-dire, que le boulet n'y paroîtra pas tomber de la même maniere qu'il auroit paru aux ſpectateurs placés dans le vaiſſeau. Voici une explication fort ſimple de ce phénomene. Une des principales loix du mouvement, & qui eſt ſi conforme à tout ce que l'on obſerve dans la nature, c'eſt qu'un corps mis une fois en mouvement, doit toujours, s'il ne trouve aucun obſtacle, continuer ſa route avec la même viteſſe, & ſans changer de direction. Or lorſque le boulet étoit attaché au haut du mât, lorſqu'il n'avoit d'autre mouvement que celui du vaiſſeau, ce mouvement lui étant alors imprimé ſelon la ligne horiſontale, il a dû le conſerver lorſqu'on l'a détaché du haut du mât. Mais quoique la peſanteur lui en ait communiqué bientôt un autre ſuivant la direction verticale, il a dû néantmoins conſerver le premier, parce que ces deux mouvemens n'étant ni oppoſés ni contraires l'un à l'autre, ils n'ont pu ſe détruire ni ſe cauſer mutuellement la moindre altération: ainſi le boulet devant ſe mouvoir en ce cas en avant & de haut en bas, il doit faire, dis-je, autant d'effort pour s'avancer & pour deſcendre, que ſi chaque force agiſſoit ſéparément. Donc tout ce que pourront produire ces deux forces qui agiſſent en même tems, ce ſera d'empêcher qu'il ne ſuive l'une ou l'autre direction horiſontale ou verticale, de ſorte qu'il décrira une ligne courbe oblique à l'horiſon, ſemblable à celle que nous voyons dé-

Explications du mouvement d'un boulet placé au haut du mât d'un vaiſſeau, & qui paroit tomber ſi différemment aux navigateurs & à ceux qui ſont ſur le rivage de la Mer.

crire à une pierre jettée horisontalement de quelque endroit élevé, cette pierre ne laissant pas de se mouvoir en avant pendant tout le tems qu'elle emploie à descendre. Or c'est précisément la même courbe que l'on verra de dessus le rivage décrire au boulet dans le tems de sa chûte : car puisque le boulet & le mât sont emportés d'une même vitesse, ils conserveront toujours la même distance entr'eux, & par conséquent le boulet tombera nécessairement au pied du mât. De plus, le mouvement par lequel ce boulet doit s'avancer horisontalement, est le même que celui du vaisseau, ou de tous les spectateurs qui sont dans le vaisseau. Mais ce mouvement commun, comme on l'a déja fait voir, ne pouvoit être apperçû avant la chûte du boulet, il ne doit donc pas l'être davantage dans le tems que le boulet tombe, d'où l'on voit par conséquent la vraie raison pourquoi l'on ne sçauroit appercevoir dans le vaisseau d'autres mouvemens, que celui que la pesanteur a donné au boulet ; c'est-à-dire, que dans le vaisseau il n'est pas possible de juger autrement de la chûte du boulet, que selon la perpendiculaire à la surface de la mer, en un mot, selon une ligne parallele au mât. Le grand nombre d'expériences qu'on a faites à ce sujet, sont rapportées par tant d'Auteurs, qu'il ne doit rester, ce me semble, aucun scrupule sur cet article.

Du mouvement d'une balle jettée de l'avant à l'arriere d'un vaisseau.

Nous pouvons encore examiner ce qui arrive, lorsque de la proue d'un vaisseau l'on jette une balle vers la poupe avec une force telle que la viteſſe de cette balle soit exactement la même, que celle du vaisseau. Supposons pour un moment que la pesanteur n'agisse point sur cette balle, il est évident, que pour-lors elle ne sçauroit avancer ni reculer ; & que par conséquent elle resteroit immobile & suspendue dans l'air, précisément au même endroit d'où on l'a jettée. Mais si la pesanteur agit à l'ordi-

naire, cette balle doit tomber en ce cas perpendiculairement à la surface de la mer, ce qui ne sçauroit être néantmoins apperçû que de ceux qui sont sur le rivage, ou sur quelque navire situé vis-à-vis l'ancre; car la force donnée à cette balle par celui qui l'aura jettée, sera détruite par une autre force égale ou directement contraire; sçavoir, celle qui lui sera commune avec le mouvement du vaisseau: cependant on ne verra point dans le vaisseau cette balle demeurer immobile, & tomber selon une ligne à plomb; mais on la verra s'avancer vers la poupe de la même maniere que si le vaisseau étoit en repos.

Si enfin la viteſſe avec laquelle la balle eſt jettée vers la poupe eſt moindre que celle du vaiſſeau, alors cette balle doit s'avancer dans le même ſens que le vaiſſeau, mais bien plus lentement, parce que le mouvement qui lui eſt commun avec celui du vaiſſeau n'eſt pas entierement détruit: or dans ce même intervalle de tems ceux qui ſe trouveront dans le vaiſſeau, ne verront pas cette balle aller de la même maniere que le vaiſſeau, mais dans un ſens tout contraire, & avec la même vîteſſe qu'elle auroit euë, ſi le vaiſſeau eût été en repos, & la balle jettée avec la même force que celle qu'on a ſuppoſée. Il paroît donc évident par tout ce que nous venons de dire, que le mouvement apparent d'un corps peut quelquefois paroître directement contraire à ſon vrai mouvement.

On objectera peut-être que c'eſt une choſe conſtante, que la balle étant une fois lancée, vient frapper la poupe du vaiſſeau; que même on y diſtingue la marque du coup qu'elle y aura imprimée; ce qui n'arriveroit point, ſi la balle ne ſe mouvoit réellement vers la poupe du vaiſſeau. OBJECTION.

Je réponds qu'il eſt bien vrai, que dans le vaiſſeau on appercevra la balle s'avancer vers la poupe & la frapper; mais que du rivage on appercevra la poupe s'avancer vers la balle, & non pas la balle vers la poupe: au reſte REPONSE.

la force du coup ſera la même, que ſi la balle eût été jettée vers la poupe, le vaiſſeau étant en repos, préciſément avec la viteſſe de la poupe lorſqu'elle a paru du rivage s'avancer vers la balle. Soient deux corps quelconques *A* & *B* égaux ou inégaux : on propoſe de conſidérer l'effort qu'ils font l'un contre l'autre dans le moment qu'ils viennent à ſe choquer : je dis que cet effort ſera le même, ſoit que le corps *B* vienne rencontrer le corps *A* immobile avec une viteſſe donnée, ſoit que le corps *B* étant immobile, le corps *A* vienne le rencontrer avec la même viteſſe : ou bien ſi l'un & l'autre corps ſe meuvent ſelon une même direction, mais que le corps *A* ayant une plus grande viteſſe vienne frapper le corps *B*, l'effort ſera préciſément le même, que ſi le corps *B* étoit en repos, & que le corps *A* n'eût eu qu'une viteſſe égale à la différence de celles qu'on a ſuppoſées à ces deux corps. Semblablement ſi les deux corps *A* & *B* ſont pouſſés l'un vers l'autre dans une direction contraire, l'effort au moment du choc ſera préciſément le même, que ſi l'un des deux étoit en repos, & que l'autre eût une viteſſe égale à la ſomme de celles qu'on a ſuppoſées. En un mot, la même viteſſe relative par laquelle deux corps s'approchent, ſubſiſtant toujours, l'effort doit être le même, lorſqu'ils viendront à ſe choquer de quelque maniere qu'on diſtribue ces viteſſes. D'où il ſuit que toutes les fois que nous navigerons dans un vaiſſeau avec telle viteſſe qu'on voudra ſuppoſer, tous nos mouvemens, comme auſſi ceux des corps que nous ferons mouvoir, ſe feront toujours de la même maniere qu'ils nous paroîtroient, ſi le vaiſſeau étoit en repos : & c'eſt une regle générale que les mouvemens de tous les corps renfermés dans un même lieu ſont préciſément les mêmes, ſoit que ce lieu ſoit dans un repos parfait, ſoit qu'il ſoit emporté d'un mouvement uniforme. C'eſt la même choſe à l'égard de leurs colliſions,

PLANCHE I. *figure 9.*

c'eſt-à-dire, de l'effort que font ces corps lorſqu'ils ſe choquent.

On a cru devoir rapporter tous ces exemples, pour mettre le Lecteur en état de connoître la différence qui peut ſe trouver entre les vrais mouvemens des corps, & leurs mouvemens apparens; & pour qu'il puiſſe juger combien il eſt difficile de diſtinguer l'un d'avec l'autre.

Il ſuit encore de tout ce que nous venons de dire, que ſi un Obſervateur étoit placé dans Jupiter, dans Saturne, ou dans quelqu'autre Planete, il ne pourroit pas mieux diſtinguer le mouvement propre de la Planete qu'il habite, que celui qui navige ne diſtingue le mouvement propre de ſon vaiſſeau: toute la différence qu'il y auroit, c'eſt qu'on s'apperçoit ſouvent dans un vaiſſeau de certains mouvemens irréguliers qui ſe font ſubitement, & dont on n'eſt alors que trop incommodé; mais parce que les Planetes font leurs révolutions d'un mouvement toujours uniforme, & qu'elles ne trouvent jamais le moindre obſtacle, elles ſe trouvent donc à très-peu près dans le même cas, qu'un vaiſſeau qui navigeroit ſur une mer peu agitée, où l'on ne connoîtroit ni les vagues, ni les grands coups de vent.

CHAPITRE TROISIEME.

Syſteme du monde.

QUoique nous nous ſoyons déja fort étendu ſur les différens Phénomenes que doit obſerver un même Spectateur placé à différens points de vûe, cependant pour donner ici une idée plus vaſte & plus étendue, qu'on n'a coutume de la concevoir, de la nature & de l'arrangement des parties de cet univers; pour mieux faire con-

noître l'harmonie admirable des mouvemens céleſtes ; en un mot, pour parvenir au but que nous nous ſommes propoſé, & nous étendre en quelque maniere ſur la conſtruction & ſur la formation de ce monde ; il eſt néceſſaire de ſuppoſer l'œil de l'Obſervateur non pas ſeulement dans un même lieu, mais à diverſes diſtances de la Terre, à des diſtances de pluſieurs millions de lieuës, afin qu'étant accoûtumé à juger & à comparer le réſultat des obſervations qu'il auroit faites ſous ces différens points de vûe, il puiſſe ſe former une idée juſte & diſtincte des ouvrages du Créateur.

C'eſt pourquoi nous ſuppoſerons d'abord, pour mieux reconnoître les mouvemens des corps céleſtes, que nous ne ſommes plus habitans de la Terre, ni fixés ſur cet atome, mais que nous avons la liberté de parcourir l'immenſité de l'eſpace ; & afin de reconnoître plus exactement les diverſes apparences que l'on doit obſerver dans chaque lieu, nous nous tranſporterons tantôt dans le Soleil, tantôt dans les Planetes, dans les Etoiles fixes, & dans les Cometes *.

Car quoique nos corps arrêtés ſur la ſurface de la Terre par l'effet de la peſanteur, ne puiſſent s'élever juſques dans les Cieux, rien n'empêche néantmoins que notre ame, ou plutôt notre imagination, ne ſe tranſporte dans toutes les régions céleſtes : ce que l'on peut nous accorder d'autant plus facilement, que c'eſt un uſage anciennement établi, & qui n'a jamais été conteſté à aucun Aſtronome. Ils ont, dis-je, tranſporté l'œil de la ſurface au centre de la Terre, afin de mieux reconnoître la régularité des mouvemens céleſtes : bien plus ils ont fait paſſer des cercles & des lignes droites par le Soleil & par les

* *Juvat ire per alta*
Aſtra. Juvat terris & inerti ſede relictis,
Nube vehi, validique humeris inſiſtere
Atlantis ..... Horat.

Etoiles ; suppositions, qu'ils sont obligés de faire continuellement, & qu'il faut bien leur accorder, puisqu'autrement ce seroit renverser les fondemens de l'Astronomie, ou que cette science demeureroit très-imparfaite, & qu'envain les Astronomes y sacrifieroient tant de veilles, de fatigues, & de dépenses.

Ainsi puisque c'est une chose si usitée parmi les Astronomes d'imaginer l'œil du Spectateur transporté au centre de la Terre, pour en déduire cette regularité constante du mouvement diurne ou apparent, ne peut-on pas supposer pareillement, le Spectateur transporté dans les Cieux, ne peut-on pas le fixer dans le lieu du Monde, d'où il découvrira les mouvemens réels & absolus des corps célestes, & d'où il les reconnoîtra semblables autant qu'il est possible ? Car les Astronomes, quelque système qu'ils aient embrassé, ont reconnu de tout tems que les mouvemens des Planetes étoient simples, réguliers, & uniformes ; mais à ne les observer que de la surface ou du centre de la Terre, on s'apperçoit bientôt que le mouvement apparent de toutes les Planetes, est inégal, & que leur cours est très-irrégulier ; d'où l'on doit naturellement conclure que la Terre n'est point le centre de leurs vrais mouvemens. C'est pourquoi pour observer les mouvemens propres de tous les corps célestes, il faudroit supposer que l'œil fût placé ou au centre du Soleil, ou du moins à une très-petite distance de ce corps lumineux. Examinons quelles doivent être les apparences du Ciel dans ce point de vuë.

Lorsque l'on compare les mouvemens des Planetes ; l'on s'apperçoit quevûs de la terre, leur cours est fort irrégulier.

Il y a néantmoins une remarque importante à faire avant que d'aller plus loin, sçavoir, qu'en quelque lieu qu'on suppose un Observateur, il doit juger naturellement qu'il est au centre de tout ce qui l'environne. Car comme les objets dont il s'agit, sont supposés fort éloignés, il importe peu qu'ils soient à une grande distance les uns des autres, surtout s'ils se trouvent dans une même ligne qui

Un Spectateur en quelqu'endroit qu'on le suppose, est toûjours placé au centre des objets les plus éloignés auxquels sa vûë peut s'étendre.

passe par notre œil ; puisque nous les rapportons communément au même lieu de cet espace immense qui comprend l'univers : & que nous les jugeons tous à une même distance. Ainsi, l'Observateur ne pouvant appercevoir d'un seul coup d'œil, les vraies distances des objets qui l'environnent, il faut nécessairement qu'il les regarde tous comme fixes dans la surface concave d'une même sphere, qui auroit pour centre le lieu où il se trouve ; & partant il verra tous les mouvemens apparens se faire dans les différens cercles de cette même surface sphérique. C'est donc aussi pour cette raison que l'on s'imagine communément que le Soleil, la Lune, tous les autres Astres aussi bien que les nuages, sont placés à une même distance de nous dans une surface sphérique concave, quoiqu'il soit cependant certain que les Etoiles sont à une distance immense de la Terre en comparaison de celle de la Lune, & même que les nuages ne sont élevés tout au plus au-dessus de nous, que d'environ une ou deux lieues. On peut donc conclure qu'en quelque lieu que l'on veuille supposer un Observateur, soit dans le Soleil, soit dans Saturne qui est la Planete la plus élevée, soit même dans une Etoile fixe, ce lieu pourra toujours être pris pour le centre du monde ; c'est-à-dire, que ceux qui l'habiteront, pourront se regarder comme au centre de l'univers.

Idée générale de ce que verroit un Spectateur placé dans le Soleil.

Considérons maintenant ce que doit observer un Spectateur qui seroit au centre du Soleil. Si malgré la lumiere éclatante de cet astre, il lui étoit possible de voir le Ciel, ne lui paroîtroit-il pas comme un voûte ou surface sphérique concave, remplie d'une multitude infinie de ces Etoiles que nous nommons fixes ? Car comme elles nous paroissent de la Terre conserver entr'elles une même situation & une même distance, ce sera la même chose étant vûes du Soleil, puisque leurs distances à la Terre ou au Soleil sont si grandes, comme on le verra ci-après, qu'à peine

peine un Obſervateur muni d'excellens inſtrumens pourroit s'appercevoir du plus petit changement ſenſible dans leurs ſituations apparentes. Il y a cependant cette grande différence entre un Obſervateur placé dans le Soleil, & un autre qui ſeroit ſur la Terre, que ce dernier, quoiqu'il apperçoive à la vérité les Etoiles fixes à des diſtances qui ſont chaque jour exactement les mêmes pendant le cours d'une ou pluſieurs années, elles lui ſemblent cependant dans un mouvement continuel, elles lui paroiſſent, dis-je, tantôt s'élever, tantôt s'abaiſſer: en un mot, tourner chaque jour autour de l'axe de la Terre: au lieu que celui qui ſeroit au centre du Soleil les remarqueroit conſtamment dans une ſituation fixe & invariable; il les appercevroit généralement toutes immobiles dans le même endroit du Ciel. Or il importe peu dans le cas préſent, que l'on attribue le mouvement qui ſe fait chaque jour en vingt-quatre heures à la Terre ou au Ciel. Car, ſoit que les Etoiles reſtent immobiles, ſoit que le Ciel avec toutes les Etoiles & le Soleil ſoit emporté chaque jour preſque d'un même mouvement d'Orient en Occident; l'Obſervateur que nous avons ſuppoſé au centre du Soleil n'appercevroit pas moins chaque Etoile immobile dans le même endroit du Ciel; puiſque ce prétendu mouvement continuel du Soleil & des Etoiles fixes autour de la Terre, ne lui ſeroit aucunement ſenſible. Il ſuffit de ſe rappeller ici ce que nous avons dit ci-deſſus à l'égard de ceux qui navigent en pleine mer, & qui ne s'apperçoivent point du mouvement de leur vaiſſeau.

La diſtance des étoiles fixes au Soleil eſt immenſe.

On apperçoit encore outre cette multitude d'Etoiles fixes, ſix autres Etoiles plus remarquables, mais qui tournent autour du Soleil dans des tems fort inégaux; ce qui n'empêche pas néantmoins que la durée de leurs révolutions ne ſoit toujours conſtante. Elles ont différentes poſitions, ſoit entr'elles, ſoit par rapport aux autres Aſtres:

Ce que l'on entend par les planetes, ou les ſix étoiles errantes.

elles changent presque continuellement de lieu dans le ciel. Ces Etoiles errantes ont été nommées Planetes, & la Terre que nous habitons, a été mise par le plus grand nombre des Astronomes au rang de ces mêmes Planetes: mais quand on supposeroit que la Terre est immobile ; & que c'est le Soleil qui fait chaque année une révolution dans l'Ecliptique, il ne sera pas moins vrai de dire qu'un Spectateur placé dans le Soleil, verroit chaque année la Terre parcourir le cercle de l'Ecliptique, comme on le démontrera d'une maniere plus évidente dans les Chapitres suivans.

Les planetes font leurs revolutions autour du Soleil & se meuvent d'Occident en Orient.

Les noms des Planetes & les caracteres qui les désignent sont, Saturne ♄, Jupiter ♃, Mars ♂, la Terre ♁, Venus ♀, & Mercure ☿, qui est le plus proche du Soleil.

Toutes ces Planetes se meuvent dans leurs Orbites autour du Soleil, & à peu près dans un même plan : leurs mouvemens se font d'Occident en Orient ; c'est-à-dire, qu'elles suivent toutes une même direction. Quand nous disons néantmoins, que leurs orbites sont à peu près dans un même plan, c'est qu'elles sont fort peu inclinées l'une à l'autre ; & que la ligne où se coupent les plans de ces orbites, passe toujours par le centre du Soleil. Or il suit de là qu'un Observateur placé à ce centre seroit toujours dans le vrai plan de l'orbite de chacune des Planetes qu'on vient de nommer ci-dessus : il leur verroit décrire exactement des révolutions périodiques dans le plan d'un grand cercle de cette surface sphérique concave du Ciel dont nous avons parlé ; mais il ne pourroit à la vûe simple juger de leur plus grande ou de leur plus petite distance au Soleil. C'est pourquoi pour mieux reconnoître ces différentes distances des Planetes au Soleil, aussi-bien que les principales inégalités apparentes de leurs mouvemens, il est à propos de transporter ailleurs l'œil de l'Observateur, que nous avons supposé jusqu'ici dans le Soleil. Nous pouvons donc

le ſuppoſer élevé au-deſſus du plan des orbites des Planetes, ou plutôt dans la ligne perpendiculaire à l'orbite de la Terre, qui paſſe par le centre du Soleil, & de plus à la même diſtance de ce centre, que la Terre eſt éloignée du Soleil. C'eſt, dis-je, de cet endroit du Ciel que l'Obſervateur pourra juger facilement des différentes diſtances des Planetes au Soleil : il verra d'abord celles qui ſont plus proches du Soleil faire leurs révolutions périodiques dans un intervalle de tems moins conſidérable que celles qui en ſont plus éloignées : leur ſituation ſera auſſi telle que la figure les repréſente. On y apperçoit premierement le Soleil au centre de toutes les orbites ; il eſt immobile en ce lieu, & les ſix Planetes, Mercure, Venus, la Terre, Mars, Jupiter & Saturne tournent perpétuellement autour de lui d'Occident en Orient ; c'eſt-à-dire, ſelon l'ordre des lettres *ABCD*. Mercure qui eſt le plus proche du Soleil, fait ſa révolution en trois mois ; Venus dont l'orbite eſt un peu plus grande, y emploie huit mois ou environ : plus loin du Soleil eſt la Terre, qui acheve ſa révolution dans l'eſpace d'une année ; Mars en deux ans : mais Jupiter qui eſt beaucoup plus élevé, eſt douze ans à faire chaque révolution. Enfin Saturne eſt de toutes les Planetes celle qui met le plus de tems à parcourir ſon cercle autour du Soleil : l'orbite de cette Planete, comme l'on voit, renferme toutes les autres ; & l'on obſerve que ſa révolution périodique eſt de trente ans. Voilà l'expoſition la plus ſimple de cet ancien ſyſteme du monde, enſeigné par Pythagore, & par ſes Diſciples. Ce Philoſophe qui l'avoit appris dans l'Orient, le répandit bientôt dans la Grece : mais le commun des Philoſophes embraſſa long-tems après un autre ſyſteme, qui ſuppoſoit la Terre immobile, & qui attribuoit aux cieux tous les mouvemens apparens. Ariſtote & ceux de ſa ſecte, qui ont enſeigné dans les écoles pendant les ſiécles ſuivans, avoient adopté cette

Situation des planetes ſoit entr'elles ſoit à l'égard du Soleil.

PLANCHE I. *Figure* 10.

derniere opinion, & l'auroient long-tems ſoutenue, ſi ſe ſçavant Aſtronome *Copernic* n'avoit tiré de l'oubli, & fait revivre, pour ainſi dire, l'ancien ſyſteme de Pythagore, l'unique & le véritable ſyſteme du Monde, comme il étoit aiſé à tous les bons eſprits de s'en convaincre, s'ils euſſent réfléchis ſur les ſolides raiſons qu'il en a rapportées. Ce ſyſteme a été appellé de ſon nom depuis le ſeizieme ſiecle, *ſyſteme de Copernic*. Environ cent ans après * la découverte des lunettes d'approche a fait connoître aux hommes un nouveau Ciel. On y a apperçu tant de Phénomenes ſurprenans, que l'ancien ſyſteme a bientôt été reconnu pour le vrai ſyſteme du monde; ce qu'il eſt aiſé de prouver d'une maniere à ne laiſſer, ce me ſemble, aucune réplique.

Les planetes ſont des corps ſphériques opaques.

Lorſqu'on conſidere les Planetes avec les meilleures lunettes d'approche, on remarque que ſemblables à la Terre, ce ſont des corps ſphériques & opaques. Car la portion du globe de chaque Planete qui eſt tournée vers le Soleil, étant éclairée, nous renvoie la lumiere par réflexion; mais l'autre portion qui eſt oppoſée, étant dans les ténebres, eſt entierement plongée dans l'ombre; & c'eſt cette ombre, comme on le verra ci-après, que nous voyons quelquefois jettée dans la partie oppoſée au Soleil. Or la ligne qui ſépare la portion éclairée d'avec la partie obſcure d'une Planete, nous paroît tantôt droite, & tantôt courbe, de maniere qu'elle eſt quelquefois concave, & quelquefois convexe, ſelon les diverſes ſituations de notre œil & de la Planete par rapport au Soleil qui l'éclaire. Nous voyons cette portion éclairée de la Planete, plus ou moins grande, ſuivant les différentes ſituations où ſe trouve la Terre que nous habitons; ce qui doit arriver néceſſairement à tous les corps ſphériques qui ſeront opaques, & qui ne reçoivent d'autre lumiere, que celle qui eſt empruntée du Soleil.

* Sçavoir en 1608.

Des planetes secondaires ou satellites.

Il y a auſſi trois Planetes ; ſçavoir, la Terre, Jupiter, & Saturne, qui ſont actuellement environnées d'autres petites Planetes qui les accompagnent dans chaque révolution autour du Soleil : on appelle ces petites Planetes, *Lunes* ou *Satellites*. Elles font leurs révolutions autour de leur Planete principale. La Terre n'a qu'une Lune ou Satellite, qu'elle entraîne autour du Soleil en parcourant ſon orbite chaque année, pendant que cette Lune fait une révolution chaque mois autour de la Terre, qui eſt au centre de ſes révolutions périodiques.

La Lune eſt un ſatellite de la terre.

Quant à ce que la Lune jette une ſi grande lumiere, en comparaiſon de celle de toutes les autres Etoiles, & qu'elle nous paroît d'une grandeur à peu près égale à celle du Soleil ; cela vient uniquement de ce qu'elle eſt fort proche de la Terre. Car ſi on l'obſervoit du Soleil, elle ne paroîtroit pas ſous un angle ſenſible, de ſorte qu'à peine ſeroit-elle viſible. Ce ſeroit donc la même choſe ſi elle étoit auſſi éloignée de la Terre, qu'eſt le Soleil ; on ne l'appercevroit gueres avec la lunette d'approche, que comme un petit point lumineux.

Jupiter a quatre Lunes ou Satellites.

Jupiter eſt continuellement accompagné de quatre Lunes ou Satellites, qui tournent autour de lui en des tems fort différens ſelon leurs diſtances au centre de leur Planete principale. * Le premier Satellite qui eſt éloigné

* Révolutions Périodiques des Satellites autour de Jupiter.

Le I.	II.	III.	IV.
1 jour. 18 h. 27'. 34".	3 j. 13 h. 13'. 42".	7 j. 3 h. 42'. 36".	16 j. 16 h. 32'. 09".

Diſtances en demi-diametres de Jupiter, & déduites des Tems Périodiques.

5,667	9,017	14,384	25,299

M. Pound a déterminé avec de fort bons Micrometres, les élongations des Satellites, d'où il réſulte que la plus grande élongation Héliocentrique du 4e Satellite, obſervée par le moyen de la lunette de 15. pieds, & réduite à la moyenne diſtance de Jupiter à la Terre, ſeroit de 8' 16" à l'égard du centre de Jupiter ; enſuite il a conſtaté par le ſecours du Téleſcope de M. Huygens de 123 pieds Anglois, l'élongation du 3e Satellite 4'. 42". Le Diametre de Jupiter avec le

du centre de Jupiter, de trois fois le diametre de cette Planete, ou plus exactement $2\frac{5}{8}$, fait sa révolution en un jour & 18 heures: le second, qui est éloigné de $4\frac{1}{2}$ diametres acheve sa révolution en 3 jours & 13 heures: le troisieme, en 7 jours & 3 heures, étant éloigné de $7\frac{1}{2}$ diametres de Jupiter: le quatrieme enfin emploie 16 jours & 18 heures à faire sa révolution, étant distant d'environ 12 diametres de Jupiter.

Le Grand *Galilée* a été le premier qui ait apperçu ces quatre Satellites de Jupiter, par le moyen des lunettes d'approche qu'on venoit de découvrir; il fut le premier à le perfectionner, & il s'en servit merveilleusement pour enrichir l'Astronomie. Il se crut même en droit de donner à ces nouvelles Planetes le nom des Medicis, dont il étoit le Mathématicien, & qui depuis près d'un siecle étoient devenus très-puissans en Italie. Ces Satellites de Jupiter ont été dans la suite très-utiles au progrès de la Physique céleste, & de la Géographie.

Cinq Satellites autour de Saturne.

Saturne dans ses révolutions autour du Soleil entraîne aussi avec lui cinq Satellites que l'on a apperçus successivement en y employant d'excellentes lunettes. Comme il est rare d'en trouver d'aussi excellentes & d'une aussi grande longueur, & qu'il est d'ailleurs fort difficile d'appercevoir ces Satellites à cause de leur extreme petitesse, on ne peut pas les observer aussi souvent que ceux de Jupiter.

même Téleſcope étant dans ſes moyennes diſtances à la Terre de 39″. Enfin par les Tems Périodiques, les élongations réduites des deux autres Satellites ont été trouvées de 2′ 56″ 47‴ & 1′ 51″ 06‴.

MM. Newton & Pound, ont encore déduit de l'obſervation du paſſage de l'ombre du premier Satellite ſur le diſque de Jupiter, le diametre de cet aſtre de 37″. Mais par le tems du paſſage obſervé tant du premier, que du troiſieme Satellite, ils ont déterminé le diametre de $37''\frac{1}{3}$. & $37''\frac{11}{12}$. C'eſt pourquoi M. Newton ſuppoſe le Diametre de Jupiter dans ſes moyennes diſtances à la Terre de $37''\frac{1}{4}$. Et partant les élongations rapportées ci-deſſus, réduites en demi-diametres de Jupiter, ſeront 5,965 9,494 15,141 & 26,63.

La révolution du premier Satellite autour de Saturne * eſt de $1\frac{7}{8}$ jour ; ſa diſtance au centre étant de $4\frac{1}{4}$ demi-diametres de Saturne : le ſecond Satellite fait ſa révolution en 2 jours 17 heures à diſtance de $5\frac{1}{7}$ demi-diametres : le 3e en 4 jours 13 heures à diſtance de 8 demi-diametres : le 4e en 16 jours à diſtance de 18 demi-diametres. Enfin le cinquieme & dernier Satellite fait ſa révolution en $79\frac{1}{2}$ jours, étant à diſtance du centre de Saturne de 54 demi-diametres.

Anneau de Saturne.

Saturne eſt encore environné d'un Anneau ou cercle lumineux ſemblable à la trace que feroit la Lune autour de la Terre, s'il en reſtoit un veſtige lumineux, lorſque nous la voyons tourner chaque jour d'Orient en Occident. Cet Anneau ou bande lumineuſe eſt également éloignée de la ſurface de Saturne, & ſe ſoutient à une aſſez grande diſtance comme une voûte, chaque partie péſant également vers le centre de la Planete. Son diametre ** eſt un peu

* Révolutions Périodiques des Satellites autour de Saturne.

I.	II.	III.
1 jour 21^h $18'$ $27''$	2 j. 17^h $41'$ $22''$	4 j. 12^h $25'$ $12''$.
I V.	**V.**	
15 j. 22^h $41'$ $14''$.	75 j. 7^h $48'$ $00''$.	

Diſtances au centre de Saturne, déduites des tems Périodiques

1,93	2,47	3,45	8,00	23,35.

Ces diſtances ont été calculées dans la ſuppoſition que le 4e Satellite, qui fut le premier découvert par M Huygens, ſe trouve éloigné dans ſa plus grande élongation du centre de Saturne d'environ 8 demi-diametres de l'anneau de cette Planete.

Enſuite MM. Newton & Pound ont établi par les obſervations faites avec le Téleſcope de 123 pieds, la plus grande élongation du même Satellite de 8,7 demi-diametres de l'anneau de Saturne ; d'où l'on tire, ſelon les Tems Périodiques rapportés ci-deſſus, les diſtances au centre de Saturne en demi-diametres de l'anneau.... 2,10 2,69 3,75 8,70 25,35.

** Vers la fin du Printems de l'année 1719 M. Pound a meſuré par le ſecours du Micrometre appliqué à la Lunette de 123 pieds, les diametres de Saturne & de ſon anneau ; & ayant déterminé leur rapport comme 3 à 7, & l'angle qu'occupoit ce dernier de 43", il a été facile d'en conclurre que l'anneau de Saturne dans ſes moyennes diſtances à la Terre, paroit ſous un angle de 42" & Saturne ſous un angle de 18". Mais la dilatation des rayons de lumiere, quoique bien moins ſenſible dans les grandes lunettes que dans celles dont on ſe ſert ordinairement, ſemble les réduire à 40" & 16", comme il eſt démontré dans les principes d'Optique de M. Newton.

M. Huygens avoit déterminé autrefois le diametre de l'anneau de 22" ou 24" plus grand, c'eſt-à-dire, de 64" : & il y avoit dans cette premiere obſervation deux

plus du double du diametre de Saturne; & quoique l'épaiſſeur de cette bande circulaire ſoit fort mince, ſa largeur ou profondeur eſt néantmoins ſi conſidérable, qu'elle égale à très-peu près la moitié de la diſtance entre la ſuperficie extérieure de l'Anneau & la ſurface de Saturne; au reſte, cet Anneau ſe ſoutient toujours de la même maniere, renfermant un grand vuide tout autour, entre ſa ſurface concave & la ſurface extérieure du globe de Saturne. Quant à l'uſage dont peut être un Anneau ſi extraordinaire, c'eſt ce que nous ne ſçavons pas bien préciſément: & même il eſt probable qu'on l'ignorera encore long-tems; car nous ne voyons rien de ſemblable ni d'analogue à ce phénomene en parcourant tout ce que l'on a obſervé de plus merveilleux dans la Nature. Nous pouvons ſeulement réfléchir ſur la grandeur des ouvrages & la toute-puiſſance de Dieu; & ſur ce qu'il nous inſpire chaque jour les moyens de connoître la magnificence de ſes ouvrages.

ſources d'erreurs, qu'il a fallu corriger dans la ſuite. La premiere vient de ce que l'eſpece de Micrometre qu'il plaçoit au foyer de ſa Lunette étoit défectueux, & donnoit néceſſairement les diametres des corps lumineux un peu trop grands: la ſeconde y contribuoit auſſi, en ce qu'il n'étoit pas poſſible de dépouiller, même avec les plus grandes Lunettes, cette fauſſe lumiere qui environne toujours le diſque tant des Planetes que des Etoiles. Ces erreurs ne pouvoient cependant influer dans la recherche que M. Huygens fit d'abord de l'inclinaiſon du plan de l'anneau, ni dans la poſition de ſon nœud à l'égard de l'Ecliptique.

Mais en 1668 lorſque MM. Huygens & Picard rechercherent par une autre méthode l'inclinaiſon du plan de cet anneau, comme ils avoient choiſi pour cet effet le tems auquel l'œil étoit le plus élevé ſur le plan, & l'appercevoit par conſéquent le moins obliquement qu'il fût poſſible, le rapport du cofinus de l'inclinaiſon au ſinus total, qu'ils tirerent du rapport obſervé du petit au grand axe de l'anneau, n'étoit pas exact, & on le corrigera, ſi l'on diminue d'une même quantité ces deux axes, à cauſe de l'irradiation de la Lumiere. Il ne faut donc pas s'étonner ſi cette inclinaiſon du plan de l'anneau à l'égard de l'Ecliptique a pour lors été déterminée trop grande, & s'il faut la réduire à environ $23^{\circ}\frac{1}{2}$, comme il avoit été conclu par la premiere méthode.

On remarquera de plus que les nœuds de l'anneau rétrogradent, & qu'en cette année 1744. ils paroiſſent moins avancés de près d'un degré que vers le milieu du dernier ſiecle. Ceci n'a pu cependant être déterminé avec d'aſſez grandes lunettes: mais cela paroît néantmoins confirmé par les obſervations faites en 1716. avec le Téleſcope de Campani d'environ 34 pieds. On trouvera dans le Livre de la Figure des Aſtres de M. de Maupertuis les conjectures les plus vraiſemblables qui aient été propoſées juſqu'ici ſur la formation de cet Anneau.

CHAPITRE QUATRIEME.

Où l'on prouve que le Syſteme qu'on vient d'expoſer, eſt le vrai ſyſteme du Monde.

UNe des principales objections que l'on pourroit faire contre le Syſteme que nous avons expliqué dans le Chapitre précédent, c'eſt qu'en vain y auroit-on ſuppoſé le Spectateur tranſporté dans le lieu du ciel d'où il découvriroit non-ſeulement les mouvemens propres de chaque Planete, mais auſſi l'ordre dans lequel elles font leurs révolutions périodiques; puiſque cette ſuppoſition ne pouvant être regardée que comme une fiction gratuite ou imaginaire, il en ſeroit de même de la ſituation que l'on vient d'attribuer à tous les Corps céleſtes. D'ailleurs, ſelon ce même principe, pour peu que l'on parte de quelque ſuppoſition différente, on ne manqueroit pas de donner tout autre arrangement aux Planetes. Ne ſeroit-il donc pas plus ſimple, étant d'ailleurs fondé ſur le rapport des ſens, de ſuppoſer la Terre immobile, & faire tourner autour de cette maſſe, comme autour d'un centre, le Soleil & les Planetes, pour en déduire les véritables regles de leurs mouvemens, & rendre raiſon de tous les Phénomenes? Je réponds à cette objection qu'il eſt bien vrai qu'on a ſuppoſé le Spectateur dans le ciel, & même dans le lieu d'où il pourroit appercevoir d'un même coup d'œil le Soleil & toutes les Planetes qui l'environnent; mais qu'il ne s'enſuit pas de cette ſuppoſition, que l'ordre & l'arrangement que nous avons donné aux Planetes ſoit une pure fiction, puiſqu'il eſt vrai de dire qu'effectivement il nous paroîtroit tel, ſi nous avions la liberté de parcourir les cieux, & nous croyons en effet être bien fondés lorſque nous

Dans la vraie Aſtronomie on doit rejeter toute hypothèſe, lorſqu'elle n'eſt fondée que ſur une fiction abſurde ou imaginaire.

aſſûrons qu'il n'y a rien de plus certain, de plus vrai, ni de plus inconteſtable. C'eſt à cette occaſion qu'il eſt à propos de faire remarquer que dans l'Aſtronomie qu'on ſe propoſe de donner ici, l'on a tâché de s'éloigner de toutes ces hypothèſes ou ſuppoſitions chimériques, ſi communes aux Philoſophes des derniers ſiecles. Nous ne voulons avoir ici d'autres guides que la nature & les Obſervations Aſtronomiques; nous croyons ne devoir rien aſſûrer, qui ne ſoit fondé ſur les meilleurs raiſonnemens phyſiques & ſur les démonſtrations géométriques: ce qui eſt bien différent de l'Aſtronomie qui s'eſt enſeignée dans les Ecoles depuis Ariſtote juſqu'à Tycho, laquelle étoit tellement embrouillée par de vaines fictions ou par des hypothèſes, qu'elle ne préſentoit autre choſe qu'un tiſſu de ſuppoſitions abſurdes & ſans aucun fondement, ſans compter que tout le ſyſteme du Monde y paroiſſoit défiguré d'une maniere bien étrange. Notre Aſtronomie au contraire, qui eſt bien plus ancienne, étant à peu de choſe près la même que celle de Pythagore, à été enſeignée long-tems avant cette derniere & dans des ſiecles plus éclairés: auſſi ſe ſoutient-elle par elle-même, & nous fait-elle connoître avec plus d'éclat la diſpoſition admirable des parties qui compoſent cet Univers. Mais en même-tems, pour peu que l'on y réfléchiſſe, y a-t-il rien qui puiſſe relever davantage l'eſprit humain, & qui puiſſe mieux nous apprendre tout ce qu'il eſt capable de produire, lorſqu'il joint à une grande ſagacité, des réflexions ſolides & profondes? Car pour être parvenu à découvrir le vrai ſyſteme du Monde, combien n'a-t-il pas fallu vaincre de préjugés? Quelle ſubtilité, quelle fineſſe, quelle ſolidité n'a-t-il pas fallu employer dans les raiſonnemens? Quel courage extraordinaire pour oſer s'élever & découvrir enfin l'ordre le plus naturel dans lequel ont été diſpoſées les parties de l'Univers? Il eſt donc tems

de dévoiler ici les preuves sur lesquelles est fondé le vrai systeme du Monde, & de désigner enfin les principales routes par où l'on est parvenu à frayer le chemin des cieux.

Preuve du mouvement des Planetes; le Soleil se trouve renfermé dans leur orbite.

Je dis premierement qu'en quelque lieu que l'on place le Soleil, il faut nécessairement reconnoître qu'il est renfermé dans l'orbite de Venus: en voici la preuve. Venus nous paroît passer tantôt derriere le Soleil, & tantôt entre le Soleil & la Terre. Elle passe derriere le Soleil lorsque vers le tems de sa conjonction, quand elle nous paroît fort proche de ce Corps lumineux, on l'apperçoit pleine ou parfaitement ronde, sa lumiere étant également vive de toute part. Qu'on se rappelle ici ce qui a été déja dit de cette Planete, qui est un Corps opaque aussi-bien que toutes les autres. Elle ne reçoit d'autre lumiere que celle du Soleil qui l'éclaire d'un côté, pendant que son hemisphere opposé au Soleil demeure dans les ténebres & dans l'obscurité. Il est donc évident que toutes les fois que Venus nous paroît pleine ou parfaitement ronde, la surface ou la moitié de cette Planete que nous appercevons, est précisément la même qui est tournée vers le Soleil; & qu'ainsi Venus est à notre égard bien au-delà du Soleil. Soit, par exemple, le Soleil en *S*, la Terre en *T*, & Venus en *F* ou *V*; il est aisé de voir que dans ce cas Venus nous paroîtra de la surface de la Terre, exactement ronde, puisque c'est le tems qu'elle parcourt réellement la partie de son orbite, qui est au-delà du Soleil. Au contraire, lorsque dans ses conjonctions au Soleil elle disparoîtra tout-à-fait, ou qu'on ne la verra seulement que comme un croissant fort mince (tel que celui de la Lune, le premier ou le dernier jour de chaque lunaison) nous devons en conclurre que cette Planete est alors entre la Terre & le Soleil; car son hémisphere éclairé n'est plus tourné vers nous, Venus étant alors au point *G* de

PLANCHE I. *Figure* 11.

ſon orbite ; ou bien elle ſera au point *H*, ſi l'on apperçoit une petite partie de ſon diſque éclairé. Auſſi lorſque Venus eſt entre la Terre & le Soleil, il doit arriver qu'elle paſſera quelquefois ſur le diſque même du Soleil. Et c'eſt ce qui a été déja obſervé une fois depuis la découverte des lunettes d'approche : on l'a vûe comme une groſſe tache noire & parfaitement ronde. Ce phénomene rare & ſingulier, obſervé pour la premiere fois par un jeune Anglois nommé Horroxius, eſt arrivé l'an 1639. On a calculé depuis, le tems où Venus y reparoîtroit pour la ſeconde fois, & l'on a trouvé que le 6 Juin de l'année 1661 elle traverſeroit le diſque apparent du Soleil. Enfin cette même Planete ne s'éloigne du Soleil qu'à une certaine diſtance, au-delà de laquelle on obſerve, qu'elle ne ſçauroit s'écarter. Jamais elle n'a paru à plus de 48° de diſtance au Soleil, ce qui eſt bien moins qu'un Arc de 60° & 90° ; & par conſéquent Venus eſt bien éloignée de paroître en oppoſition ou à 180° du Soleil. Cependant, pour que ſon orbite renfermât l'orbite de la Terre, il faudroit qu'elle nous parût à d'auſſi grands arcs de diſtances.

Les mouvemens que l'on obſerve à l'égard de Venus ſont conformes à ceux que l'on remarque dans la Planete de Mercure.

Il en eſt de même de Mercure qui eſt preſque perpétuellement plongé dans les rayons du Soleil, & qui, parce qu'il s'en écarte beaucoup moins que Venus, doit par cette raiſon avoir une orbite plus petite. Nous ne répéterons point ici tout ce qui a été dit ci-deſſus pour prouver que ſon orbite ſemblable à celle de Venus, doit renfermer le Soleil enſorte que celui-ci en occupe le centre. Toute la différence qu'il peut y avoir en appliquant les mêmes preuves à Mercure, c'eſt que l'orbite de Venus comprend celle de Mercure, qui eſt plus petite ; mais le Soleil demeure conſtamment au centre de l'une & l'autre orbite. Une autre preuve que Mercure eſt plus proche du Soleil, c'eſt que ſa lumiere eſt très-vive, & bien plus

éclatante que celle de Venus & des autres Planetes.

Mars, bien différent des deux Planetes dont nous venons de parler, paroît quelquefois en opposition, c'est-à-dire, à 180° de distance au Soleil. Il faut donc que son orbite contienne ou renferme non seulement la Terre, mais aussi le Soleil, qui sera par conséquent au centre de l'orbite qu'il décrit. Car si l'on vouloit insister au contraire, il faudroit que vers le tems de sa conjonction au Soleil, Mars nous parût en croissant de même que Venus & Mercure, ce qui n'arrive point. Les observations nous ont appris que pour lors Mars est extrémement petit & parfaitement rond. Mais quand cette Planete se trouve éloignée du Soleil, & qu'elle en paroît distante d'environ 90°, alors sa rondeur est un peu altérée, & c'est le seul tems où l'on puisse l'observer sous cette phase.

L'orbite de Mars entoure aussi le Soleil, qui par conséquent en occupe le centre.

Soit le Soleil en *S*, la Terre en *T*, & l'orbite de Mars représentée par le cercle *MNPR*: il est aisé de voir que lorsque Mars paroîtra en *M* ou en *P*, l'on doit appercevoir de la Terre son disque exactement rond, parce que dans l'une & l'autre situation, c'est précisément le disque ou l'hémisphere éclairé qui est tourné vers nous: mais il ne l'est plus entierement lorsque Mars arrive en *N* ou en *R*; de là vient cette altération que l'on observe dans son disque apparent, n'étant pas possible alors d'appercevoir l'hémisphere lumineux dans toute son étendue. Enfin, quand Mars est en opposition au Soleil, son disque apparent est sept fois plus grand que vers sa conjonction: il est donc sept fois plus près de nous que dans l'opposition, & tout au contraire dans la conjonction il est le plus loin de nous qu'il puisse être. Par cette observation même, n'est-on pas bien fondé à conclurre que ce n'est pas la Terre, mais le Soleil qui est au centre de l'orbite de cette Planete & n'en résulte-t-il pas la preuve la plus complete que la Terre est fort éloignée de ce centre?

PLANCHE I. *Figure 12.*

La Terre n'est point au centre de l'orbite de Mars.

On observe encore à très-peu près les mêmes Phénomenes dans Jupiter & dans Saturne, qu'à l'égard de Mars.

Au reste, la même chose s'observe encore à l'égard des diametres apparens de Jupiter & de Saturne, n'y ayant de différence que dans la quantité dont ces diametres, & par conséquent les distances à la Terre de ces Planetes, varient dans le cours de chaque année : car l'inégalité dans les diametres ou dans les distances est bien moins considérable dans Jupiter que dans Mars, & beaucoup moins encore dans Saturne que dans Jupiter. Mais il suit néantmoins de ces variétés de diametres & de distances, que l'une & l'autre Planete font leurs révolutions autour du Soleil dans des orbites qui sont fort au-delà de l'orbite de Mars. De plus lorsqu'on observe de la Terre les mouvemens de toutes ces Planetes, ils nous paroissent inégaux & très-irréguliers. Nous les voyons toutes successivement directes, stationaires & rétrogrades ; au lieu qu'en réduisant leurs mouvemens à ceux que l'on observeroit du Soleil, on trouve que chaque Planete doit parcourir son orbite toujours dans le même sens, suivant une même direction ; on n'y reconnoît plus qu'une seule loi générale, laquelle est inaltérable ou constante, comme on le verra ci-après.

Comment on prouve que la Terre se meut aussi dans une orbite particuliere autour du Soleil.

De tout ce que nous venons de dire, l'on doit enfin conclurre, que c'est le Soleil & non pas la Terre qui est au centre des orbites de toutes les Planetes. Car, puisque l'on a démontré que la Terre se trouve placée entre les orbites de Venus & de Mars, il faut nécessairement qu'elle ait une orbite semblable à celle de ces Planetes, & que par conséquent elle tourne autour du Soleil. Ceci est d'autant plus facile à démontrer, que si, malgré ce qui a été dit ci-dessus, quelqu'un vouloit prétendre que la Terre reste toujours immobile au-dedans des trois orbites de Mars, de Jupiter & de Saturne qui l'environnent, on le convaincroit bientôt par un calcul fort simple, que dans cette situation il ne seroit plus possible

d'observer ces mêmes Planetes stationaires ou rétrogrades: or il est certain qu'on les observe chaque année tantôt directes & tantôt stationaires ou rétrogrades. Il faut donc conclurre que notre Terre se trouvant placée parmi un si grand nombre de Planetes, & à peu près vers le milieu entre les orbites de Mars & de Venus; la Terre, dis-je, de même que toutes ces Planetes doit faire aussi ses révolutions dans une orbite à l'entour du Soleil. D'ailleurs, comme l'orbite de la Terre se trouve entre celle de Venus & de Mars, de même le tems de sa révolution doit s'accomplir nécessairement entre les tems des révolutions de ces deux Planetes. Or le tems que Venus emploie à faire sa révolution est d'environ huit mois: la Terre, comme l'on sçait, y emploie une année, & enfin la révolution de Mars se fait en deux ans. Voilà, ce me semble, assez de preuves inconteſtables pour démontrer le mouvement de la Terre: il n'en a pas fallu d'autres pour nous déterminer à placer la Terre dans le ciel au rang des Planetes, & pour établir le Soleil immobile au centre du Monde. Ce sont-là les principes les plus certains & les raisonnemens les plus solides sur lesquels est fondé le vrai systeme du Monde, & c'est de là d'où nous étions partis lorsqu'il en a fallu exposer les principales parties; en un mot lorsqu'il nous a fallu établir l'ordre, l'arrangement, & les mouvemens réels de tous les corps célestes.

Harmonie merveilleuse entre les distances des Planetes au Soleil & leurs tems périodiques.

Que l'on compare maintenant le tems que toutes les Planetes emploient à faire leurs révolutions, avec leurs distances moyennes au Soleil, l'on y reconnoîtra bientôt une harmonie & une proportion admirable: car plus la Planete est proche du Soleil, plus son mouvement paroit rapide, sa révolution périodique s'achevant beaucoup plus vîte que celle des autres Planetes. Mais on a découvert une loi constante & qui sert de regle aux mouvemens

Grande Regle ou Loi de Kepler.

des Planetes. Selon cette loi générale, *les Quarrés des tems périodiques ſont toujours proportionnels aux cubes des diſtances au Soleil.* Le fameux Kepler l'avoit d'abord appliquée aux Planetes principales : mais cette belle découverte s'eſt étendue dans la ſuite à toutes les autres Planetes. Car les Satellites de Saturne & de Jupiter ſuivent exactement cette loi ; c'eſt-à-dire, que les tems de leurs révolutions périodiques ſe ſont trouvés tellement réglés, que les Quarrés de ces mêmes tems ſont toujours proportionnels aux cubes des diſtances au centre de leur Planete principale. Par exemple, le premier Satellite eſt éloigné du centre de Jupiter de $2\frac{5}{6}$ diametres, & le tems de ſa révolution périodique eſt de 42 heures. Mais le tems de la révolution de tout autre Satellite (ce ſera, par exemple, le quatrieme Satellite) étant connu, ſçavoir de 402 heures, ſi l'on fait comme 1764 quarré de 42 eſt à 161604 quarré de 402, ainſi $\frac{40123}{216}$ qui eſt le cube de $2\frac{5}{6}$ à un 4e terme, l'on aura $\frac{4500000}{216}$, dont la racine cubique $\frac{76}{6} = 12\frac{2}{3}$ ſera la diſtance du quatrieme Satellite au centre de Jupiter : or c'eſt préciſément la même diſtance en diametres de Jupiter que l'on a trouvée par les obſervations.

Newton a expliqué le premier la vraie cauſe phyſique de cette regle de Kepler.

Quoique Kepler ait fait cette admirable découverte, il s'en falloit bien cependant qu'il en connût la cauſe phyſique : auſſi n'avoit-il établi cette loi qu'après avoir conſidéré une longue ſuite de diſtances des Planetes au Soleil, comparées au tems de leurs révolutions périodiques. Le grand Newton nous a enfin donné la vraie raiſon phyſique de cette loi, les principes dont il étoit parti lui en ayant fait connoître la vraie cauſe : elle eſt de telle nature, que toute autre loi ne ſçauroit avoir lieu ſi l'on admet les premiers principes & les plus évidens de toute la Phyſique.

Ainſi tous les Aſtronomes ſont obligés de reconnoître

que

que la loi de Kepler, dont on vient de parler, sert constamment de regle aux mouvemens des quatorze Planetes, c'est-à-dire, au mouvement de cinq Planetes principales qui font leurs révolutions autour d'un centre commun, & à celui de neuf autres que l'on connoît sous le nom de Satellites : d'ailleurs puisque la Terre est le centre de l'orbite que la Lune parcourt chaque Mois en faisant ses révolutions périodiques; c'est-à-dire, puisque la Lune est le Satellite de la Terre, il faudroit, pour appliquer au Soleil cette même loi générale, en supposant que ce Corps lumineux feroit ses révolutions autour de la Terre, admettre celle-ci pour un moment immobile, au centre de l'écliptique ou de l'orbite du Soleil. Mais d'autant que la Lune emploïe 27 jours à faire chaque révolution, & le Soleil une année ou 365 jours; que d'ailleurs la Lune est éloignée de nous d'environ 60 demi-diametres terrestres; on auroit donc comme le quarré de 27, sçavoir 729 est à 133225 quarré de 365, ainsi 216000 qui est le cube de 60 à un quatrieme terme; ce qui donneroit 39460356, dont la racine cubique 340 répondroit à la distance du Soleil en demi-diametres de la Terre.

On voit par là quelle seroit la distance du Soleil à la Terre, si en supposant que la Lune & le Soleil tournent autour d'elle, l'on vouloit y appliquer la loi de Kepler qu'observent tous les Corps célestes dans leurs révolutions périodiques autour d'un même centre : mais l'on sçait d'ailleurs, tous les Astronomes conviennent entr'eux, & même on le démontre d'une maniere à ne laisser aucun doute à ce sujet, que la distance du Soleil à la Terre est au moins trente fois plus grande; c'est-à-dire, qu'elle surpasse trente fois les 340 demi-diametres que l'on vient de trouver. Il faut donc conclurre nécessairement qu'on ne sçauroit admettre le mouvement du Soleil autour de la Terre, sans aller contre la loi générale qui s'observe dans

Cette harmonie n'a plus lieu, lorsqu'on vient à supposer le mouvement du Soleil autour de la Terre.

la nature, ni sans troubler le rapport constant que l'on a été obligé de reconnoître dans les mouvemens de tous Corps célestes. C'est pourquoi pour ne point altérer la loi générale dont nous venons de parler, nous croyons devoir considérer desormais la Terre dans le rang qu'elle tient parmi les autres Planetes, & nous lui ferons parcourir chaque année autour du Soleil l'écliptique qui certainement est son orbite. En effet, cette vérité une fois bien reconnue, que ce n'est point le Soleil, mais la Terre qui tourne & décrit une orbite, on rétablit aussi-tôt l'harmonie des mouvemens célestes; en un mot, la loi ou régle de Kepler est observée sans exception, ni sans rien changer à l'ordre si sagement établi par le souverain Etre dans ce vaste Univers.

Le Soleil & les Etoiles fixes ne sont point opaques, mais des Corps lumineux d'une même nature.

De même que l'on peut inférer que toutes les Planetes sont à peu près d'une même nature, puisque semblables à la Terre, nous voyons qu'elles n'ont aucune lumiere par elles-mêmes ou qu'il n'y en a jamais qu'une moitié d'éclairée; & qu'étant rondes ou sphériques, elles ne nous réfléchissent qu'une lumiere empruntée du Soleil; qu'enfin elles tournent toutes à peu près de la même maniere autour de cet Astre: de même on peut conclurre que le Soleil & toutes les Etoiles fixes sont aussi d'une matiere à peu près semblable ou homogene, puisqu'il faudra bientôt reconnoître que ces Astres sont autant de Corps lumineux; puisqu'ils sont immobiles dans le même lieu du Ciel, & qu'ils gardent une situation invariable, les uns à l'égard des autres. Car quant à ce que le Soleil nous paroît si grand en comparaison des Etoiles fixes, & que sa lumiere est si vive qu'elle efface presqu'entierement tous ces autres Corps lumineux, l'on en peut aisément trouver la cause: la Terre est à une très-petite distance du Soleil, en comparaison de sa distance aux Etoiles, que l'on sçait être immense. Il arriveroit donc que si

nous nous approchions tellement d'une Etoile fixe que nous n'en fussions plus qu'à la même distance où nous sommes du Soleil, cette Etoile s'appercevroit dès-lors aussi grande & aussi éclatante qu'est le Soleil : mais en même-tems comme nous serions à une distance immense de notre Soleil, il ne seroit pas facile de le distinguer des autres Etoiles, puisqu'il n'auroit en ce cas qu'un très-petit diametre & une lumiere semblable aux autres Etoiles : ainsi les Etoiles fixes sont autant de Soleils, ou si l'on veut, le Soleil est lui-même une Etoile fixe.

La distance des Etoiles fixes est immense en comparaison de la distance de la Terre au Soleil.

Voici de quelle maniere nous pouvons nous former une idée assez précise de toutes ces distances, & particulierement de la distance de la Terre au Soleil. Les Observations Astronomiques nous apprennent que la Terre, cette masse qui nous paroît d'abord si énorme, ne seroit vûe cependant du Soleil que comme un point imperceptible. Il faut donc que le Soleil soit prodigieusement éloigné de nous : & néantmoins cette distance de la Terre au Soleil est si petite en comparaison de celle des Etoiles fixes, que quand même on regarderoit des Etoiles fixes toute l'orbite que décrit la Terre chaque année, & dont le diametre est le double de la distance dont nous venons de parler : cette orbite, dis-je, ne paroîtroit que comme un point ; l'angle qu'elle formeroit à l'Etoile seroit si petit, qu'il ne doit point être étonnant s'il a échappé jusqu'ici aux recherches les plus subtiles des Astronomes. En effet, puisqu'il est certain que cet angle, qu'on nomme communément la Parallaxe de l'orbe annuel, est au-dessous d'une minute, il faut nécessairement que la distance de la Terre aux Etoiles, soit au moins dix mille fois plus grande que n'est celle de la Terre au Soleil.

Ceci servira à expliquer dans le systeme du mouvement de la Terre autour du Soleil, pourquoi certaines

Etoiles ne paroiſſent pas plus grandes dans un tems de l'année que dans l'autre ; & pourquoi la diſtance apparente où elles ſont les unes à l'égard des autres, ne ſçauroit varier ſenſiblement par rapport à nous. Car il y a telle Etoile dont la Terre s'approche effectivement dans l'eſpace de ſix mois de tout le diametre de ſon orbite ; & par la même raiſon elle doit s'en éloigner pendant les ſix autres mois de l'année. Si nous ne pouvons donc reconnoître de changemens ſenſibles dans la ſituation apparente de ces Etoiles, c'eſt une marque qu'elles ſont à une diſtance immenſe de la Terre, & que c'eſt préciſément de même que ſi nous ne changions point de lieu. Il en eſt à peu près de même que lorſqu'on apperçoit ſur la Terre deux tours à peu de diſtance l'une de l'autre, mais éloignées de notre œil de plus de dix mille pas ; car ſi nous n'avançons que d'un ſeul pas, aſſurément nous ne verrons pas pour cela les deux tours, ni plus grandes, ni à une diſtance plus conſidérable l'une de l'autre : il faudroit pour qu'il y eût un changement ſenſible, s'en approcher davantage. Ainſi quoique la Terre ſoit un peu plus proche dans un tems de l'année de certaines Etoiles que ſix mois après, ou qu'elle n'en étoit ſix mois auparavant, cependant comme ce n'eſt pas même d'une dixmillieme partie qu'elle s'en approche, il ne ſçauroit y avoir de changemens remarquables, ſoit dans la grandeur, ſoit par rapport à la diſtance apparente de ces Etoiles.

De l'angle ſous lequel on obſerveroit le Soleil s'il étoit tranſporté auſſi loin que ſont les Etoiles fixes à notre égard.

Que l'on ſuppoſe préſentement le Soleil à la même diſtance que l'Etoile fixe la plus proche de la Terre, il eſt aiſé de voir que l'angle ſous lequel il paroîtroit, ſeroit au moins dix mille fois plus petit qu'il ne nous paroît : or l'angle ſous lequel nous voyons le Soleil, eſt d'environ un demi-degré ou 30 minutes ; il ſuit donc, que ſi nous étions placés dans quelque Etoile fixe, le Soleil ne nous y paroîtroit que ſous un angle égal à la millieme partie

de trois minutes, c'eſt-à-dire d'environ dix tierces.

Objection. On objectera peut-être que ſi la diſtance des Etoiles fixes étoit auſſi conſidérable que nous venons de la ſuppoſer, il faudroit néceſſairement que les Etoiles fuſſent de beaucoup plus grandes que le Soleil : bien plus qu'il s'enſuivroit qu'elles ſeroient au moins auſſi grandes que le diametre de l'orbe annuel de la Terre ; car puiſque divers Auteurs ont prétendu que l'on voyoit les Etoiles ſous un angle d'une minute, & que d'ailleurs la Parallaxe de l'orbe annuel (c'eſt-à-dire, l'angle ſous lequel on verroit des Etoiles fixes le diametre de l'orbe terreſtre) eſt ſelon eux, d'environ une minute, il en faut conclurre que les Etoiles ſeroient auſſi grandes que l'orbe de la Terre. En effet, chaque Etoile deviendroit par-là un globe lumineux, qui ayant un demi-diametre égal à la diſtance qu'il y a de la Terre au Soleil, ſeroit dix millions de fois plus gros que le Soleil. Il y auroit donc une différence énorme entre la groſſeur du Soleil & celle des Etoiles & par conſéquent on ne pourroit plus dire que ce ſont des Corps lumineux ſemblables : on ſeroit, dis-je, très-mal fondé à mettre le Soleil au nombre des Etoiles fixes.

Reponse. Les Etoiles fixes ne paroiſſent ſous aucun diametre ni ſous aucun angle ſenſible : mais l'eſpace qu'elles occupent dans le ciel n'eſt qu'un

Il n'eſt pas difficile de répondre à cette Objection. Cette prétendue grandeur des Etoiles n'eſt fondée que ſur des Obſervations fort imparfaites, & il eſt vrai que quelques Aſtronomes peu habiles en ce genre ſe ſont trompés conſidérablement dans les diametres apparens qu'ils ont aſſignés aux Etoiles. L'angle ſous lequel on apperçoit les Etoiles fixes eſt ſi petit, * que ſelon les plus

* L'angle ſous lequel paroiſſent les Etoiles fixes de la premiere grandeur n'eſt pas même d'une ſeconde ; car lorſque la Lune rencontre *l'Oeil du Taureau*, *le Cœur du Lion* ou *l'Epi de la Vierge*, l'occultation eſt tellement inſtantannée, & l'Etoile ſi brillante à cet inſtant, qu'un Obſervateur bien attentif ne ſçauroit ſe tromper, ni demeurer dans l'incertitude pendant une demi-ſeconde de tems. Or ſi ces Etoiles avoient, par exemple, un diametre au moins de 5 ſecondes, on les verroit s'éclipſer peu à peu & diminuer ſenſiblement de grandeur pendant près de 10 ſecondes de tems, à raiſon de 13 degrés que la Lune parcourt en 24 heures.

point imperceptible, comme on peut s'en convaincre en les dépouillant de cette fausse lumiere qui les environne.

parfaites Observations on ne l'a pas même trouvé de la soixantieme partie d'une minute. Il y a autour des Etoiles, sur-tout lorsqu'on les observe pendant la nuit, une espece de fausse lumiere, un raïonnement ou scintillation qui nous trompe, & qui fait que nous les jugeons au moins cent fois plus grandes qu'elles ne sont. On fait disparoître cependant la plus grande partie de cette fausse lumiere, en regardant les Etoiles par un trou fait à une carte avec la pointe d'une aiguille, ou plutôt en y employant d'excellentes lunettes d'approche, qui en absorbent la plus grande quantité, puisqu'on n'y apperçoit plus les Etoiles fixes que comme des points lumineux, & beaucoup plus petites qu'à la vûe simple. On sçait pourtant que les lunettes d'approche grossissent les objets : or il semble que le contraire paroît à l'égard des Etoiles fixes ; ce qui prouve combien le diametre apparent des Etoiles est peu sensible à notre égard. On ne sçait comment le P. Riccioli s'y est laissé tromper jusqu'à établir le diametre apparent de Sirius de 18 secondes : car si l'on suppose qu'à la vûe simple les deux lignes tirées des extrémités du diametre de Sirius forment dans notre œil un angle de 18 secondes, une lunette qui augmenteroit deux cens fois les objets, nous feroit par conséquent appercevoir cette Etoile sous un angle de 3600 secondes, c'est-à-dire, sous l'angle d'un degré ; d'où il s'ensuivroit que le disque apparent de Sirius excéderoit quatre fois le disque apparent du Soleil. Or quoique les plus excellentes lunettes ne soient pas même capables d'absorber totalement cette fausse lumiere qui environne les Etoiles fixes, il est certain toutefois que Sirius n'y paroît pas plus grand que la Planete de Mars mesurée ou au Micrometre ou à la vûe simple. Mais le diametre de Mars dans son opposition au Soleil est tout au plus de 30 secondes : ainsi quoique la lunette augmente d'environ deux cens

La preuve est fondée sur les Observations qui en ont été faites avec les meilleurs Télescopes.

fois le diametre apparent de Sirius, l'angle ſous lequel on y apperçoit cette Etoile n'eſt que d'environ 30 ſecondes; c'eſt-à-dire, qu'à la vûe ſimple ce diametre ne ſeroit gueres que de $\frac{1}{20}$ de ſecondes; ce qui fait environ neuf tierces. Il eſt donc vrai de dire que Sirius eſt à peu près égal au Soleil; c'eſt-à-dire, que ſi nous en approchions à la même diſtance que nous ſommes actuellement à l'égard du Soleil, nous le verrions pour lors à peu près auſſi grand. On demandera peut-être maintenant comment nous pouvons appercevoir les Etoiles fixes, puiſque leur diametre apparent répond à un angle qui n'eſt aucunement ſenſible; mais il faut faire attention que c'eſt ce raïonnement & cette ſcintillation qui les environne, qui eſt cauſe que les Corps lumineux ſe voyent à des diſtances ſi prodigieuſes, au contraire de ce qui arrive à l'égard de tout autre objet. L'expérience ne nous apprend-t'elle pas qu'une bougie ou un flambeau allumé ſe voit pendant la nuit ſous un angle très-ſenſible à plus de deux lieues de diſtance, au lieu que ſi dans le plus grand jour l'on expoſe tout autre objet de pareille groſſeur à la même diſtance, on ne pourra jamais l'appercevoir; à peine pourroit-on même diſtinguer un objet qui occuperoit un eſpace dix fois plus grand que n'en occupe la flamme de la bougie pendant la nuit. La raiſon eſt que les Corps lumineux lancent de tous côtés une lumiere incomparablement plus forte que celle qui eſt réfléchie, & que celle-ci étant amortie par la réflexion, devient plus foible, & ſe fait à peine ſentir à une grande diſtance; l'autre au contraire eſt tellement vive, qu'elle ébranle avec une force incomparablement plus grande les fibres de la rétine; ce qui produit une ſenſation tout-à-fait différente, & nous fait juger par cette raiſon les Corps lumineux beaucoup plus grands qu'ils ne ſont en effet.

Nous avons déja fait voir que les Etoiles, ces objets

Les Etoiles fixes sont autant de feux, & par conséquent sont de véritables Corps lumineux & comme autant de Soleils.

lumineux dont chacun est un globe de feu, sont semblables à notre Soleil, non seulement en ce qu'ils sont immobiles dans le même endroit du Ciel; mais aussi parce qu'ils sont à très-peu de chose près d'une semblable grandeur. Ainsi nous les regarderons desormais comme autant de Soleils: mais tous ces Soleils ne doivent point être à égales distances ni dans une même surface sphérique du Ciel. Car comme cet Univers est immense, & qu'il n'a peut-être point de bornes, il n'y a point de doute que ces Soleils ne doivent être à de très-grandes distances les uns des autres, de maniere qu'entre deux Soleils ou deux Etoiles fixes, il y a peut-être le même intervalle que celui qui se trouve entre Sirius & le Soleil. En un mot, si un Observateur venoit à se trouver à une fort petite distance d'un de ces Soleils, il le regarderoit comme l'unique Soleil qui soit dans la nature, & tous les autres ne seroient pour lui que les Etoiles étincelantes du Firmament.

Au reste il est bien difficile de croire que Dieu ait placé tant de Soleils à de si grandes distances les uns des autres, sans qu'il y ait autour de chacun des Corps opaques qui en reçoivent de la lumiere & de la chaleur. Rien ne paroît assurément plus convenable à la sagesse divine, Dieu ne les ayant pas créés inutilement; il semble donc qu'il faudroit reconnoître qu'il y a diverses Planetes qui tournent autour de ces Soleils, chacune dans son orbite; & qu'elles sont aussi entourées de Lunes ou de Satellites placés à différentes distances.

Quelle grande idée ne doit-on pas avoir présentement de tout ce qui compose cette vaste étendue de l'Univers? Nous voyons d'abord un espace immense, où sont répandus tant de Soleils que le nombre n'en sçauroit jamais parvenir à notre connoissance. Ce sont les Etoiles que nous découvrons à la vûe simple, mais dont le nombre

augmente

augmente à l'infini lorſqu'on pointe la lunette d'approche dans les différentes régions du Ciel. Chaque Etoile ou Soleil fait un Monde particulier étant environné de Planetes ; chaque Etoile, dis-je, tient à peu près le même rang dans ſon ſyſteme, que tient parmi nous le Soleil dans ce que l'on appelle le ſyſteme ſolaire, ou dans notre Monde planétaire.

Tel eſt le ſpectacle incomparable, où l'on reconnoît d'abord la ſageſſe, la toute-puiſſance & la bonté divine, où l'on ne ſçauroit, dis-je, ſe laſſer d'admirer la gloire ſupreme, & l'étendue immenſe des ouvrages du Créateur.

CHAPITRE CINQUIEME.

Des taches du Soleil, de la rotation du Soleil & des Planetes autour de leurs axes, & de quelques changemens dans les Etoiles fixes.

La grande diſtance de la Terre au Soleil eſt l'unique cauſe qui nous empêche d'en appercevoir la convexité ; ce qui n'eſt pas fort étonnant, puiſque nous ne voyons pas même celle de la Lune qui eſt bien moins éloignée de nous : au lieu d'appercevoir leur ſurface ſphérique, nous jugeons au contraire l'une & l'autre planes ou comme des diſques, au milieu deſquels nous imaginons un point, qui quoique réellement dans leur ſuperficie, n'en eſt pas moins regardé comme le centre de l'Aſtre, bien qu'il ne ſoit que celui de la ſurface ou du diſque apparent. Au reſte ſi la lumiere du Soleil étoit égale dans toute ſa ſurface, comme il n'y auroit jamais aucune variété, mais une uniformité conſtante, nous l'appercevrions toujours de la même maniere, de ſorte qu'il pourroit tourner autour de ſon axe ſans que nous en euſſions

La diſtance trop conſidérable du Soleil ou de la Lune fait diſparoître leur convexité à nos yeux.

la moindre connoiſſance. Mais parce que dans le diſque lumineux du Soleil, au milieu de cette même lumiere ſi vive & ſi éclatante, l'on apperçoit aſſez ſouvent diverſes taches fort noires & qui occupent en effet le même lieu de ſa ſuperficie, le mouvement apparent de ces taches nous a fait enfin connoître le tems de ſa Rotation : car elles paroiſſent d'abord à la partie orientale du diſque du Soleil, enſuite elles s'avancent vers ſon milieu, d'où elles paſſent enfin à ſa partie la plus occidentale, pour y diſparoître juſqu'à ce que quatorze jours s'étant écoulés elles ſe font voir de nouveau à la partie orientale. Soit le cercle *AGHD* le diſque apparent du Soleil, c'eſt-à-dire, la ſurface de ce globe qui eſt tournée vers nous : il arrive, comme on vient de le dire, que nous voyons ſouvent en *A*, certains amas de matieres aſſez compacts & obſcurs, ſemblables à nos nuages, mais beaucoup plus ſolides & qui paroiſſent s'avancer vers *B*, en traverſant quelquefois le centre du diſque ; ils paſſent enſuite en *C* & *D* juſqu'à ce qu'ils ſe perdent dans la circonférence où ils ſemblent néantmoins reſter immobiles pendant quelque eſpace de tems.

Diverſes taches ſur la ſurface du Soleil.

Elles nous font connoître que le Soleil tourne autour de ſon axe.

PLANCHE I. *Figure* 13.

Quelquefois ces taches, environ 27 jours après leur premiere apparition en *A*, reviennent préciſément au même lieu, après avoir employé un auſſi long intervalle de tems à parcourir la ſurface oppoſée du Soleil, que celle qui eſt tournée de notre côté. Lorſque ces taches ſont en *A* & en *D*, leur mouvement paroît très-lent : mais il accélere à meſure qu'elles approchent du centre du diſque. De plus elles paroiſſent bien plus petites, & leur figure ſemble plus réguliere vers les bords du Soleil, que vers le centre, comme ſi elles ſe montroient dans toute leur étendue. Ce Phénomene eſt produit par une matiere denſe & obſcure, qui s'amaſſe vers la ſurface du Soleil & ſe trouve emportée d'un mouvement commun à chaque

Les taches qui ont commencé à paroître à quelque point déterminé de la ſurface du Soleil, y retournent aſſez ſouvent après une révolution qui dure 27 jours.

révolution du Soleil autour de son axe. Quelques Auteurs ont avancé que ces taches n'étoient point à la surface du Soleil, mais à une certaine distance, de maniere qu'elles feroient leurs révolutions autour du Soleil, de même que les Satellites autour de Jupiter : mais il est aisé de détruire cette opinion. Car si ces taches n'étoient pas à la surface du Soleil, on ne verroit pas une même tache parcourir le disque apparent ou la moitié de cette surface dans l'intervalle d'une demi-révolution périodique. Supposons que du point *B* de la surface de la Terre on observe le Soleil, dont le centre est au point *A*, sous l'angle *DBC* d'environ 32 minutes ; il est clair que si une tache quelconque avoit une orbite particuliere *HEG* éloignée de la surface du Soleil, elle ne commenceroit à paroître sur le disque que lorsqu'elle arriveroit au point *E* de son orbite, c'est-à-dire, dans le point où passe la tangente tirée de la Terre à la circonférence du Soleil. Tirant de la même maniere la tangente *BCG*, le point *G* seroit celui de l'orbite où disparoîtroit la tache à qui l'on auroit vû parcourir le disque du Soleil, & cela précisément dans le même tems qu'elle auroit décrit l'arc *EG* : mais cet arc *EG* est beaucoup plus petit que la demi-circonférence de l'orbite, ainsi il seroit parcouru en bien moins de tems qu'une demi-période ; ce qui ne s'accorde pas avec les Observations. Il y a certaines taches du Soleil à qui l'on a vû décrire deux ou trois révolutions sans se dissoudre, & qui sont revenues constamment au même lieu au bout des 27 jours qui se sont écoulés à chaque période : or toutes ces taches ont employé exactement $13\frac{1}{2}$ jours à passer du bord occidental du Soleil à son bord oriental. Il suit donc que puisqu'elles ont employé à chaque fois la moitié du tems périodique, à parcourir le disque apparent du Soleil, leur orbite doit convenir précisément avec la surface extérieure de ce Corps lumineux ; c'est-à-dire, qu'el-

Elles sont véritablement à la surface & non pas à une plus grande distance du Soleil.

PLANCHE I. *Figure* 14.

les nagent, pour ainsi dire, sur le Soleil.

Souvent les taches semblent se dissoudre & disparoissent ; mais souvent elles s'accumulent ou se ramassent plusieurs en une seule masse.

Entre toutes les taches que nous voyons, il y en a qui ne commencent à paroître que vers le milieu de son disque, & d'autres qui disparoissent entierement après s'être détruites peu à peu à mesure qu'elles se sont avancées. Souvent plusieurs taches se ramassent ou s'accumulent en une seule ; & souvent une même tache se résout en une infinité d'autres extrémement petites. Galilée est le premier qui les ait découvertes, aussi-tôt après l'invention du Télescope ; Scheiner les observa dans la suite avec plus de soin, & a publié un gros Livre à ce sujet. Dans ce tems-là on en voyoit plus de cinquante sur le Soleil : mais depuis 1653 jusqu'en 1670 à peine en a-t-on découvert une ou deux ; depuis elles ont reparu assez souvent en abondance. Il semble qu'elles ne suivent aucune loi dans leurs apparitions.

La cause la plus vraisemblable de cette pâleur du Soleil qui a duré plusieurs années entieres au rapport de la plupart des Historiens.

Les Histoires sont pleines de remarques sur des années entieres où le Soleil a paru fort pâle & dépouillé de cette vive lumiere à laquelle les hommes sont accoutumés : on prétend même que sa chaleur étoit alors sensiblement ralentie ; ce qui pourroit bien venir d'une multitude extraordinaire de taches qui couvroient alors le disque apparent du Soleil. Il est certain que nous voyons souvent des taches sur le Soleil, dont la surface excede non seulement l'*Asie* ou l'*Afrique*, mais même un plus grand espace que n'occuperoit sur le Soleil toute la surface de la Terre.

L'axe du Soleil est incliné au plan de l'écliptique, & son équateur fait un angle de sept degrés avec le plan de l'écliptique ou de l'orbe terrestre.

Le mouvement des taches du Soleil est d'Occident en Orient : mais il ne se fait pas précisément dans le plan de l'orbite de la Terre ; ainsi l'axe autour duquel tourne le Soleil n'est pas perpendiculaire à cet orbite. Si l'on fait passer par le centre du Soleil l'axe de l'orbite terrestre, cet axe doit faire avec celui du Soleil un angle de 7 degrés ou environ. Ainsi l'équateur du Soleil, c'est-à-

dire, le cercle qui est également éloigné des deux extrémités de son axe ou de ses deux poles, cet Equateur, dis-je, fait un angle de 7 degrés avec le plan de l'orbite de la Terre : & si l'on imagine la ligne, où ces deux plans se coupent, prolongée de part & d'autre jusqu'à la circonférence de l'orbite terrestre, lorsque la Terre arrivera dans l'un ou l'autre de ces deux points diamétralement opposés, la trace apparente des taches observées sur le disque du Soleil sera pour lors une ligne droite ; ce qui est évident, puisque l'œil est alors dans le plan où se fait leur vrai mouvement : mais dans toute autre situation de la Terre sur son orbite, l'Equateur solaire sera tantôt élevé au-dessus de notre œil, & tantôt abaissé, & pour lors la trace apparente des taches observées sur le Soleil, sera une ligne courbe ou portion d'ellipse.

On découvre aussi des taches dans les Planetes.

Si dans un Corps aussi lumineux qu'est le Soleil, il y a différentes matieres dont la plus épaisse ou la plus grossiere forme les taches qui l'obscurcissent, on ne doit pas être étonné si les Planetes qui sont opaques, contiennent aussi des parties solides & fluides qui réfléchissent une lumiere plus ou moins vive, ou qui l'absorbent presqu'entierement. La surface de toutes nos Planetes doit donc paroître couverte d'une infinité de taches, & c'est ce que l'on a reconnu avec d'excellentes lunettes d'approche, principalement sur Mars, Jupiter & Venus. C'est aussi par le mouvement apparent des taches qui ont été remarquées sur ces Planetes, qu'on est parvenu à découvrir le tems de leur Rotation autour de leurs axes. Le même argument qui nous a servi à prouver la Rotation du Soleil en 27 jours, subsiste encore à l'égard des Planetes, & l'on sçait depuis long-tems que Venus tourne sur elle-même en 23 heures, & Mars en 24 heures 40 minutes : la Terre, comme l'on sçait, fait sa révolution en un jour, c'est-à-dire, dans le tems d'une révolution du Ciel étoilé,

Ces taches servent encore à faire connoître le tems de la Rotation des Planetes autour de leur axe.

qui nous ſemble à chaque fois emporté d'un mouvement très-rapide d'Orient en Occident.

Dans Jupiter, outre les taches, nous voyons pluſieurs *Bandes paralleles* qui traverſent ſon diſque apparent. Elles ne ſont cependant pas toujours de même grandeur ni à même diſtance; il ſemble qu'elles augmentent ou diminuent alternativement. Tantôt elles ſont fort éloignées l'une de l'autre, tantôt elles paroiſſent ſe rapprocher: mais c'eſt toujours avec quelque nouveau changement. Elles ſont ſujettes à s'altérer de même que les taches du Soleil. Une tache très-conſidérable que M. Caſſini avoit apperçue ſur Jupiter en 1665, ne s'y conſerva que près de deux années. Elle parut pendant tout ce tems immobile au même endroit de la ſurface. On en détermina pour lors la figure, auſſi-bien que la ſituation par rapport *aux Bandes*. Elle diſparut enfin en 1667, & ne parut que vers l'an 1672 où l'on continua de l'appercevoir pendant trois années conſécutives. Enfin elle s'eſt montrée & cachée alternativement, de maniere qu'en 1708 on comptoit depuis 1665 huit apparitions completes. C'eſt par les révolutions de cette tache obſervées un grand nombre de fois, qu'on a découvert le tems de la révolution de Jupiter autour de ſon axe, lequel eſt de 9 heures 56 minutes.

Or il eſt vraiſemblable que la Terre que nous habitons eſt dans un état plus tranquille & bien différent de celui de Jupiter, puiſque l'on obſerve dans la ſurface de cette Planete de plus grands changemens qu'il n'arriveroit ſur notre globe, tels que ſi l'Ocean, par exemple, changeant de lieu, venoit à ſe répandre indifféremment ſur toutes les Terres, enſorte qu'il s'y formât de nouvelles Mers, de nouvelles Iſles, & de nouveaux Continens.

La proximité de Mercure au Soleil, & la vivacité de la lumiere qu'il nous réfléchit, ont empêché juſqu'içi d'y

découvrir aucune tache considérable, & par une raison toute contraire, on n'en a pu découvrir aucunes dans Saturne la plus éloignée de toutes les Planetes : c'est ce qui fait que l'on ignore le tems de leur Rotation. Il est probable cependant que l'un & l'autre tournent autour de leurs axes ; que leur Rotation est réiterée plusieurs fois dans le cours de chaque révolution périodique ; en un mot il faut que ces Planetes présentent successivement chaque partie de leur hémisphere au Soleil, & qu'elles participent aux vicissitudes du jour & de la nuit, conformément à tout ce qui s'observe de la nature.

CHAPITRE SIXIEME.

De la diversité des Grandeurs, & de la disposition des Etoiles dans le Ciel ; Des principaux Catalogues, du nombre des Constellations, & de quelques changemens particuliers à certaines Etoiles fixes.

LA principale cause de la diversité des grandeurs que nous remarquons dans les Etoiles, doit être attribuée à l'inégalité de leurs distances : car celles qui sont les plus proches de nous, doivent, à ce qu'il semble, paroître beaucoup plus éclatantes & d'une grandeur qui surpasse toutes les autres : & c'est le contraire pour celles qui sont les plus éloignées ; leur lumiere doit paroître plus affoiblie : quant à leurs grandeurs, elles doivent nous paroître plus petites que toutes les autres. Ces différences dans les grandeurs apparentes des Etoiles, ont porté les Astronomes à les distribuer en plusieurs classes. Celles de la premiere classe ou premiere espece, ont été nommées Etoiles de la premiere grandeur, les autres sont de la seconde, troisieme, &c. & ainsi de suite jusqu'à la sixieme gran-

Les Etoiles ont été distribuées en plusieurs classes, comme étant de différentes grandeurs.

deur, qui eſt le terme au-delà duquel il n'eſt plus poſſible de les diſtinguer à la vûe ſimple. Il reſte néantmoins une multitude très-conſidérable d'autres Etoiles qu'on découvre à meſure qu'on y emploie de plus longues lunettes : mais il n'étoit pas poſſible aux Anciens de les ranger dans les ſix claſſes dont nous venons de parler. Il faut encore remarquer que quoique l'on ſoit convenu depuis près de deux mille ans de conſerver preſque toutes les Etoiles fixes dans le même ordre & dans les mêmes claſſes où elles ont été d'abord diſtribuées par Hipparque & les autres Aſtronomes, il ne faut pas s'imaginer pour cela, que dans une même claſſe les Etoiles ſoient préciſément de même grandeur : il ſuffit de dire ici, pour faire comprendre à quel point s'étendent les différences que l'on y apperçoit, qu'il faudroit établir preſqu'autant de claſſes particulieres, qu'il y a d'Etoiles fixes. En effet il eſt bien rare d'en trouver deux qui ſoient préciſément d'une même grandeur ; & pour ne parler uniquement que de celles de la premiere grandeur, voici les principales différences que l'on y a reconnues. *Sirius* eſt la plus grande & la plus éclatante de toutes : enſuite on trouve qu'*Arcturus* ſurpaſſe en grandeur & en lumiere *Aldebaran* & l'*Epi de la Vierge ;* & cependant on les nomme communément Etoiles de la premiere grandeur. Il eſt vrai que l'on en a diſtingué quelques-unes qui pourroient être placées entre la premiere & la ſeconde grandeur. Par exemple le *Petit chien*, autrement nommé *Procyon*, n'eſt que de la ſeconde grandeur ſelon Tycho, quoique Ptolomée l'ait rangé dans la premiere claſſe. L'on pourroit donc ne compter cette Etoile, ni parmi celles de la premiere grandeur, ni parmi celles de la ſeconde, mais l'établir parmi celles qu'il faut regarder comme d'un genre intermédiaire.

Des Conſtellations.

Au reſte les Aſtronomes ne ſe ſont pas ſeulement attachés à diſtribuer les Etoiles ſelon leurs différentes grandeurs,

grandeurs: mais ils ont encore imaginé pour les faire reconnoître plus facilement, de faire plusieurs cartes qui expriment la situation propre & la disposition des unes à l'égard des autres dans les différentes régions du Ciel. Ils ont formé pour cet effet ces assemblages, qu'on nomme Constellations, de sorte qu'une certaine quantité d'Etoiles se rapporte à telle ou telle Constellation. Il en est de même des autres. Le nom de Constellation n'est donc autre chose qu'un assemblage ou système d'une certaine quantité d'Etoiles qu'on regarde comme distinguées ou séparées des autres, parce qu'en effet on les a distribuées dans les principales régions du Ciel où se trouve le plus grand nombre d'Etoiles. D'ailleurs pour reconnoître encore plus facilement toutes les Etoiles dans le Ciel, & principalement pour ne point oublier celles dont on tire quelqu'usage pour l'observation des Planetes, les anciens Astronomes ont appliqué à ces Constellations des figures d'animaux ou de divers autres sujets qu'ils ont tirés des Fables ou des principaux évenemens rendus célebres par les Poëtes ou par les Prêtres de leurs Religions. Or les modernes ont jugé à propos de conserver ces anciennes Constellations pour éviter toute équivoque, ou plutôt l'incommodité trop fréquente & l'embarras continuel qu'il y auroit de comparer les Observations présentes avec celles des Anciens, si l'on venoit à faire quelques changemens à leurs Constellations.

La distribution des Etoiles fixes en Figures ou Constellations a jusqu'ici été regardée comme ce qui nous reste de plus ancien, elle pourroit bien avoir précédé l'Astronomie & la Philosophie. Dans un des Chapitres de Job, l'un des plus anciens Livres hebreux, il est parlé d'*Orion*, d'*Arcturus* & des *Pleïades* : Homere & Hesiode, qui ont précédé tous les autres Poëtes Grecs ont parlé plusieurs fois des différentes Constellations, & les

noms s'en trouvent répétés dans les principaux endroits de leurs Ouvrages. En un mot il eſt vraiſemblable que les Aſtronomes ont ſenti dès le commencement la néceſſité de partager ainſi les régions du Ciel, & de ranger toutes les Etoiles fixes dans chaque Conſtellation & dans une diſpoſition conſtante.

Les Etoiles fixes doivent paroître dans le même ordre & dans une même ſituation de quelque Planete qu'on les regarde.

Comme la diſtance de toutes les Etoiles eſt immenſe par rapport à nous, il importe peu en quel endroit de notre ſyſteme ſolaire ſeroit placé l'Obſervateur qui les regarde: car ſoit qu'on le ſuppoſe dans le Soleil, ſur la Terre, ou dans Saturne, qui eſt la derniere & la plus éloignée de toutes les Planetes, il eſt certain que de chacun de ces différens points de notre ſyſteme Solaire, il appercevroit également les Etoiles fixes dans le même endroit du Ciel: effectivement quelque ſoin qu'il employât à examiner les différentes régions de cette vaſte étendue, les Etoiles lui paroîtroient exactement dans une même ſituation les unes par rapport aux autres, ſans que leurs diſtances paruſſent jamais altérées, malgré les différens points de vûe qu'il occupe à meſure qu'il a changé de lieu. Il s'enſuit donc que dans toutes les Planetes, l'on doit voir de la même maniere le Ciel étoilé; & qu'il en eſt de même que s'il n'y avoit uniquement qu'une ſeule voute, ou un même Monde qui environneroit chaque Planete en particulier, & préciſément de la même maniere.

Les trois Principales régions du Ciel étoilé.

Les Aſtronomes ont auſſi diſtribué le Ciel étoilé en trois parties principales; ſçavoir le *Zodiaque* qui eſt celle du milieu & qui renferme toutes les Etoiles qui ſe trouvent ou aux environs de la route des Planetes pendant leurs révolutions périodiques, ou dans les plans de leurs orbites. Non ſeulement le Zodiaque renferme les Conſtellations ou figures d'animaux qui ſe trouvent dans la route de toutes les Planetes, mais il s'étend auſſi juſqu'aux li-

mites, au-delà desquelles elles ne sçauroient jamais s'écarter. Cette zone ou bande est terminée par deux autres régions immenses du Ciel, dont l'une s'appelle *Boréale*, & l'autre *Australe*.

Les anciens ayant partagé le Ciel entier en Quarante-huit Constellations, dont douze composoient le Zodiaque; voici les noms qui leur ont été donnés. Le *Belier*, le *Taureau*, les *Gemeaux*, l'*Ecrevisse*, le *Lion*, la *Vierge*, le *Scorpion*, le *Sagittaire*, le *Capricorne*, la *Balance*, le *Verseau*, & les *Poissons*. Les XLVIII. Figures ou Constellations selon les Anciens.

Du côté du Septentrion on compte vingt & une Constellations, sçavoir, la *petite Ourse*, la *grande Ourse*, le *Dragon*, *Céphée*, le *Bouvier*, la *Couronne Septentrionale*, *Hercules*, la *Lyre*, le *Cygne*, la *Cassiopée*, *Persée*, *Andromede*, le *Triangle*, le *Cocher*, *Pégase*, le *petit Cheval*, le *Dauphin*, la *Fleche*, l'*Aigle*, le *Serpentaire*, & le *Serpent*. On y a ajouté, quelques siecles après, d'autres Constellations formées par quelques Etoiles, qui se trouvoient entre ces anciennes Constellations, & qu'on nommoit pour cette raison *Etoiles informes*. Ces nouvelles sont *Antinoüs* proche l'*Aigle*, & la *Chevelure de Berenice* proche la *Queue du Lion*.

Du côté du Midi les Anciens ont établi quinze Constellations, sçavoir, la *Baleine*, l'*Eridan*, le *Lievre*, *Orion*, le *grand Chien*, le *petit Chien*, le *Vaisseau d'Argos*, l'*Hydre*, la *Coupe*, le *Corbeau*, le *Centaure*, le *Loup*, l'*Autel*, la *Couronne Australe*, & le *Poisson Méridional*. Mais dans ces derniers tems on y a ajouté douze Constellations, situées proche le Pole Austral, & qui ne sont point visibles en Europe, ni même dans presque tout l'hémisphere septentrional, à cause de la rondeur de la Terre. Voici leurs noms. Le *Phœnix*, la *Grue*, le *Paon*, l'*Indien*, l'*Oiseau du Paradis*, le *Triangle Austral*, la *Mouche*, le *Cameleon*, le *Poisson volant*, le *Toucan* ou l'*Oie d'Amerique*, l'*Hydre*, *Xiphias* ou la *Dorade*.

Des Etoiles qu'on nomme informes.

Nous avons déja dit qu'entre les Conſtellations il ſe trouvoit diverſes Etoiles, qu'on avoit pour cette raiſon nommées informes: or il eſt à remarquer que les principaux Aſtronomes modernes en ont formé quelquefois de nouvelles Conſtellations.

La Voie Lactée.

Parmi les Images céleſtes ou Conſtellations, on place communément la *Voie Lactée*, qui eſt une eſpece de bande très-remarquable, fort étendue, & qui approche fort de la blancheur du lait. Elle ſe diviſe en quelques endroits en deux branches: mais la plus grande partie n'eſt qu'une ſimple branche qui occupe, & même ſemble diviſer toute la région du Ciel. Galilée a dit que cet eſpace du Ciel étoit rempli d'un nombre innombrable de petites Etoiles fixes, & en effet il y en a découvert un grand nombre avec ſa lunette d'approche, la premiere qui ait été connue parmi les Aſtronomes. » * Quoique chaque » Etoile ſoit imperceptible à la vûe ſimple, à cauſe de ſon » extreme petiteſſe, la lumiere cependant de toutes ces » Etoiles enſemble forme une blancheur dans cette ré» gion du Ciel, qui nous fait paroître cet endroit plus » éclairé que n'eſt le reſte du Firmament. »

Opinion de Galilée adoptée par l'Auteur, conformément à ce qui a été dit par la foule des Ecrivains.

Les plus anciens Aſtronomes ayant donc diſtribué, comme nous l'avons déja dit, toutes les Etoiles répandues dans le Ciel, dans les différentes Conſtellations, on a ſongé dans la ſuite à conſtruire des Catalogues avec une attention toute particuliere. Ces Catalogues ayant eté néantmoins augmentés & même corrigés ſur les découvertes des Modernes, on y trouve aujourd'hui non-ſeulement toutes les Etoiles que l'on peut découvrir à la vûe ſimple, mais encore un grand nombre d'autres qui ne

* Cette opinion vulgaire a été répétée en une infinité d'endroits: mais elle n'a point été adoptée pour cela de tous les Aſtronomes; puiſqu'en y employant de longues lunettes de 15 & 25 pieds, on n'y découvre pas plus d'Etoiles que dans les autres régions du Ciel. On remarque ſeulement dans la Voie Lactée une blancheur que l'on pourroit conjecturer provenir d'une matiere ſemblable à celle qui compoſe les Etoiles nébuleuſes.

sçauroient être apperçues que par les lunettes d'approche.

Hipparque est le premier qui ait réussi à construire un Catalogue général des Etoiles fixes.

Hipparque natif de Rhodes, & qui vivoit environ cent vingt ans avant J. C. a été le premier de tous les Grecs qui ait entrepris de réduire les Etoiles fixes dans un Catalogue. « Ce fut une entreprise bien hardie, & pour ainsi » dire, réservée aux Dieux (selon Pline) de vouloir con» noître & de transmettre à la postérité le nombre & la » situation de toutes les Etoiles chacune selon son véri» table lieu. Il inventa divers instrumens nécessaires pour » déterminer leurs longitudes & latitudes, après avoir » distingué leurs différentes grandeurs : car il se pro» posoit de faciliter aux Astronomes qui lui succéde» roient, tous les moyens possibles de reconnoître, non» seulement si quelques-unes de ces Etoiles s'éteindroient » ou s'il en reparoîtroit de nouvelles, mais encore s'il y » en auroit qui disparoîtroient totalement; si d'ailleurs el» les n'auroient pas quelque mouvement particulier; en » un mot, si l'éclat de leur lumiere, ou leur grandeur ap» parente, n'augmenteroit ou ne diminueroit pas. Hip» parque regardoit cet espace immense du Ciel qu'il avoit » tant cultivé, comme un patrimoine ou espece d'héritage » qu'il laissoit aux Astronomes futurs, dans le dessein que » si l'on pouvoit y remarquer quelques changemens, on » pût un jour parvenir à rendre raison de ces sortes de » Phénomenes. »

Le nombre d'Etoiles qu'Hipparque nous a laissé dans son Catalogue, où il assigne à chacune sa vraie longitude & latitude pour le tems où il vivoit, ne monte qu'à 1022. Il étoit parvenu à exécuter ce grand ouvrage par le secours de quelques observations des Anciens, qui furent dès lors comparées à celles qu'il fit en un bien plus grand nombre. Or c'est ce qui lui fit appercevoir ce mouvement des Etoiles qu'on nomme aujourd'hui la Précession des Equinoxes.

Ptolomée l'a augmenté de 4 Etoiles.

Ptolomée, qui est venu ensuite, ne nous donne que quatre Etoiles de plus, son Catalogue n'étant composé que de 1026. Mais après lui *Ulug Beigh*, petit-fils du grand Tamerlan, entreprit de nouveau de restituer les positions des Etoiles de ce Catalogue, & publia les lieux vrais de 1017. Etoiles. Dans le seizieme siecle, & dans les suivans, il s'est formé un plus grand nombre d'Astronomes, entre lesquels on connoît principalement *Regiomontanus* & *Copernic*. Mais le fameux *Tycho-Brahé*, Danois, a surpassé par un travail immense tout ce qui avoit été fait dans les siecles qui l'ont précédé. Ce grand Astronome avoit résolu de n'employer aux observations du Ciel que des instrumens beaucoup plus parfaits que ceux des Anciens; & bientôt il y réussit, & même avec une industrie si merveilleuse, que sans la découverte des lunettes d'approche, il n'auroit gueres été possible de pouvoir jamais déterminer plus exactement les vrais lieux des 777 Etoiles fixes qu'il nous a laissées dans le Catalogue qu'il en a publié. Il ne faut pas confondre ce Catalogue des longitudes & latitudes d'Etoiles établies par *Tycho*, avec un autre Catalogue que *Kepler* a rapporté dans ses Tables Rudolphines, sous le nom du même Auteur, & qui contient 1163 Etoiles; puisque tout ce que l'on y trouve au-delà des 777 Etoiles de *Tycho*, a été recueilli en partie de l'Almageste de *Ptolomée*, & en partie de quelques ouvrages particuliers publiés par différens Auteurs. Car *Tycho* n'a dû publier d'autres Etoiles dans son Catalogue, que celles qu'il avoit observées lui-même, ou du moins dont il avoit calculé la vraie position.

Le second Catalogue publié par Ulug-Beigh, contient 1017 Etoiles.

Le troisieme Catalogue a été entrepris par Tycho-Brahé qui a observé les lieux de plus de 1000 Etoiles, & ayant déja publié les longitudes & latitudes de 777 dont les positions étoient nouvellement restituées.

Guillaume, Prince de Hesse, a observé les Positions de 400 Etoiles, & les a réduites en catalogue.

Dans le même siecle où vivoit Tycho, le Prince *Guillaume de Hesse-Cassel* s'appliqua long-tems à l'étude de l'Astronomie, & observa pendant plus de trente ans avec un soin tout particulier les lieux de plus de 400 Etoiles, dont il forma un Catalogue, étant aidé principalement

Etoiles du Cygne qui forment une grande Croix, dans la voye Lactée.
Etoiles de Cassiopée, qui forment une espéce de Chaise renversée, dans la voye Lactée.
le Serpentaire
le Serpent
la Voye Lactée
Aquilon
l'Aigle
Hercule
le Dauphin
le Petit Cheval
le Mont Menale
la Couronne
le Bouvier
Arcturus
Pegase
Cephe
Cassiopée
Andromede
les Poissons
la Chevelure de Berenice
le petit Lion
le Linx
le Sextant
les Gemeaux
le Cocher d'Erichthon
la Baleine
Orion
le petit Chien
l'Hydre
la grande Ourse
la petite Ourse
la Polaire
la Tête d'Andromede
Etoiles de Pegase, qui composent un Quadrilatere, avec la tête d'Andromede.
Dessiné et gravé par Pichillaud. L.


la Grue
le Scorpion
Riguel
Orion
Pied du Centaure
la Croizade
le Serpentaire
Antinous
l'Ecu de Sobieski
le Verseau
le Capricorne
le Sagittaire
l'Autel
le Paon
le Phenix
la Grue
le Toucan
le Navire
la Coupe
le Corbeau
le Centaure
le Loup
le Compas
la Regle
la Boussole
le Triangle Austral
le Poisson Austral
le grand Chien
la Colombe
la Licorne
Voye Lactée
Desiné et gravé par Dheulland

des deux Mathématiciens *Rothmanus* & *Byrgius*, qui calculerent sur toutes ces observations les lieux des Etoiles selon les longitudes qu'il avoit déduites des observations immédiates.

Riccioli, Jésuite d'Italie, augmenta dans la suite le Catalogue de *Kepler* de 305 Etoiles, de maniere que le Catalogue étoit plus complet, & contenoit déja 1468 Etoiles fixes : mais il faut bien prendre garde que ce Catalogue n'a point été rectifié sur les propres observations de *Riccioli* ; à peine cet Auteur, conjointement avec le P. *Grimaldi*, a-t-il pû déterminer les lieux vrais de 101 Etoiles : encore a-t-il été obligé d'y employer des instrumens particuliers, & moins exacts que ceux de *Tycho*, mais à la vérité assez simples & plus commodes pour la forme ordinaire de tous les calculs. Les autres Etoiles du Catalogue de *Riccioli* ont été prises dans les ouvrages de *Tycho*, *Kepler*, & des autres Auteurs. C'est une chose remarquable que plusieurs Etoiles qu'on voyoit distinctement du tems de Tycho, & même qu'il avoit observées avec soin, aient entierement disparu dans l'espace de cinquante à soixante ans qui se sont écoulés jusqu'au tems de *Riccioli*, sans qu'on les ait jamais pû voir jusqu'à ce jour, & cependant cet Auteur nous les a données dans son Catalogue, comme s'il les avoit observées lui-même.

Le P. Riccioli a publié aussi un catalogue : mais les Etoiles qu'il a observées sont en très-petit nombre.

Bartschius dans la description de son Globe céleste, imprimée à Strasbourg en 1635. nous apprend que *Bayer* dans son *Uranométrie* avoit publié 1725 Etoiles, comme cela se voit en effet dans ses Cartes célestes. Pour lui il tâche de faire valoir à ce sujet son propre ouvrage qui en contient 1762 ; mais il ne dit pas quel Astronome les a observées, ni dans quel tems ces observations ont été faites.

Quant à ce qui regarde les autres Etoiles situées vers

M. Hallei eſt le premier qui ait obſervé avec exactitude les Etoiles ſituées vers le Pole Auſtral.

le Pole Antarctique & qui ne ſont point viſibles dans nos climats, le premier qui les a obſervées avec ſoin eſt le célebre M. *Hallei*, Profeſſeur d'Aſtronomie à Oxfort ; lequel ayant toujours conçu une paſſion naturelle pour le progrès de l'Aſtronomie, entreprit autrefois une navigation très-longue & très-dangereuſe à l'Iſle Sainte Helene, dans le deſſein d'y obſerver les diſtances de toutes les Etoiles auſtrales, & d'en déduire leurs véritables longitudes & latitudes. Il en a publié à ſon retour, le Catalogue qui contient les lieux de 373 Etoiles pour le commencement de l'année 1677.

Le quatrieme Catalogue général a été publié par Hévelius, qui a obſervé la poſition de 1553 Etoiles, & dont le catalogue qui contient les Etoiles auſtrales de M. Hallei, renferme les longitudes & latitudes de 1888 Etoiles.

A peu près dans le même tems le célebre *Hévelius*, Conſul à Dantzic, réputé dès lors pour un obſervateur infatigable, & muni d'un ſomptueux appareil d'inſtrumens faits avec ſoin & par les meilleurs Artiſtes, avoit déja obſervé un plus grand nombre de lieux d'Etoiles fixes, qu'on n'avoit fait dans les ſiecles précédens. Car ſelon ſes propres obſervations il a calculé les poſitions de 1553 Etoiles. Mais le nouveau Catalogue qu'il a publié vers la fin du dernier ſiecle, contient 1888 Etoiles, dont il y en a 950 qu'on trouve dans les anciens Catalogues, leſquelles lui ont été viſibles ſur l'horiſon de Dantzic ; & de plus 603 autres Etoiles de celles qu'on n'avoit encore jamais obſervées avec une exactitude ſuffiſante. Enfin il en a ajouté 335 du Catalogue des Etoiles auſtrales publié par M. Hallei. M. Hévelius ne pouvoit appercevoir ces dernieres ſous la latitude de Dantzic, où elles ne montent jamais ſur l'horiſon : mais il les a calculées relativement à quelques autres que lui & M. Hallei avoient obſervées, & cela après les avoir extraites & réduites du catalogue publié par ce dernier.

Le Catalogue de Flamſteed, ou cinquieme Catalogue gé-

Depuis quelques années M. *Flamſteed*, Aſtronome de l'Obſervatoire royal de Greenvich, après avoir longtems promis un Catalogue de 3000 Etoiles, & par conſéquent

conſéquent beaucoup plus nombreux que tous les précédens, nous a donné ce grand ouvrage dans ſon Hiſtoire céleſte, où l'on trouve les lieux des Etoiles bien mieux déterminés que par tout ailleurs, les obſervations & les calculs ayant été fondés ſur une méthode particuliere, & même inconnue à tous les Aſtronomes qui l'ont précédé. Or de même qu'*Hévelius* avoit obſervé deux fois plus d'Etoiles que *Tycho*, de même l'infatigable Anglois a publié deux fois plus d'Etoiles qu'on n'en trouve dans le Catalogue d'*Hévelius*. Ainſi l'Aſtronomie s'eſt trouvée ſi fort avancée par les travaux de cet illuſtre Aſtronome, qu'à peine peut-on découvrir aujourd'hui d'Etoiles viſibles dans les Cieux, même ſi petites qu'elles ſoient, dont le lieu n'ait été déterminé plus exactement, que n'ont été rectifiés dans la partie la mieux connue de notre Géographie, les poſitions des villes & autres lieux conſidérables, tant des Continents, que des Caps, des Iſles ou des Ports de Mer. Il y auroit ſans doute lieu d'être étonné pourquoi les Aſtronomes ont ſoutenu tant de veilles & de fatigues pour déterminer la vraie poſition des Etoiles fixes, ſi l'on ne ſçavoit pas que ces lieux, une fois bien déterminés, procurent bientôt aux Obſervateurs un moyen ſûr & facile d'obſerver le mouvement, ſoit des Planetes, ſoit des Cometes, pour en déduire enfin la vraie poſition de leurs orbites. Ces lieux, dis-je, étant une fois bien connus, on a l'unique fondement de toute l'Aſtronomie-pratique. Ce ſont là les baſes d'où partent les Aſtronomes, ſemblables à ces colomnes que les anciens Architectes inventerent autrefois & deſtinées à ſoutenir les plus grands édifices.

neral le plus Ample & l'un des plus exacts qui ayent été publié juſqu'à ce jour.

Grande utilité des Catalogues dans l'Aſtronomie.

Il eſt à remarquer que des 3000 Etoiles que *Flamſteed* nous a données dans ſon Catalogue, il y en a beaucoup qu'on ne peut découvrir qu'avec la lunette d'approche : elles ſont trop petites pour être apperçues à la vûe ſimple.

Les Etoiles qu'on découvre à la vûe ſimple ne ſont pas à beaucoup près en auſſi grand nombre qu'on ſe l'imagine.

Il faut ſe réduire à mille, ou environ, lorſqu'on veut fixer le nombre de celles qu'une bonne vûe peut appercevoir en Europe. Ce qui paroîtra ſans doute difficile à croire à ceux qui, lorſque le Ciel eſt ſerein dans une des plus longues nuits d'Hiver, lorſqu'il n'y a point de clair de Lune, jettent leurs regards ſur l'hemiſphere qui les environne : ils jugent au premier coup d'œil que le nombre des Etoiles eſt immenſe, & qu'il ne ſe peut compter : mais cette apparence n'eſt qu'une illuſion. Ce qui nous trompe c'eſt la ſcintillation, ou la vivacité avec laquelle les Etoiles lancent leurs lumieres, l'œil étant ébloui, & ne les regardant toutes à la fois que d'une maniere confuſe & ſans aucun ordre : au lieu que ſi l'on vient à les conſidérer plus attentivement, & même à les diſtinguer l'une après l'autre, il ſeroit bien difficile d'en trouver qui n'ayent été marquées dans les Cartes ou les Catalogues d'*Hévelius* & de *Flamſteed*. Bien plus, ſi l'on a devant les yeux un de ces grands Globes ſemblables à ceux de *Blaeu*, & qu'on le compare avec le Ciel, quelqu'excellente vûe que l'on ait, on n'en pourra gueres découvrir, même parmi les plus petites Etoiles, qui n'aient été placées ſur la ſurface de ce Globe.

Mais auſſi le nombre des Etoiles qu'on découvre avec les lunettes eſt preſqu'immenſe.

Il faut avouer néantmoins que le nombre des Etoiles eſt immenſe & preſqu'infini : car avec les lunettes d'approche on en découvre un grand nombre qui ne ſont point encore dans les catalogues. Il n'eſt pas poſſible de les appercevoir à la vûe ſimple : mais plus la lunette eſt longue, plus on en découvre. On peut de cette maniere rendre une raiſon aſſez ſimple de ce que l'on a dit de la Voie Lactée, où l'on prétend qu'il y a un ſi grand nombre d'Etoiles voiſines les unes des autres, & en même tems ſi petites, que cette région du Ciel ſemée d'Etoiles imperceptibles, produit néantmoins aſſez de lumiere pour augmenter cette blancheur que l'on y apperçoit depuis tant de ſiecles.

Le fameux *Hook* dit dans sa Micrographie, *p.* 241. qu'ayant une fois dirigé une lunette de 12 pieds aux Pleïades (qu'on découvroit autrefois jusqu'au nombre de sept, & qui sont réduites à six qu'on distingue actuellement à la vûe simple) il en découvrit jusqu'à 78: mais qu'ayant employé une lunette encore plus grande, le nombre en paroissoit plus considérable. Le P. *Reïta* *, dit aussi que dans la vaste Constellation d'Orion il en avoit compté près de 2000 par le secours de sa lunette d'approche.

La matiere qui compose les Corps célestes n'est point incorruptible.

Il paroît donc évident, suivant ce qui a été dit dans le précédent Chapitre, que cette vieille opinion des sectateurs d'Aristote, qui prétendoient que les Cieux étoient incorruptibles, est absolument fausse & dénuée de raisons solides. Peut-être qu'étant un peu trop prévenus en faveur de tous ces corps lumineux que nous voyons dans le Ciel, ils se sont laissé entraîner à dire qu'il ne pouvoit jamais y arriver de changement. Et comme il ne leur en coûtoit gueres plus de multiplier les avantages ou les propriétés des corps célestes, ils ont enfin pris le parti d'assûrer que la matiere des Cieux est tout-à-fait différente de celle dont la Terre est formée. Qu'il falloit regarder la matiere terrestre non-seulement comme sujette à se corrompre, mais encore comme étant propre à prendre toutes sortes de configurations; au lieu que celle dont les corps célestes ont été formés, étoit au contraire tellement incorruptible, qu'ils devoient nous paroître perpétuellement sous une même forme, avec les mêmes dimensions, sans qu'il leur arrivât le moindre changement. Mais nous avons vû ci-dessus que dans le Soleil & les Planetes il se forme continuellement de nouvelles taches ou amas de matieres très-considérables qui se détruisent ou se corrompent ensuite, & qu'il a fallu de nécessité, depuis l'in-

* *In Radio suo sidereo Mystico. pag.* 197. Ceci n'a point été confirmé.

vention des lunettes d'approche, reconnoître divers changemens sur la surface des Corps célestes. Ainsi puisque c'est une chose certaine que sur la Terre & dans toutes les Planetes de notre systeme solaire, il se fait des changemens continuels ; cette corruption générale de la matiere doit s'étendre successivement à tous les Corps : car il y a par tout l'Univers un principe de génération & de corruption. Les Etoiles fixes qui sont à une distance énorme de la Terre ; les plus éloignées, dis-je, de ces Etoiles n'en sont pas même exemptes ; en un mot tous les Corps célestes, sans en excepter un seul, sont sujets au changement.

Il y a dans la nature un principe universel de génération & de corruption qui s'étend jusqu'aux Etoiles les plus éloignées de notre systeme solaire.

Des Etoiles qui paroissent & disparoissent alternativement.

Il y a quelques Etoiles observées par les anciens qui ne paroissent plus dans le Ciel, comme si elles avoient été détruites entierement, ou du moins d'une partie considérable. On en voit aussi d'autres qui s'allument, & renaissent ; mais qui probablement seront détruites dans la suite des siecles. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'il y a des Etoiles dont la lumiere s'éteint absolument pour reparoître ensuite après s'être montrées sous différens degrés de lumiere. Parmi ces dernieres Etoiles, celle du *Col de la Baleine* est célebre parmi les Astronomes. Il arrive pendant huit ou neuf mois qu'on cesse absolument de voir cette Etoile, & les trois ou quatre autres mois de l'année on la voit augmenter & diminuer de grandeur. L'on pourroit croire que cela vient uniquement de ce que la surface de cette Etoile est couverte pour la plus grande partie de Corps opaques ou taches *

* Cette derniere opinion des Philosophes sur l'apparition & la disparition des Etoiles, n'est gueres vraisemblable ; si l'on considere que nonobstant quelques inégalités, l'Etoile de la Baleine paroit & disparoit assez régulierement dans les mêmes saisons de l'année ; ce que l'on ne doit pas raisonnablement soupçonner à l'égard des taches qui peuvent se détruire ou renaitre sans observer d'ordre soit dans les tems, soit à l'égard des saisons. Il est bien plus simple d'imaginer que ces sortes d'Etoiles ne sont pas rondes comme le Soleil, mais considérablement applaties, parce qu'elles tournent sans doute très-rapidement autour de leur axe. Cette supposition est d'autant plus légitime, que l'on voit

ſemblables à celles du Soleil ; qu'il n'y reſte qu'une partie découverte ou lumineuſe, & que cette Etoile achevant ſucceſſivement ſes révolutions ou Rotations autour de ſon axe, ne ſçauroit toujours préſenter directement ſa partie lumineuſe ; enſorte que nous devons l'appercevoir tantôt plus ou moins grande, ou ceſſer de la voir entiérement lorſque cette partie lumineuſe n'eſt preſque plus tournée vers nous. Ce qui a fait ſoupçonner que c'étoient des taches qui ſont la principale cauſe de tous ces changemens, c'eſt qu'en diverſes années l'Etoile ne conſerve pas une régularité conſtante, ou n'eſt pas préciſément de même grandeur : tantôt elle égale en lumiere & grandeur les plus belles Etoiles de la ſeconde grandeur, tantôt celles de la troiſieme ; en un mot l'augmentation ou la diminution de ſa lumiere ne répond pas à des intervalles égaux. Elle n'eſt viſible quelquefois que pendant trois mois entiers, au lieu qu'on l'a vûe ſouvent pendant quatre mois & davantage.

Des Etoiles nouvelles.

Au reſte les Obſervations Aſtronomiques nous apprennent qu'on a vû ſubitement en différens ſiecles de nouvelles Etoiles inconnues auparavant, & qui ont augmenté de grandeur & de lumiere à tel point qu'elles égaloient les plus éclatantes Etoiles ; bientôt après elles ont commencé à diminuer, juſqu'à ce qu'elles ſe ſont enfin éteintes entierement. Ce fut une Obſervation de cette eſpece que fit *Hipparque*, & qui a engagé cet Aſtronome le plus célebre de toute l'antiquité, à former ſon Catalo-

parmi nos Planetes celles qui tournent le plus rapidement autour de leur axe, bien plus applaties que les autres. Jupiter, ſelon l'obſervation de M. Picard faite en 1668. & ſelon les meſures de MM. Caſſini & Pound, eſt ſenſiblement applati, ce qu'on ne peut pas dire des autres Planetes. Pourquoi ne ſeroit-il donc pas permis de ſuppoſer des Etoiles fixes, plus ou moins applaties, ſelon qu'elles tournent plus ou moins rapidement. D'ailleurs comme de groſſes Planetes peuvent faire leurs révolutions autour de ces Etoiles, & changer à notre égard la ſituation de l'axe de ces Corps lumineux, il s'enſuit que ſelon leur inclinaiſon plus ou moins grande, ils paroîtront plus ou moins éclatans, juſqu'à ne nous envoyer qu'une très-petite quantité de lumiere. *Voyez la Figure des Aſtres, chap.* VII. *pag.* 114.

gue des Etoiles fixes ; il a voulu le tranſmettre à la poſtérité, afin que l'on pût reconnoître un jour par ce moyen s'il paroîtroit ſemblablement de nouvelles Etoiles, ou du moins ſi pluſieurs de celles qu'on appercevoit de ſon tems ne diſparoîtroient pas dans la ſuite.

De la nouvelle Etoile qui a paru dans la Caſſiopée.

Long-tems après *Hipparque*, *Tycho-Brahé* ce fameux reſtaurateur de l'Aſtronomie, apperçut auſſi une Etoile nouvelle dans la Conſtellation de Caſſiopée, & qui fut remarquée des autres Aſtronomes. Ce fut donc preſque le même motif qui avoit porté *Hipparque* à former ſon Catalogue, qui engagea *Tycho* à conſtruire un nouveau Catalogue. La nouvelle Etoile fut apperçue vers le milieu du mois de Novembre 1572. Elle demeura fixe comme les autres pendant tout le tems de ſon apparition, qui fut d'environ ſeize mois ; enfin elle s'éteignit peu à peu. D'abord elle égaloit en grandeur *la Lyre*, enſuite *Sirius*, deux des plus belles Etoiles du Ciel ; ſa groſſeur apparente parvint même à tel degré, qu'elle égaloit preſque Venus *Perigée*, & on la voyoit pour lors à la vûe ſimple en plein midi : mais ayant perdu peu à peu ſa lumiere, elle a ceſſé de ſe montrer, & on ne l'a pas encore apperçue depuis ce tems-là. *Leovicius* qui en parle, nous apprend que l'an de J. C. 945, ſous l'empire d'Othon le Grand, il avoit paru une nouvelle Etoile dans la Conſtellation de Caſſiopée, ſemblable à celle qu'il apperçut en 1572. Cet Auteur ſe fonde auſſi ſur un autre témoignage moins ancien, pour prouver que l'an 1264, on avoit apperçu du côté du Nord, proche cette même Conſtellation, une nouvelle Etoile fort grande & qui n'avoit aucun mouvement propre. On pourroit donc croire que c'eſt la même qui avoit paru en 945, & que *Tycho* obſerva enſuite l'an 1572.

D'une autre nouvelle Etoile dans la conſtellation du Cygne.

Pendant l'année 1600 & la ſuivante, *Kepler* en obſerva une autre dans la poitrine du Cygne. Cette Etoile a été vûe long-tems dans le même endroit; juſques-là même

qu'*Hévelius* l'apperçut de la troiſieme grandeur ; mais elle diſparut en 1660. Au mois de Septembre 1666 Hévelius la revit pour la premiere fois, lorſqu'elle paroiſſoit à la vûe ſimple égale aux Etoiles de la ſixieme grandeur. Elle n'avoit point changé de lieu par rapport aux autres Etoiles ; enſorte qu'elle n'auroit eu aucun mouvement particulier depuis 1601 juſqu'en 1662.

Il paroît donc certain, ſi l'on conſulte les Catalogues dont nous avons parlé ci-deſſus, que pluſieurs Etoiles qui ont été obſervées par les anciens, & même par *Tycho* dans le ſeizieme ſiecle, ne ſont plus viſibles aujourd'hui : c'eſt auſſi ce que nous avons déja dit par rapport aux Pleïades qui étoient anciennement au nombre de ſept, mais dont on n'en apperçoit plus que ſix depuis fort longtems, même dans les climats orientaux où le Ciel eſt le plus ſerein. Ce qui a fait dire à *Ovide* au troiſieme Livre des Faſtes.

Quæ ſeptem dici, ſex tamen eſſe ſolent.

Montanari autrefois Profeſſeur de Mathématiques à Boulogne, dans une de ſes lettres du mois d'Avril 1670, écrites à la Société Royale de Londres, nous a aſſûré qu'il manquoit alors deux Etoiles de la ſeconde grandeur, * dans la poupe du vaiſſeau, & ſur les bancs des rameurs. « Ces Etoiles ſont, dit-il, marquées β & γ dans » *Bayer*, proche le Grand Chien. Elles ont été, ajoute-t-il, » obſervées & reconnues par moi & par d'autres Aſtro- » nomes, ſur-tout à l'occaſion de la Comete qui a paru » en 1664 : mais elles ont diſparu enſuite, & il eſt diffi-

* Cette prétendue Obſervation de Montanari ne mérite gueres d'attention puiſqu'il eſt vrai, ſelon M. Kirch, que les deux belles Etoiles que Montanari prétend avoir perdu de vûe, ont été apperçues continuellement depuis Ptolomée juſqu'à ce jour, à un ſigne au-delà, ou 30 degrés loin de l'endroit du Ciel où on les cherchoit. L'erreur des Cartes de Bayer vient ſans de ce que cet Auteur s'en eſt rapporté aux Traductions Latines du Texte de Ptolomée; au lieu que l'Edition Grecque de Baſle nous apprend qu'il falloit chercher ces Etoiles dans le vieux Catalogue vers le 15 deg. du Lion, & non pas au 15 deg. de l'Ecreviſſe. *Miſc. Berol. Cont.* V

» cile de retrouver le véritable tems où elles ont ceſſé » d'être viſibles. Ce qui eſt certain, c'eſt que depuis le 10 » Avril 1668, il n'a jamais été poſſible de les découvrir » dans le Ciel, quoique les autres Etoiles qui les envi- » ronnent, & qui ſont de la troiſieme & quatrieme gran- » deur, n'aient ſouffert aucun changement ni altération » ſenſibles. On peut dire la même choſe d'un très-grand » nombre d'autres Etoiles moins conſidérables, ſur leſquel- » les j'ai fait la même remarque à diverſes occaſions. »

De tout ce que l'on vient de dire nous devons être portés à conclurre que ces Etoiles fixes ont été entierement couvertes de Corps opaques, ou de taches beaucoup plus groſſes que celles du Soleil, & qu'ainſi elles ont perdu totalement leur propre lumiere; d'où il s'enſuivroit que s'il y a pluſieurs Planetes qui les accompagnent, ces Planetes ſont alors réduites à ne plus recevoir la lumiere de leur Soleil, mais ſeulement cette foible lueur qui leur vient perpétuellement des autres Etoiles fixes.

CHAPITRE SEPTIEME.

Du mouvement annuel de la Terre à l'égard du Soleil, & de ſa Rotation autour de ſon axe, d'où réſulte le mouvement diurne apparent du Soleil, & de tous les autres Aſtres.

APRE'S avoir parcouru, autant qu'il étoit néceſſaire, ce qui regarde la diſpoſition générale des parties de l'Univers, tant par rapport aux Etoiles, qu'à l'égard des divers amas de matiere qu'on obſerve dans les Cieux; il reſte à examiner plus attentivement & dans toute ſon étendue ce qui concerne notre ſyſteme ſolaire. Car l'Aſtronomie que nous allons traiter ne conſiſte pas ſeulement dans l'étude

l'étude du mouvement des Etoiles fixes, dont on a déja parlé assez amplement : mais il s'agit principalement du mouvement des Planetes qui nous environnent, ou plutôt qui environnent le Soleil.

Il est necessaire de commencer par établir le mouvement de la Terre.

C'est pourquoi il est à propos de commencer par le mouvement de la Terre, qui est notre demeure ; il paroît même que rien n'est plus nécessaire que d'en bien distinguer les vrais mouvemens : car autrement nous ne sçaurions pas la cause des mouvemens apparens du Soleil, & il seroit impossible d'expliquer ceux des autres Planetes, ou de les réduire à une forme de calcul qui pût être exacte.

Le Soleil est au centre de notre système planétaire.

Nous avons fait voir dans les Chapitres précédens que le Soleil étoit la plus considérable & la premiere de toutes les Planetes qui se trouvent dans notre système ; qu'il n'y avoit que ce seul Corps qui fût lumineux ; & qu'étant au centre de notre Monde planétaire, il répandoit continuellement ses rayons de tous côtés, éclairant toujours l'hémisphere de chacune de nos Planetes, qui sont des Corps opaques, & leur communiquant sans cesse, de même qu'aux habitans de la Terre, cette chaleur si utile dans la nature, & même à notre conservation, puisqu'elle nous donne, pour ainsi dire, une nouvelle vie. Or les Planetes faisant leurs révolutions périodiques autour du Soleil chacune en différens tems & à différentes distances, il faut que la Terre, qui n'est autre chose qu'une Planete, fasse aussi sa révolution périodique chaque année, & qu'elle ait de plus une Rotation autour de son axe dans l'espace de vingt-quatre heures. Mais parce que la distance des Etoiles fixes au Soleil ou à la Terre est prodigieuse en comparaison de la distance de la Terre au Soleil ; il suit que ce doit être précisément la même apparence du Ciel étoilé, soit qu'on le regarde de la surface de la Terre ou du centre du Soleil, la situation de toutes les Etoiles dans

La Terre se meut autour du Soleil, nonobstant sa Rotation autour de son axe.

La situation ou l'arrangement des Etoiles doit paroître le même, vû du Soleil ou de la Terre.

ce dernier cas étant précisément la même : ainsi elles paroîtront vûes du Soleil, arrangées de la même maniere qu'on les apperçoit de la surface de la Terre. Ce qui étant une fois établi pour constant, on voit d'abord qu'un Observateur qui seroit dans le Soleil, n'ayant point d'autre terme où il puisse borner sa vûe ; que le Ciel étoilé auquel il rapporte les mouvemens soit de la Terre, soit de tous les autres Corps qui sont éloignés du lieu qu'il occupe ; cet Observateur, dis-je, doit s'imaginer que la Terre décrit chaque année dans cette espece de voute céleste, qu'il regarde comme une sphere, la circonférence d'un grand cercle, c'est-à-dire, d'un cercle dont le plan passe par le centre du Soleil ; en un mot qui est le même que celui du Ciel étoilé, & cela à cause de la distance presqu'immense de toutes les Etoiles fixes.

Le mouvement de la Terre vû du Soleil. PLANCHE I. *Figure 15.*

Soit le Soleil en *S*, l'orbite de la Terre *ABCD*, sur laquelle cette Planete se meut d'Occident en Orient, sçavoir de *A* en *BCD* : si l'Observateur est supposé en *S* au centre du Soleil, le lieu vrai qu'occupe la Terre lorsqu'elle est en *A*, lui paroîtra répondre au point ♈ dans le Ciel. Et lorsque la Terre sera parvenue en *B*, elle lui paroîtra répondre aux Etoiles qui sont en ♋. De même la Terre continuant à s'avancer jusqu'en *C*, elle paroîtra pour lors répondre au point ♎ de la sphere. Enfin lorsque la Terre sera arrivée en *D*, elle paroîtra répondre au point ♑ du Ciel étoilé ; de maniere que si l'on observoit du Soleil le tems auquel sa période sera achevée, ou sa position lorsqu'elle seroit en *A*, elle répondroit alors pour la seconde fois aux Etoiles qui sont en ♈, d'où on l'a vû partir l'année d'auparavant.

Pour mieux faire comprendre ce que nous venons de dire, imaginons le plan de l'orbite terrestre continué de toutes parts jusqu'aux Etoiles fixes : ce plan formera dans la surface sphérique du Ciel, un cercle qui sera celui que

l'œil placé dans le Soleil verroit décrire chaque année à la Terre parmi les Etoiles fixes ; c'eſt ce cercle qu'on nomme l'*Ecliptique*, & que les Aſtronomes ont partagé en douze parties égales, qu'ils appellent les ſignes de l'Ecliptique ou du Zodiaque. D'ailleurs comme chaque ſigne a pris ſon nom de la Conſtellation qui s'y trouvoit lorſqu'on a fait cette diſtribution pour la premiere fois, on a cru devoir les conſerver juſqu'à préſent & les voici tous dans leur ordre: *Le Belier* ♈, *le Taureau* ♉, *les Gemeaux* ♊, *l'Ecreviſſe* ♋, *le Lion* ♌, *la Vierge* ♍, *la Balance* ♎, *le Scorpion* ♏, *le Sagittaire* ♐, *le Capricorne* ♑, *le Verſeau* ♒, *& les Poiſſons* ♓.

L'Ecliptique.

Il eſt diviſé en douze parties égales.

Leurs noms.

Maintenant ſi au lieu de ſuppoſer l'Obſervateur dans le Soleil, nous le plaçons ſur la Terre, comme il doit être, dans cette ſuppoſition ſi le lieu de la Terre eſt au point *C* de ſon orbite, le Soleil lui paroîtra ſe mouvoir dans le Ciel étoilé de la même maniere & dans le même ſens qu'auroit été obſervée la Terre, l'œil étant placé au centre du Soleil. La Terre étant donc au point *C* de ſon orbite, l'Obſervateur qui s'y trouve, verra le Soleil au point ♈ de la ſphere des Etoiles fixes; & parce que ce même Obſervateur eſt emporté & qu'il participe à tous les autres mouvemens, & ſur-tout au mouvement annuel de la Terre ; il eſt évident qu'il ne ſçauroit plus s'en appercevoir en aucune maniere, toutes les parties du globe de la Terre qui l'environnent étant en ce cas dans une même ſituation & dans une même diſtance à ſon égard. Mais continuant à obſerver le Soleil, il lui paroîtra s'avancer juſqu'en ♋, au lieu que c'eſt réellement la Terre qui s'eſt avancée juſqu'en *D* : ainſi l'Obſervateur attribuera un mouvement réel au Soleil, parce qu'il lui aura paru traverſer ſucceſſivement les Etoiles fixes qui ſont ſituées depuis ♈, ♉, ♊, juſqu'en ♋ : ſemblablement la Terre étant tranſportée de *D* en *A*, le Soleil paroîtra parcourir

Le mouvement apparent du Soleil vû de la Terre.

dans le même espace de tems les signes ♋, ♌, ♍, & enfin lorsqu'elle achevera l'autre demi-cercle *ABC*, le Soleil lui semblera avoir parcouru les six autres signes ♎, ♏, ♐, ♑, ♒, ♓, de la surface concave du Ciel étoilé. Ainsi les Habitans de la Terre ne s'appercevant jamais de leur propre mouvement autour du Soleil, l'attribuent par conséquent au Soleil, quoiqu'immobile, & ils lui voient parcourir dans l'espace d'une année le même cercle de la sphère, qu'un Observateur placé au centre de cet Astre verroit décrire à la Terre pendant le même intervalle de tems.

PLANCHE I. *Figure 15.*

Le Soleil nous paroit s'avancer chaque jour vers des Etoiles plus orientales.

Telle est donc l'origine de ce mouvement du Soleil, qui nous paroît se faire chaque jour vers les Etoiles orientales. Si l'on observe, par exemple, qu'une Etoile située proche l'Ecliptique se leve en même tems que le Soleil, on s'appercevra peu de jours après que le Soleil s'est avancé plus vers l'Orient, de maniere que l'Etoile se levera quelque tems auparavant, mais au contraire elle se couchera plutôt que le Soleil. De même une Etoile située vers l'Ecliptique, & que l'on voit le soir du côté de l'Occident à une distance assez considérable du Soleil, s'en approche tellement de jour en jour, qu'on ne sçauroit bientôt plus l'appercevoir la nuit, ou plutôt immédiatement après le coucher du Soleil. Or le mouvement apparent du Soleil qui se fait dans un sens contraire au mouvement diurne d'Occident en Orient, a été regardé par le commun des hommes, & sur-tout depuis Aristote & Ptolomée, comme un mouvement réel appartenant au Soleil. Mais nous avons fait voir d'une maniere assez simple la cause de ce mouvement apparent, qui ne doit être fondée que sur le mouvement propre de la Terre dans son orbite autour du Soleil.

Il est évident qu'on observeroit de meme dans les autres Planetes des mouvemens apparens du Soleil plus ou moins

grands, selon qu'elles tournent plus ou moins vîte autour de ce Corps lumineux; de sorte que si nous habitions ces mêmes Planetes, nous verrions le Soleil décrire préciſément le même cercle dans la ſphere des Etoiles fixes & y employer le même tems, qu'on l'obſerveroit à l'égard de chacune de ces Planetes, ſi l'œil au contraire étoit placé dans le Soleil. Je ſuppoſe, par exemple, que nous ſoyons dans Jupiter, nous y verrions le Soleil tourner autour de cette Planete dans un tems fort long, & dans un cercle peu différent de notre Ecliptique: mais nous verrions auſſi les mouvemens du Soleil plus lents qu'ils ne nous paroiſſent de deſſus la Terre; car le Soleil paſſant ſucceſſivement par différentes Etoiles, ne retourneroit à la même place, c'eſt-à-dire, n'acheveroit ſa révolution que dans l'eſpace de douze années.

On pourroit obſerver des mouvemens à peu près ſemblables, & qu'on attribueroit au Soleil, ſi l'on ſe trouvoit ſucceſſivement dans chaque Planete.

C'eſt ainſi qu'on peut encore s'imaginer pourquoi l'on verroit de Saturne décrire au Soleil un autre cercle encore plus grand & dans un tems beaucoup plus long; puiſque cette Planete emploie près de trente ans à achever ſa révolution périodique. Mais puiſqu'il n'eſt pas poſſible que le Soleil ait en même tems tous ces différens mouvemens; qu'il ſe meuve tout à la fois fort vîte & très-lentement, & que d'ailleurs il n'y a pas de raiſon pourquoi un de ces mouvemens apparens vû d'une Planete comme de la Terre, appartiendroit plutôt au Soleil, que celui qui ſeroit vû de Jupiter ou de Saturne, il s'enſuit que tous ces mouvemens apparens du Soleil ne lui ſont pas propres, qu'il n'en a en effet aucuns; qu'en un mot ce ne ſont là que des apparences dont il faut attribuer la cauſe aux mouvemens réels des Planetes.

La Rotation de la Terre autour de ſon axe.

Maintenant que nous avons aſſez parlé du mouvement annuel de la Terre dans ſon orbite, il eſt néceſſaire de parler auſſi de ce qui concerne ſa Rotation ou de la révolution diurne de la Terre autour de ſon axe, qui ſe fait

d'Occident en Orient. Mais nous remarquerons auparavant que de même que les deux points où se rencontrent les deux extrémités de l'axe de la Terre, se nomment les deux Poles, de même les deux autres points où cet axe prolongé rencontre la surface concave de la sphere des Etoiles fixes, se nomment aussi les deux Poles du Monde. De plus excepté les deux Poles, tous les autres points de la surface de la Terre décrivent par le mouvement diurne de Rotation une circonférence plus ou moins grande, selon que ces points sont plus ou moins éloignés des Poles. Il n'y a donc que les deux Poles de la Terre qui soient exempts du mouvement de rotation, tout le reste étant dans un mouvement continuel. Ainsi les lieux de la Terre qui sont également éloignés des deux Poles seront exposés au mouvement le plus rapide, parce qu'ils sont en effet situés de maniere qu'ils décrivent le plus grand cercle; on nomme ce cercle l'*Equateur* ou l'*Equinoxial*; au lieu que tous les autres petits cercles compris entre l'Equateur & les Poles, sont appellés cercles paralleles.

Les Poles.

L'Equateur & ses Paralleles.

Si l'on conçoit aussi qu'à chaque lieu que nous occupons sur la surface de la Terre, il passe un plan qui ne la touche qu'en ce seul point, & qui étant prolongé de tous côtés soit terminé dans la sphere des Etoiles fixes; ce plan à cause de la prodigieuse petitesse de la Terre, divisera le Ciel en deux parties égales, & y formera un grand cercle. C'est ce cercle que nous appellons l'*Horizon*. Il sépare la partie visible ou supérieure du Ciel, d'avec la partie inférieure, & qui nous est invisible à cause de la rondeur de la Terre qui n'est point transparente, mais opaque. Cet horizon n'est proprement que l'horizon sensible, mais il ne differe qu'insensiblement de l'horizon rationel qui lui est parallele, & qui passe par le centre de la Terre. De plus, ces deux cercles, quoique paralleles, sont censés se rencontrer dans le même lieu du Ciel,

Le Cercle de l'Horizon.

L'Horizon sensible.

L'Horizon rationel.

parce qu'un auſſi petit intervalle qu'eſt le demi-diametre de la Terre, & qui eſt compris entre ces deux horizons, s'évanouit auſſi-tôt qu'on le compare à une diſtance auſſi énorme qu'eſt le rayon de la ſphere des Etoiles fixes.

PLANCHE I. *Figure 16.*

Conſidérons préſentement la rotation de la Terre autour de ſon axe. Il doit d'abord paroître évident que le Spectateur qui ſe trouve à la ſurface, doit être emporté, & par conſéquent tourner de la même maniere vers l'Orient que le plan de ſon propre horizon, qui eſt l'unique terme d'où il meſure la hauteur apparente de tous les Aſtres. Or il arrive de là que la partie du Ciel qu'il ne voyoit pas auparavant du côté de l'Orient, parce qu'elle étoit au-deſſous de l'horizon, doit ſe découvrir à ſon égard, pendant que du côté de l'Occident il perdra de vûe peu à peu tous les lieux du Ciel qu'il voyoit élevés au-deſſus de ſon horizon quelques moments auparavant. Il verra donc les Aſtres ſe lever d'un côté, monter enſuite & s'abaiſſer de l'autre pour ſe coucher dans l'horizon. C'eſt-là l'origine des noms *Lever* & *Coucher*, qu'on a donnés à ces deux points oppoſés. Il eſt donc vrai de dire que le mouvement de rotation de la Terre eſt la cauſe de ces mouvemens des Corps céleſtes vers l'Occident que nous obſervons chaque jour. Ces mouvemens nous paroiſſent tels, parce qu'on eſt naturellement porté à croire que la maſſe entiere du Ciel étoilé, le Soleil & toutes les Planetes, ſont emportés véritablement d'Orient en Occident d'un mouvement uniforme & régulier; & qu'enfin tous les différens points que nous remarquons dans le Ciel, décrivent autour de l'axe de la Terre des cercles plus ou moins grands, ſelon qu'ils ſont plus ou moins éloignés des deux Poles: ceux-ci, comme on l'a déja dit, étant les ſeuls points du Ciel que l'on remarque conſtamment immobiles.

La Rotation de la Terre autour de ſon Axe eſt l'unique cauſe du mouvement apparent de tous les Aſtres, d'Orient en Occident, & qui ſe fait en 24 heures.

Quoique la lumiere des Etoiles fixes ſe répande continuellement ſur la ſurface de la Terre, néantmoins celle

Du Jour.

du Soleil eſt ſi grande, qu'elle efface, lorſqu'il eſt une fois levé ſur l'horizon, la plus grande partie de l'éclat que nous voyons autour des Etoiles fixes; ce qui fait que ſans les lunettes d'approche nous ne pouvons voir les Etoiles en plein midi. Mais lorſqu'il arrive quelqu'éclipſe du Soleil en plein jour, ou bien lorſque le Soleil eſt deſcendu ſous l'horizon; c'eſt-à-dire, pour parler plus exactement, lorſque notre horizon s'eſt élevé au-deſſus de cet Aſtre, alors il fait nuit, & l'on peut appercevoir toutes les Etoiles fixes. Nous avons déja dit que la ſurface ou le globe entier de la Terre, puiſqu'elle eſt à très-peu près ſphérique, eſt un amas de matiere opaque, ou qui abſorbe tellement les rayons, qu'elle n'en laiſſe jamais paſſer aucun, au contraire de ce qui arrive à l'égard de tous les Corps tranſparens. Ainſi le Soleil n'en peut éclairer que la moitié, & le reſte eſt plongé dans une obſcurité profonde. On peut donc ſe repréſenter ici un grand cercle qui ſépare continuellement la moitié de la Terre qui eſt éclairée de celle qui ſe trouve dans l'ombre, c'eſt-à-dire, de celle qui ne reçoit aucun des rayons du Soleil. C'eſt ce cercle que nous appellerons dans la ſuite *le Terme de la lumiere & de l'ombre*, & ſur le plan duquel eſt toujours perpendiculaire la ligne droite tirée du centre du Soleil au centre de la Terre.

De la Nuit.

Le terme de la lumiere & de l'ombre eſt toujours un grand cercle de la ſurface terreſtre.

Si l'axe de la Terre étoit perpendiculaire au plan de l'orbite (lequel eſt le même que le plan de l'Ecliptique) le terme de la lumiere & de l'ombre paſſeroit perpétuellement par les Poles, & diviſeroit par conſéquent l'Equateur & ſes paralleles en deux parties égales; de ſorte que le Soleil & tous les Aſtres paroîtroient en ce cas un auſſi long-tems ſur l'horizon, qu'ils en emploieroient à parcourir la partie inférieure & inviſible du Ciel, & dans cette ſuppoſition les jours devroient être égaux aux nuits par toute la Terre & dans tous les tems. Mais l'axe de la Terre n'eſt

L'Axe de la Terre n'eſt point perpendiculaire au plan de l'Ecliptique.

point

point perpendiculaire au plan de l'Ecliptique ; il y eſt incliné de $66°\frac{1}{2}$. Ainſi le plan de l'Equateur eſt très-différent du plan de l'Ecliptique ; & il s'en faut bien que ces deux plans ne forment qu'un même cercle ; car il eſt évident que le plan de l'Equateur terreſtre étant prolongé dans le Ciel, y forme auſſi un grand cercle qu'on appelle l'Equateur céleſte, ou l'Equinoxial ; de ſorte que les plans de l'Ecliptique & de l'Equateur forment entr'eux un angle de $23°\frac{1}{2}$.

La Terre parcourt ſon orbite de maniere que ſon axe demeure toujours parallele à lui-même ou à ſa premiere direction, ce qu'il eſt aiſé de concevoir ſi l'on imagine une fois une ligne tirée parallelement à l'axe dans telle ſaiſon ou telle ſituation de la Terre que l'on voudra : car cet axe lui demeurera toujours parallele dans quelque point que ce ſoit de l'orbite où la Terre ſe trouve : il ne changera jamais ſa premiere inclinaiſon, mais il paroîtra conſtamment dirigé vers le même point du Ciel : cela comme l'on voit, doit arriver naturellement ſi la Terre parcourant ſon orbite, n'a d'autre mouvement propre que celui de Rotation autour de ſon axe. Car ſoit une Planete quelconque, dont le centre parcourre une petite portion de ſon orbite, qu'on peut regarder ici comme une ligne droite *AB* : cet Aſtre étant en *A*, ſi l'on tire un diametre *CD* incliné ſous un certain angle à la ligne *AB* ; il eſt évident que ſi cette Planete n'a d'autre mouvement que celui ſelon lequel elle s'avance de *A* vers *B*, ſon diametre *CD* ne doit jamais avoir d'autre direction que ſelon la ligne *cd* parallele au premier diametre *CD* : mais ſi outre ce mouvement de tranſlation, on imagine que la Planete en ait un autre de Rotation autour de ſon axe *CD*, quoiqu'il ſoit vrai de dire en ce cas que tous les autres diametres de cette Planete changent continuellement de direction, le vrai axe *CD* ou *cd*, eſt néantmoins exempt de ce

PLANCHE I. *Figure 17.*

mouvement de rotation : il ne ſçauroit changer ſa direction, mais il doit toujours demeure parallele à lui-même en quelqu'endroit qu'il ſe trouve.

Cette explication eſt ſi ſimple & ſi naturelle, qu'il eſt aſſez ridicule que certains Philoſophes aient eu beſoin de ſuppoſer un troiſieme mouvement pour expliquer le paralléliſme de l'axe de la Terre. On conviendra ſans doute qu'il ſuffit que la Terre n'ait d'autre mouvement que les deux dont nous avons parlé ci-deſſus, c'eſt-à-dire celui de Tranſlation & celui de Rotation autour de ſon axe. Car quoiqu'elle n'en ait pas un troiſieme, ſon axe n'en eſt pas moins exactement dirigé au même point du Ciel, & il eſt impoſſible qu'il ne ſoit toujours parallele à lui-même.

Puiſque le plan de l'Equateur eſt incliné à celui de l'Ecliptique, il faut néceſſairement que les plans de ces deux cercles ſe coupent dans une ligne droite, & que par conſéquent leur ſection commune ſe trouve auſſi parallele à elle-même, pendant tous le tems que la Terre parcourt ſon orbite. On peut alléguer ici les mêmes raiſons que celles qui ont été rapportées pour prouver le paralléliſme de ſon axe. Or il ſuit de-là que cette ſection commune ſera toujours dirigée aux deux points de l'Ecliptique diamétralement oppoſés ; c'eſt-à-dire qu'elle ſera conſtamment dirigée aux mêmes points de l'Univers.

Le Colure des Equinoxes.
Le Colure des Solſtices.

Si par cette commune ſection & par les poles du Monde on fait paſſer un grand cercle de la ſphere, ce cercle ſera celui qu'on nomme *le Colure des Equinoxes*, de même qu'on nomme *Colure des Solſtices* l'autre grand cercle qui lui eſt perpendiculaire, & qui paſſe auſſi par les Poles. Ce dernier déſigne par ſon interſection avec l'Ecliptique les deux points où ce cercle eſt le plus éloigné de l'Equateur. Mais puiſque le même Colure des Solſtices coupe à angles droits l'Ecliptique & l'Equateur, il s'enſuit qu'il paſſe par les Poles de ces deux cercles. Enfin

les quatre points où ces deux colures coupent l'Ecliptique, ſont regardés comme les quatre points cardinaux; parce que quand le Soleil s'y rencontre, on commence à compter dès-lors le commencement de l'une des quatre ſaiſons de l'année. L'interſection du colure des Equinoxes avec l'Ecliptique détermine les points équinoxiaux, & celle du colure des Solſtices avec l'Ecliptique, détermine les points ou les tems auſquels arrivent les Solſtices.

Planche I. *Figure* 18.

Suppoſons maintenant que l'œil regarde obliquement le plan de l'orbite de la Terre, dont la projection ſelon les regles de la Perſpective, doit paroître alors une ovale ou ellipſe, au milieu de laquelle ſe trouve le Soleil en *S*: ſi l'on mene par le centre de cet Aſtre la droite ♈ *S* ♎ parallele à la ſection commune de l'Ecliptique & de l'Equateur, & qui rencontre l'Ecliptique en deux points ♈ & ♎; il eſt clair que lorſque la Terre paroîtra dans l'un de ces deux points, la ligne ♈♎ qui joint les centres de la Terre & du Soleil, ſera pour lors dans la ſection commune des deux plans. Cette ligne, dis-je, de même que la ſection commune des plans de l'Ecliptique & de l'Equateur ne doivent former qu'une même ligne droite: elle ſera donc en ce cas perpendiculaire à l'axe de la Terre, puiſque c'eſt une de celles qui ſe trouvent dans le plan de l'Equateur. Mais cette même ligne droite étant auſſi perpendiculaire au plan du cercle, que nous avons dit être le terme de la lumiere & de l'ombre, il ſuit que l'axe de la Terre ſe trouvera pour lors dans le plan de ce cercle, & paſſera par conſéquent par les Poles; enſorte qu'il diviſera tous les paralleles à l'Equateur en deux parties égales. La Terre étant donc au commencement de ♎ & le Soleil paroiſſant pour lors au commencement du ♈ dans la commune ſection des plans de l'Ecliptique & de l'Equateur, cet Aſtre doit par conſéquent nous paroître alors dans l'Equateur céleſte ſans aucune déclinaiſon, ſoit au

Ce que l'on doit obſerver lorſque la Terre eſt en ♎ & que le Soleil eſt vû en ♈.

Nord soit au Midi, étant à égales distances des Poles. Il est encore évident qu'il paroîtra décrire par son mouvement diurne le cercle Equinoxial dont nous avons parlé ci-dessus; de maniere que dans cette situation sa lumiere répandue sur la Terre, doit se terminer également aux deux Poles *A* & *B*, & que le grand cercle où se termine cette lumiere, divisera en deux parties égales tous les petits cercles paralleles à l'Equateur. Mais parce que tous les lieux de la Terre sont emportés d'un mouvement uniforme par la Rotation qui se fait autour de son axe en 24 heures, il s'ensuit qu'on y appercevra pour lors les jours égaux aux-nuits, chaque point de la surface de la Terre demeurant autant plongé dans les ténebres qu'exposé aux rayons qui émanent du disque apparent du Soleil: or puisque pendant tout ce tems le jour est précisément égal à la nuit, on a pour cette raison nommé l'*Equinoxial* le cercle que le Soleil parcourt dans ces tems-là.

Le mouvement annuel de la Terre sur son orbite détruit bientôt cette uniformité; car cette Planete étant transportée depuis ♎, ♏, ♐, jusques en ♑, il arrive pour lors que la section des plans de l'Equateur & de l'Ecliptique, qui reste comme nous l'avons dit parallele à elle-même sans changer de direction, ne passe plus par le centre du Soleil, mais s'en écarte peu à peu considérablement. Elle forme bien en ♑ un angle droit avec la ligne *SP* tirée du centre du Soleil au centre de la Terre: mais parce que cette ligne *SP* est dans le plan de l'Ecliptique & non pas dans celui de l'Equateur, l'angle *BPS* formé par l'axe de la Terre avec la ligne *BP* n'est plus un angle droit, mais un angle aigu de $66°\frac{1}{2}$; c'est-à-dire, égal à l'inclinaison de cet axe sur le plan de l'Ecliptique. Faisant donc au point *P* l'angle droit *SPL*, il est clair que le terme de la lumiere & de l'ombre passera par le point *L*, & que l'arc *BL* ou l'angle *BPL* sera de $23°\frac{1}{2}$, sçavoir égal

Ce que l'on doit observer lorsque la Terre est en ♑ & que le Soleil paroît au point ♋ du Solstice d'Eté.

au complement à 90° de l'angle *BPS*. Mais faisant aussi l'angle droit *BPE*, il suit que la ligne *PE* sera dans le plan de l'Equateur; d'où l'on voit que puisque l'arc *BE* est égal à *LT*, l'un & l'autre étant de 90°, & que l'arc *BT* de $66°\frac{1}{2}$ leur est commun, les deux autres arcs *TE*, *LB*, seront chacun de $23°\frac{1}{2}$, & par conséquent égaux. Il faut faire maintenant *EM* égal à *ET*, & décrire par les points *T* & *M* les deux paralleles à l'Equateur *TC*, *MN*, qui seront les deux Tropiques, dont l'inférieur *MN* se nomme le *Tropique du Capricorne* ♑, & l'autre *TC le Tropique du Cancer* ou *de l'Ecrevisse* ♋. Or dans cette situation de la Terre, le Soleil est à plomb ou perpendiculairement élevé sur le point *T*, & c'est le tems où il est le plus éloigné de l'Equateur, c'est-à-dire, dans sa plus grande déclinaison possible vers le Pole boréal. Le cercle qu'il paroît pour lors décrire par son mouvement diurne, se trouve dans le Ciel directement au-dessus du cercle *TC* de la Terre, & se nomme par conséquent le Tropique céleste du ♋: mais la révolution diurne de la Terre autour de son axe immobile, est cause que tous les points de la Terre qui sont sous ce même parallele à l'Equateur, doivent passer successivement par ce point *T* où l'œil apperçoit le Soleil perpendiculaire: ainsi le Soleil paroîtra pour lors à l'instant du midi à plomb ou vertical à tous les habitans de ce parallele. Enfin tant que la Terre demeurera dans cette situation, il est nécessaire que le cercle qui représente le terme de la lumiere & de l'ombre se trouve au-delà du Pole boréal *B*, étant parvenu jusqu'en *L*; & qu'au contraire il soit écarté jusqu'en *F* du Pole austral *A*, & cela pendant plusieurs jours. Si l'on décrit donc enfin par les point *L* & *F* les deux paralleles à l'Equateur, on aura les deux *Cercles Polaires* qu'on nomme *Arctique* & *Antarctique*, & c'est toute cette région de la Terre comprise entre le Pole boréal & le cercle Polaire arctique *KL*, qui

Les deux Tropiques.

Les deux Polaires.

demeurera pour lors dans un jour perpétuel, malgré la Rotation diurne de la Terre autour de son axe. Car le Soleil répand alors toujours sa lumiere jusqu'à ce cercle Polaire, qui est tout entier au-delà du terme de la lumiere & de l'ombre, les rayons ne pouvant plus, indépendamment de la Rotation de la Terre, s'étendre au-delà du cercle Polaire arctique. Au contraire l'autre région opposée de la Terre, laquelle est compriſe entre le Pole austral & le Cercle polaire antarctique, se trouvera pour lors plongée dans de profondes ténebres : on n'y verra plus le Soleil, & le jour qu'on aura vû diminuer ou qu'on a perdu peu à peu dans l'espace de trois mois aura été changé en une nuit continuelle. On voit aussi par là que dans les autres cercles paralleles compris entre l'Equateur & le Cercle polaire arctique ou antarctique, il se trouve une partie d'autant plus grande de ces Cercles plongée dans la lumiere ou dans la nuit, qu'ils sont plus éloignés de l'Equateur ou plus avancés vers les Poles. C'est pourquoi dans cette situation de la Terre où l'on suppose que le Soleil paroît au ♋, il est nécessaire que tous les habitans de l'hemisphere septentrional depuis l'Equateur jusqu'au Cercle polaire jouissent des plus longs jours & qu'ils n'aient que des nuits très-courtes, ce qui est à leur égard la saison qu'on nomme l'Eté ; & qu'au contraire dans l'hemisphere qu'on nomme méridional, les nuits y soient alors fort longues, & que les habitans s'y trouvent dans cette saison qu'on nomme l'Hiver, puisque leurs jours sont les plus courts & que le froid les pénetre alors davantage que dans les autres saisons de l'année.

Des plus longs jours de l'année.

Des plus courts jours.

Après avoir expliqué pourquoi les lieux de la Terre où l'on doit observer les plus longs jours & les nuits les plus courtes, sont ceux qui sont les plus éloignés de l'Equateur, il est à propos de considérer que de tous les cercles paralleles, il n'y en a aucun qui soit véritablement un

grand cercle, & partant qu'il ne ſçauroit y avoir que l'Equateur qui puiſſe être coupé en deux également par ce grand cercle que nous avons nommé le terme de la lumiere & de l'ombre : or il ſuit de là qu'il n'y a ſur la Terre que les habitans de l'Equateur qui ayent l'avantage de conſerver leurs jours égaux aux nuits dans toutes les ſaiſons de l'année.

Ce qui doit s'obſerver lorſque le Soleil paroît dans le point équinoxial de l'Automne.

Suppoſons en troiſieme lieu que la Terre s'avance ſur ſon orbite depuis ♑, ♒, ♓, juſqu'au ♈, pendant lequel tems le Soleil paroîtra parcourir les ſignes ♌, ♍ & ♎, alors on verra cet Aſtre ſe rapprocher peu à peu de l'Equateur, de maniere que la Terre étant une fois en ♈, le Soleil paroîtra pour lors en ♎, & ſe trouvera pour la ſeconde fois dans la commune ſection de l'Ecliptique & de l'Equateur, puiſqu'elle s'eſt toujours avancée dans une ſituation parallele. C'eſt pourquoi le Soleil doit alors paroître dans le cercle équinoxial, ce qui doit donner encore les jours égaux aux nuits dans toute l'étendue de la ſurface de la Terre, & cela préciſément de la même maniere qu'il eſt arrivé lorſque la Terre étoit en ♎ ou que le Soleil paroiſſoit en ♈. Dans ce cas le terme de la lumiere & de l'ombre paſſera encore par les deux Poles, & l'on a pu remarquer, par ce que nous avons dit juſqu'ici, qu'il n'y a que le Pole ſeptentrional *B* qui s'eſt trouvé continuellement éclairé du Soleil pendant l'eſpace de ſix mois que la Terre a employé à parcourir la moitié de ſon orbite depuis ♎ juſqu'en ♈; & qu'au contraire le Pole meridional a été conſtamment plongé dans l'ombre ou dans la nuit pendant le même intervalle de tems.

Ce qui doit arriver lorſque le Soleil paroît au ♑ qui eſt le point du Solſtice d'Hiver.

Enfin la Terre venant à s'avancer ſelon la ſuite des ſignes ♈, ♉ & ♊, c'eſt-à-dire, le Soleil paroiſſant parcourir les ſignes ♎, ♏ & ♐, il doit s'éloigner peu à peu de l'Equateur, de maniere que la Terre étant une fois parvenue en ♋, le Soleil paroîtra pour lors au commencement du ♑ de la ſphere des Etoiles fixes. D'ailleurs l'axe

de la Terre n'ayant point changé sa direction, puisqu'il a conservé son parallélisme, la Terre se présentera pour lors au Soleil avec la même inclinaison de son axe, qu'elle s'y présentoit six mois auparavant lorsqu'elle étoit au commencement du ♑; mais avec cette différence qu'au lieu que la region renfermée dans le cercle *KL* étoit éclairée du Soleil lorsque la Terre passoit au point ♑ de son orbite, au contraire la Terre étant en ♋, cette même région se trouvera entierement plongée dans l'ombre, & enfin celle qui lui est opposée, ou qui est terminée par le cercle *FG*, se trouvera éclairée du Soleil dans toute son étendue, au lieu qu'elle étoit six mois auparavant dans une nuit profonde, parce qu'elle ne recevoit point les rayons du Soleil.

De même tous les paralleles qui sont entre l'Equateur & le Pole septentrional *B*, seront alors pour la plus grande partie plongés dans l'ombre, au contraire de ce qu'on remarquoit six mois auparavant; au lieu que vers le Pole meridional *A*, plus de la moitié de la circonférence de ces cercles paralleles sera éclairée du Soleil, là où six mois auparavant on a pu remarquer que c'étoit la plus grande partie de la circonférence de ces mêmes cercles qui étoit plongée dans l'ombre. Enfin le Soleil paroîtra pour lors à plomb ou vertical aux habitans du Tropique *MN*, comme s'il avoit effectivement descendu à l'égard de la surface de la Terre, depuis le parallele ou Tropique qui répond à *TC* jusqu'à l'autre Tropique celeste qui répond à *MN*, c'est-à-dire selon l'arc *CQN* de 47°. Il n'est pas moins évident que des deux diverses manieres dont la Terre se présente au Soleil tous les six mois, il en doit résulter cette regle générale; sçavoir que dans les lieux de l'hemisphere septentrional ou méridional compris entre les Poles & les Tropiques, le Soleil doit paroître de 47° plus près du zénit dans un tems de l'année, que dans l'autre; c'est-à-dire,

Le Soleil s'approche plus, dans un tems de l'année que dans l'autre, du zénit des habitans situés par de là les Tropiques d'environ 47°.

dire, qu'il doit s'approcher du Pole, ou monter tous les jours dans le Méridien depuis le Solſtice d'hiver juſqu'à celui d'été, comme s'il ne parcouroit autre choſe que l'arc de ce Méridien lequel eſt d'environ 47°. Il ne faut donc pas s'imaginer pour cela que c'eſt la Terre qui tantôt s'éleve & tantôt s'abaiſſe par un mouvement particulier; au contraire ces changemens n'arrivent que parce qu'elle ne s'éleve, ni ne ſçauroit s'abaiſſer, mais qu'elle ſe préſente toujours de la même maniere par rapport au reſte de l'Univers, ou plutôt à l'égard des Etoiles. Il n'y a qu'à l'égard du Soleil qu'elle eſt inclinée différemment, parce qu'elle parcourt chaque année (ſon axe étant dans une inclinaiſon conſtante) une orbite à l'entour de cet Aſtre, & qu'elle doit par conſéquent lui préſenter ce même axe ſous différentes obliquités à meſure qu'elle tourne.

Expérience qui peut confirmer d'une maniere plus ſenſible ce que l'on vient d'établir.

On peut faire une expérience aſſez ſimple pour mieux comprendre ce que nous venons de dire: elle conſiſte à expoſer dans une chambre obſcure un globe à une bougie qui dans ce cas repréſentera le Soleil: ſi l'on prend ce globe pour la Terre, & que l'on y marque les Poles, l'Equateur, le Méridien & quelques uns des Paralleles, qu'enfin on le ſuſpende de maniere que ſon axe au lieu d'être perpendiculaire au plan de l'horizon, qu'il faut regarder ici comme l'Ecliptique, y ſoit incliné de pluſieurs degrés; alors tournant ce globe de maniere qu'un de ſes Poles regarde le Nord & l'autre le Midi, & que la lumiere de la bougie éclaire également l'un & l'autre Pole, (il faut tâcher de conſerver exactement dans cette opération le paralléliſme ou la même poſition de l'axe) on le fera tourner ainſi autour de la circonférence d'un plan circulaire parallele à l'horizon, au centre duquel la bougie eſt immobile, & dès-lors on pourra obſerver à loiſir la maniere dont le Pole, les Paralleles, & l'Equateur de ce globe ſeront éclairés; car il ſera facile de remarquer

les mêmes phénomenes que nous venons d'expliquer par rapport à la Terre & au Soleil.

Dans toute autre Planete on obſerveroit, à quelques circonſtances près, les mêmes apparences que celles qui ſont produites ici par le mouvement de Rotation de la Terre autour de ſon axe. Par exemple, Jupiter tournant en près de dix heures ſur ſon axe, un Obſervateur placé dans Jupiter doit appercevoir toutes les Etoiles, la Terre & le Soleil emportés d'un mouvement au moins deux fois plus rapide d'Orient en Occident : mais d'autant que l'axe de Jupiter eſt à peu près perpendiculaire au plan de ſon orbite, il faut que le cercle qui repréſente dans cette Planete le terme de la lumiere & de l'ombre, paſſe continuellement par les Poles de Jupiter, de ſorte que les jours y ſont perpétuellement égaux aux nuits, & par conſéquent dans cette Planete on ne doit point éprouver toutes les viciſſitudes des ſaiſons ; il n'y a point d'Eté ni d'Hiver ; en un mot c'eſt la même température qui y regne pendant tout le cours de la révolution de cette Planete dans ſon orbite autour du Soleil.

Si par le centre de la Terre ou du Soleil (car c'eſt la même choſe, puiſque leur diſtance n'eſt rien en comparaiſon de celle des Etoiles fixes, l'orbite de la Terre ne paroiſſant des Etoiles que comme un ſeul point) on imagine une ligne perpendiculaire au plan de l'Ecliptique & qui ſoit prolongée de part & d'autre dans le Ciel, cette ligne ſera l'*axe de l'Ecliptique ;* & les points où cet axe rencontrera la ſphere des Etoiles fixes, ſeront *les Poles de l'Ecliptique.* Enfin ſi l'on mene par ces Poles, des cercles qui paſſent par toutes les Etoiles, l'on conçoit aiſément que ces cercles ſeront de grands cercles de la ſphere, qui ſeront perpendiculaires à l'Ecliptique : on les a nommés *Cercles de latitude.* Or la Latitude ou la diſtance d'un Aſtre à l'Ecliptique, ſe meſure par l'arc d'un de ces

L'Axe de l'Ecliptique.

Les Poles de l'Ecliptique.

Les cercles ſecondaires de l'Ecliptique.

grands cercles perpendiculaires, compris entre cet Aſtre & l'Ecliptique : mais la Longitude d'une Etoile, eſt l'arc de l'Ecliptique compris entre la ſection faite en ♈ & l'interſection de l'Ecliptique & du cercle de la latitude qui paſſe par l'Etoile.

La latitude d'un Aſtre.
Sa longitude.

Semblablement, ſi par le Pole de l'Equateur terreſtre, qui eſt le Pole de la Terre, l'on mene pluſieurs grands cercles qui paſſent par les principaux lieux de la ſurface, & qui ſoient par conſéquent perpendiculaires à l'Equateur, ces cercles prennent le nom de Méridiens, ou cercles de longitude : mais chacun retient le nom du Méridien d'un lieu particulier. Lorſque le Soleil paſſe par le plan de ce Méridien, il eſt midi pour tous les peuples qui ſe trouvent dans le demi-cercle ou du même côté de la circonférence de ce cercle. La *latitude d'un lieu ſur la Terre*, eſt l'arc du Méridien compris entre ce lieu & l'Equateur ; & la *longitude* du même lieu, eſt l'arc de l'Equateur compris entre le point de l'interſection commune de l'Equateur & du Méridien de ce lieu, & un autre point fixe dont on eſt convenu.

Ce que c'eſt que la latitude d'un lieu ſur Terre.
La longitude.

CHAPITRE HUITIEME.

De quelques autres Phénomenes qui dépendent du Mouvement de la Terre.

PUISQUE la Terre tourne autour du Soleil de maniere que ſon axe demeure conſtamment parallele à lui-même pendant tout le tems de ſa révolution, il eſt facile de concevoir que dans les différentes ſaiſons de l'année, ce même axe doit être dirigé à différens points du Ciel, & qu'il ſeroit même dirigé à différentes Etoiles fixes, ſi elles n'étoient pas à une diſtance preſqu'infinie à

l'égard de la Terre. Car l'Etoile, ou le point du Ciel qui se trouveroit en Eté, par exemple, dans la direction des Poles de la Terre, ne devroit plus y paroître dirigé en Hiver, puisque le vrai point du Ciel où l'axe de la Terre répondroit dans cette derniere saison, sembleroit écarté du premier, d'un intervalle égal au diametre de l'orbe terrestre.

PLANCHE II. *Figure* 1. Si la Terre décrit un orbe annuel autour du Soleil, son axe doit par conséquent répondre dans chaque saison de l'année à différentes Etoiles, à moins qu'on ne les suppose à une distance presqu'immense du Soleil ou de la Terre.

Soit *ACBD* l'orbite de la Terre, au centre de laquelle est le Soleil, sçavoir en *S*: il est évident que si la Terre est en *A* & son axe dirigé vers quelque Etoile fixe *E*, qui se trouve par conséquent à plomb ou verticale sur l'un des Poles; lorsque la Terre six mois après sera parvenue en *B*, & que par conséquent son axe sera dans une direction parallele à la ligne *AE*, alors ce même axe ne doit plus être dirigé à la même Etoile *E*, mais à une autre Etoile *F*; ensorte que la distance de ces deux Etoiles l'une à l'égard de l'autre soit précisément égale au diametre *AB* de l'orbite de la Terre. Cela supposé l'angle sous lequel on appercevra ces deux Etoiles, c'est-à-dire, leur distance apparente, seroit mesuré par *EBF*, qui est égal à l'angle *AEB par la 29me Prop. du 1er Livre d'Euclide.* Or ce dernier angle *AEB* est celui sous lequel un Observateur placé dans l'Etoile en *E* verroit le diametre de l'orbite terrestre, que les Astronomes désignent autrement sous le nom de grand orbe: c'est pourquoi ils ont nommé l'angle *EBF* ou *AEB la parallaxe du grand Orbe.* Il est certain maintenant que si l'on pouvoit observer assez exactement cet angle ou cette parallaxe, on auroit aussi-tôt la distance de l'Etoile à la Terre, relativement à celle de la Terre au Soleil. Car dans le triangle *EAB*, on connoît l'angle *E* égal à l'angle *EBF* déterminé par l'observation; on connoit aussi l'angle *EAB* qui est droit ou de 90° au tems des Equinoxes, dans les Solstices de $66°\frac{1}{2}$, c'est-à-dire, égal à l'inclinaison de l'axe de la Terre sur le plan

Ce que l'on entend par la Parallaxe du grand orbe.


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Horizon Sensible
Horizon Rationel.
Fig. 17.
Fig. 18.

de l'orbite, & en général qui eſt toujours égal au complément de la déclinaiſon du Soleil. Ainſi connoiſſant tous les angles & le côté *AB*, on peut calculer facilement par la Trigonometrie le côté *AE*, c'eſt-à-dire, la diſtance de l'Etoile à la Terre.

Cette méthode de trouver la parallaxe ou la diſtance des Etoiles fixes a été tentée, mais ſans aucun ſuccès principalement dans ces derniers ſiecles. On a reconnu depuis long-tems que l'angle *EBF* eſt ſi petit, qu'à peine peut-on le ſoupçonner de quelque grandeur ſenſible, même en y employant les meilleurs inſtrumens d'Aſtronomie. Ce qu'il y a de très-certain, c'eſt qu'on l'a trouvé juſqu'ici beaucoup plus petit qu'une minute *: & parce que ſur un auſſi petit angle la moindre erreur produit auſſi-tôt des différences étonnantes ou exceſſives dans le calcul des diſtances, il n'eſt gueres poſſible de pouvoir rien conclurre de bien précis ſur la diſtance des Etoiles, de tout ce qui a été obſervé à ce ſujet. Car, ſi l'on ſuppoſe la parallaxe de l'orbe annuel de 42″ telle que Flamſteed ** l'a déterminée, & ſi l'on ſuppoſe auſſi qu'il l'ait obſervée trop grande de 25″, ce qui eſt poſſible, puiſqu'il eſt difficile de ne pas ſe tromper de cette quantité dans l'obſervation, il réſulteroit de là que la vraie diſtance des Etoiles

La Parallaxe du grand orbe n'a pu etre apperçue juſqu'ici & s'eſt trouvée preſqu'inſenſible.

On ne ſçauroit gueres eſpérer de déterminer par cette voie la diſtance des Etoiles fixes.

* L'Auteur pourroit bien dire aujourd'hui que cet angle ne s'eſt pas même trouvé d'une ſeconde dans le grand nombre d'Etoiles qui ont été obſervées juſqu'ici avec d'excellens ſecteurs à Wanſteed proche de Londres, & à Paris près la rue de Louis le Grand: *Tranſ. Philoſ. & Degré du Meridien entre Paris & Amiens.*

** Les deux Auteurs des Elémens d'Aſtronomie *Keill* & *Wiſthon* n'avoient pas aſſez réfléchi ni recherché ce qui avoit été publié ſur cette matiere lorſqu'ils ont raiſonné l'un & l'autre d'après ce qui avoit été publié par Flamſteed ſur la Parallaxe. *Wiſthon* admettant les obſervations de celui-ci comme très-certaines en a voulu conclurre le mouvement de la Terre, qu'il s'imaginoit par là avoir prouvé d'une maniere inconteſtable. Il n'avoit cependant pas eu le premier cette idée ſur la parallaxe; mais il la faiſoit valoir d'après ſon Auteur. Or long-tems auparavant l'excellent Aſtronome M. *Picard* avoit découvert ce mouvement de l'Etoile polaire d'environ 40″, comme on le voit par ſes obſervations rapportées dans le voyage d'Uranibourg & dans l'Hiſtoire Céleſte; & dès l'an 1680 il avoit publié ſa découverte où il prouvoit évidemment qu'un mouvement ſi ſingulier dans cette Etoile ne pouvoit être cauſé par le mouvement de la Terre dans ſon orbite, ni par le changement des Réfractions.

fixes ſeroit au moins deux fois plus grande que ne l'a obſervée Flamſteed. Mais il y a plus : ſi l'on ſuppoſe des erreurs encore plus grandes dans ces ſortes d'obſervations de la parallaxe, de maniere qu'il y en ait qui different les unes des autres d'environ une minute (erreur que l'on trouve communément parmi les obſervations aſtronomiques*) alors les diſtances des Etoiles fixes que l'on calculeroit ſur ces obſervations différeroient d'une quantité énorme, & la diſtance des Etoiles en deviendroit incertaine, & partant tout-à-fait inconnue.

*Voyez ſur-tout ce qui a été dit ſur les changemens qui ont pû arriver dans la hauteur du Pole. Mem. de l'Acad. 1693. Tom. X. p. 360.

L'Aberration des Etoiles fixes.

[Les variations dans la hauteur de l'Etoile polaire, qui paroiſſoit d'environ 40 ſecondes plus élevée dans un tems de l'année que dans l'autre, n'ayant pu s'expliquer dans l'eſpace de près de cinquante ans, on découvrit enfin en 1727 qu'elles étoient cauſées par le mouvement ſucceſſif de la lumiere combiné avec le mouvement réel de la Terre dans ſon orbite. Si la France a produit dans le dernier ſiecle les deux plus grandes découvertes de l'Aſtronomie phyſique, ſçavoir l'Accourciſſement du Pendule ſous l'Equateur, dont Richer s'apperçut en 1672, & la Propagation ou le mouvement ſucceſſif de la lumiere démontré dans l'Académie des Sciences par M. Roemer, l'Angleterre peut bien ſe flater aujourd'hui d'avoir annoncé la plus grande découverte de ce 18e ſiecle.

Elle eſt cauſée par le mouvement réel de la Terre & par le mouvement ſucceſſif de la lumiere.

Voici de qu'elle maniere le grand Aſtronome M. Bradleï a expliqué la théorie de l'aberration, après avoir obſervé pendant deux années conſécutives, que l'Etoile γ de la tête du Dragon, qui paſſoit à ſon zenit & qui eſt fort proche du Pole de l'Ecliptique, étoit plus méridionale de $39''$ au mois de Mars qu'au mois de Septembre.

Théorie de l'aberration découverte par M. Bradleï.

PLANCHE II. *Figure* 2.

Si l'on ſuppoſe que l'œil ſoit emporté uniformément ſelon la ligne droite AB (qu'on peut bien regarder ici comme une très-petite partie de la tangente de l'orbe terreſtre décrite dans l'eſpace de quelques minutes) & qu'il

parcourre l'intervalle compris depuis *A* jusqu'à *B* précisément dans le tems que la lumiere se meut depuis *C* jusqu'en *B* : je dis qu'au lieu d'appercevoir l'Etoile dans une direction parallele à *BC*, l'œil appercevra (dans le cas présent) l'Etoile selon une direction parallele à la ligne *AC*. Car supposons que l'œil étant entraîné depuis *A* jusqu'en *B* regarde continuellement au travers de l'axe d'un tube très-délié & qui seroit toujours parallele à lui-même suivant les directions *ae*, *ae*, &c. il est évident que si *la viteſſe de la lumiere a un rapport aſſez ſenſible à la viteſſe de la Terre*, & que ce rapport soit comme *BC* à *AB*, alors la particule de lumiere qui d'abord s'étoit trouvée à l'extrémité *C* du tube, coulera uniformément & sans trouver d'obstacles le long de l'axe, à mesure que le tube viendra à s'avancer ; puisque, selon la supposition, on a toujours *AB* est à *BC* comme *aB* est à *Bc* (*Euclide*, *Liv.* VI. *prop.* 2) c'est-à-dire, que l'œil ayant parcouru l'intervalle *Aa* la particule de lumiere a du descendre d'une maniere uniforme ou proportionnellement jusqu'en *c*. D'ailleurs il est aisé de voir que si l'on donnoit au tube toute autre inclinaison, la particule de lumiere ne pourroit plus couler le long de l'axe, mais trouveroit dès son entrée un obstacle à son passage pour peu que l'œil, qui est à son extrémité, s'avançât de *A* vers *B*. Or, puisque parmi cette multitude innombrable de rayons que lance l'Etoile & qui viennent tous parallelement à *BC*, il s'en trouve assez de quoi fournir continuellement de nouvelles particules qui se succedant les unes aux autres à l'extrémité du tube, coulent le long de l'axe & forment par conséquent un rayon suivant la direction *AC*, il est évident que ce même rayon sera l'unique qui viendra frapper l'œil, qui par conséquent ne sçauroit l'appercevoir autrement que suivant cette même direction. Maintenant si au lieu de ce tube on imagine autant de lignes droites ou petits tubes

extraordinairement fins & déliés, que la prunelle de l'œil peut admettre de rayons à la fois ; le même raisonnement ayant lieu pour chacun de ces tubes, que s'il s'agissoit de celui dont nous venons de parler, l'œil ne sçauroit donc recevoir d'autres rayons de l'Etoile que ceux qui viendront suivant des directions paralleles *ac* ; & partant ce qui reste de rayons étant rejettés, l'Etoile doit paroître en effet là où elle n'est pas véritablement ou dans une direction différente de celle où elle seroit apperçue si l'œil restoit fixe au point *B*.

PLANCHE II. *Figure* 3. Si l'on prend aussi *bc* égal au rayon de l'orbe annuel on prouvera avec les Astronomes que la lumiere emploie sept à huit minutes à venir d'un intervalle égal à la distance du Soleil ; car l'on trouvera en prenant l'angle *bca* de 20″ ou égal à la moitié de l'aberration d'une Etoile située au Pole de l'Ecliptique, la petite portion *ab*, ou de la tangente parcourue, égale à environ $\frac{1}{10000}$ de *bc*, puisque *bc* est à *ba* comme le rayon est à la tangente de 20″.

Au reste puisque les directions paralleles *bc*, *BC*, ou bien *ac*, *AC* concourent au même point du Ciel, il s'ensuit qu'à mesure que la Terre s'avancera sur la circonférence de son orbite, l'arc ou la petite tangente *ab* qu'elle décrit chaque jour, venant à changer de direction, il en sera de même à l'égard de la ligne *AC*, qui dans le cours d'une année entiere aura un mouvement conique autour de *BC* ou *A E*, ensorte que prolongée dans le Ciel, son extrémité doit décrire un petit cercle autour du vrai lieu qu'occupe l'Etoile : & parce que l'angle *ACB* ou l'angle alterne *CA E* est de 20″, il sera vrai de dire, que l'*Etoile ne sçauroit jamais être apperçue dans son vrai lieu ;* mais qu'à chaque année elle doit recommencer à parcourir la circonférence d'un cercle autour de son véritable lieu ; ensorte que si elle est au zénit, par exemple, elle pourra être vûe à son passage au Méridien alternativement 20″ plus

au

au Nord ou plus au Midi à chaque intervalle d'environ six mois.]

Jusqu'ici nous avons supposé que l'axe de la Terre étoit perpétuellement dans une situation constante, ou qu'il conservoit exactement son parallélisme ; qu'en un mot il n'avoit d'autre mouvement que celui qui convient au mouvement annuel de la Terre dans son orbite autour du Soleil. Cependant il y a bien long-tems que les Astronomes en ont découvert un autre extrêmement lent, mais qui change peu à peu d'une très-grande quantité, le parallélisme ou la direction de cet axe. Ce changement n'est gueres sensible dans l'espace d'une ou plusieurs années, & néantmoins il devient très-considérable après plusieurs siecles. C'est pour cette raison que lorsque nous avons tâché d'expliquer ci-dessus tout ce qui regardoit le mouvement annuel de la Terre, nous avons évité de parler de ce mouvement particulier de son axe qu'on pouvoit regarder alors comme insensible, & cela afin de ne pas tomber dans un détail trop embarrassant. Car, nous le disons encore, ce changement dans la direction de l'axe n'influe qu'insensiblement chaque année sur la plûpart des phénomenes dont nous avons parlé ci-dessus : ce n'est donc qu'après une longue suite d'années qu'il devient assez considérable pour qu'on puisse s'appercevoir à la vûe simple que l'axe de la Terre ne répond plus aux mêmes Etoiles. Il ne faut pas pourtant confondre ce changement de direction de l'axe avec l'inclinaison qu'il a sur le plan de l'Ecliptique. Cette inclinaison demeure constamment la même, & n'est aucunement altérée par cet autre mouvement particulier de l'axe dans le Ciel étoilé.

L'axe de la Terre ne conserve pas perpétuellement son parallélisme.

Pour expliquer comment cela doit arriver, & pour faire comprendre d'une maniere fort simple comment un mouvement particulier dans la direction de l'axe de la Terre ne sçauroit changer son inclinaison sur le plan de l'Ecliptique.

PLANCHE II. *Figure 4.*

Soit la ligne *DCH* une petite partie de l'orbite de la Terre qui a pour lors son centre au point *C*: si l'on éleve de ce point *C* la ligne *CE* perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, laquelle rencontre la sphere ou le Ciel étoilé au point *E*, il est clair que cette ligne (quoiqu'elle ne soit véritablement qu'une parallele à celle qui passe par le Soleil ou par le centre de l'orbite) représentera l'axe de l'Ecliptique, & que le point *E* sera dans le Ciel étoilé le vrai Pole de ce grand cercle. Mais si l'on tire aussi par le centre de la Terre la ligne *Cp* qui en est l'axe, & qui prolongée dans le Ciel, se termine au point *P* qui est le Pole de l'Equateur ou le Pole du Monde; il est évident que ce sera autour de ce point que tous les Astres nous paroîtront tourner chaque jour, à cause de la Rotation de la Terre autour de son axe. Or si l'on fait passer un grand cercle de la sphere *EPA* par les points *E* & *P* qui sont les Poles de l'Ecliptique & de l'Equateur, ce cercle sera par conséquent perpendiculaire sur leur plan; de sorte que c'est sur sa circonférence qu'il faudra compter l'arc *PA*, qui mesure l'inclinaison de l'axe sur le plan de l'Ecliptique, ou ce qui est la même chose, l'angle *PCH* de $66°\frac{1}{2}$: enfin l'arc *EP* qui est son complément à 90°, sera de $23°\frac{1}{2}$, & c'est la distance des deux Poles de l'Ecliptique & de l'Equateur, cet arc mesurant l'angle *ECP* que forme l'axe de la Terre, avec l'axe de l'Ecliptique. Maintenant si du Pole *E* de l'Ecliptique on décrit un petit cercle de la sphere *PFG*, qui sera par conséquent parallele à l'Ecliptique, il suit naturellement que l'axe de la Terre ne doit avoir d'autre mouvement dans le Ciel que selon la circonférence de ce petit cercle, si l'on veut qu'il soit toujours incliné de la même maniere au plan de l'Ecliptique; car dans toute autre supposition il arriveroit que l'angle de $23°\frac{1}{2}$ qu'il forme avec l'axe de l'Ecliptique, ou, ce qui revient au même, son inclinaison de $66°\frac{1}{2}$ sur

L'Axe de l'Ecliptique.

Pour que l'autre Axe ou celui qui passe par les Poles de la Terre, demeure toujours incliné de la même maniere sur le plan de l'Ecliptique, il est nécessaire de reconnoître que son mouvement, puisqu'il en a un, se fait peu à peu selon la circonférence d'un petit cercle de la sphere parallele au plan de l'Ecliptique.

le plan de l'Ecliptique seroit sujette à divers changemens. Ainsi le Pole du Monde *P*, qui est désigné par l'extrémité de l'axe de la Terre, ne doit donc nous paroître se mouvoir autrement que dans la circonférence du cercle *PFG*. On voit encore que si l'axe de la Terre conservoit perpétuellement une seule direction constante par rapport au Ciel étoilé, on s'appercevroit chaque année, lorsque la Terre revient au point *C* de son orbite, que le Pole du monde répondroit au même point *P* des Cieux sans qu'il pût jamais y arriver aucun changement. Mais puisque l'on a observé qu'il a un mouvement fort lent, représenté par la circonférence *PFG* que nous venons de décrire, ce même axe au lieu de répondre au point *P*, aura effectivement au bout de 72 ans rétrogradé d'un degré contre l'ordre des signes; c'est-à-dire, qu'il sera dirigé pour lors vers le point *Q* du petit cercle parallele, lequel est éloigné d'un degré du premier point *P*. Le mouvement de l'axe du Monde, ou de la Terre peut donc être regardé comme un mouvement conique; c'est-à-dire qu'il doit être considéré comme le mouvement d'une ligne qui décriroit la superficie d'un cone dont le sommet est en *C* au centre de la Terre, & dont la base est le cercle *PFG*. On doit aussi conclurre que le Pole *P* du Monde fait sa révolution périodique par un mouvement très-lent dans la circonférence *PFG*, mais d'un mouvement qui paroît rétrograde, puisqu'il se fait d'Orient en Occident. Le tems de cette révolution est de 25920 ans; c'est-à-dire, que depuis la premiere observation qu'on auroit faite de la situation du Pole, qui répondroit à l'Etoile *P* jusqu'à son retour à la même Etoile, il doit s'écouler un aussi long intervalle de tems que celui de 25920 ans. Il est facile aussi de reconnoître que l'Etoile *P* qui nous paroît aujourd'hui au Pole du Monde en sera éloignée après une demie période de 12960 ans

de deux fois $23°\frac{1}{2}$ ou 47°, c'eſt-à-dire lorſque le Pole ſera une fois parvenu en *G*.

Le cercle *EPA* qui paſſe toujours par le Pole de l'Ecliptique & par le Pole du Monde, eſt le colure des Solſtices.

Le grand cercle de la ſphere *EPA*, qui paſſe par les Poles de l'Ecliptique & de l'Equateur, & qui leur eſt perpendiculaire, devient à chaque fois le colure des Solſtices. Ainſi le point *A* de l'Ecliptique eſt celui qui détermine le point du Solſtice lorſque le Pole eſt en *P*, & c'eſt auſſi le point de ce cercle qui eſt le plus éloigné de l'Equateur. Mais lorſque l'axe de la Terre répond au point *q* ou que cet axe prolongé eſt dans la ligne *CQ*, il ſuit encore qu'un grand cercle *EQB* qui paſſeroit par les Poles *E* & *Q* de l'Ecliptique & de l'Equateur, ſeroit par conſéquent perpendiculaire à ces deux cercles, & que dans cette ſituation de l'axe de la Terre, le cercle *EQB* ſera le véritable colure des Solſtices, comme auſſi le point *B* le vrai point où doit arriver le Solſtice. Les points ſolſtitiaux doivent donc paroître rétrograder de même que les Poles du Monde, & cela préciſément d'un même nombre de degrés & dans des intervalles de tems parfaitement égaux. Car ſi le mouvement *PQ* du Pole ſe fait d'un degré, par exemple, dans la circonférence du petit cercle *PFG* parallele à l'Ecliptique, l'arc *AB* dont le point du Solſtice aura paru rétrograder dans le même tems, ſera préciſément d'un degré, parce que les deux arcs *QP* & *BA* ſont ſemblables.

Pourquoi les points des Solſtices rétrogradent.

Il eſt maintenant très-facile d'appercevoir la raiſon pourquoi les points des Solſtices s'écartent continuellement des Etoiles fixes, de maniere que ſi le point du Solſtice répond aujourd'hui à une Etoile *A*, ce même point doit paroître par rapport à cette Etoile, d'un degré plus à l'Occident au bout de 72 ans. Mais puiſque c'eſt une ſuite néceſſaire du mouvement apparent de l'axe ou des Poles de la Terre que les points des Solſtices rétrogradent; il faut en même tems que les points équi-

Les points des Equinoxes rétrogradent auſſi d'un mou-

noxiaux, de même que tous les autres points de l'Ecliptique paroiſſent auſſi rétrograder d'un mouvement ſemblable. Car la diſtance de chaque point de l'Ecliptique aux points ſolſtitiaux eſt conſtamment la même : les points des Equinoxes, par exemple, ſont toujours à 90° des points ſolſtitiaux ; ainſi lorſque ceux-ci rétrogradent, ou qu'ils ſont d'un degré plus à l'Occident, les points équinoxiaux doivent auſſi rétrograder vers l'Occident de la même quantité, autrement leur diſtance ne ſeroit plus la même, & ſurpaſſeroit un Quart-de-Cercle ou les 90°, ce que l'on ne ſçauroit ſuppoſer. C'eſt pourquoi nous regarderons deſormais le mouvement rétrograde des Equinoxes & de tous les autres points de l'Ecliptique, comme dépendans d'un loi générale. C'eſt-là ce mouvement qu'on nomme communément Rétrograde ou contre *l'Ordre des Signes*, afin de le diſtinguer du mouvement ordinaire de la Terre & de toutes les Planetes, qui ſe fait continuellement autour du Soleil d'Occident en Orient, ſelon l'ordre ou la ſuite des Signes, c'eſt-à-dire ſuivant ♈, ♉, ♊, &c. Le mouvement rétrograde des Equinoxes ſe nomme encore *la Préceſſion*, parce qu'il ſe fait, comme nous venons de le dire, vers les Signes qui précedent, c'eſt-à-dire, au contraire de la ſuite des Signes.

vement ſemblable & uniforme.

La Préceſſion des Equinoxes.

Mais puiſque toutes les Etoiles fixes demeurent immobiles dans les Cieux, & que la commune ſection de l'Equateur & de l'Ecliptique, qu'on nomme autrement les points équinoxiaux, eſt emportée peu à peu d'un mouvement rétrograde ; la diſtance de ces Etoiles aux points équinoxiaux n'eſt donc plus la même qu'auparavant, ainſi ces Etoiles doivent paroître ſe mouvoir peu à peu, de même que les Planetes, d'Occident en Orient ; ce qui fait que leur longitude augmente, puiſqu'en effet on compte la longitude depuis l'une des ſections de l'Ecliptique & de l'Equateur, ſçavoir celle qui ſe fait en ♈.

Puiſque les points des Equinoxes rétrogradent ou ſe meuvent contre l'ordre des Signes, il s'enſuit que toutes les Etoiles paroîtront avoir un mouvement contraire, c'eſt-à-dire, ſelon la ſuite des Signes.

De cette maniere les Etoiles fixes paroîtront s'avancer peu à peu ſelon l'ordre des ſignes, non pas parce qu'elles ont un mouvement propre ou réel, mais parce que c'eſt la ſection qui ſe fait en ♈, & d'où l'on commence à compter, qui ſe meut au contraire d'Orient en Occident.

Toutes les Conſtellations & principalement celles de l'Ecliptique ont changé de place.

Or il eſt arrivé de là que toutes les Conſtellations anciennes ont changé de place dans les Cieux: elles ne nous paroiſſent plus dans le même lieu où les premiers Aſtronomes les ont remarquées. La Conſtellation du Belier, par exemple, qui paroiſſoit du tems d'Hipparque dans la commune ſection de l'Ecliptique & de l'Equateur, n'a laiſſé que ſon nom dans cette région du Ciel: car préſentement elle paroît avancée juſques dans le lieu où étoit autrefois celle du Taureau, & celle-ci a pris la place de la Conſtellation des Gemeaux, laquelle occupe actuellement le lieu où les Anciens ont placé l'Ecreviſſe. Il en eſt ainſi des autres, l'Ecreviſſe ayant pris la place du Lion, & le Lion s'eſt avancé là où étoit la Vierge, &c. de ſorte que depuis le tems auquel l'on a d'abord obſervé le lieu des douze Conſtellations du Zodiaque, elles ſe ſont avancées d'une douzieme partie de ſa circonférence; c'eſt-à-dire, que chacune a pris la place de celle qui la précédoit. Il faut bien prendre garde ici de ne pas confondre les douze portions de l'Ecliptique ou les douze ſignes du Zodiaque avec les douze Conſtellations des Etoiles fixes qui s'y ſont trouvées du tems d'Hipparque & où elles ont laiſſé les mêmes noms qu'on y conſerve encore aujourd'hui. Pour les diſtinguer on appelle ces douze portions égales de l'Ecliptique de 30° chacune, *les douze ſignes du Zodiaque* *; & les douze figures qui comprennent les Etoiles qui s'y trouvoient autrefois, mais qui ſe ſont avancées d'un Signe, ſe nomment les *douze Conſtellations du Zodiaque* **.

* Latinè *Signa Anaſtra.* ** Signa *Stellata.*

Les anciens Aſtronomes s'étoient d'abord imaginé que la ſection commune de l'Ecliptique & de l'Equateur étoit fixe & immobile dans le Ciel étoilé : mais parce qu'on reconnut dans la ſuite que les Etoiles s'en éloignoient en s'avançant peu à peu au-delà de cette ſection, on a voulu conclurre que toute la ſphere des Etoiles fixes faiſoit ſes révolutions périodiques quoique par un mouvement très-lent, autour des Poles de l'Ecliptique. C'eſt ce qui fait qu'on a enſeigné communément dans les traités de Sphere, la plûpart copiés d'après l'Almageſte de Ptolomée, que les Etoiles s'avançoient par leur propre mouvement dans l'Ecliptique ou dans ſes paralleles, & qu'elles faiſoient leurs révolutions dans l'eſpace de 25920 ans. Après ce tems écoulé, elles ſe retrouveront dans les mêmes lieux où les premiers Aſtronomes les ont apperçues. Auſſi ont-ils donné le nom de Grande année à ce long eſpace de tems, qui ſurpaſſe quatre à cinq fois celui que l'on compte vulgairement depuis la création du Monde. Mais quelques Aſtrologues ſe ſont imaginé qu'après cette révolution des Etoiles, toutes choſes recommenceroient préciſément comme auparavant.

La Grande Année; ce que c'eſt.

La vraie cauſe phyſique de la préceſſion des Equinoxes, étoit tellement ignorée avant que Newton l'eût expliquée, qu'il eſt difficile de trouver à ce ſujet parmi les plus célebres Auteurs quelques conjectures qui puiſſent paroître aſſez vraiſemblables : mais ce grand Philoſophe ayant concilié les loix de la gravité avec les différens mouvemens qu'il en faut déduire, Newton, dis-je, nous a bientôt dévoilé la vraie cauſe de la préceſſion des Equinoxes. Elle dépend preſqu'uniquement de la figure qu'a la Terre. On ſçait aſſez que cette figure eſt un ſphéroïde applati ; & il a été démontré, il y a plus de 70 ans, que la Terre doit avoir cette figure, à cauſe de la Rotation qui ſe fait chaque jour autour de ſon axe.

La Figure de la Terre eſt l'une des principales cauſes de la Préceſſion des Equinoxes.

Le mouvement de la Terre dans son orbe, n'eſt point uniforme comme les Anciens l'ont ſuppoſé.

Quoique la Terre acheve ſa révolution autour du Soleil chaque année, de maniere qu'elle y employe toujours le même intervalle de tems, & que par conſéquent toutes ſes révolutions périodiques ſe faſſent généralement dans des tems égaux; il n'en eſt pas ainſi du mouvement qui répond aux différentes parties de ſon orbite: tantôt ſon mouvement s'accélere, & tantôt il diminue; mais de maniere qu'il y a une partie de l'orbite où la viteſſe de la Terre augmente chaque jour, enſorte qu'elle parcourt alors un plus grand eſpace, au contraire de ce qui arrive dans la partie oppoſée de ſon orbite. Or il faut pour cet effet que ſon mouvement réel & par conſéquent le mouvement apparent du Soleil dans l'Ecliptique, ne ſoit pas uniforme; enſorte que le Soleil ne parcourre pas des arcs de même grandeur dans des tems préciſément égaux. Auſſi voit-on qu'il fait moins de chemin chaque jour pendant l'Eté, qu'il ne fait en Hiver; ſa viteſſe même paroît ſi différente, que ſon vrai lieu ſurpaſſe dans un certain point de l'orbite d'environ deux degrés, celui où il ſeroit parvenu s'il ne ſe fût avancé que d'un mouvement égal & uniforme. La même choſe s'apperçoit auſſi lorſqu'il retarde ſon mouvement: car il arrive enfin qu'il s'en faut plus de deux degrés qu'il ne ſoit dans le vrai lieu où il ſeroit parvenu ſans cette inégalité qui retarde ſon mouvement. En un mot le Soleil emploie huit jours de plus à parcourir les ſix Signes ſeptentrionaux, que les ſix méridionaux; de maniere que depuis l'Equinoxe du Printems, juſqu'à celui d'Automne, il s'écoule près de 186 jours & demi, quoique pendant ce tems le Soleil paroiſſe parcourir préciſément les 180° ou la moitié de l'Ecliptique: auſſi depuis l'Equinoxe d'Automne juſqu'à celui du Printems, il n'employe que 178 jours & demi à parcourir l'autre moitié de l'Ecliptique, & qui répond aux ſix Signes méridionaux. Enfin les Obſervations nous font connoître

Notre Eté eſt de huit jours plus long que n'eſt l'Hiver.

que

que le diametre apparent du Soleil pendant l'Hiver, lorſque ſon mouvement eſt le plus rapide, eſt beaucoup plus grand qu'en Eté lorſqu'il paroît ſe mouvoir le plus lentement. La différence eſt ſi grande, qu'en Hiver lorſque le Soleil paroît ſous le plus grand angle, ſon diametre eſt de 32′ 47″, & en Eté lorſque ſon diametre paroît le plus petit, on l'obſerve ſous un angle de 31′ 40″, avec une différence de plus d'une minute, ce qui nous fait connoître que pendant l'Eté le Soleil eſt beaucoup plus loin de la Terre que pendant l'Hiver.

Le diametre apparent du Soleil eſt plus grand pendant notre Hiver que dans l'Eté.

Les anciens Aſtronomes ont fait diverſes tentatives pour expliquer les inégalités qu'on obſerve dans le mouvement apparent du Soleil; mais étant un peu trop prévenus en faveur des orbites circulaires, ne pouvant d'ailleurs s'imaginer qu'il y en eût d'autres dans les Cieux, & s'étant déja perſuadé que tous les mouvemens céleſtes devoient être uniformes, ils ont placé le Soleil un peu au-delà du centre de l'orbite de la Terre, afin qu'il pût réellement parcourir la circonférence d'un cercle d'un mouvement toujours égal & uniforme. Car il eſt évident que ſi nous étions au centre d'une orbite circulaire, nous verrions en ce cas le Soleil parcourir des angles égaux dans des tems égaux; mais qu'il en ſeroit tout autrement ſi l'œil étoit placé dans tout autre lieu qu'au centre, à telle diſtance déterminée que ce ſoit.

Hypotheſe des Anciens.

Suppoſons, par exemple, que l'orbite circulaire que les Anciens ont attribuée à la Terre ſoit *ABCD*, & que le Soleil *S* ſoit à quelque diſtance du centre *E* de cette orbite; il eſt clair que lorſque la Terre ſera en *A*, le Soleil paroîtra au même inſtant au point ♈; que quand la Terre ſera en *B*, le Soleil ſera vû en ♋, & qu'enfin lorſqu'elle ſera en *C*, l'on obſervera le Soleil en ♎. Ainſi le tems que la Terre aura employé à venir de *A* en *C*, ſera égal à celui que le Soleil aura paru employer à parcourir

Du mouvement de la Terre dans un cercle excentrique. PLANCHE II. *Figure* 5.

la moitié de l'Ecliptique. A l'égard de l'autre moitié le Soleil paroîtra la parcourir pendant l'intervalle de tems que la Terre emploiera à décrire la partie *CDA* de son orbite. Mais puisque l'arc *ABC* est plus grand que l'arc *CDA*, il s'ensuit que le Soleil doit nous paroître employer plus de tems à parcourir la moitié de l'Ecliptique ♈, ♉, ♎, que l'autre moitié ♎, ♑, ♈. De plus lorsque la Terre est en *B*, elle est plus éloignée du Soleil, que lorsqu'elle arrive au point *D*. Et supposant ici avec les Anciens, que son mouvement est égal & uniforme dans toutes les parties de son orbite, il paroîtra néantmoins inégal, étant vû du Soleil; c'est-à-dire, qu'il paroîtra très-rapide au point *D*, & au contraire fort lent au point *B*. Mais parce qu'il en est de même à l'égard du mouvement apparent du Soleil vû de la Terre, on voit par cette explication la raison pourquoi le Soleil semble s'avancer plus lentement en Eté dans l'Ecliptique, & pourquoi il paroît au contraire accélérer son mouvement pendant l'Hiver. Les Astronomes avoient donc conclu autrefois que cette inégalité du mouvement de la Terre (ou du Soleil) n'étoit point réelle ni produite par aucune cause physique; mais que c'étoit uniquement une apparence, c'est-à-dire, une inégalité optique, laquelle n'avoit d'autre cause que la situation du Soleil, qui par hasard ne se trouvoit point au centre *E* de l'orbite terrestre, mais à quelques distances de ce centre. Car ils soutenoient tous unanimement, qu'un Observateur qui auroit été placé au centre *E* de l'orbite, se seroit d'abord apperçu que la Terre décrit en effet une orbite circulaire & d'un mouvement toujours égal.

Cette hypothese doit être rejettée s'il est vrai que les mouvemens réels & diurnes des Planetes ne sont pas

Cette hypothese des Anciens parut d'abord très-simple, & même si naturelle, qu'il sembloit presqu'impossible de rien imaginer de meilleur pour satisfaire à toutes les inégalités observées du mouvement apparent du Soleil, ou du moins pour expliquer aussi facilement la cause de tous les

phénomenes. On étoit encore dans cette opinion avant Kepler, & l'on ne s'étoit guéres avisé de proposer aucune difficulté considérable à ce sujet, parce qu'on étoit convaincu, ou plutôt qu'on regardoit comme un axiome dont il n'étoit plus permis de douter, que tous les mouvemens célestes ne pouvoient être assujettis à aucune inégalité réelle; en un mot qu'ils ne devoient pas se faire autrement que dans des orbites circulaires. Mais cette opinion ou prétendue vérité a été jugée par le grand Kepler absolument fausse, & il a démontré qu'elle n'avoit aucun fondement. Car ayant examiné avec le plus grand soin les mouvemens célestes, & ayant comparé les plus récentes & les plus exactes observations qui furent faites vers la fin du seizieme siecle par le fameux Tycho-Brahé; il nous a fait connoître la fausseté de ce qu'avoient supposé les Anciens, & de quelle maniere cela devoit être incompatible avec les vrais mouvemens des Corps célestes. En un mot Kepler a démontré par les observations & par les faits, que les mouvemens de tous les Astres n'étoient point exempts d'inégalités réelles, & que leurs orbites bien loin d'être circulaires, s'écartoient souvent de cette figure d'une quantité assez considérable. Ainsi il a fallu reconnoître (puisque les observations des diametres l'ont décidé, ce qui a mis fin à toutes les disputes) que les orbites des Planetes sont des ovales ou de vraies ellipses qui different du cercle les unes un peu plus & les autres un peu moins; mais qui en different assez sensiblement pour nous faire connoître que les inégalités du mouvement des Planetes ne sont plus de simples apparences; qu'en effet ces mouvemens sont inégaux & réels dans toutes les Planetes, & que c'est là l'une des principales causes de leurs viteſſes plus ou moins grandes, quoique dans leurs ellipses elles se trouvent plus ou moins éloignées du Soleil.

égaux, & si en effet leurs orbites ne sont pas circulaires.

Les orbites des Planetes sont des ellipses.

L'Ellipse est une ligne courbe très-connue des Géo-

Maniere de décrire l'ellipſe.

metres, & dont ils démontrent les différentes propriétés. L'origine de cette courbe n'eſt pas difficile à découvrir : c'eſt la ſection qui ſe fait lorſqu'on coupe obliquement un cone ou un cylindre. Mais nous ferons peut-être mieux connoître ici cette courbe par une opération méchanique, que s'il falloit renvoyer le Lecteur aux ſections obliques du cone ou du cylindre. C'eſt pourquoi imaginons deux aiguilles ou bâtons enfoncés perpendiculairement ſur une table ou ſur un terrein uni, dont l'une demeure immobile en *H* & l'autre en *G* : ſuppoſons auſſi que l'on ait une corde ou un fil, lequel étant plié en deux & noué par ſes extrémités ſoit un peu plus long que la diſtance *HG*. Si donc ce fil eſt mis à l'entour des deux aiguilles, & que l'on poſe un ſtilet au-dedans, de maniere qu'on le faſſe tourner en rond, ayant toujours attention de tenir le fil tendu, la pointe du ſtylet décrira par cette opération une ligne courbe qui ſera l'ellipſe que l'on demande. Si l'on vouloit décrire une autre ellipſe un peu moins allongée, ou qui approchât plus de la figure du cercle, on pourroit diminuer la diſtance des deux aiguilles *HG*, ſans changer pour cela l'étendue qu'occupe le fil qu'on ſuppoſe toujours noué par ſes deux extrémités : l'on pourroit même approcher tellement les deux aiguilles, que l'ellipſe ſe confondroit peu à peu avec la figure circulaire. Car ſi ces deux aiguilles ſe trouvent enfin réunies au même point, c'eſt-à-dire, s'il n'y avoit plus qu'une ſeule aiguille en *C*, la pointe du ſtylet tournée en rond par le moyen du fil (qui dans tous ces mouvemens doit toujours être également tendu) décriroit alors un cercle parfait.

PLANCHE II. *Figure 6.*

Les foyers de l'ellipſe.

Dans l'ellipſe que nous avons décrite ci-deſſus, les points *H* & *G*, où étoient placées les deux aiguilles, ſe nomment les *deux foyers de l'Ellipſe :* le point *C*, qui ſe trouve au milieu de la ligne *HG*, c'eſt-à-dire, à égale diſtance

des deux foyers, est *le centre de l'Ellipse :* & enfin la ligne *DK*, qui passe par ce centre, par les foyers, & qui se termine de part & d'autre dans la circonférence de l'ellipse, se nomme l'*Axe*. Or il suit de cette génération de l'ellipse, que si l'on tire de quelque point que ce soit de sa circonférence, tel que *B*, aux deux foyers *G* & *H* les lignes *BG*, *BH*, la somme de ces deux lignes sera nécessairement égale à l'axe *KD* de l'ellipse, c'est-à-dire, à la longueur du fil moins la distance des foyers *HG*.

PLANCHE II. *Figure 7.*

Selon Kepler, le Soleil au lieu de se trouver au centre d'une courbe semblable à celle que nous venons de décrire, est placé en *S*, conformément aux Observations, c'est-à-dire, dans l'un des deux foyers de la courbe. Les Astronomes appellent l'axe *AP* de l'ellipse, *la ligne des Apsides :* le point *A* est l'*Aphélie*, *P* le *Perihélie*, & la distance *SC* entre le Soleil & le centre de l'ellipse, se nomme l'*Excentricité*. Si du centre de l'ellipse on éleve à l'axe la ligne perpendiculaire *CE* qui se termine au point *E* de sa circonférence, & que de ce point *E* on tire au Soleil la ligne droite *SE*, cette ligne représentera *la distance moyenne de la Planete au Soleil :* car elle est égale à la moitié de l'axe *CA* ou *CP*, & par conséquent représente la moyenne proportionnelle arithmetique entre la plus grande & la plus petite distance *SA*, *SP* de la Terre au Soleil. Il faut bien remarquer à l'égard des Planetes, que quelques orbites, quoiqu'elliptiques, ne different pas considérablement de la figure circulaire. Celle de la Terre, par exemple, est telle que l'excentricité *SC* n'est gueres que dix-sept fois la millieme partie de la moyenne distance *SE*; c'est-à-dire, que supposé cette distance *CE* de 1000 parties, *SC* n'en contiendroit que 17. A la vérité cette excentricité du Soleil n'est gueres que la moitié de celle qui a été supposée par les anciens Astronomes : mais il n'étoit plus possible à ceux-ci, à moins que de la supposer

La ligne des Apsides.

L'Aphélie.

Le Perihélie.

L'Excentricité : ce que c'est.

Ce qu'il faut entendre par la moyenne distance.

Quelle est l'excentricité de l'orbite de la Terre.

deux fois plus grande qu'elle n'a été découverte en ces derniers tems, d'expliquer conformément aux Obſervations, les apparences du mouvement du Soleil en y employant une orbite circulaire.

Comment les Planetes ſe meuvent dans une ellipſe.

Les Planetes ne ſe mouvant donc pas uniformément dans des ellipſes, elles ont un mouvement qui augmente en effet juſqu'à un certain point, & qui diminue enſuite ſelon une même loi conſtante. On ſçait aujourd'hui que le rayon tiré du Soleil à la Planete, décrit par un mouvement continuel des Aires elliptiques proportionnelles au tems. Par exemple, la Planete partant du point *A* emploie un certain eſpace de tems à venir en *B*, de maniere qu'elle décrit pendant cet intervalle de tems l'aire *ASB*, ou plutôt cette aire eſt décrite par le rayon qui a ſes extrémités dans la Planete & dans le Soleil. Mais ſi l'on conſidere de la même maniere, lorſque la Planete part du point *P*, le tems qu'elle emploie à parvenir en *D* (qui eſt le point de ſon orbite où la ligne *SD* tirée du Soleil forme une aire *PSD* égale à l'autre aire *ASB*) ce tems ſe trouvera égal au premier; c'eſt-à-dire, que dans des tems égaux la Planete aura paru parcourir les arcs de l'ellipſe *AB*, *PD*, qui, comme l'on voit, ſont fort inégaux entr'eux. Or il eſt évident que ſi l'on eût pris d'abord ces aires, & par conſéquent les arcs décrits par la Planete, extremement petits, ils euſſent été alors à très-peu près en raiſon réciproque de leur diſtance au Soleil. Car puiſqu'on a ſuppoſé les aires parfaitement égales, l'arc *PD* doit ſurpaſſer d'autant l'arc *AB*, que la hauteur *PS* de l'aire *PSD* eſt ſurpaſſée par la hauteur *AS* de l'autre aire *ASB*. La démonſtration de tout ce que nous venons de dire ſur le mouvement des Planetes dans des orbes elliptiques a été donnée par le fameux Kepler dans ſes Commentaires ſur le mouvement de Mars, & elle a été conſtatée depuis par d'autres preuves ſi ſolides, que tous les

Elles décrivent des Aires égales dans des tems égaux.

M. Newton a démontré que les Planetes de-

Aſtronomes l'ont adoptée unanimement en ces derniers tems ſur-tout après en avoir connu la vraie cauſe phyſique : cette hypotheſe de Kepler ſatisfait merveilleuſement à tous les phénomenes. Au reſte l'arc de cercle compris entre les deux rayons prolongés dans le Ciel étoilé, l'angle qu'il meſure ou bien l'aire *ASG*, qui eſt toujours proportionnelle au tems, s'appelle l'*Anomalie moyenne* de la Planete. Il faut bien diſtinguer cet angle proportionnel au tems dans le Ciel étoilé, de l'angle *ASG* qu'on nomme l'*Anomalie vraie* de la Planete parvenue en *G*. L'anomalie moyenne auſſi-bien que l'Anomalie vraie de la Planete, ſe compte l'un & l'autre depuis l'Aphélie : mais ſi l'on veut compter depuis ♈, ou le commencement du ſigne du Belier, alors ce nom d'Anomalie ſe change en celui de *Mouvement de la Planete en longitude*, lequel eſt auſſi de deux ſortes, ſçavoir le *moyen Mouvement*, tel qu'il paroîtroit véritablement ſi l'œil étant au centre d'une orbite circulaire, voyoit décrire à la Planete cette même orbite d'un mouvement toujours égal & uniforme. Le *Mouvement vrai* eſt celui que l'on voit décrire à la Planete, l'œil étant placé au foyer *S* de ſon orbe elliptique : il eſt ſucceſſivement accéleré ou retardé, ſelon les différentes diſtances de la Planete au Soleil.

voient décrire des ellipſes, ſi l'on admet une peſanteur univerſelle vers le Soleil, & qui agit ſur les Corps céleſtes en raiſon renverſée du quarré de leur diſtance à cet Aſtre.

Anomalie moyenne.

Anomalie vraie.

Moyen mouvement en longitude.

Mouvement vrai de la Planete en longitude.

De cette maniere il eſt facile de déterminer le vrai lieu de chaque Planete dans ſon orbite pour quelque tems que ce ſoit depuis ſon paſſage par l'aphélie : car ſi l'on diviſe continuellement l'aire elliptique par la droite *SG*, de maniere qu'il y ait un même rapport entre le tems de la révolution péridioque de la Planete & le tems donné, comme entre l'aire totale ou la ſurface entiere de l'ellipſe & l'aire *ASG* ; le quatrieme terme de la proportion donnera la poſition de la ligne *SG*, & par conſéquent le point *G*, qui eſt le vrai lieu de la Planete que l'on cherche. Les

Comment on détermine le lieu d'une Planete dans ſon orbite.

Géometres ont publié depuis Kepler un grand nombre de ſolutions différentes de ce probleme ; ils nous ont, dis-je, enſeigné la vraie méthode de couper l'aire elliptique dans une raiſon donnée : nous en parlerons plus particulierement & d'une maniere plus étendue en ſon lieu.

Pourquoi le plus grand chaud arrive lorſque le Soleil eſt à notre égard dans ſa plus grande diſtance de la Terre.

On ſera peut-être ſurpris que le Soleil étant beaucoup plus éloigné de nous en Eté que pendant l'Hiver, nous reſſentions cependant un grand chaud pendant l'Eté, au contraire de ce qui devroit arriver & que le froid ſoit d'ailleurs ſi conſidérable pendant notre Hiver. Mais c'eſt qu'il faut conſidérer ici pluſieurs cauſes du chaud & du froid. S'il n'y avoit qu'une ſeule & unique cauſe, ſçavoir celle dont nous venons de parler, il eſt hors de doute que le contraire arriveroit de ce que nous éprouvons : mais les autres cauſes la détruiſent du moins en partie, ou ſans l'anéantir totalement. Une des plus fortes raiſons que l'on puiſſe apporter de la chaleur pendant l'Eté, c'eſt que les rayons du Soleil tombent ſur la Terre beaucoup plus directement dans cette ſaiſon, & produiſent par conſéquent, de même qu'une balle lancée contre un mur, un effet tout autre, que lorſqu'ils ſont fort obliques à notre égard, ainſi qu'il arrive pendant l'Hiver. D'ailleurs toutes choſes égales, il tombe beaucoup plus de rayons ſur une ſurface, lorſqu'ils ſont à très-peu près perpendiculaires, que lorſqu'ils ſont obliques. De plus en Hiver comme les rayons du Soleil traverſent fort obliquement notre Atmoſphere, & par conſéquent l'air groſſier qui nous environne, ils parcourent alors un plus grand eſpace de cet air groſſier qu'ils ne font pendant l'Eté lorſqu'ils tombent aſſez directement. Or il ſuit de là que la force de ces mêmes rayons eſt dans le premier cas, pour ainſi dire, amortie à cauſe des différentes réfractions qu'ils ſont obligés de ſouffrir : ces rayons ſont beaucoup plus briſés à midi pendant l'Hiver que pendant l'Eté ; & c'eſt pour cette raiſon que

lorſqu'ils

lorſqu'ils tombent le plus obliquement qu'il eſt poſſible, comme il arrive toutes les fois que le Soleil parvient à l'horizon, alors on peut ſans aucun riſque regarder cet Aſtre, ſoit dans la lunette, ſoit à la vûe ſimple, ce qui n'arrive pas à beaucoup près lorſqu'il eſt à de plus hauts degrés d'élévation, & ſur-tout dans les grands jours d'Eté vers le midi.

La cauſe de l'augmentation de la chaleur vient principalement de ce que les jours d'Eté ſont beaucoup plus longs que les nuits.

Mais il y a une raiſon beaucoup plus forte & qui influe bien davantage que toutes les autres ſur la viciſſitude des ſaiſons. L'on ſçait communément qu'un corps dur & compact s'échauffe d'autant plus qu'il demeure expoſé à un feu violent. Or en Eté la Terre eſt échauffée par les rayons du Soleil pendant ſeize heures continuelles, & ne ceſſe de l'être que pendant huit heures: on peut auſſi remarquer que c'eſt tout le contraire pendant l'Hiver; d'où l'on voit clairement pourquoi il doit y avoir une ſi grande différence de chaleur dans ces deux ſaiſons.

OBJECTION.

On pourroit objecter ici. Puiſque la force des rayons du Soleil eſt la plus grande lorſqu'ils tombent le plus directement qu'il eſt poſſible, ils doivent par conſéquent cauſer une plus grande quantité de chaleur dans les plus longs jours d'Eté, & le plus grand chaud devroit ainſi ſe faire ſentir lorſque le Soleil entre dans l'Ecreviſſe: car c'eſt alors qu'il s'approche le plus du point qui eſt à plomb ſur notre tête & que ſes rayons nous frappent plus directement & ſe répandent ſur notre horizon pendant l'intervalle de tems le plus conſidérable. Cependant au contraire ce n'eſt preſque jamais que long-tems après le Solſtice d'Eté que commencent les plus grandes chaleurs; & de l'aveu de tout le monde nous ne les reſſentons gueres que vers la fin du mois de Juillet ou dans le mois d'Août lorſque le Soleil a traverſé le ſigne entier de l'Ecreviſſe.

REPONSE.

Je répons qu'il faut bien ſe donner de garde de conſidérer l'action du Soleil ſur les corps terreſtres qu'il échauffe,

On explique ici pourquoi la chaleur n'eſt pas la plus grande lorſque le Soleil parvient au Tropique, c'eſt-à-dire, lorſqu'il paroit s'élever à ſa plus grande hauteur ſur l'horizon.

de même que celle de la lumiere, laquelle n'eſt gueres que paſſagere : car cette action a un effet permanent & d'aſſez longue durée. Un corps qui eſt une fois échauffé par le Soleil, demeure encore échauffé fort long-tems quoiqu'il n'y ſoit plus expoſé. La raiſon en eſt fort ſimple. Les rayons ou particules de chaleur qui viennent du Soleil, pénetrent, ou ſont abſorbés du moins pour la plus grande partie, par les Corps qui leur ſont expoſés : ils s'y introduiſent peu à peu ; ils y reſtent même aſſez pour y exciter une grande chaleur ; & les corps ne commencent à ſe refroidir qu'à meſure que cette chaleur s'évapore, ou ſe communique à l'air qui l'environne. Mais ſi un corps eſt toujours plus échauffé qu'il ne perd de ſa chaleur, ſi les intervalles de tems ſont inégaux, enſorte qu'il perde bien moins de chaleur qu'il n'en a acquis, il eſt certain qu'il doit recevoir continuellement de nouveaux degrés d'augmentation de chaleur. Or c'eſt préciſément le cas qui arrive à la Terre. Car lorſque le Soleil paroît au Tropique du ♋ les degrés de chaleur qui ſe répandent chaque jour tant dans notre air que ſur la Terre augmentent preſque continuellement. Il n'eſt donc pas ſurprenant que la Terre s'échauffe de plus en plus & même fort au-delà du tems du Solſtice. Suppoſons, par exemple, qu'en Eté dans l'eſpace d'un jour, c'eſt-à-dire, pendant tout l'intervalle de tems que le Soleil paroît ſur notre horizon, la Terre & l'air qui nous environnent reçoivent cent degrés de chaleur ; mais que pendant la nuit, qui eſt alors beaucoup plus courte que le jour, il s'en évapore cinquante ; il reſtera encore cinquante degrés de chaleur : le jour ſuivant le Soleil agiſſant preſqu'avec la même force, en communiquera à très-peu près cent autres, dont il ſe perdra encore environ cinquante pendant la nuit. Ainſi au commencement du troiſieme jour, la Terre auroit acquis déja cent degrés de chaleur. D'où il ſuit que puiſ-

qu'elle acquiert pour lors beaucoup plus de chaleur pendant le jour, qu'elle n'en perd pendant la nuit, il ſe doit faire en ce cas une augmentation très-conſidérable. Mais après l'Equinoxe les jours venant à diminuer, & les nuits devenant beaucoup plus longues, il ſe doit faire une compenſation ; de ſorte que lorſqu'on eſt en Hiver, il s'évapore une plus grande quantité de chaleur de deſſus la ſurface de la Terre pendant la nuit, qu'elle n'en reçoit pendant le jour ; ainſi le froid doit ſe faire ſentir à ſon tour.

CHAPITRE NEUVIEME.

De la Lune, de ſes différentes Phaſes, & de ſon Mouvement.

DE tous les Corps céleſtes celui qui nous donne le plus de lumiere dans l'abſence du Soleil & principalement pendant la nuit, c'eſt aſſurement la Lune que nous regardons communément comme une Planete appartenante à la Terre, puiſqu'elle eſt ſon Satellite, qu'elle l'accompagne ou la ſuit dans chacun de ſes mouvemens périodiques autour du Soleil. Elle eſt même dans une ſi grande proximité de la Terre, qu'à peine l'appercevroit-on du Soleil s'en écarter de plus de dix minutes dans ſes plus grandes digreſſions, c'eſt-à-dire, vers le premier ou le dernier quartier. Mais puiſque la Lune eſt le Satellite de la Terre & qu'elle eſt emportée chaque année avec elle d'un mouvement commun autour du Soleil, il faut donc qu'elle faſſe auſſi chaque mois autour de la Terre ſes révolutions périodiques dans une orbite particuliere & qui lui ſoit propre. La principale différence qu'on apperçoit entre les mouvemens des autres Planetes & celui de la Lune ſe peut aiſément concevoir. Car

puiſque toutes ces Planetes tournent autour du Soleil qui eſt à très-peu près au centre de leur mouvement, & puiſqu'il les attire, pour ainſi dire, à chaque inſtant, il arrive de là que tantôt elles ſe trouvent aſſez proches de la Terre, & que tantôt elles en ſont prodigieuſement éloignées. Mais il n'en eſt pas tout-à-fait de même à l'égard de la Lune : on doit la regarder comme un Corps terreſtre. Ainſi ſelon les loix de la Gravitation elle ne ſçauroit gueres s'éloigner de nous, mais elle eſt retenue à très-peu près dans tous les tems à la même diſtance, puiſque cette force la détourne continuellement de ſon mouvement rectiligne en la repouſſant vers le centre de la Terre. De cette maniere elle doit faire ſes révolutions autour de ce centre, & par conſéquent elle ne ſçauroit trop changer ſa diſtance. Chaque révolution de la Lune autour de la Terre étant d'environ 27 jours & 8 heures, il reſte à faire voir de quelle maniere lorſqu'elle tourne ainſi autour de nous, elle nous doit paroître ſucceſſivement ſous différentes phaſes ; en un mot pourquoi elle prend différentes figures de Croiſſans, de Quartiers, &c. Il y a certaines choſes dans la nature ſi ſimples par elles-mêmes, & ſi faciles à expliquer qu'on eſt ſouvent fort étonné comment elles nous ont rebuté tant de fois lorſqu'il s'agiſſoit d'en déſigner la vraie cauſe. Rien ne paroît d'abord ſi embarraſſant que de pénétrer la raiſon véritable pourquoi la Lune, ſoit dans ſon décours, ſoit lorſqu'elle croît après ſa conjonction au Soleil, nous paroît tantôt comme un croiſſant fort mince, tantôt coupée en deux parties égales ; pourquoi elle eſt enſuite peu à peu moins altérée dans ſa rondeur ; pourquoi elle eſt pleine ; pourquoi immédiatement après ſon décours elle diſparoît : en un mot pourquoi on ne la voit quelquefois vers le ſoir, que pendant quelques heures, comme auſſi d'autres fois quelques heures de grand matin. Il eſt encore à remarquer qu'on

l'apperçoit auſſi ſoit à différentes ſoit à pareilles phaſes, tantôt fort haute & tantôt baſſe; tantôt vers le Nord & tantôt vers le Midi, & cela même dans certaines années, beaucoup plus avant que ne nous paroît le Soleil aux ſolſtices d'Hiver & d'Eté. Ces ſortes d'obſervations avoient été faites autrefois avec un très-grand ſoin par *Endymion*, qui vraiſemblablement n'en avoit laiſſé échapper aucune circonſtance remarquable. C'eſt, ſans doute, ce qui a fait dire aux Poëtes qu'il étoit en commerce avec la Lune, dont ils l'ont ſuppoſé éperduement amoureux. Mais voici l'explication de toutes ces apparences.

La Lune eſt un Corps opaque à très-peu près de figure ronde, ſemblable à la Terre, c'eſt-à-dire, compoſée d'une matiere fort denſe, & ayant diverſes inégalités dans ſa ſurface. Elle emprunte ſa lumiere du Soleil, qu'elle nous refléchit enſuite; car elle n'eſt point lumineuſe par elle-même. En effet, comme cette quantité prodigieuſe de lumiere qui émane du diſque du Soleil & ſe répand de tous côtés, rencontre la Terre, la Lune & les Planetes, qui ſont des Corps ronds & opaques; il s'en trouve donc continuellement une moitié d'éclairée, ſçavoir celle qui regarde le Soleil; l'autre moitié étant de neceſſité plongée dans l'ombre, comme on l'a déja expliqué dans les Chapitres précédens. Mais cette même moitié du globe de la Lune qui eſt éclairée du Soleil, n'eſt pas toujours celle que nous devons appercevoir: cela ne peut arriver qu'une ſeule fois, ſçavoir dans la pleine Lune. Ainſi ſelon les différentes ſituations de la Lune par rapport à la Terre & au Soleil, nous la voyons éclairée de différentes manieres: & c'eſt ce qui fait que nous ne ſçaurions appercevoir qu'une partie plus ou moins grande de l'hémiſphere éclairé: c'eſt la ſeule raiſon pourquoi nous voyons la Lune d'abord entiere, enſuite moins grande, plus petite encore, & enfin diſparoître tout-à-fait. Une figure fera peut-être comprendre

PLANCHE II. *Figure* 8.

ceci un peu plus facilement. Soit le Soleil au point *S*, la Terre en *T*, & l'arc *RTZ* une partie de l'Ecliptique ou de l'orbite que la Terre décrit en une année autour du Soleil. Soit auſſi *ABCDEFGH* l'orbite que la Lune décrit chaque mois autour de la Terre par ſon mouvement qui ſe fait remarquer aſſez ſenſiblement chaque jour d'Occident en Orient. Si l'on tire par les centres de la Lune & du Soleil les lignes droites *SL*, & qu'on faſſe paſſer par le centre *L* de la Lune un plan *MLN* perpendiculaire à la direction de cette ligne *SL*; ce plan formera dans la ſuperficie du globe lunaire un cercle qui ſera *le Terme de la Lumiere & de l'Ombre*, & qui ſéparera l'hémiſphere éclairé de la Lune, de celui qui ſe trouve plongé dans les ténebres. Si l'on tire de la même maniere les lignes *TL* par le centre de la Terre & de la Lune, & que par le point *L*, qui eſt le centre de la Lune, l'on faſſe encore paſſer un plan *PLO* perpendiculaire à la direction de *TL*; ce plan formera dans la ſurface de la Lune un autre cercle qui ſéparera l'hémiſphere viſible de la Lune, de celui qui nous eſt caché par la rondeur de ce globe. Or on peut appeller ce dernier cercle, *le Terme où ſe borne notre vûe à la ſurface de la Lune.*

Explication du Mouvement de la Lune d'Occident en Orient.

Situation du cercle qui repréſente dans la Lune le terme de la lumiere & de l'ombre.

Situation du cercle où ſe borne notre vûe à la ſurface du globe lunaire.

Il eſt aiſé d'appercevoir maintenant que lorſque la Lune eſt en *A*, c'eſt-à-dire, dans le point de ſon orbite où elle nous paroît en oppoſition au Soleil, alors le cercle qui eſt le Terme de la lumiere & de l'ombre, & celui où ſe borne notre vûe à la ſurface de la Lune, ne ſont qu'un ſeul & même cercle; & partant que tout l'hemiſphere éclairé de la Lune doit être alors tourné vers nous; il doit, dis-je, être apperçu en entier en quelque point de la Terre que nous ſoyons, & c'eſt-là le véritable tems où la Lune doit nous paroître dans ſon Plein. Ainſi les oppoſitions de la Lune au Soleil, peuvent être regardées comme les vrais momens auſquels arrivent les pleines lu-

La pleine Lune.

nes ; car c'eſt le ſeul tems où la Terre ſe trouve dans la ligne droite qui paſſe par les centres de la Lune & du Soleil, ou que ces deux Aſtres nous paroiſſent dans les points du Ciel oppoſés. Mais lorſque la Lune ſe ſera avancée juſqu'au point *B* de ſon orbite, le demi-cercle éclairé *MPN* ne ſera plus entierement vû de la Terre, puiſque la partie *MP* n'en ſçauroit être apperçue. Ainſi le reſte de l'hemiſphere éclairé de la Lune que l'on obſervera pour lors ne doit plus avoir la rondeur d'un cercle, mais on appercevra le diſque ſenſiblement altéré dans une partie de ſa circonférence. En un mot la Lune nous paroîtra ſous une phaſe ſemblable à celle qu'on voit au point *B* dans la neuvieme figure. Enſuite la Lune venant au point *C* de ſon orbite, & l'angle *CTS* qu'elle nous paroît former avec le Soleil étant d'un quart-de-cercle ou de 90°, il n'eſt plus gueres poſſible d'appercevoir qu'environ la moitié du diſque éclairé de la Lune *MPN*, & en ce cas la Lune paroîtra dans ſon quartier comme il eſt repréſenté au point *C* de la neuvieme figure. On nomme auſſi la Lune *Dichotome* le tems auquel cet Aſtre paroît en quartier : cette ſituation de la Lune eſt telle qu'il ſe trouve en ce moment un arc de près de 90° ou d'un quart-de-cercle entre la Lune & le Soleil. Cet aſpect de la Lune a été nommé pour cette raiſon *Quadrat :* mais on dit encore plus communément que la Lune eſt dans ſes Quadratures. Quelque tems après la Quadrature, la Lune s'avançant en *D*, nous ne voyons pour lors qu'une petite portion *PN* de ſon hémiſphere éclairé, la plus grande partie *ON* de l'hémiſphere ou du diſque *ONP* qui eſt tourné vers la Terre, étant abſolument plongé dans l'ombre : or c'eſt ce qui fait que nous voyons alors la Lune en croiſſant ; car ſa ſurface étant ſphérique, & néantmoins regardée par le commun des hommes comme un diſque plat, il doit s'enſuivre qu'à chaque fois que le cercle qui eſt le terme de la lumiere

Les autres phaſes de la Lune.

Le diſque de la Lune altéré dans ſa rondeur, ou *Luna Gibboſa.*

La Lune Dichotome ou ſéparée en deux aux tems des Quadratures.

La Lune en croiſſant.

& de l'ombre, & celui où se termine notre vûe dans la surface de la Lune, formeront un angle aigu ou plus petit qu'un droit, alors la partie de l'hémisphere éclairé de la Lune, nous paroîtra comme un croissant, c'est-à-dire comme en *D* de la neuvieme figure. Enfin lorsque la Lune sera parvenue en *E*, l'on ne pourra appercevoir d'aucun point de la surface de la Terre, la moindre partie de l'hemisphere éclairé de la Lune, l'hemisphere plongé dans l'ombre étant alors exactement tourné vers nous. Or comme ce cas arrive à chaque conjonction de la Lune & du Soleil, c'est-à-dire, lorsque ces deux Astres répondent au même point de l'Ecliptique, ces conjonctions doivent par cette raison répondre précisément aux tems des nouvelles Lunes. Jusqu'ici nous venons de considérer toutes les phases que l'on observe dans le décours ou depuis la pleine Lune jusqu'à la nouvelle : passons maintenant à celles qui sont formées dans l'autre moitié de la révolution. Il paroît évident qu'on doit retrouver précisément les mêmes phases à égales distances du Soleil : il y aura cependant cette différence qu'elles doivent être tournées dans un sens opposé : car, selon ce qui a été dit cidessus, si la Lune s'avance au point *F* de son orbite, alors elle nous paroîtra de nouveau comme un croissant, mais les pointes des cornes seront tournées vers l'Orient, au lieu que dans le décours avant la nouvelle Lune elles étoient tournées vers l'Occident. En *G* dans la Quadrature, ou lorsqu'elle sera à 90° du Soleil, nous la verrons dans son Quartier. Elle nous paroîtra plus grande en *H*; & enfin la Lune sera Pleine lorsqu'elle sera revenue au point *A*.

Des nouvelles Lunes, Neomenies, ou inter-lunes.

Au reste les Astronomes entendent par *Elongation de la Lune au Soleil* l'arc *EL* ou l'angle *STL* compris entre les lignes droites tirées des centres de la Lune & du Soleil au centre de la Terre. Or l'arc *MO*, ou la partie du demi-

L'Elongation de la Lune au Soleil.

cercle

cercle éclairé *MON* tournée vers la Terre, & qui mesure l'angle que forment les deux cercles qui représentent d'une part le terme de notre vûe, & de l'autre celui de la lumiere & de l'ombre ; cet arc, dis-je, est à très-peu près égal à l'arc *EL* ou à l'élongation de la Lune au Soleil. Car l'arc *EL* est la mesure de l'angle *STL*, qui est à très-peu près égal à *PLN*, ou à son opposé au sommet *MLO*, ce qui se peut démontrer comme il suit. Puisque les angles *TLP*, *MLS* sont égaux entr'eux étant droits ou chacun de 90°, si l'on prolonge la ligne *SL*, vers *X*, & qu'on retranche de l'angle droit les angles égaux *OLS*, *PLX*, puisqu'ils sont opposés au sommet ; les angles qui restent *MLO*, *TLX* seront par conséquent égaux entr'eux. Mais puisque l'angle *TLX* est extérieur ou bien égal aux deux intérieurs opposés *STL*, *TSL* du triangle *STL*, il suit que l'angle *MLO* sera égal à ces deux intérieurs. D'un autre côté l'angle *TSL* est toujours fort petit, puisqu'il n'excede pas même dans les Quadratures la sixieme partie d'un degré ou dix minutes, la distance de la Lune à la Terre étant peu considérable en comparaison de celle du Soleil. On peut donc négliger absolument cet angle. Partant l'angle *MLO* doit être regardé comme égal à l'angle *STL*, ou l'arc *MO* comme semblable à l'arc *EL*.

Voyez la situation de la Lune en F. PLANCHE II. *Figure* 8.

Puisque le plan du demi-cercle *OMP* passe par notre œil, sa projection doit donc se faire en une ligne droite ; c'est-à-dire, qu'il doit paroître comme une ligne droite *OP* sur le disque de la Lune : mais il n'en est pas de même du cercle qui est le terme de la lumiere & de l'ombre. Comme nous le voyons presque toujours obliquement, sa projection doit être apperçue comme une ellipse. Cela supposé, étant donnée l'élongation de la Lune au Soleil, on peut facilement représenter la phase qui convient au tems proposé. Car soit le cercle *COBP* le disque apparent de la Lune tel qu'il nous paroît de la Terre, *OP* la

Maniere de décrire les phases, étant donnée l'élongation de la Lune au Soleil. PLANCHE II. *Fig.* 8 *&* 10.

projection du demi-cercle *OMP* représentée par une ligne droite à laquelle soit élevé un autre diametre perpendiculaire *BC*: il faut prendre maintenant la ligne *LF*, (en supposant *LP* pour rayon) égale au cosinus de l'élongation de la Lune au Soleil; & les deux demi-axes *LB*, *LF* étant donnés, on décrira l'ellipse *BFC*, qui séparera sur le disque de la Lune qui est tourné vers nous, la partie éclairée *BFCPB* de celle qui est dans l'ombre.

PLANCHE II. *Figure* 10.

Car puisque dans la supposition que le rayon est *LP*, la ligne *LF* représente le cosinus de l'élongation de la Lune au Soleil, *PF* sera donc le sinus verse qui répond à cette même élongation, & partant la demi-ellipse *BFC*, qui sépare la partie éclairée de la Lune de celle qui est dans l'ombre est ainsi déterminée, puisque, son grand axe étant égal au diametre de la Lune qui est constant, la moitié de l'autre axe est égale au demi-diametre de la Lune moins le sinus verse de l'élongation de la Lune au Soleil. Soit, par exemple, *OBPC* le disque de la Lune tourné vers nous, & *BFC* la demi-ellipse qui sépare la partie du disque éclairée de celle qui ne l'est pas: si l'on tire une droite quelconque *GHN* parallele au petit axe & qui rencontre le grand axe en *M*, alors selon cette propriété générale pour l'ellipse & pour le cercle, les deux rapports de *LP* à *LF* & de *MG* à *MH*, seront égaux entr'eux, ou ce qui est la même chose (en divisant) *LP* sera à *PF* comme *GM* à *GH*. De même si l'on prend le double des antécédens, *PO* sera à *PF* comme *GN* à *GH*. Or comme c'est la même propriété pour toute autre ligne *GN* parallele au petit axe; il suit selon la douzieme proposition du cinquieme Livre d'Euclide, que *PO* doit être à *PF* comme toutes les lignes *GN* à tous les sinus verses *GH*; c'est-à-dire, (puisque toutes les lignes *GN* forment le disque entier de la Lune, & que tous les sinus verses *GH* composent la partie éclairée de la Lune qui nous est visi-

Démonstration de la méthode dont on s'est servi pour déterminer la portion éclairée.

ble) que le diametre de la Lune *PO* doit être au sinus verse de l'élongation au Soleil, comme le disque entier de la Lune est à la phase que l'on s'est proposé de déterminer. Ainsi en quelque tems que ce soit, il y aura toujours le même rapport entre la phase de la Lune & le disque entier tel que nous le voyons dans les pleines Lunes, comme entre le sinus verse de son élongation au Soleil, & le double du sinus total ou le diametre du cercle.

La Lune est encore éclairée par la lumiere de la Terre, laquelle s'y trouve réfléchie principalement vers les tems de la conjonction au Soleil.

Il n'est peut-être pas inutile de considérer ici que comme la lumiere que nous recevons de la Lune n'est autre chose que celle du Soleil qu'elle emprunte, & qui est réfléchie vers nous; de même celle de la Terre éclaire la Lune, ou plutôt étant bien plus abondante, réfléchit sur la Lune une quantité beaucoup plus considérable des rayons qu'elle reçoit du Soleil. En effet la surface de la Terre surpasse environ quinze fois celle de la Lune; & si l'on suppose que l'une des deux Planetes n'absorbe pas une plus grande quantité de rayons que l'autre, & que par conséquent ces rayons soient réfléchis avec une force égale, il doit s'ensuivre que la Lune sera quinze fois plus éclairée par la lumiere que la Terre réfléchit dans quelque phase que ce soit, que nous ne recevons de lumiere de la Lune à pareille phase. Ce qui se peut comprendre d'autant plus facilement, qu'on sçait déja, suivant ce qui a été dit cidessus, qu'un Observateur placé dans la Lune, appercevroit la Terre quinze fois plus grande què la Lune ne nous paroît dans le Ciel. Dans les nouvelles Lunes toute la surface de la Terre qui est éclairée, est exactement tournée vers la Lune; c'est donc alors qu'elle doit paroître pleine étant vûe de la Lune: mais cette grande lumiere réfléchie vers la Lune, en éclaire toute la partie obscure qui est dans la nuit, ou qui est privée des rayons du Soleil, & c'est ce que l'on y pourroit appeller *Pleine Terre*. Or on peut expliquer par là d'une maniere assez

La Lumiere Secondaire de la Lune est d'autant plus sensible que le Croissant est moins éloigné de la nouvelle Lune.

La Lumiere Secondaire nous fait appercevoir tout le reſte du diſque lorſque la Lune eſt en Croiſſant.

naturelle la cauſe d'un phénomene que l'on remarque un peu avant ou après la nouvelle Lune, lorſque le Croiſſant paroît aſſez foible : on a pu s'appercevoir qu'outre le Croiſſant qui n'occupe alors qu'une très-petite partie de ſon diſque, le reſte, quoique plongé dans l'ombre, puiſqu'il ne reçoit point de rayons du Soleil, paroît cependant aſſez viſible, & ſe diſtingue même à tel point, qu'on y voit des taches, & qu'il n'eſt gueres poſſible de n'y pas ſoupçonner quelque lumiere. A la vérité cette lumiere eſt bien moins vive que celle du Croiſſant, mais elle n'en eſt pas moins réelle : la preuve qu'on en peut donner, c'eſt qu'elle va en s'affoibliſſant à meſure que la Terre s'écarte du lieu qu'elle occupoit relativement au Soleil & à la Lune, c'eſt-à-dire à meſure que la Lune s'approche des quadratures & de ſon oppoſition au Soleil. Auſſi lorſque la Lune nous paroît en oppoſition, l'Obſervateur placé dans la Lune, nous appercevroit au contraire en conjonction avec le Soleil, & alors la Terre ceſſeroit de réfléchir aucune lumiere ſur la Lune, puiſque ſon hémiſphere obſcur eſt tourné vers cet Aſtre; enſorte qu'il ne lui ſeroit pas plus facile d'appercevoir la lumiere de la Terre en conjonction, qu'à nous la Lune dans ſes conjonctions ou nouvelles Lunes lorſqu'il n'y a point d'Eclipſes. De cette maniere l'Obſervateur placé dans la Lune ne peut retrouver la Terre qu'un peu après ſa conjonction au Soleil, lorſqu'elle reparoît en forme de Croiſſant. En un mot il doit y obſerver ſucceſſivement les mêmes phaſes que celles que nous remarquons ici à l'égard de la Lune, avec cette différence que ce ſera dans des tems contraires ou dans des ſituations oppoſées.

Des Mois périodiques & ſynodiques.

Quoique la révolution de la Lune dans ſon orbite autour de la Terre, & qu'on nomme communément ſon *Mois périodique*, ſe faſſe dans l'eſpace d'environ 27 jours 7 heures 43 min. 5 ſec. cependant le tems que

cette Planete emploie à retourner vers le Soleil à chaque conjonction est un peu plus long de quelques jours: on nomme ce dernier espace de tems *Lunaison*, ou *Mois synodique*. La cause de ces différences entre les révolutions périodiques & les révolutions synodiques de la Lune est bien facile à découvrir. Elle vient uniquement de ce que la Terre, & par conséquent la Lune qui est son Satellite, s'avance sur l'Ecliptique ou sur le grand orbe, pendant que la Lune parcourt son orbite en 27 jours 7 heures. Dans cet espace de tems le mouvement commun à ces deux Planetes est tel qu'il s'en faut bien peu qu'elles ne parcourent un signe entier d'Occident en Orient; d'où il suit que le point de l'orbite de la Lune qui nous paroissoit au tems de la premiere conjonction dans la ligne droite qui joignoit les centres de la Terre & du Soleil, doit être plus occidental au tems de la conjonction suivante, & qu'ainsi la Lune étant revenue au même point de son orbite, il s'en faudra près d'un signe qu'elle ne paroisse en conjonction avec le Soleil.

Le Mois synodique est de 29 jours 12 heures 44 minutes 3 sec. 10 tierces.

Soit *AB* une partie quelconque de l'orbite de la Terre, *S* le Soleil, *ACDL* l'orbite de la Lune. Supposons d'abord la Terre en *T* & que la Lune soit au point *L* de son orbite; c'est-à-dire, qu'elle nous paroisse en conjonction avec le Soleil: il est évident qu'après cette premiere conjonction, à mesure que la Lune s'éloignera du point L & qu'elle parcourra son orbite *LACD*, la Terre décrira l'arc *Tt* du grand orbe. Quand donc la Terre sera parvenue au point *t* & que par conséquent l'orbite de la Lune se trouvera portée en *lacd*, le point *L* doit se retrouver dans la ligne *tl* parallele à la ligne *TL* où la premiere conjonction vient d'être observée. Or il est évident que quoique la Lune ait fait une révolution exacte *lacd* sur le plan de son orbite, quoiqu'elle se retrouve, dis-je, précisément au point *l*, elle ne nous doit pas pour cela paroître en

PLANCHE II. *Figure* 11.

conjonction avec le Soleil, puiſqu'il faut qu'elle parcourre encore l'arc *l M* de ſa révolution ſuivante, avant qu'elle rencontre la ligne droite *t M S* tirée de la Terre au Soleil. Suppoſant donc le tems de la révolution périodique de la Lune d'environ 27 jours 7 heures, on auroit environ 27° pour l'arc *Tt* que la Terre décrit en même tems ſur ſon orbite, & qui ſeroit égal à l'arc *l M* à cauſe des angles alternes égaux *lt M*, *MSL*. Cependant l'arc qui reſte à décrire pour que la Lune reparoiſſe en conjonction avec le Soleil, eſt encore plus grand que l'arc *l M* ou *Tt*, à cauſe que la Terre ſe meut encore quelque peu au-delà du point *t* dans le commencement de cette ſeconde révolution; d'où l'on voit que le tems qui s'écoule dans l'eſpace d'une lunaiſon, c'eſt-à-dire, depuis une nouvelle Lune juſqu'à la ſuivante, doit s'étendre à plus de 29 jours, comme d'environ douze heures au-delà, puiſqu'en effet le mouvement dont la Lune s'éloigne chaque jour du Soleil n'eſt que de 12° & quelques minutes. On a nommé ce mouvement comparé, *le Mouvement diurne de la Lune au Soleil.*

Mouvement diurne de la Lune au Soleil.

Si le plan de l'orbite de la Lune n'étoit point différent du plan de l'Ecliptique; c'eſt-à-dire, ſi les deux orbites de la Lune & de la Terre, n'avoient aucune inclinaiſon l'une à l'égard de l'autre; ſi ces plans, dis-je, ne formoient point entr'eux d'angle ſenſible, il eſt très-certain que la trace du mouvement de la Lune que l'on obſerveroit dans les cieux, ſeroit la même que celle du Soleil, & que l'un & l'autre Aſtre parcourreroit exactement le plan de l'Ecliptique. C'eſt pourquoi il n'y auroit d'autre différence dans l'obſervation de leurs mouvemens, qu'à l'égard du tems de leurs révolutions périodiques, la Lune paroiſſant parcourir le cercle entier en un mois, au lieu que le Soleil y emploie toute une année. Mais, parce que le plan de l'orbite de la Lune eſt ſenſiblement incliné

La Lune ne ſe meut pas dans le plan de l'Ecliptique, mais elle s'en écarte alternativement au Nord & au Midi.

sur le plan de l'Ecliptique ou de l'orbite de la Terre; puisque ces deux orbites se coupent sous un angle d'environ cinq degrés (leur section commune se faisant toujours dans une ligne droite qui passe par le centre de la Terre) il faut donc ici considérer les phénomenes du mouvement de la Lune, qui par cette raison doivent être encore changés à notre égard.

PLANCHE II. *Figure* 12.

Supposons que l'arc *AB* représente une partie de l'orbite de la Terre, & que le cercle *CEDF* soit l'orbite de la Lune dont le centre *T* est le même que celui de la Terre; il est clair que si de ce centre *T*, on décrit dans le plan de l'orbite terrestre, le cercle *CGDH* dont le diametre soit égal à celui de l'orbite de la Lune, ce cercle pourra représenter l'Ecliptique, ensorte qu'il formera un angle d'environ 5° avec le plan de l'orbite lunaire. Mais puisque ces deux cercles ont un même centre *T*, & que leur section commune se fait dans une ligne droite qui passe par le centre de la Terre, il est clair qu'une moitié *CED* de l'orbite de la Lune sera élevée au-dessus du plan de l'Ecliptique *CGDH* du côté du Septentrion, & qu'au contraire l'autre moitié *DFC* sera abaissée sous ce plan de la même quantité du côté du Midi. Or la ligne *CD*, qui est la commune section de ces deux cercles, s'appelle *la Ligne des nœuds*, & les sommets des angles que forment ces cercles en *C* & *D* se nomment *les Nœuds* de la Lune. Comme c'est au point *C* que cette Planete passe de la partie méridionale de son orbite dans la partie septentrionale, on l'a nommé pour cet effet *le nœud Ascendant* ou *la Tête du Dragon*, & on le désigne par ce caractere ☊; quant à l'autre nœud *D* où la Lune passe de la partie septentrionale de son orbite dans la partie méridionale, on le nomme *nœud Descendant*, ou *la Queue du Dragon*, & on le désigne par cet autre caractere ☋. Il faut bien faire attention maintenant que si la ligne des nœuds étoit immobile, ou si elle n'avoit

La ligne des nœuds.

Le nœud ascendant.

Le nœud descendant.

d'autre mouvement que celui qui eſt commun à l'orbite de la Lune & à la Terre dans leurs révolutions périodiques autour du Soleil, cette ligne ſeroit perpétuellement dirigée au même point du Ciel ou de l'Ecliptique ; ou plutôt elle ſeroit parallele à elle-même en quelque lieu que l'orbite ſe trouvât dans le cours de chaque année : mais parce qu'elle ſe meut continuellement d'Orient en Occident, ou qu'elle rétrograde contre l'ordre des ſignes, elle ne peut reparoître aux mêmes points des Cieux qu'au bout d'une révolution d'environ dix-neuf ans ; ainſi les nœuds ne ſe retrouvent aux mêmes points de l'Ecliptique où on les auroit une fois obſervés de la ſurface ou du centre de la Terre, qu'après une révolution entiere dont la durée eſt d'un peu moins que dix-neuf ans.

Le mouvement des nœuds eſt rétrograde.

Leur révolution s'acheve en 18 ans 224j. 4h½.

De tout ce que nous venons de dire, l'on peut conclurre qu'à chaque lunaiſon ou chaque révolution de la Lune ſur ſon orbite, nous ne devons l'appercevoir que deux fois ſeulement dans l'Ecliptique, ſçavoir lorſqu'elle eſt dans l'un ou l'autre nœud : car dans tout autre point de ſon orbite, elle ſe trouve plus ou moins écartée du plan de l'Ecliptique, ſelon qu'elle ſera plus ou moins éloignée des nœuds, & le tems auquel la Lune paroîtra dans ſa plus grande diſtance de l'Ecliptique, doit arriver lorſqu'elle ſera également éloignée des nœuds, comme en *E* & *F* : on nomme ces deux points *les Limites :* & la diſtance de la Lune à l'Ecliptique, s'appelle auſſi *la Latitude.* Elle ſe meſure par l'arc d'un grand cercle perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, & que l'on ſuppoſe paſſer par le centre de la Lune. Comme cet arc nous fait connoître la plus grande diſtance entre la Lune & l'Ecliptique, & par conſéquent la latitude ; c'eſt pour cette raiſon qu'on a attribué vraiſemblablement à ces ſortes de cercles perpendiculaires à l'Ecliptique, le nom de *cercles de Latitude.* Or la plus grande latitude poſſible de la Lune arrive

Des limites & de la latitude de la Lune.

Les cercles de latitude.

arrive lorſqu'elle ſe trouve en *E* ou en *F* dans ſes limites, on l'obſerve auſſi quelquefois de cinq degrés & dix-huit minutes, mais l'angle qui meſure cette grande latitude, a toujours ſon ſommet dans l'un ou l'autre nœud.

CHAPITRE DIXIEME.

Des inégalités du mouvement de la Lune ; de la figure de ſon diſque apparent, des Montagnes & des Cavités profondes que l'on y apperçoit.

La Lune ſe meut dans une orbe élliptique.

COMME toutes les Obſervations Aſtronomiques s'accordent à nous faire connoître que la diſtance de la Lune à la Terre change à notre égard d'une maniere très-ſenſible, c'eſt-à-dire, qu'on l'apperçoit d'abord plus éloignée dans certains points de ſa révolution, & qu'au contraire dans d'autres elle ſe trouve plus proche de nous, paroiſſant alors ſous un bien plus grand angle *; il faut donc néceſſairement que ſon orbite ne ſoit point circulaire, mais une ellipſe qu'elle ſemble décrire autour de la Terre, telle que la courbe *ABPD* dont le grand axe ou la ligne des Apſides eſt *AP*, le point *T* l'un des foyers qu'occupe la Terre, *TC* l'excentricité, *A* l'*Apogée* ou le lieu que la Lune occupe lorſqu'elle eſt dans ſa plus grande diſtance de la Terre, & *P* le *Périgée*, c'eſt-à-dire, le point où la Lune approche de nous le plus près qu'il eſt poſſible. De plus ſi l'orbite de la Lune n'avoit d'autre mouvement que celui qui l'emporte de même que la Terre autour du Soleil dans le cours de chaque année, alors le grand axe de cette orbite elliptique ſeroit toujours parallele

PLANCHE II. *Figure* 13.

Son Apogée & ſon Perigée.

* L'angle ſous lequel le diametre horizontal de la Lune a été obſervé lorſqu'elle étoit Pleine & Périgée, excede un peu 33′½: mais étant Pleine & Apogée on ne l'apperçoit gueres que ſous un angle de 29′ 30″.

à lui-même & nous paroîtroit constamment dirigé au même point des Cieux : c'est pourquoi à chaque retour de la Lune à ce point, cet Astre nous paroîtroit précisément à la même distance de la Terre. Mais il est certain que ce grand axe ou ligne des apsides a un mouvement propre & particulier, ainsi qu'on l'a déja dit à l'égard des nœuds, quoiqu'il y ait bien de la différence, puisqu'au contraire du mouvement des nœuds, celui de l'axe se fait d'Occident en Orient, & par conséquent sa révolution s'acheve suivant l'ordre des signes : en un mot cet axe ou ligne des apsides ne se retrouve au même point du Ciel qu'après un intervalle d'environ neuf ans.

La révolution moyenne de l'Apogée se fait en 8 ans 309 j. 8h 37′.

Il n'y a point d'Astres particuliers dans les Cieux dont le cours ou l'orbite même se trouvent aussi affectés de mouvemens variés, ni qui soient assujettis à tant d'irrégularités apparentes, que la Lune. Car 1°. lorsque la Terre est dans son aphélie, ou lorsqu'elle est de même que la Lune qui est son Satellite, dans sa plus grande distance du Soleil, le mouvement de ce Satellite nous paroît alors très-rapide : au contraire la Terre étant perihélie, & la Lune se trouvant par cette raison plus près du Soleil, son mouvement nous paroît très-rallenti ; ensorte que la Lune parcourt son orbite, ou, ce qui est la même chose, acheve sa révolution périodique beaucoup plus vîte, la Terre étant aphélie, que lorsqu'elle est perihélie ; & c'est ce qui est cause que les Mois périodiques sont presque toujours inégaux entr'eux.

Différentes inégalités dans le mouvement de la Lune.

2°. Lorsque la Lune est dans les Sisigies, c'est-à-dire, dans la ligne qui passe par les centres de la Terre & du Soleil, on observe alors (toutes choses d'ailleurs étant supposées égales) qu'elle se meut bien plus rapidement.

3°. Selon les différentes distances de la Lune aux Sisigies, c'est-à-dire, à l'égard de ses conjonctions ou oppositions au Soleil, son mouvement est sujet à diverses

inégalités : car dans la 1re des quatre parties qui composent chaque lunaison, c'est-à-dire, depuis la conjonction, ou la nouvelle Lune, jusqu'au premier Quartier, son mouvement se rallentit peu à peu; mais il accélere ensuite depuis la quadrature jusqu'à l'opposition. De même dans la troisieme partie de la lunaison il nous paroît retardé peu à peu, mais enfin il augmente ou commence à s'accélérer dans la quatrieme partie de la lunaison, c'est-à-dire, depuis le dernier Quartier jusqu'à la nouvelle Lune. Telle est cette inégalité si célebre que Tycho a découverte le premier & que l'on a nommée jusqu'à ce jour *la Variation.*

Ce que l'on entend par la variation dans le mouvement de la Lune.

4°. Puisque la Lune se meut dans une ellipse, au foyer de laquelle se trouve la Terre, & d'où cet Astre doit paroître décrire des aires ou espaces elliptiques proportionnels aux tems, il faut absolument que de même que les Planetes principales, elle se meuve plus lentement dans l'Apogée, & au contraire très-rapidement dans le Périgée.

5°. Mais l'orbite de la Lune paroît presque continuellement changer de figure; ce n'est jamais une ellipse de même espece; elle est tantôt plus ou moins allongée, son excentricité étant sujette à divers accroissemens ou diminutions. Or la plus grande excentricité de l'orbite de la Lune arrive lorsque le grand axe, ou la ligne des apsides se trouve dans les Sisigies, c'est-à-dire, quand le grand axe convient exactement avec la ligne qui passe par les centres de la Terre & du Soleil; d'où l'on voit que la plus petite excentricité * doit s'observer lorsque ces deux lignes se coupent à angles droits. Il est encore à remar-

L'orbite de la Lune & son excentricité varient jusqu'à souffrir d'assez grands changemens.

* Cela est aisé à reconnoître par les diametres apparens que l'on observe. M. Picard est le premier qui ait découvert que la Lune périgée au 1er & au 2d quartier paroissoit sous un angle d'environ une minute plus petit que lorsquelle étoit pleine & périgée; ce qui a fait connoitre la loi suivant laquelle l'excentricité de son orbite varioit à chaque lunaison. Celle du Soleil, qui est constante, ne produit dans les moyennes distances qu'une différence d'environ 1°56′ entre son lieu moyen & son lieu vrai, & c'est là sa plus grande Equation du centre. Par les obser-

quer que la différence entre la plus grande & la plus petite excentricité eſt ſi grande que dans le premier de ces deux cas, elle excede la moitié de cette derniere.

Inégalités dans le mouvement de l'Apogée.

6°. L'apogée de la Lune eſt lui-même ſujet à une inégalité très-conſidérable. Car lorſque cet apogée ſe trouve dans la ligne des Siſigies, il paroît ſe mouvoir de même que le Soleil ſelon la ſuite des ſignes : mais dans les Quadratures il eſt au contraire rétrograde. Or les mouvemens de l'apogée, ſoit qu'il s'accélere ou qu'il rétrograde, ne ſont pas toujours égaux : car il doit arriver, lorſque la Lune eſt dans l'un ou l'autre Quartier, que la ligne de ſon apogée, s'avancera bien plus lentement qu'à l'ordinaire, ou qu'il deviendra rétrograde ; au lieu que ſi la Lune eſt en conjonction, le mouvement de l'apogée eſt le plus rapide que l'on puiſſe obſerver.

7°. Le mouvement des nœuds quoique perpétuellement rétrograde n'eſt pas non plus égal ni uniforme, puiſqu'il arrive à chaque fois que la ligne des nœuds ſe trouve dans les Siſigies, que ſon mouvement devient à peine ſenſible, & qu'au contraire le mouvement de cette même ligne ſe fait très-rapidement contre l'ordre des ſignes lorſqu'elle ſe trouve dans les Quadratures.

Il eût été très-difficile, pour ne pas même dire preſqu'impoſſible, ſoit en Aſtronomie, ſoit dans la Phyſique, de découvrir les cauſes de toutes ces inégalités du mouvement de la Lune, ſi le grand Newton ne l'eût entrepris, en y appliquant ſa Théorie de la Gravitation. Suivant cette Théorie l'on démontre d'une maniere fort élégante les loix méchaniques d'où dépendent les mouvemens que l'on a reconnus tant à l'égard de la Lune, que

vations des Eclipſes de Lune, on avoit conclu autrefois la plus petite excentricité de l'orbite de cette Planete, ce qui donnoit pour ſa plus grande équation du centre 5° ou 4° 59′ 30″. Mais de l'obſervation de M. Picard il a fallu conclure que l'équation du centre pouvoit être vers le 1er ou 2d Quartier de 7° 30′ 00″ & qu'ainſi les deux plus grandes équations qui peuvent arriver l'une dans la pleine Lune, & l'autre dans les Quadratures different d'environ 2° 30′.

de ſon orbite apparente. C'eſt une choſe remarquable que l'Aſtre qui eſt le plus proche de la Terre, ſoit celui dont les mouvemens nous ſoient, pour ainſi dire, les moins connus. Ces mouvemens de la Lune ſont néantmoins ſi irréguliers, qu'on n'eſt pas encore parvenu à découvrir entierement ce qui appartient à la Théorie de cette Planete, & cela faute d'une longue ſuite d'Obſervations qui demandent beaucoup de veilles & d'aſſiduités.

La Lune tourne uniformément autour de ſon axe.

Le ſeul mouvement régulier & uniforme que l'on obſerve par rapport à la Lune, c'eſt celui de Rotation autour de ſon axe : il s'acheve préciſément dans le même eſpace de tems que celui de la révolution de cette Planete autour de la Terre. C'eſt-là ce qui fait que nous voyons toujours à très-peu près le même hémiſphere de la Lune. Cette uniformité même eſt cauſe d'une inégalité ſinguliere que l'on obſerve par rapport au diſque apparent de la Lune, cet Aſtre nous paroiſſant avoir une Libration ou eſpece de balancement, tel que ſeroit un commencement de rotation apparente autour de ſon axe. La libration ſe fait d'abord d'Occident en Orient, enſuite d'Orient en Occident; de ſorte que diverſes régions qui paroiſſoient ſituées vers le bord occidental ou oriental de la Lune, ou ſe cachent, ou ſe montrent alternativement. Il en eſt de même de toutes les autres régions du diſque apparent de la Lune, qui s'approchent auſſi plus ou moins, ou s'éloignent ſucceſſivement de ſa circonférence ; en un mot c'eſt-là ce qui a fait donner le nom de *Libration* à ce mouvement qui reſſemble très-bien à une eſpece de balancement. L'une des principales cauſes de cette Libration vient de l'inégalité du mouvement de la Lune dans la circonférence de ſon orbite qui eſt une ellipſe. En effet il eſt évident que ſi la Terre occupoit le centre d'un cercle dont la circonférence ſeroit l'orbite véritable de la Lune, & ſi la Lune employoit à tourner autour de

La Libration.

son axe le même espace de tems qu'elle employeroit à parcourir la circonférence de ce cercle, assurément ce seroit toujours le même plan d'un Méridien lunaire qui passeroit par notre œil ou par le centre de la Terre; & partant l'on appercevroit exactement chaque jour le même hémisphere de la Lune. Mais puisque l'orbite de la Lune est une ellipse dont la Terre occupe le foyer, & que d'ailleurs la rotation de cette Planete autour de son axe est uniforme; ou ce qui revient au même, puisqu'un Méridien quelconque de la Lune décrit perpétuellement autour de l'axe des angles proportionnels aux tems, il suit que le plan du même Méridien ne sçauroit être constamment dirigé vers le centre de la Terre, mais qu'il doit s'en écarter de part & d'autre jusqu'à un certain point.

PLANCHE II. *Figure* 14. Soit *ALP* l'orbite de la Lune, dont le foyer *T* est au centre de la Terre. Si l'on suppose d'abord la Lune en *A*, il est clair que le plan d'un de ses Méridiens *MN* étant prolongé, passera par le point *T*, ou par le centre de la Terre. Or si la Lune n'avoit aucune rotation autour de son axe, comme elle s'avance chaque jour sur son orbite, ce même Méridien *MN* seroit toujours parallele à lui-même, & la Lune étant parvenue en *L*, ce Méridien paroîtroit dans la situation représentée par *PQ*, c'est-à-dire, parallelement à *MN*: mais le mouvement de rotation de la Lune autour de son axe qui est uniforme, est cause que le Méridien *MN* change de situation; & parce qu'il décrit des angles proportionnels aux tems & qui répondent à quatre angles droits dans l'espace d'une révolution périodique, il sera par conséquent dans une situation *mLn*, telle que l'angle *QLn* qu'il forme avec *PQ*, seroit à un angle droit ou de 90°; comme le tems que la Lune emploie à parcourir l'arc *AL* est au quart du tems périodique. Mais le tems que la Lune emploie à parcourir l'arc *AL* est au quart du tems périodique comme l'aire *ATL* est à l'aire

ACL ou au quart de l'aire elliptique; ainſi l'angle *QLn* ſera à un angle droit dans le même rapport: & d'autant que l'aire *ATL* eſt beaucoup plus grande que l'aire *ACL*, de même l'angle *QLn* ſera néceſſairement plus grand qu'un angle droit. Or puiſque *QLT* eſt un angle aigu, il s'enſuit que l'angle *QLn* qui eſt obtus ſera plus grand que l'angle *QLT*, & partant la Lune étant en *L*, ce même Méridien *MN* dont le plan paſſoit par le centre de la Terre lorſque la Lune étoit au point *A*, ne ſçauroit être davantage dirigé vers le point *T* ou vers le centre de la Terre. Il eſt donc vrai de dire que l'hémiſphere viſible de la Lune, ou qui eſt tourné vers la Terre en *L*, n'eſt plus exactement le même qu'il étoit apperçu lorſque la Lune s'eſt trouvée en *A*, & qu'ainſi au-delà du point *Q* de la circonférence du diſque, on pourra découvrir quelques régions qui n'étoient nullement viſibles auparavant. Enfin lorſque la Lune ſera parvenue au point *P* de ſon orbite où elle eſt périgée, comme ſon Méridien *MN* aura préciſément achevé une demi-révolution, alors le plan de ce Méridien paſſera exactement par le centre de la Terre. On verra donc en ce cas le diſque de la Lune au même état que lorſqu'elle étoit apogée en *A*; d'où il ſuit que les termes de la Libration de la Lune ſont l'Apogée & le Périgée, & que ce phénomene peut s'obſerver deux fois dans chaque lunaiſon, ou dans chaque Mois périodique.

La ſurface de la Lune eſt inégale & raboteuſe.

Si la ſurface de la Lune étoit unie ou polie comme ſont nos glaces de miroirs, il s'en faudroit bien qu'elle pût réfléchir ſa lumiere de tous côtés; elle ne nous renverroit qu'une petite image du Soleil preſque imperceptible, & qu'on ne diſtingueroit peut-être qu'à cauſe de l'éclat ou de la vivacité des rayons de lumiere lancés par le Soleil: mais il en ſera autrement, ſi la Lune eſt entierement ſemblable à la Terre. Or ſa ſurface inégale eſt parſemée

de montagnes & de cavités qui réfléchiſſent la lumiere du Soleil de tous côtés ; c'eſt donc ce qui fait qu'elle nous renvoie les rayons en une bien plus grande quantité, ce qui étoit abſolument néceſſaire pour que la Terre en fût éclairée pendant les nuits.

Il s'y trouve de très-hautes montagnes.

Ces inégalités ou montagnes que nous prétendons être à la ſurface de la Lune, ne ſont pas peu conſidérables : elles ne reſſemblent pas néantmoins à la plupart de celles que nous voyons communément ſur la Terre, car il y a en effet dans la Lune une multitude prodigieuſe de montagnes énormes, de profondes vallées, de grandes cavités ou abîmes qu'on n'y auroit peut-être jamais ſoupçonnés, ſi l'on n'étoit parvenu à en conſtater des meſures exactes. D'ailleurs s'il n'y avoit point de ſemblables inégalités dans la ſurface de la Lune, ſi toutes les parties de ſa ſurface étoient dans un niveau parfait, ſemblable aux eaux de la mer lorſque nous la voyons dans un calme, il eſt certain que ce ſeroit toujours une ligne droite ou portion d'ellipſe très-réguliere qui détermineroit dans les Quadratures & les autres phaſes, le terme de la lumiere & de l'ombre. Mais les lunettes d'approche nous le repréſentent bien différemment ; ce n'eſt plus une courbure uniforme, mais très-inégale & comme dentelée, ayant dans chaque interruption de profondes cavités qui la rendent irréguliere, & qui la défigurent, pour ainſi dire. Bien plus on voit dans la partie du diſque qui n'eſt point éclairée, quelques endroits lumineux & même fort loin au-delà du terme qui ſépare la lumiere & l'ombre : ſi, par exemple, l'on obſerve le Croiſſant environ quatre jours après la nouvelle Lune, on diſtingue dans la partie obſcure divers points lumineux ſemblables à des pointes de rochers ou aux petites Iſles ſoit de l'Ocean ſoit de la Méditerranée, & cela bien avant au-delà du terme de la lumiere & de l'ombre. On voit auſſi au-dedans de la partie du diſque éclairé,

Ce qui eſt démontré d'une maniere fort évidente.

éclairé, divers petits espaces en forme de croissans, qui augmentent & qui changent peu à peu de figure à mesure que la Lune croît ou s'approche de son opposition au Soleil, de sorte que la lumiere les entourant tout-à-fait, ils sont enfin confondus dans la partie éclairée lorsque les rayons de cette même lumiere les ont, pour ainsi dire, pénétrés de toute part. Il en est de même dans les phases suivantes d'une infinité d'autres qu'on découvre successivement chaque jour, & qui sortent de la partie obscure à mesure que la Lune croît. Enfin c'est tout le contraire dans le décours : ces mêmes points lumineux se trouvent à moitié éclairés dans le sens opposé, de maniere que lorsqu'ils sont vers le terme de la lumiere & de l'ombre, ils disparoissent successivement ; mais ce n'est pour l'ordinaire, que lorsqu'ils se trouvent un peu au-delà de ce terme. Or il seroit impossible d'observer tous ces phénomenes si ces points qui nous paroissent lumineux, n'étoient pas plus élevés que le reste de la surface de la Lune, & même assez élevés pour recevoir plus long-tems la lumiere du Soleil lorsqu'il devient presque horisontal à leur égard. Il faut pour cet effet que ces points qu'on remarque assez avant dans la partie obscure au-delà du terme de la lumiere & de l'ombre, ne soient autre chose que les pointes ou sommets de quelques montagnes très-élevées, qui, à cause de leurs hauteurs prodigieuses, peuvent recevoir beaucoup plutôt la lumiere du Soleil, & c'est par une raison à peu près semblable qu'ils la perdront beaucoup plus tard que les autres points de la surface de la Lune. On peut dire aussi que les taches noires que l'on remarque en même tems dans la partie éclairée assez proche du terme de la lumiere & de l'ombre, sont les cavités où ces vallées si profondes qui n'étant pas encore remplies de la lumiere du Soleil dont les rayons sont pour lors trop obliques à leur égard, n'en reçoivent seulement qu'un peu vers

On apperçoit dans la Lune de très grandes cavernes.

leurs extrémités supérieures, c'est-à-dire, vers les parties les plus élevées de leurs circonférences. Elles doivent donc ainsi nous paroître d'autant plus noires, qu'étant entourées de rayons qui réfléchissent une lumiere très-vive, elles s'en trouvent alors privées totalement; & cependant le Soleil venant à s'élever peu à peu, ses rayons deviennent chaque jour bien moins obliques: aussi ces taches paroissent-elles peu à peu plus éclairées, & l'ombre diminue d'autant plus que le Soleil s'éleve sur leur horizon, de maniere que lorsque le Soleil se trouve une fois vertical ou perpendiculaire, l'ombre s'évanouit, & ces mêmes endroits ressemblent à d'autres taches lumineuses. C'est peut-être la seule raison pourquoi il est alors très-difficile de les reconnoître sur le disque de la Lune: elles sont dans ce dernier cas confondues avec les pointes ou sommets des montagnes, puisqu'elles réfléchissent de la même maniere les rayons du Soleil, leur ombre étant sans doute l'unique cause qui pouvoit nous les faire distinguer. Cependant il semble qu'on doit les reconnoître dans la Pleine Lune, parce qu'elles sont beaucoup plus éclairées que tout le reste: en effet ces mêmes vallées si profondes réfléchissent une plus grande multitude de rayons que les pointes ou sommets des montagnes. Il est donc démontré que la Lune est couverte de montagnes & qu'elle a des vallées profondes. Passons maintenant à ce qu'il y a de plus particulier à ce sujet.

La Géométrie fournit un moyen fort simple pour mésurer la hauteur des montagnes de la Lune. PLANCHE II. *Figure* 15.

Il y a sur la surface de la Lune des montagnes beaucoup plus hautes que celles qui sont sur la surface de la Terre; voici comment les Géométres ou les Astronomes les ont mesurées. Soit *EGD* l'hémisphere éclairé de la Lune, *ECD* le diametre du cercle qui est le terme de la lumiere & de l'ombre, *A* le sommet d'une montagne observé, s'il est possible, au premier instant qu'elle commence à paroître. On mesurera par le moyen d'un treillis

placé au foyer d'une Lunette, ou si l'on aime mieux, avec le micrometre, la distance *AE* comme aussi le diametre apparent de la Lune, ce qui fera connoître leur rapport. Cela supposé, puisque *ES* est une tangente au globe de la Lune, si l'on tire la droite *AC*, le triangle *ACE* sera rectangle *, & partant étant données *AE*, *EC*, on connoîtra *CA* dont on retranchera *CB* égale à *CE*, & le reste *BA* sera la hauteur de la montagne que l'on cherche. En voici un exemple. *Riccioli* dit que le quatriéme jour après la nouvelle Lune il a observé l'instant où la montagne qu'il nomme Sainte Catherine a commencé d'être éclairée, & que sa distance *AE* au terme de la lumiere & de l'ombre (lequel paroît quelquefois assez régulier) étoit égale à la seizieme partie du diametre de la Lune, c'est-à-dire, égale à la huitieme partie du demi-diametre. Supposant donc *EA* d'une partie dont *EC* en contiendroit 8, les quarrés de *EA* & *EC* seront 1 & 64, dont la somme 65 sera égale au quarré de l'hypothénuse *AC selon la 47e Prop. du 1er liv. d'Euclide.* Or la racine quarrée de 65 est 8,062 égale *AC;* c'est pourquoi si l'on en retranche 8,000 = *BC* ou *CE*, le reste 0,062 sera la vraie hauteur de la montagne *AB;* d'où il suit que *CB* ou *CE* est à *AB* comme 8000 à 62. Or le demi-diametre de la Lune étant d'environ 400 lieues, si l'on fait comme 8000 à 62 : ainsi 400 lieues sont à un quatriéme terme, on trouvera exactement 3,1 lieues pour la hauteur de cette montagne, ce qui est environ trois fois la hauteur de nos plus hautes montagnes Européennes.

* *Euclid. liv. 3. prop. 16.*

Ceux qui considéreront la Lune avec les meilleures lunettes d'approche, y reconnoîtront bien-tôt peut-être avec une surprise agréable, une variété presqu'infinie d'objets éclairés, dont les uns sont si éclatans que quelques bons Philosophes se sont avancés jusqu'à dire que c'étoient des roches d'une matiere semblable à nos diamans; d'autres

Varietés surprenantes sur la surface de la Lune.

veulent qu'elles reſſemblent à nos perles ; d'autres enfin à des volcans. Toutes ces parties de la Lune ſont ou des montagnes, ou dès corps très-ſolides, la plupart très-aiſés à diſtinguer de quantité d'autres taches beaucoup plus étendues & en très-grand nombre qui paroiſſent obſcures ou noirâtres & que l'on a regardées comme des lacs, des marais, ou des mers. Cependant ſi l'on vient à ſe ſervir des plus excellentes lunettes d'approche, on reconnoîtra d'abord que ces grandes taches qu'on a prétendu reſſembler à nos mers, ne ſont point de véritables amas de matieres fluides ; car on y apperçoit une infinité de cavernes ou de cavités très-profondes (ce qui ſe remarque principalement par le moyen des ombres qui ſont jettées au-dedans lorſque la Lune croît ou qu'elle eſt dans ſon décours.) Or c'eſt ce qui ne paroît gueres convenir à une mer d'une vaſte étendue. Ainſi il eſt probable que ces régions de la Lune ne ſont point des mers, mais qu'elles ſont d'une matiere moins dure & moins blanche que les autres contrées des pays montueux. On doit auſſi remarquer que parmi ces taches pâles & comme obſcures, il s'en trouve d'autres petites qu'elles renferment & qui ſont d'une lumiére bien plus vive & même preſqu'auſſi éclatante que les ſommets des montagnes dont nous avons parlé ci-deſſus. Enfin il y a beaucoup d'apparence que ſur la Lune il n'y a jamais de nuages * ni de pluies ; car s'il s'y trouvoit des nuages on les verroit ſe répandre indifféremment ſur les différentes régions du

Il eſt aſſez vraiſemblable qu'il n'y a point de mers dans la Lune.

* Les nuages pourroient néantmoins ſe trouver dans la partie de l'Athmoſphere qui n'eſt point éclairée du Soleil ; car la chaleur qui eſt très-grande dans la partie éclairée (l'unique Hemiſphere qu'il nous eſt permis d'appercevoir) cette chaleur, dis-je, excitée par les rayons du Soleil qui éclairent ſans diſcontinuer ces regions de la Lune pendant près de 15 fois 24 heures, ſuffit, à ce qu'il ſemble, pour rarefier l'Athmoſphere de la Lune. De plus au ſujet de cet Athmoſphere on a remarqué en 1736 & 1738 que l'Etoile *Aldebaran* s'avançoit en *Plein-jour* un peu ſur le diſque éclairé de la Lune, où cette même Etoile a diſparu enſuite après avoir entamé très-ſenſiblement le diſque, & cela vers le diametre horiſontal de la Lune.

TABLE générale des Phaſes de la Lune ſelon la Sélenographie d'Allemagne; avec les termes de la plus grande & de la plus petite Libration publiée par HEVELIUS en 1645.

TABLE pour la moyenne Libration & les Pleines Lunes publiée dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences de l'Année 1692.

A. Mare Humorum. B. Mare Nubium. E. Mare Tranquillitatis F. Mare Serenitatis.
C. Mare Imbrium. D. Mare Nectaris. G. Mare Fœcunditatis. H. Mare Crisium.

II.

Table generale des Phases de la Lune selon la Sélenographie des P. P. Grimaldi et Riccioli.

Figures redressées de la Lune telles qu'on les voit dans la Lunette à quatre Verres convexes.



Selon RICCIOLI

a. Thales.
b. Endymion.
c. Zoroaster.
d *d*. Seneca, Plutarchus.
e. Mutus.
f. Cabeus.
g. Schillerus.
h. Bartolus.
i. Vieta.
k. Krisimannus
l. Riccioli.
m. Hevelius.
n. Cardanus.
o. Seleucus.
p. Pythagoras.
q. Anaximenes.
r. Anaximander.
s. Philolaus.
t. Anaxagoras.
u. Meton.
x. Euctemon.





Selon HEVELIUS

a. Montes Tarmatici.
b. Lacus Hyperboreus superior.
c. Palus Amadoca.
d *d*. Mons Alaunus.
e. Mons Dalanguer.
f. Mons Carmaniæ.
g. Lacus Meridionalis.
h. Mons Meridionalis.
i. Mons Eos.
k. Mons Pharan Arabiæ.
l. Stagnum Mœris.
m. Mons Pherme Ægypti.
n. Mons Africanus.
o. Mons Pendactylus.
p. 1
q. 2
r. 3
s. Montes Hyperborei 4
t. 5
u. 6
x. 7

On a rapporté ici les Noms des Taches qui ont servi à observer la Libration de la Lune.

disque apparent, ce qui feroit disparoître assez souvent ces mêmes régions à notre égard : mais c'est ce que l'on n'a jamais remarqué, ensorte qu'il faut que le Ciel y soit perpétuellement serein. Il ne paroît pas non plus que la Lune ait d'athmosphere, puisque les Planetes & les Etoiles fixes qui approchent de son bord, ne paroissent souffrir aucune réfraction.

Voyez cependant l'Observation du P. Feuillée Minime & celle de M. de la Hire en 1699.

Parmi les Observateurs qui ont tâché de représenter la figure de la Lune telle qu'on l'apperçoit avec les lunettes ordinaires, on connoît principalement **Langrenus*, *Hevelius*, *Grimaldi* & *Riccioli*. Ils ont sur-tout représenté dans leurs Selenographies les plus belles taches, & leur ont donné des noms afin qu'on pût mieux les reconnoître. Langrenus & Riccioli dans cette distribution n'ont employé d'autres noms que ceux de quelques personnes illustres ou des principaux Philosophes; ainsi chaque tache porte le nom d'un Roi, d'un Prince, d'un Philosophe, ou d'un Mathématicien. Mais Hevelius, qui appréhendoit les guerres civiles qui se seroient élevées à ce sujet entre les Philosophes modernes, au lieu de leur distribuer tout ce domaine, comme il se l'étoit proposé, jugea qu'il seroit plus à propos d'y appliquer des noms ** de notre Géographie. Il est vrai que ces taches ne ressemblent gueres, tant par rapport à leurs situations qu'à l'égard de leurs figures, aux mers & aux continents de notre terre dont ils portent le nom.

Joann. Hevelii Selenographia Gedani, Edit. ann. 1647.

* De toutes les figures de la Lune qui ont été publiées jusqu'à ce jour, on peut dire que celles qui ont été gravées en 1635 par le fameux Cl. *Mellan* par ordre de *Peiresc* sur les Observations de Gassendi (& qui consistent en trois phases dont l'une représente la Pleine Lune & les deux autres le Premier Quartier & le Décours) ont été regardées sans contredit comme les meilleures & les plus ressemblantes. Quoiqu'il n'y ait pas plus de 20 ans qu'elles soient devenues publiques, ces mêmes phases sont néantmoins des plus anciennes, puisqu'elles ont précédé celles d'Hévélius & de Riccioli, qui sont celles que l'on a le plus imitées & dont les Astronomes ont tâché de faire usage jusqu'à ce jour.

** On a recommandé jusqu'ici aux Astronomes ces noms géographiques, qui ne sçauroient leur devenir trop familiers, principalement à ceux qui veulent étudier dans *Ptolomée* la Géographie ancienne.

SUR LA PREMIERE EQUATION des Moyens Mouvemens de la Lune.

Le moyen Mouvement de la Lune eſt inégal ſelon les diverſes diſtances de la Terre au Soleil.

LA theorie de la Gravitation a confirmé entierement les inégalités qu'on avoit depuis longtems ſoupçonnées, & que les Aſtronomes commençoient déja à établir à l'égard du moyen mouvement de la Lune. Ce mouvement moyen ne ſçauroit être le même à chaque Lunaiſon, parce que l'orbite de la Lune ſe dilate, pour ainſi dire, plus ou moins par l'action du Soleil, ſelon que la Terre & la Lune ſe trouvent à une plus grande ou à une plus petite diſtance de cet Aſtre.

Le moyen Mouvement d'une Planete n'eſt ſuppoſé égal & uniforme, que parce que chacunes de ſes Révolutions périodiques ſont parfaitement égales ou de même durée.

Ce que l'on a dû entendre juſqu'ici par le moyen mouvement d'une Planete, n'eſt autre choſe, comme on l'a aſſés expliqué ci-deſſus, que le mouvement égal & uniforme d'un corps céleſte, que l'on feint employer le même intervalle de tems que la Planete, à revenir à l'Apogée, c'eſt-à-dire, préciſément au même point de l'orbite d'où on les auroit vu partir. On ſuppoſe pour cet effet que le corps céleſte parcourt la circonférence d'un cercle concentrique à l'orbite de la Planete; & afin de mieux établir les moyens mouvemens, au lieu de ne conſidérer que le tems d'une révolution ſur laquelle il eſt preſqu'impoſſible de ne pas commettre quelque erreur, les Aſtronomes y ont employé les intervalles les plus éloignés qui leur ſoient parvenus, comme de deux ou trois mille ans, pour que les erreurs inévitables des obſervations ſe puiſſent repartir autant de fois qu'il y a de révolutions écoulées. En effet, l'erreur ſur la révolution du Soleil devient par-là deux à trois mille fois moindre, & partant preſqu'inſenſible lorſqu'elle eſt déduite de révolutions auſſi éloignées; au lieu que ſi l'on n'eût jamais obſervé que deux révolutions conſécutives, l'erreur s'y trouveroit entiere, & s'accu-

muleroit prodigieuſement dans la ſuite. Au reſte l'orbite apparente du Soleil ou plûtôt l'orbite de la Terre ne change pas comme celle de la Lune, dont la figure eſt altérée ou varie continuellement dans l'eſpace d'une année, c'eſt-à-dire, à meſure que la Terre & par conſéquent la Lune qui eſt ſon Satellite, s'approche ou s'éloigne du Soleil. Auſſi les moyens mouvemens de la Lune que les Aſtronomes avoient établis autrefois de la même maniere que ceux du Soleil, ne doivent-ils plus être conſidérés que d'une maniere vague ou générale, comme on le va voir par ce qui ſuit; car puiſqu'il eſt certain que chacunes des révolutions de cette Planete à ſon Apogée ſont inégales ſelon les différentes Lunaiſons, on ne ſçauroit ſe diſpenſer d'introduire ici une nouvelle Equation qui puiſſe rétablir un mouvement moyen plus ou moins accéléré, ſelon qu'il eſt néceſſaire.

M. Newton ayant calculé l'Equation annuelle du moyen mouvement de la Lune, trouve (en ſuppoſant l'excentricité de l'orbite terreſtre de $17\frac{7}{8}$ ſur 1000 qui eſt le rayon du grand orbe) qu'elle peut aller à $11' 49''$; car l'action du Soleil eſt la plus grande lorſque la Terre eſt Périgée, & dilate par conſéquent pour lors, le plus qu'il eſt poſſible, l'orbite de la Lune. Au contraire elle eſt la plus petite lorſque la Terre eſt Apogée; ce qui fait qu'alors l'orbite lunaire ſe contracte, pour ainſi dire, davantage, la peſanteur de la Terre vers la Lune agiſſant en ce cas avec bien plus d'effet. Or lorſque l'orbite lunaire eſt la plus dilatée, la révolution de la Lune s'acheve plus lentement; & au contraire la vîteſſe de la Lune eſt la plus grande, lorſqu'environ ſix mois après l'orbite s'eſt contractée le plus qu'il eſt poſſible. Ainſi l'Equation annuelle qui en réſulte eſt la plus grande dans les moyennes diſtances de la Terre au Soleil, & doit être nulle, lorſque la Terre ſe trouve tant au Périhélie qu'à l'Aphélie.

L'Equation du moyen Mouvement de la Lune eſt toujours ſouſtractive, lorſque l'Equation du centre du Soleil eſt additive, & au contraire.

La même Théorie * a fait encore découvrir que lorſ-

* *Philoſoph.*

Natur. Princ. Math. lib. 3.

que la Terre eſt au Périhélie, l'action du Soleil qui eſt alors la plus grande, fait mouvoir l'Apogée & le Nœud de la Lune avec plus de vîteſſe qu'au tems de l'Aphélie, & cela en raiſon réciproque des cubes de la diſtance de la Terre au Soleil: les Equations du mouvement de l'Apogée & du Nœud qui en réſultent, ſont ainſi proportionnelles à l'Equation du centre du Soleil. Car le mouvement du Soleil (comme on le démontrera au chapitre XXIII.) eſt toûjours réciproquement comme le quarré de ſes diſtances à la Terre, en ſorte que les inégalités du mouvement de cet Aſtre produiſent dans les moyennes diſtances, ſuivant cette loi, la plus grande Equation du centre du Soleil, de $1^{\circ}\ 56'\ 26''$. (Ce qu'il faut entendre dans la ſuppoſition que cette plus grande Equation du centre répond à $17\frac{15}{16}$ qui ſeroit l'excentricité de l'orbite terreſtre.) Conſidérant d'ailleurs que ſi le mouvement réel du Soleil étoit réciproquement comme les cubes de ſa diſtance, la ſomme des inégalités qui en réſulteroient, produiroit la plus grande Equation poſſible, de $2^{\circ}\ 56'\ 09''$, il doit donc s'enſuivre que les plus grandes Equations des inégalités du mouvement de l'Apogée & du Nœud ſeront à $2^{\circ}\ 56'\ 09''$ comme les moyens mouvemens diurnes, tant de l'Apogée que du Nœud, ſont au moyen mouvement diurne du Soleil; c'eſt-à-dire, que la plus grande Equation du moyen mouvement de l'Apogée ſera de $19'\ 52''$ dans les moyennes diſtances de la Terre au Soleil, comme auſſi celle du Nœud, de $9'\ 27''$. Quant aux autres Equations, elles ſont, comme on l'a déja dit, proportionnelles à chacune des Equations du centre du Soleil; mais l'on voit aſſez que celle de l'Apogée doit s'ajoûter, au lieu que celle du Nœud (qui eſt rétrograde) doit ſe retrancher lorſque la Terre va du Périhélie à l'Aphélie, & que c'eſt le contraire lorſque la Terre deſcend de l'Aphélie à ſon Périhélie.

TABLES

TABLES

DU

SOLEIL

ET

DE LA LUNE.

Tables des Moyens Mouvemens du Soleil & de son Apogée.

Années Juliennes.	Moyens mouvemens.				Mouvemens de l'Apogée.				Mouvement des Etoiles fixes.		
	Signe.	D.	M.	S.	*Signe.*	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1	11	29	45	40	0	00	01	03	00	00	50
2	11	29	31	20	0	00	02	06	00	01	40
3	11	29	17	00	0	00	03	09	00	02	30
4 B	00	00	01	48	0	00	04	12	00	03	20
5	11	29	47	28	0	00	05	15	00	04	10
6	11	29	33	09	0	00	06	18	00	05	00
7	11	29	18	49	0	00	07	21	00	05	50
8 B	00	00	03	37	0	00	08	24	00	06	40
9	11	29	49	17	0	00	09	27	00	07	30
10	11	29	34	58	0	00	10	30	00	08	20
11	11	29	20	38	0	00	11	33	00	09	10
12 B	00	00	05	26	0	00	12	36	00	10	00
13	11	29	51	06	0	00	13	39	00	10	50
14	11	29	36	46	0	00	14	42	00	11	40
15	11	29	22	27	0	00	15	45	00	12	30
16 B	00	00	07	15	0	00	16	48	00	13	20
17	11	29	52	55	0	00	17	51	00	14	10
18	11	29	38	35	0	00	18	54	00	15	00
19	11	29	24	15	0	00	19	57	00	15	50
20 B	00	00	09	04	0	00	21	00	00	16	40
21	11	29	54	44	0	00	22	03	00	17	30
22	11	29	40	24	0	00	23	06	00	18	20
23	11	29	26	04	0	00	24	09	00	19	10
24 B	00	00	10	53	0	00	25	12	00	20	00
25	11	29	56	33	0	00	26	15	00	20	50
26	11	29	42	13	0	00	27	18	00	21	40
27	11	29	27	53	0	00	28	21	00	22	30
28 B	00	00	12	42	0	00	29	24	00	23	20
29	11	29	58	22	0	00	30	27	00	24	10
30	11	29	44	02	0	00	31	30	00	25	00
31	11	29	29	42	0	00	32	33	00	25	50
32 B	00	00	14	30	0	00	33	36	00	26	40
33	00	00	00	10	0	00	34	39	00	27	30
34	11	29	45	50	0	00	35	42	00	28	20
35	11	29	31	30	0	00	36	45	00	29	10
36 B	00	00	16	19	0	00	37	48	00	30	00
37	00	00	01	59	0	00	38	51	00	30	50
38	11	29	47	39	0	00	39	54	00	31	40
39	11	29	33	19	0	00	40	57	00	32	30
40 B	00	00	18	08	0	00	42	00	00	33	20
60 Bissextiles	00	00	27	12	0	01	03	00	00	50	00
80 Bissextiles	00	00	36	16	0	01	24	00	01	06	40
100 Bissextiles	00	00	45	20	0	01	45	00	01	23	20
200 Bissextiles	00	01	30	40	0	03	30	00	02	46	40
400 Bissextiles	00	03	01	20	0	07	00	00	05	33	20
600 Bissextiles	00	04	32	00	0	10	30	00	08	20	00
800 Bissextiles	00	06	02	40	0	14	00	00	11	06	40
1000 Bissextiles	00	07	33	20	0	17	30	00	13	53	20
2000	00	15	06	40	1	05	00	00	27	46	40
3000	00	22	40	00	1	22	30	00	41	40	00
4000	01	00	13	20	2	10	00	00	55	33	20
5000	01	07	46	40	2	27	30	00	69	26	40
6000	00	15	20	00	3	15	00	00	83	20	00

Epoques des mouvemens du Soleil réduites au Méridien de PARIS.

Années.	Longitude moyen. du Soleil.				Lieu de l'Apogée du Soleil.			
	S.	D.	M.	S.	S.	D.	M.	S.
1581 Greg.	9	19	49	03	3	05	38	30
1582	9	19	34	43	3	05	39	33
1582	9	09	43	20	3	05	39	31
1603	9	10	06	44	3	05	59	28
1661	9	10	33	56	3	07	02	28
1662	9	10	19	36	3	07	03	31
1663	9	10	05	16	3	07	04	34
1664 B	9	10	50	04	3	07	05	37
1665	9	10	35	45	3	07	06	40
1666	9	10	21	25	3	07	07	43
1667	9	10	07	05	3	07	08	46
1668 B	9	10	51	53	3	07	09	49
1669	9	10	37	34	3	07	10	52
1670	9	10	23	15	3	07	11	55
1671	9	10	08	55	3	07	12	58
1672 B	9	10	53	43	3	07	14	01
1673	9	10	39	23	3	07	15	04
1674	9	10	25	03	3	07	16	07
1675	9	10	10	44	3	07	17	10
1676 B	9	10	55	31	3	07	18	13
1677	9	10	41	12	3	07	19	16
1678	9	10	26	52	3	07	20	19
1679	9	10	12	32	3	07	21	22
1680 B	9	10	57	20	3	07	22	25
1681	9	10	43	00	5	07	23	28
1682	9	10	28	40	3	07	24	31
1683	9	10	14	20	3	07	25	34
1684 B	9	10	59	08	3	07	26	37
1685	9	10	44	49	3	07	27	40
1686	9	10	30	29	3	07	28	43
1687	9	10	16	09	3	07	29	46
1688 B	9	10	00	57	3	07	30	49
1689	9	10	46	37	3	07	31	52
1690	9	10	32	18	3	07	32	55
1691	9	10	17	58	3	07	33	58
1692 B	9	10	02	46	3	07	35	01
1693	9	10	48	26	3	07	36	04
1694	9	10	34	06	3	07	37	07
1695	9	10	19	46	3	07	38	10
1696 B	9	10	04	34	3	07	39	13
1697	9	10	50	14	3	07	40	16
1698	9	10	35	54	3	07	41	19
1699	9	10	21	34	3	07	42	22
1700	9	10	07	15	3	07	43	25
1701	9	09	52	55	3	07	44	28
1702	9	09	38	35	3	07	45	31
1703	9	09	24	15	3	07	46	34
1704 B	9	10	09	03	3	07	47	37
1705	9	09	54	43	3	07	48	40
1706	9	09	40	23	3	07	49	43
1707	9	09	26	03	3	08	50	46
1708 B	9	10	10	52	3	08	51	49
1709 Greg.	9	09	56	32	3	07	52	52
1710	9	09	42	12	3	07	53	55
1711	9	09	27	52	3	07	54	58
1712 B	9	10	12	41	3	07	56	01
1713	9	09	58	21	3	07	57	04
1714	9	09	44	01	3	07	58	07
1715	9	09	29	41	3	07	59	10
1716 B	9	10	14	30	3	08	00	13
1717	9	10	00	10	3	08	01	16
1718	9	09	45	50	3	08	02	19
1719	9	09	31	30	3	08	03	22
1720 B	9	10	16	19	3	08	04	25
1721	9	10	01	59	3	08	05	28
1722	9	09	47	39	3	08	06	31
1723	9	09	33	19	3	08	07	34
1724 B	9	10	18	08	3	08	08	37
1725	9	10	03	48	3	08	09	40
1726	9	09	49	28	3	08	10	43
1727	9	09	35	08	3	08	11	46
1728 B	9	10	19	57	3	08	12	49
1729	9	10	05	37	3	08	13	52
1730	9	09	51	17	3	08	14	55
1731	9	09	36	57	3	08	15	58
1732 B	9	10	21	45	3	08	17	01
1733	9	10	07	25	3	08	18	04
1734	9	09	53	05	3	08	19	07
1735	9	09	38	46	3	08	20	10
1736 B	9	10	23	34	3	08	21	13
1737	9	10	09	14	3	08	22	16
1738	9	09	54	54	3	08	23	19
1739	9	09	40	34	3	08	24	22
1740 B	9	10	25	23	3	08	25	25
1741	9	10	11	03	3	08	26	28
1742	9	09	56	43	3	08	27	31
1743	9	09	42	23	3	08	28	34
1744 B	9	10	27	11	3	08	29	37
1745	9	10	12	52	3	08	30	40
1746	9	09	58	32	3	08	31	43
1747	9	09	44	12	3	08	32	46
1748 B	9	10	29	00	3	08	33	49
1749	9	10	14	40	3	08	34	52
1750	9	10	00	21	3	08	35	55
1751	9	09	46	01	3	08	36	58
1752 B	9	10	30	49	3	08	38	01
1753	9	10	16	29	3	08	39	04
1754	9	10	02	09	3	08	40	07
1755	9	09	47	50	3	08	41	10
1756 B	9	10	32	38	3	08	42	13
1757	9	10	18	18	3	08	43	16
1758	9	10	03	58	3	08	44	19
1759	9	09	49	38	3	08	45	22
1760 B	9	10	34	27	3	08	46	25

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DU SOLEIL
Pour les Jours de l'Année.

Années Bissextiles.	Années Communes.	JANVIER. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.	FEVRIER. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.
Jours	*Jours*	S. D. M. S.	S.	S. D. M. S.	S.
1	0	0.00.00.00.	00	1.00.33.18.	05
2	1	0.00.59.08.		1.01.32 27.	
3	2	0.01.58.17.		1.02.31.35.	
4	3	0.02.57.25.		1.03.30.43.	
5	4	0.03.56.33.		1.04.29.52.	
6	5	0.04 55.42.		1.05.29.00.	
7	6	0.05.54.50.	01	1.06.28.08.	06
8	7	0.06.53.58.		1.07.27.16.	
9	8	0.07.53.07.		1.08.26.25.	
10	9	0.08.52.15.		1.09.25.33.	
11	10	0.09.51.23		1.10.24.41.	
12	11	0.10.50.32.	02	1.11.23.50.	07
13	12	0.11.49.40.		1.12 22.58.	
14	13	0.12.48.48.		1.13 22.06.	
15	14	0.13.47.57.		1.14.21.15.	
16	15	0.14.47.05.		1.15.20.23.	
17	16	0.15.46.13		1.16.19.31.	
18	17	0.16.45.22.	03	1.17.18.40.	08
19	18	0.17.44.30.		1.18.17.48.	
20	19	0.18.43.38.		1.19.16.56.	
21	20	0.19.42.47.		1.20.16.04.	
22	21	0.20.41.55.		1.21.15.12.	
23	22	0.21.41.03.		1.22.14.21.	
24	23	0.22.40.12	04	1.23.13.30.	09
25	24	0.23.39.20.		1.24.12.38.	
26	25	0.24.38.28.		1.25.11.46.	
27	26	0.25.37.37.		1.26.10.55.	
28	27	0.26.36.45.		1.27 10.03.	
29	28	0.27.35.53.		1.28.09.11.	10
30	29	0.28.35.02.	05		
31	30	0.29.34.10.			
	31	1.00.33.18.			

Années Communes ou Bissextiles.	MARS. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.	AVRIL. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.
Jours	S. D. M. S.	S.	S. D. M. S.	S.
1	1.29.08.20.	10	2.29.41.38.	16
2	2 00.07.28.		3.00.40.46.	
3	2.01.06.36.		3.01.39.55.	
4	2.02.05.45.		3.02.39.03.	
5	2.03.04.53.	11	3.03.38.11.	
6	2.04.04.01.		3.04.37.20.	17
7	2.05.03.10.		3.05.36.27.	
8	2.06.02.18.		3.06.35.36.	
9	2.07.01.26.		3.07.34.45.	
10	2.08 00.35.	12	3.08.33.53.	
11	2.08.59.43.		3.09.33.01.	
12	2.09.58.51.		3.10.32.10.	18
13	2.10.58.00.		3.11.31.18.	
14	2.11.57.08.		3.12.30.26.	
15	2.12.56.16.		3.13.29.35.	
16	2.13.55.25.	13	3.14 28.43.	
17	2.14.54.33.		3.15.27.51.	
18	2.15.53.41.		3.16.27.00.	19
19	2.16.52.50.		3.17.26.08.	
20	2.17.51.58.		3.18.25.16.	
21	2.18.51.06.		3.19.24.24.	
22	2.19.50.15.	14	3.20.23.33.	
23	2.20.49.23.		3.21.22.41.	
24	2.21.48.31.		3.22.21.49.	20
25	2.22.47.40.		3.23.20.58.	
26	2.23.46.48.		3.24.20.06.	
27	2.24.45.56.	15	3.25.19.14.	
28	2.25.45.05.		3.26.18.23.	
29	2.26.44.13.		3.27.17.31.	
30	2.27.43.21.		3.28.16.39.	21
31	2.28.42.30.			

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DU SOLEIL
Pour les Jours de l'Année.

Années Communes ou Bissextiles.	MAI. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.	JUIN. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.
JOURS	S. D. M. S.	S.	S. D. M. S.	S.
1	3.29.15.48.	21	4.29.49.06.	26
2	4.00.14.56.		5.00.48.14	
3	4.01.14.04.		5.01.47.23.	
4	4.02.13.13.		5.02.46.31.	
5	4.03.12 21.		5.03.45.39.	27
6	4.04.11.29.	22	5.04.44.48.	
7	4.05.10.38.		5.05.43.56.	
8	4.06.09.46.		5.06.43.04.	
9	4.07.08.54.		5.07.42.13.	
10	4.08.08.03.		5.08.41.21.	
11	4.09.07.11.		5.09.40.29	28
12	4.10.06.19.	23	5.10.39.38.	
13	4.11.05.28.		5.11.38.46.	
14	4.12.04.36.		5.12.37.54.	
15	4.13.03.44.		5.13.37.03.	
16	4.14.02.53.		5.14.36.11.	29
17	4.15.02.01.		5.15.35.19.	
18	4.16.01.09.	24	5.16.34.28.	
19	4.17.00.18.		5.17.33.36.	
20	4.17.59 26		5.18.32.44.	
21	4.18.58.34.		5.19.31.53.	
22	4.19.57.42.		5.20.31.01.	30
23	4.20 56.51.		5.21.30.09.	
24	4.21.55.59.	25	5.22.29.18.	
25	4.22.55.08.		5.23.28.26.	
26	4.23.54.16.		5.24.27.34.	
27	4.24.53.24.		5.25.26.43.	
28	4.25.52.33.		5.26.25.51.	31
29	4.26 51.41.		5.27.24.59.	
30	4.27.50.49.	26	5.28.24.08.	
31	4.28.49.58.			

Années Communes ou Bissextiles.	JUILLET. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.	AOUST. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.
JOURS	S. D. M. S.	S.	S. D. M. S.	S.
1	5.29.23.16.	31	6.29.56.34.	37
2	6.00.22.24.		7.00.55.42.	
3	6.01.21.32		7.01.54.51.	
4	6.02.20.40.	32	7.02.53.59.	
5	6.03.19.49.		7.03.53.07.	
6	6.04.18.57.		7.04.52.16.	38
7	6.05.18.06.		7.05.51.24	
8	6.06.17.14.		7.06.50.32.	
9	6.07.16.22.		7.07.49 41.	
10	6.08.15.31.	33	7.08 48.49.	
11	6.09.14.39.		7.09.47.57.	
12	6.10.13.47.		7.10.47.06.	39
13	6.11.12.56.		7.11.46.14.	
14	6.12.12.04.		7.12.45.22.	
15	6.13.11.12.	34	7.13.44 31.	
16	6.14.10.21.		7.14 43.39.	
17	6.15.09.29.		7.15.42.47.	40
18	6.16.08.37.		7.16.41.56.	
19	6.17.07.46.		7.17.41.04.	
20	6 18 06.54.		7.18.40.12.	
21	6.19.06.02.		7.19.39.21.	
22	6.20.05.11.	35	7.20.38.29.	
23	6.21.04.19.		7.21.37.37.	41
24	6.22.03.27.		7.22.36.46.	
25	6.23.02.36.		7.23.35.54.	
26	6.24.01.44.	36	7.24.35.02.	
27	6.25.00.52.		7.25.34.11.	
28	6.26.00.01.		7.26.33.19.	
29	6.26.59.09.		7.27.32.27.	42
30	6 27.58 17.		7.28.31.36.	
31	6.28.57.26.		7.29.30.44.	

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DU SOLEIL
Pour les Jours de l'Année

Années Communes ou Bissextiles.	SEPTEMB. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.	OCTOBRE. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.
JOURS	S. D. M. S.	S.	S. D. M. S.	S.
1	8.00.29.52.	42	9.00.04.02.	47
2	8.01.29.01.		9.01.03.10.	
3	8.02.28.09.		9.02.02.19.	
4	8.03 27 17.		9.03.01.27.	
5	8.04.26.36.		9.04.00.35.	
6	8.05.25.34.	43	9.04.59.44.	48
7	8.06 24.42.		9.05.58.52.	
8	8.07.23.51.		9.06.58 00.	
9	8.08.22 59.		9.07.57.08.	
10	8.09.22.07.		9.08.56.17.	
11	8.10.21.16.		9.09.55.25.	
12	8.11.20.24.	44	9.10.54.34.	49
13	8.12.19.32.		9.11.53.42.	
14	8.13.18.41.		9.12.52.50.	
15	8.14.17.49.		9.13.51.59.	
16	8.15.16.57.		9.14.51.07.	
17	8.16.16.05.		9.15.50.15.	
18	8.17.15.14	45	9.16 49.24.	50
19	8.18.14.22.		9.17.48.32.	
20	8.19.13.30.		9.18.47.40.	
21	8.20.12.39.		9.19.46.49.	
22	8 21.11.47.		9.20.45.57.	
23	8.22.10.55		9.21.45.05.	
24	8.23.10.04.	46	9.22.44.14.	51
25	8 24.09.12.		9.23.43.22.	
26	8.25.08.20.		9.24.42.30.	
27	8.26.07.29.		9.25.41.39.	
28	8.27.06.37.		9.26.40.47.	
29	8.28.05.45.		9.27 39.55.	
30	8.29.04.54.	47	9.28.39.04.	
31			9.29.38.12.	52

Années Communes ou Bissextiles.	NOVEMB. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.	DECEMB. Moyen mouvement du Soleil.	Apogée.
JOURS	S. D M. S.	S.	S. D. M. S.	S.
1	10.00.37.20	52	11.00.11.30	
2	10.01.36.29		11.01.10.38	58
3	10.02.35.37		11.02.09.47	
4	10.03.34.45		11.03.08.55	
5	10.04.33.54	53	11.04.08.03	
6	10.05.33.02		11.05.07.12	
7	10.06.32.10		11 06.06.20	59
8	10.07.31.19		11.07 05.28	
9	10.08.30.27		11.08.04.37	
10	10.09.29.35	54	11.09.03.45	
11	10.10.28 44		11.10.02.53	
12	10.11.27.52		11.11.02.02	
13	10.12.27 00		11.12.01.10	60
14	10.13.26.09		11.13.00.18	
15	10.14.25.17	55	11.13 59.27	
16	10.15.24.25		11.14.58.35	
17	10.16.23.34		11.15.57.43	
18	10.17.22.42		11.16.56.52	
19	10.18.21.50		11.17.56.00	61
20	10.19.20.59		11.18.55.08	
21	10.20.20.07	56	11.19.54.17	
22	10.21.19.15		11.20.53.25	
23	10.22.18.24		11.21.52.33	
24	10 23.17.32		11.22.51.42	
25	10.24.16.40		11.23.50.50	62
26	10.25.15.49		11.24.49.58	
27	10.26.14.57	57	11.25.49.07	
28	10.27 14.05		11.26.48.15	
29	10.28.13.13		11.27.47.23	
30	10.29.12.22		11.28.46.32	
31			11.29.45.40	63

SUITE DE LA TABLE DES MOYENS MOUVEMENS DU SOLEIL.

Heures	D. M. S.			Heures	D. M. S.		
M.	M. S. T.			M.	M. S. T.		
S.	S. T. Q.			S.	S. T. Q.		
0	0	00	00	30	1	13	55
1	0	02	28	31	1	16	23
2	0	04	56	32	1	18	51
3	0	07	24	33	1	21	19
4	0	09	51	34	1	23	47
5	0	12	19	35	1	26	14
6	0	14	47	36	1	28	42
7	0	17	15	37	1	31	10
8	0	19	43	38	1	33	38
9	0	22	11	39	1	36	06
10	0	24	38	40	1	38	34
11	0	27	06	41	1	41	02
12	0	29	34	42	1	43	29
13	0	32	02	43	1	45	57
14	0	34	30	44	1	48	25
15	0	36	58	45	1	50	53
16	0	39	25	46	1	53	21
17	0	41	53	47	1	55	49
18	0	44	21	48	1	58	16
19	0	46	49	49	2	00	44
20	0	49	17	50	2	03	12
21	0	51	45	51	2	05	40
22	0	54	13	52	2	08	08
23	0	56	40	53	2	10	36
24	0	59	08	54	2	13	03
25	1	01	36	55	2	15	31
26	1	04	04	56	2	17	59
27	1	06	32	57	2	20	27
28	1	09	00	58	2	22	55
29	1	11	27	59	2	25	23
30	1	13	55	60	2	27	50

TABLE DU DEMI-DIAMETRE DU MOUVEMENT HORAIRE, ET DE LA PARALLAXE DU SOLEIL.

ANOMALIE MOYENNE DU SOLEIL.

	Demi-diametre.		Mouv. Horaire.		Parall.	
Sig. D.	M.	S.	M.	S.	S.	
O. 0	15	50	2	23	$14\frac{1}{4}$	XII. 0
6	15	50	2	23		24
12	15	50	2	23		18
18	15	50	2	23		12
24	15	51	2	23		6
I. 0	15	52	2	23		XI. 0
6	15	53	2	24		24
12	15	54	2	24		18
18	15	55	2	24		12
24	15	56	2	25		6
II. 0	15	58	2	25		X. 0
6	15	59	2	26		24
12	16	1	2	26		18
18	16	2	2	27		12
24	16	4	2	27		6
III. 0	16	6	2	28	15	IX. 0
6	16	8	2	28		24
12	16	9	2	29		18
18	16	11	2	29		12
24	16	13	2	30		6
IV. 0	16	14	2	30		VIII. 0
6	16	15	2	31		24
12	16	17	2	31		18
18	16	19	2	32		12
24	16	20	2	32		6
V. 0	16	21	2	32		VII. 0
6	16	22	2	33		24
12	16	22	2	33		18
18	16	22	2	33		12
24	16	23	2	33		6
VI. 0	16	23	2	33	$15\frac{1}{4}$	VI. 0

	Demi-diametre.		Mouv. Horaire.		Parall.	

ANOMALIE MOYENNE DU SOLEIL.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DU SOLEIL.

Otez en descendant.

Anomalie moyenne du *Soleil*.

Anomalie moyenne.	O. Signe. D. M. S.	Différence M. S.	I. D. M. S.	Différence M. S.	II. D. M. S.	Différence M. S.	Anomalie moyenne.
0	0 00 00	1 59	0 57 07	1 43	1 39 41	1 01	30
1	0 01 59	2 00	0 58 51	1 42	1 40 42	0 59	29
2	0 03 59	1 59	1 00 33	1 42	1 41 41	0 58	28
3	0 05 58	1 59	1 02 15	1 40	1 42 39	0 56	27
4	0 07 57	1 59	1 03 55	1 40	1 43 35	0 54	26
5	0 09 56	1 59	1 05 35	1 39	1 44 29	0 52	25
6	0 11 55	1 58	1 07 14	1 37	1 45 21	0 50	24
7	0 13 53	1 58	1 08 51	1 36	1 46 11	0 49	23
8	0 15 51	1 58	1 10 27	1 34	1 47 00	0 46	22
9	0 17 49	1 58	1 12 01	1 34	1 47 46	0 45	21
10	0 19 47	1 58	1 13 35	1 32	1 48 31	0 42	20
11	0 21 45	1 57	1 15 07	1 31	1 49 13	0 40	19
12	0 23 42	1 56	1 16 38	1 29	1 49 53	0 39	18
13	0 25 38	1 57	1 18 07	1 29	1 50 32	0 37	17
14	0 27 35	1 55	1 19 36	1 27	1 51 09	0 35	16
15	0 29 30	1 55	1 21 03	1 25	1 51 44	0 33	15
16	0 31 25	1 55	1 22 28	1 23	1 52 17	0 31	14
17	0 33 20	1 54	1 23 51	1 23	1 52 48	0 28	13
18	0 35 14	1 54	1 25 14	1 21	1 53 16	0 27	12
19	0 37 08	1 53	1 26 35	1 20	1 53 43	0 24	11
20	0 39 01	1 52	1 27 55	1 18	1 54 07	0 23	10
21	0 40 53	1 51	1 29 13	1 15	1 54 30	0 20	9
22	0 42 44	1 51	1 30 29	1 14	1 54 50	0 19	8
23	0 44 35	1 50	1 31 43	1 13	1 55 09	0 16	7
24	0 46 25	1 49	1 32 56	1 12	1 55 25	0 14	6
25	0 48 14	1 48	1 34 08	1 10	1 55 39	0 12	5
26	0 50 02	1 48	1 35 18	1 08	1 55 51	0 10	4
27	0 51 50	1 46	1 36 26	1 07	1 56 01	0 08	3
28	0 53 36	1 46	1 37 33	1 05	1 56 09	0 06	2
29	0 55 22	1 45	1 38 38	1 03	1 56 15	0 04	1
30	0 57 07		1 39 41		1 56 19		0
Anom. moy.	XI.		X.		IX.		Anom. moy.

Anomalie moyenne du *Soleil*.

Ajoutez en montant.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DU SOLEIL.

Otez en descendant.

Anomalie moyenne du *Soleil.*

Anomalie moyenne.	III. D. M. S.	Différence M. S.	IV. D. M. S.	Différence M. S.	V. D. M. S.	Différenc. M. S.	Anomalie moyenne.
0	1 56 19	0 01	1 41 48	1 00	0 59 15	1 49	30
1	1 56 20	0 01	1 40 48	1 02	0 57 26	1 49	29
2	1 56 19	0 03	1 39 46	1 05	0 55 37	1 49	28
3	1 56 16	0 04	1 38 41	1 06	0 53 48	1 51	27
4	1 56 12	0 07	1 37 35	1 08	0 51 57	1 52	26
5	1 56 05	0 09	1 36 27	1 10	0 50 05	1 52	25
6	1 55 56	0 11	1 35 17	1 12	0 48 13	1 54	24
7	1 55 45	0 14	1 34 05	1 13	0 46 19	1 54	23
8	1 55 31	0 16	1 32 52	1 15	0 44 25	1 55	22
9	1 55 15	0 17	1 31 37	1 17	0 42 30	1 56	21
10	1 54 58	0 20	1 30 20	1 19	0 40 34	1 57	20
11	1 54 38	0 22	1 29 01	1 20	0 38 37	1 57	19
12	1 54 16	0 24	1 27 41	1 22	0 36 40	1 59	18
13	1 53 52	0 26	1 26 19	1 24	0 34 41	1 59	17
14	1 53 26	0 28	1 24 55	1 25	0 32 42	1 59	16
15	1 52 58	0 31	1 23 30	1 27	0 30 43	2 00	15
16	1 52 27	0 32	1 22 03	1 28	0 28 43	2 01	14
17	1 51 55	0 35	1 20 35	1 30	0 26 42	2 01	13
18	1 51 20	0 36	1 19 05	1 32	0 24 41	2 02	12
19	1 50 44	0 39	1 17 33	1 33	0 22 39	2 02	11
20	1 50 05	0 41	1 16 00	1 34	0 20 37	2 03	10
21	1 49 24	0 42	1 14 26	1 36	0 18 34	2 03	9
22	1 48 42	0 45	1 12 50	1 37	0 16 31	2 03	8
23	1 47 57	0 46	1 11 13	1 39	0 14 28	2 04	7
24	1 47 11	0 49	1 09 34	1 40	0 12 24	2 03	6
25	1 46 22	0 51	1 07 54	1 41	0 10 21	2 04	5
26	1 45 31	0 53	1 06 13	1 42	0 08 17	2 04	4
27	1 44 38	0 55	1 04 31	1 44	0 06 13	2 04	3
28	1 43 43	0 56	1 03 47	1 45	0 04 09	2 05	2
29	1 42 47	0 59	1 01 02	1 47	0 02 04	2 04	1
30	1 41 48		0 59 15		0 00 00		0
Anom. moy.	VIII.		VII.		VI.		Anom. moy.

Anomalie moyenne du *Soleil.*

Ajoutez en montant.

I. TABLE DE L'EQUATION DU TEMS.

Otez en descendant.

Anomalie moyenne du Soleil.

Anom. moyen.	O.	I.	II.	III.	IV.	V.	Anom. moyen.
D	M S	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	D.
0	0. 00	3. 48	6. 39	7. 45	6. 47	3. 57	30
1	0. 08	3. 55	6. 43	7. 45	6. 43	3. 50	29
2	0. 16	4. 02	6. 47	7. 45	6. 35	3. 42	28
3	0. 24	4. 05	6. 50	7. 45	6. 53	3. 35	27
4	0. 32	4. 15	6. 54	7. 45	6. 30	3. 28	26
5	0. 40	4. 22	6. 58	7. 44	6. 26	3. 20	25
6	0. 48	4. 25	7. 01	7. 44	6. 21	3. 13	24
7	0. 55	4. 31	7. 05	7. 43	6. 16	3. 05	23
8	1. 03	4. 42	7. 08	7. 42	6. 11	2. 57	22
9	1. 11	4. 48	7. 11	7. 41	6. 06	2. 50	21
10	1. 19	4. 54	7. 14	7. 40	6. 01	2. 42	20
11	1. 27	5. 00	7. 17	7. 38	5. 56	2. 34	19
12	1. 35	5. 06	7. 19	7. 37	5. 51	2. 26	18
13	1. 42	5. 12	7. 22	7. 35	5. 45	2. 18	17
14	1. 50	5. 18	7. 24	7. 34	5. 40	2. 11	16
15	1. 58	5. 24	7. 27	7. 32	5. 34	2. 03	15
16	2. 06	5. 30	7. 29	7. 30	5. 28	1. 55	14
17	2. 13	5. 35	7. 31	7. 28	5. 22	1. 47	13
18	2. 21	5. 41	7. 33	7. 25	5. 16	1. 39	12
19	2. 28	5. 46	7 35	7. 23	5. 10	1. 30	11
20	2. 36	5. 52	7. 36	7. 20	5. 04	1. 22	10
21	2. 44	5. 57	7. 38	7. 17	4. 58	1. 14	9
22	2. 51	6. 02	7. 39	7. 15	4. 52	1. 06	8
23	2. 58	6. 07	7. 40	7. 12	4. 45	0. 58	7
24	3. 06	6. 12	7. 41	7. 09	4. 38	0. 49	6
25	3. 13	6. 16	7. 42	7. 06	4. 31	0. 41	5
26	3. 20	6. 21	7. 43	7. 02	4. 25	0. 33	4
27	3. 27	6. 26	7. 44	6. 59	4. 18	0. 25	3
28	3. 34	6. 30	7. 44	6. 55	4. 11	0. 16	2
29	3. 41	6. 34	7. 45	6. 51	4. 04	0. 08	1
30	3. 48	6. 39	7. 45	6. 47	3. 57	0. 00	0
Anom. moyen.	XI.	X.	IX.	VIII.	VII.	VI.	Anom. moyen.

Anomalie moyenne du Soleil.

Ajoutez en montant.

Supposant l'Equation du centre du Soleil $\left\{\begin{matrix} 1^{d} & 56' & 26'' \\ 1 & 55 & 20 \end{matrix}\right\}$ On a $\left\{\begin{matrix} 0^{h} & 07' & 45''\frac{1}{2} \\ 0 & 07 & 41\frac{1}{2} \end{matrix}\right\}$

II. TABLE DE L'EQUATION DU TEMS.

Otez en descendant.

Lieu du Soleil.

Lieu du Soleil.	♈ ♎	♉ ♏	♊ ♐	Lieu du Soleil.
	0 6	1 7	2 8	
D.	M. S.	M. S.	M. S.	D.
0	0 00	8 24	8 45	30
1	0 20	8 34	8 35	29
2	0 40	8 44	8 24	28
3	1 00	8 54	8 13	27
4	1 19	9 02	8 01	26
5	1 39	9 10	7 48	25
6	1 59	9 17	7 34	24
7	2 18	9 24	7 20	23
8	2 37	9 30	7 06	22
9	2 57	9 35	6 50	21
10	3 16	9 40	6 35	20
11	3 34	9 44	6 18	19
12	3 52	9 48	6 02	18
13	4 10	9 50	5 44	17
14	4 28	9 52	5 27	16
15	4 46	9 53	5 08	15
16	5 04	9 54	4 50	14
17	5 20	9 54	4 31	13
18	5 37	9 53	4 11	12
19	5 53	9 51	3 52	11
20	6 09	9 49	3 32	10
21	6 25	9 46	3 11	9
22	6 40	9 42	2 51	8
23	7 54	9 37	2 30	7
24	7 09	9 31	2 09	6
25	7 23	9 25	1 48	5
26	7 36	9 19	1 26	4
27	7 48	9 12	1 05	3
28	8 01	9 04	0 43	2
29	8 13	8 55	0 22	1
30	8 24	8 24	0 00	0
Lieu du Soleil.	11 5	10 4	9 3	Lieu du Soleil.
	♌ ♍	♒ ♑	♓ ♋	

Lieu du Soleil.

Ajoutez en montant.

Cette Table & la précédente servent à réduire le Tems vrai ou Apparent en Tems moyen.

AVERTISSEMENT.

LEs Tables de la Lune que l'on donne ici sont dues principalement aux grandes découvertes que M. Newton a faites dans la Théorie de cette Planete : on avoit regardé jusqu'ici comme les meilleures celles que Flamsteed publia pour la seconde fois il y a plus de 60 ans dans le cours de Mathématique du Chevalier J. Moore ; mais ces Tables étant encore fort imparfaites, l'Auteur s'appliqua depuis à les perfectionner, en y substituant la plus grande partie de celles que l'on trouve ici. Quoique ces dernieres Tables de Flamsteed n'ayent pas été publiées, on ne sçauroit assurer cependant si c'est uniquement parce qu'elles n'étoient pas achevées. Dans l'état où elles se trouvoient lorsqu'elles nous ont été communiquées, on jugea d'abord qu'il n'y manquoit que la Table qui sert à calculer les Latitudes : encore cette Table étoit-elle déja commencée.

Cependant comme Flamsteed n'y avoit inseré que trois Tables différentes de l'Equation du centre de la Lune, en supposant la plus grande Equation possible de chaque orbite, de cinq, six & sept degrés on n'a pas été long-tems sans reconnoître combien il seroit incommode de faire usage de ces Tables toutes les fois que l'Apogée de la Lune ou le grand Axe de son orbite viendroit à se rencontrer dans la ligne des Sisigies ; car la plus grande Equation possible est alors de $7^{o}\ 39'\ \frac{1}{2}$. On a donc entrepris de calculer rigoureusement une quatrieme Table d'Equation en y employant la solution du Probleme de Kepler, donnée par M. Newton.

En construisant cette quatrieme Table de l'Equation du centre de la Lune, on a déterminé en même-tems les distances de la Planete au foyer, ce qui a encore augmenté les Tables des Parallaxes & Diametres de la Lune qui ne se trouvoient pas calculées, pour la plus grande excentricité possible, dans les Tables manuscrites de Flamsteed.

Au reste, il est nécessaire de reconnoître ici que dès l'an 1640 Bouillaud & Horoxius avoient certainement contribué à l'avancement de la Théorie de la Lune : leurs Ouvrages ont fait connoître à tous les Astronomes que l'orbite lunaire ne conservoit pas constamment la même figure, mais qu'elle répondoit successivement à différentes Ellipses ; en un mot qu'elle changeoit son excentricité : ceci ne fut pas d'abord adopté unanimement, parce que les orbites du Soleil & des Planetes étant invariables, la plûpart des Modernes en avoient jugé de même à l'égard de la Lune qui est notre Satellite. Cependant Flamsteed s'est fondé principalement sur la variation Apparente du diametre de la Lune Perigée observée dans les Pleines Lunes & aux Quadratures. La découverte de cette variation Apparente étoit due, comme on l'a déja dit, à la vigilance de M. Picard, & en 1672 Flamsteed confirma la même chose par ses propres Observations. Par là on ne pouvoit plus ignorer la véritable cause de cette seconde inégalité de la Lune introduite par Ptolomée au Tems des Quadratures.

Anciennement avant l'Almageste, on ne connoissoit qu'une seule Equation dans la Lune, & cette premiere Equation qu'Hypparque avoit reconnue par les Observations d'un grand nombre d'Eclipses n'alloit gueres qu'à cinq degrés : mais la seconde inégalité de la Lune qui se fit appercevoir au tems de quelques Quadratures selon Ptolomée, supposoit comme l'on voit une orbite bien différente, puisqu'il ne falloit pas moins qu'augmenter la plus grande Equation d'environ deux degrés & demi. Flamsteed a donc senti la nécessité de calculer diverses Tables d'Equations, & il a publié le premier les deux différentes Tables qui représentoient toutes les Equations du centre dans les Ellipses de la plus grande & de la plus petite excentricité. Ces Tables sont imprimées à la fin des Ouvrages d'Horoxius. D'un autre côté la troisieme inégalité de la Lune découverte par Tycho-Brahé ne pouvoit être confondue avec les deux premieres, puisque lorsqu'elle est la plus grande, la Lune se trouve dans les Octans. Aussi a-t-on eu soin de séparer ces trois inégalités les unes des autres, comme dépendantes de causes très-différentes : il en a fallu séparer aussi les Tables de corrections qui conviennent au Moyen Mouvement, de la Lune, de son Apogée & de son Nœud, lesquelles ont été proposées d'abord sous différents titres par les Astronomes du dernier siécle, mais dont la cause n'étoit gueres connue avant MM. Halley & Newton : on en reconnoît aisément quelque vestige dans Kepler & principalement dans Lansberge ; ensorte que Flamsteed, le Fevre & M. de la Hire s'en servoient en 1684 dans le calcul des Eclipses. Enfin les difficultés que M. de la Hire s'est proposées en 1710 & qu'il ne pouvoit résoudre, ne portent aucune atteinte à ce que l'on vient de dire, puisque tous les Astronomes conviennent avec lui que la plus grande Equation du centre de la Lune ne sçauroit excéder cinq degrés quand le grand Axe de l'orbite est dans les Quadratures, mais qu'il n'en est pas de même lorsque ce même Axe est dans la ligne des Sisigies.

M. Newton ayant changé au 3e Livre de la derniere Edition des Princ. Mathem. de la Philosophie, *l'époque du Moyen Mouvement de la Lune, qu'il suppose à* $10^{s}\ 15^{o}\ 21'\ 00''$ *le* 31 *Decembre* 1700 *v. st. à midi de Tems Moyen, & ayant aussi avancé celle de l'Apogée de* $1^{o}\ 40''$, *on les a réduites au n. st. & au Meridien de Paris, ensuite les deux Tables suivantes ont été nouvellement construites.*

Table des Moyens Mouvemens de la Lune, de son Apogée & de son Nœud.

Années Juliennes.	Moyens Mouvemens de la Lune.				Moyens Mouvemens de l'Apogée.				Nœud Ascendant Rétrograde.			
	Signes.	D.	M.	S.	*Signes.*	D.	M.	S.	*Signes.*	D.	M.	S.
1	4	09	23	03	1	10	39	50	0	19	19	43
2	8	18	46	06	2	21	19	41	1	08	39	26
3	0	28	09	10	4	01	59	31	1	27	59	10
4 B	5	20	42	49	5	12	46	03	2	17	22	04
5	10	00	05	52	6	23	25	53	3	06	41	47
6	2	09	28	56	8	04	05	44	3	26	01	31
7	6	18	51	59	9	14	45	34	4	15	21	13
8 B	11	11	25	38	10	25	32	06	5	04	44	07
9	3	20	48	41	0	06	11	56	5	24	03	50
10	8	00	11	45	1	16	51	47	6	13	23	33
11	0	09	34	48	2	27	31	37	7	02	43	16
12 B	5	02	08	27	4	08	18	09	7	22	06	10
13	9	11	31	30	5	18	57	59	8	11	25	53
14	1	20	54	34	6	29	37	50	9	00	45	36
15	6	00	17	37	8	10	17	40	9	20	05	19
16 B	10	22	51	16	9	21	04	12	10	09	28	13
17	3	02	14	19	11	01	44	02	10	28	47	56
18	7	11	37	23	00	12	23	53	11	18	07	39
19	11	21	00	26	01	23	03	43	00	07	27	22
20 B	04	13	34	05	03	03	50	15	00	26	50	15
21	08	22	57	08	04	14	30	05	01	16	09	58
22	01	02	20	12	05	25	09	56	02	05	29	41
23	05	11	43	15	07	05	49	46	02	24	49	24
24 B	10	04	16	54	08	16	36	18	03	14	12	19
25	02	13	39	57	09	27	16	08	04	03	32	02
26	06	23	03	01	11	07	55	59	04	22	51	45
27	11	02	26	04	00	18	35	49	05	12	11	28
28 B	03	24	59	43	01	29	22	21	06	01	34	22
29	08	04	22	46	03	10	02	11	06	20	54	05
30	00	13	45	50	04	20	42	02	07	10	13	48
31	04	23	08	53	06	01	21	52	07	29	33	31
32 B	09	15	42	32	07	12	08	24	08	18	56	25
33	01	25	05	35	08	21	48	14	09	08	16	08
34	06	04	28	39	10	03	28	05	09	27	35	51
35	10	13	51	42	11	14	07	55	10	16	55	34
36 B	03	06	25	21	00	24	54	27	11	06	18	28
37	07	15	48	24	02	05	34	17	11	25	38	11
38	11	25	11	28	03	16	14	09	00	14	57	54
39	04	04	34	31	04	26	53	59	01	04	17	37
40 B	08	27	08	10	06	07	40	30	01	23	40	30
60 Bissextiles	01	10	42	15	09	11	30	45	02	20	30	45
80 Bissextiles	05	24	16	20	00	15	21	00	03	17	21	00
100	10	07	50	25	03	19	11	15	04	14	11	15
200	08	15	40	50	07	08	22	30	08	28	22	30
400	05	01	21	40	02	16	45	00	05	26	45	00
600	01	17	02	30	09	25	07	30	02	25	07	30
800	10	02	43	20	05	03	30	00	11	23	30	00
1000	06	18	24	10	00	11	52	30	08	21	52	30
Selon *la Hire.*	06	18	20	10	00	12	22	41	08	21	51	10
Kepler.	06	18	08	30	00	12	22	41	08	21	51	07
Bouillaud.	06	18	06	01	00	13	04	56	08	22	02	46

Table des Moyens Mouvemens de la Lune, de son Apogée & de son Nœud Ascendant.

Années.	Moyens Mouvemens de la Lune.				Moyens. Mouvemens de l'Apogée.				Nœud Ascendant Retrograde.			
	Sig.	D.	M.	S.	Sig.	D.	M.	S.	Sig.	D.	M.	S.
1581 Julien	7	23	51	22	4	15	18	27	10	08	25	51
1582	0	03	14	25	5	25	58	17	09	19	06	08
1583	7	21	28	35	5	24	51	26	09	19	37	54
1601 Grég.	7	25	39	37	7	18	01	52	09	12	07	22
1661	9	06	21	52	04	29	32	37	06	21	36	37
1662	1	15	44	56	06	10	12	27	06	02	16	54
1663	5	25	08	00	07	20	52	17	05	12	57	11
1664 B	10	17	41	38	09	01	38	49	04	23	34	17
1665	02	27	04	42	10	12	18	39	04	04	14	33
1666	07	06	27	44	11	22	58	30	03	14	54	50
1667	11	15	50	48	01	03	38	20	02	25	35	07
1668 B	04	08	24	26	02	14	24	53	02	06	12	13
1669	08	27	47	30	03	25	04	43	01	16	52	30
1670	00	27	10	33	05	05	44	33	00	27	32	47
1671	05	06	33	37	06	16	24	22	00	08	13	05
1672 B	09	29	07	16	07	27	10	55	11	18	50	11
1673	02	08	30	20	09	07	50	46	10	29	30	28
1674	06	17	53	23	10	18	28	36	10	10	10	45
1675	10	27	16	37	11	29	10	27	09	20	51	02
1676 B	01	19	50	05	01	09	56	58	09	01	28	08
1677	07	29	13	08	02	20	36	49	08	12	08	25
1678	00	08	36	12	04	01	16	39	07	22	48	42
1679	04	17	59	16	05	11	56	30	07	03	29	59
1680 B	09	10	32	54	06	22	43	01	06	14	06	05
1681	01	19	55	58	08	03	22	52	05	24	46	22
1682	05	29	19	01	09	14	02	42	05	05	26	39
1683	10	08	42	05	10	24	42	33	04	16	06	56
1684 B	03	01	15	43	00	05	29	04	03	26	44	02
1685	07	10	38	47	01	16	08	55	03	07	24	19
1686	11	20	01	50	02	26	48	45	02	18	04	36
1687	03	29	24	54	04	07	28	36	01	28	44	53
1688 B	08	21	58	32	05	18	15	08	01	09	21	59
1689	01	01	21	35	06	28	54	58	00	20	02	16
1690	05	10	44	39	08	09	34	48	00	00	42	33
1691	09	20	07	43	09	20	14	39	11	11	22	50
1692 B	02	12	41	21	11	01	01	10	10	21	59	56
1693	06	22	04	25	00	11	41	01	10	02	40	13
1694	10	31	27	28	01	22	20	51	09	13	20	30
1695	03	10	50	32	03	03	00	42	08	24	00	47
1696 B	08	03	24	10	04	13	47	14	08	04	37	53
1697	00	12	47	14	05	24	27	04	07	15	18	10
1698	04	22	10	17	07	05	06	55	06	25	58	27
1699	09	01	33	21	08	15	46	45	06	06	38	44
1700	01	10	56	24	09	26	26	36	05	17	19	01
1701	05	20	19	28	11	07	06	26	04	27	59	18
1702	09	29	42	31	00	17	46	17	04	08	39	35
1703	02	09	05	35	01	28	26	07	03	19	19	52
1704 B	07	01	39	13	03	09	12	39	02	29	56	58
1705	11	11	02	17	04	19	52	29	02	10	37	15
1706	03	20	25	20	06	00	32	20	01	21	17	32
1707	07	29	48	24	07	11	12	10	01	01	57	49
1708 B	00	22	22	02	08	21	58	42	00	12	34	55

Années.	Moyens Mouvemens de la Lune.				Moyens Mouvemens de l'Apogée.				Nœud Ascendant Retrograde.			
	Sig.	D.	M.	S.	Sig.	D.	M	S.	Sig.	D.	M.	S.
1709 Grég.	05	01	45	06	10	02	38	32	11	23	15	12
1710	09	11	08	09	11	13	18	23	11	03	55	29
1711	01	20	31	13	00	23	58	13	10	14	35	46
1712 B	06	13	04	51	02	04	44	45	09	25	12	52
1713	10	22	27	55	03	15	24	35	09	05	53	09
1714	03	01	50	58	04	26	04	26	08	16	33	26
1715	07	11	14	02	06	06	44	16	07	27	13	43
1716 B	00	03	47	40	07	17	30	48	07	07	50	49
1717	04	13	10	44	08	28	10	38	06	18	31	06
1718	08	22	33	47	10	08	50	29	05	29	11	23
1719	01	01	56	51	11	19	30	19	05	09	51	40
1720 B	05	24	30	29	01	00	16	51	04	20	28	46
1721	10	03	53	33	02	10	56	41	04	01	09	03
1722	02	13	16	36	03	21	36	32	03	11	49	21
1723	06	22	39	40	05	02	16	22	02	22	29	38
1724 B	11	15	13	18	06	13	02	54	02	03	06	44
1725	03	24	36	22	07	23	42	44	01	13	47	01
1726	08	03	59	25	09	04	22	35	00	24	27	18
1727	00	13	22	29	10	15	02	25	00	05	07	35
1728 B	05	05	56	07	11	25	48	57	11	15	44	41
1729	09	15	19	11	01	06	28	47	10	26	24	58
1730	01	24	42	14	02	17	08	38	10	07	05	15
1731	06	04	05	18	03	27	48	28	09	17	45	32
1732 B	10	26	38	56	05	08	35	00	08	28	22	38
1733	03	06	02	00	06	19	14	50	08	09	02	55
1734	07	15	25	03	07	29	54	40	07	19	43	11
1735	11	24	48	07	09	10	34	31	07	00	23	28
1736 B	04	17	21	45	10	21	21	02	06	11	00	34
1737	08	26	44	49	00	02	00	53	05	21	40	51
1738	01	06	07	52	01	12	40	43	05	02	21	08
1739	05	15	30	56	02	23	20	34	04	13	01	25
1740 B	10	08	04	34	04	04	07	05	03	23	38	31
1741	02	17	27	38	05	14	46	56	03	04	18	48
1742	06	26	50	41	06	25	26	46	02	14	59	06
1743	11	06	13	44	08	06	06	37	01	25	39	23
1744 B	03	28	47	23	09	16	53	09	01	06	16	29
1745	08	08	10	27	10	27	32	59	00	16	56	46
1746	00	17	33	30	00	08	12	49	11	27	37	03
1747	04	26	56	34	01	18	52	40	11	08	17	20
1748 B	09	19	30	12	02	29	39	11	10	18	54	26
1749	01	28	53	16	04	10	19	02	09	29	34	43
1750	06	08	16	19	05	20	58	52	09	10	15	00
1751	10	17	39	23	07	01	38	43	08	20	55	17
1752 B	03	10	13	01	08	12	25	14	08	01	32	33
1753	07	19	36	05	09	23	05	05	07	12	12	40
1754	11	28	59	08	11	03	44	55	06	22	52	56
1755	04	08	22	12	00	14	24	46	06	03	33	13
1756 B	09	00	55	50	01	25	11	17	05	14	10	19
1757	01	10	18	54	03	05	51	08	04	24	50	36
1758	05	19	41	57	04	16	30	58	04	05	30	53
1759	09	29	05	01	05	27	10	49	03	16	11	10
1760 B	02	21	38	39	07	07	57	20	02	26	48	16

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DE LA LUNE
Pour les Jours de l'Année.

Années Bissextiles.	Années Communes.	JANVIER. Moyen mouvement de la Lune.				Moyen Mouvem. de l'Apogée.			Nœud Ascendant Retrograde.			Années Bissextiles.	Années Communes.	FEVRIER. Moyen mouvement de la Lune.				Moyen Mouvem. de l'Apogée.			Nœud Ascendant Retrograde.		
jours	*jours*	*Sig.*	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	*jr.*	*jr.*	*Sig.*	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1	0	0	00	00	00	0	00	00	0	00	00	1	0	1	18	28	06	3	27	13	1	38	30
2	1	0	13	10	35	0	06	41	0	03	11	2	1	2	01	38	41	3	33	54	1	41	41
3	2	0	26	21	10	0	13	22	0	06	21	3	2	2	14	49	16	3	40	35	1	44	52
4	3	1	09	31	45	0	20	03	0	09	32	4	3	2	27	59	51	3	47	16	1	48	02
5	4	1	22	42	20	0	26	44	0	12	43	5	4	3	11	10	26	3	53	57	1	51	13
6	5	2	05	52	55	0	33	25	0	15	53	6	5	3	24	21	01	4	00	38	1	54	24
7	6	2	19	03	30	0	40	06	0	19	04	7	6	4	07	31	36	4	07	19	1	57	34
8	7	3	02	14	05	0	46	48	0	22	14	8	7	4	20	42	11	4	14	01	2	00	44
9	8	3	15	24	40	0	53	29	0	25	25	9	8	5	03	52	46	4	20	42	2	03	55
10	9	3	28	35	15	1	00	10	0	28	36	10	9	5	17	03	21	4	27	23	2	07	06
11	10	4	11	45	50	1	06	51	0	31	46	11	10	6	00	13	56	4	34	04	2	10	16
12	11	4	24	56	25	1	13	32	0	34	57	12	11	6	13	24	31	4	40	45	2	13	27
13	12	5	08	07	00	1	20	13	0	38	08	13	12	6	26	35	06	4	47	26	2	16	38
14	13	5	21	17	35	1	26	54	0	41	18	14	13	7	09	45	41	4	54	07	2	19	49
15	14	6	04	28	10	1	33	35	0	44	29	15	14	7	22	56	16	5	00	48	2	22	59
16	15	6	17	38	45	1	40	16	0	47	40	16	15	8	06	06	51	5	07	29	2	26	10
17	16	7	00	49	20	1	46	57	0	50	50	17	16	8	19	17	26	5	14	10	2	29	20
18	17	7	13	59	55	1	53	38	0	54	01	18	17	9	02	28	01	5	20	51	2	32	31
19	18	7	27	10	30	2	00	19	0	57	11	19	18	9	15	38	36	5	27	32	2	35	41
20	19	8	10	21	05	2	07	00	1	00	22	20	19	9	28	49	11	5	34	13	2	38	52
21	20	8	23	31	40	2	13	41	1	03	33	21	20	10	11	59	46	5	40	54	2	42	03
22	21	9	06	42	15	2	20	23	1	06	43	22	21	10	25	10	21	5	47	35	2	45	13
23	22	9	19	52	50	2	27	04	1	09	54	23	22	11	08	20	56	5	54	16	2	48	24
24	23	10	03	03	26	2	33	45	1	13	05	24	23	11	21	31	31	6	00	57	2	51	35
25	24	10	16	14	01	2	40	26	1	16	15	25	24	0	04	42	06	6	07	38	2	54	45
26	25	10	29	24	36	2	47	07	1	19	26	26	25	0	17	52	41	6	14	19	2	57	56
27	26	11	12	35	11	2	53	48	1	22	37	27	26	1	01	03	16	6	21	01	3	01	07
28	27	11	25	45	46	3	00	29	1	25	47	28	27	1	14	13	51	6	27	42	3	04	17
29	28	0	08	56	21	3	07	10	1	28	58	29	28	1	27	24	26	6	34	24	3	07	28
30	29	0	22	06	56	3	13	51	1	32	09												
31	30	1	05	17	31	3	20	32	1	35	19												
	31	1	18	28	06	3	27	13	1	38	30												

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DE LA LUNE
Pour les Jours de l'Année.

Année Communes ou Bissextiles.	MARS.									Année Communes ou Bissextiles.	AVRIL.								
	Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvem. de l'Apogée.			Nœud Ascendant Retrograde.			Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvem. de l'Apogée.			Nœud Ascendant Retrograde.	
JOURS	Sig.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	JOURS	Sig.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1	2	10	35	01	6	41	04	3	10	38	1	3	29	03	07	10	08	18	4	49	08
2	2	23	45	36	6	47	45	3	13	49	2	4	12	13	42	10	14	59	4	52	18
3	3	06	56	11	6	54	26	3	16	59	3	4	25	24	17	10	21	40	4	55	29
4	3	20	06	46	7	01	07	3	20	10	4	5	08	34	52	10	28	21	4	58	40
5	4	03	17	21	7	07	48	3	23	20	5	5	21	45	27	10	35	02	5	01	50
6	4	16	27	56	7	14	29	3	26	31	6	6	04	56	02	10	41	43	5	05	01
7	4	29	38	31	7	21	11	3	29	42	7	6	18	06	37	10	48	25	5	08	12
8	5	12	49	07	7	27	52	3	32	52	8	7	01	17	12	10	55	06	5	11	22
9	5	25	59	42	7	34	33	3	36	03	9	7	14	27	47	11	01	47	5	14	33
10	6	09	10	17	7	41	14	3	39	14	10	7	27	38	22	11	08	28	5	17	44
11	6	22	20	52	7	47	55	3	42	24	11	8	10	48	57	11	15	09	5	20	54
12	7	05	31	27	7	54	36	3	45	35	12	8	23	59	32	11	21	50	5	24	05
13	7	18	41	02	8	01	17	3	48	46	13	9	07	10	07	11	28	31	5	27	16
14	8	01	52	37	8	07	58	3	51	56	14	9	20	20	42	11	35	12	5	30	27
15	8	15	03	12	8	14	39	3	55	07	15	10	03	31	17	11	41	53	5	33	37
16	8	28	13	47	8	21	20	3	58	17	16	10	16	41	52	11	48	34	5	36	48
17	9	11	24	22	8	28	01	4	01	28	17	10	29	52	27	11	55	15	5	39	59
18	9	24	34	57	8	34	42	4	04	39	18	11	13	03	02	12	01	56	5	43	09
19	10	07	45	32	8	41	23	4	07	49	19	11	26	13	37	12	08	37	5	46	20
20	10	20	56	07	8	48	04	4	11	00	20	0	09	24	13	12	15	18	5	49	31
21	11	04	06	42	8	54	46	4	14	10	21	0	22	34	48	12	22	00	5	52	42
22	11	17	17	17	9	01	27	4	17	21	22	1	05	45	23	12	28	41	5	55	53
23	0	00	27	52	9	08	08	4	20	32	23	1	18	55	58	12	35	22	5	59	03
24	0	13	38	27	9	14	49	4	23	42	24	2	02	06	33	12	42	03	6	02	14
25	0	26	49	02	9	21	30	4	26	53	25	2	15	17	08	12	48	44	6	05	24
26	1	09	59	37	9	28	11	4	30	04	26	2	28	27	43	12	55	25	6	08	35
27	1	23	10	12	9	34	52	4	33	14	27	3	11	38	18	13	02	06	6	11	45
28	2	06	20	47	9	41	33	4	36	25	28	3	24	48	53	13	08	47	6	14	56
29	2	19	31	22	9	48	14	4	39	36	29	4	07	59	28	13	15	28	6	18	06
30	3	02	41	57	9	54	55	4	42	46	30	4	21	10	03	13	22	09	6	21	17
31	3	15	52	32	10	01	36	4	45	57											

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DE LA LUNE
Pour les Jours de l'Année.

Années Communes ou Bissextiles.	MAI.									JUIN.								
	Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvement de l'Apogée.			Nœud Ascendant Retrograde.			Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvement de l'Apogée.			Nœud Ascendant Retrograde.
jours	*Sig.*	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	*jours*	*Sig.*	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1	5	04	20	38	13	28	50	6	24	27	1	6	22	48	43	16	56	03	8	02	57
2	5	17	31	13	13	35	31	6	27	38	2	7	05	59	18	17	02	44	8	06	08
3	6	00	41	48	13	42	12	6	30	48	3	7	19	09	54	17	09	25	8	09	18
4	6	13	52	23	13	48	53	6	33	59	4	8	02	20	29	17	16	06	8	12	29
5	6	27	02	58	13	55	34	6	37	10	5	8	15	31	04	17	22	47	8	15	40
6	7	10	13	33	14	02	15	6	40	20	6	8	28	41	39	17	29	28	8	18	50
7	7	23	24	08	14	08	57	6	43	31	7	9	11	52	14	17	36	10	8	22	01
8	8	06	34	43	14	15	38	6	46	42	8	9	25	02	49	17	42	51	8	25	11
9	8	19	45	18	14	22	19	6	49	52	9	10	08	13	24	17	49	32	8	28	22
10	9	02	55	53	14	29	00	6	53	03	10	10	21	23	59	17	56	13	8	31	33
11	9	16	06	28	14	35	41	6	56	14	11	11	04	34	34	18	02	54	8	34	43
12	9	29	17	03	14	42	22	6	59	24	12	11	17	45	08	18	09	35	8	37	54
13	10	12	27	38	14	49	03	7	02	35	13	0	00	55	44	18	16	16	8	41	05
14	10	25	38	13	14	55	44	7	05	46	14	0	14	06	19	18	22	57	8	44	15
15	11	08	48	48	15	02	25	7	08	56	15	0	27	16	54	18	29	38	8	47	26
16	11	21	59	23	15	09	06	7	12	07	16	1	10	27	29	18	36	19	8	50	37
17	0	05	09	58	15	15	47	7	15	18	17	1	23	38	04	18	43	00	8	53	47
18	0	18	20	33	15	22	28	7	18	28	18	2	06	48	39	18	49	41	8	56	58
19	1	01	31	08	15	29	09	7	21	39	19	2	19	59	14	18	56	22	9	00	09
20	1	14	41	43	15	35	50	7	24	50	20	3	03	09	49	19	03	03	9	03	19
21	1	27	52	18	15	42	32	7	28	00	21	3	16	20	24	19	09	45	9	06	30
22	2	11	02	53	15	49	13	7	31	11	22	3	29	30	59	19	16	26	9	09	41
23	2	24	13	28	15	55	54	7	34	22	23	4	12	41	34	19	23	07	9	12	51
24	3	07	24	03	16	02	35	7	37	32	24	4	25	52	09	19	29	48	9	16	02
25	3	20	34	38	16	09	16	7	40	43	25	5	09	02	44	19	36	29	9	19	13
26	4	03	45	13	16	15	57	7	43	54	26	5	22	13	19	19	43	10	9	22	23
27	4	16	55	48	16	22	38	7	47	04	27	6	05	23	54	19	49	51	9	25	34
28	5	00	06	23	16	29	19	7	50	15	28	6	18	34	29	19	56	32	9	28	45
29	5	13	16	58	16	36	00	7	53	25	29	7	01	45	04	20	03	13	9	31	55
30	5	26	27	33	16	42	41	7	56	36	30	7	14	55	39	20	09	55	9	35	06
31	6	09	38	08	16	49	22	7	59	47											

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DE LA LUNE
Pour les Jours de l'Année.

Années Communes ou Bissextiles.	JUILLET.									AOUST.								
	Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvement de l'Apogée.			Nœud Ascendant Rerrgrade.		Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvement de l'Apogée.			Nœud Ascendant Rerrgrade.	
JOURS	Sig.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M. S.	Sig.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M. S.
1	7	28	06	14	20	16	36	9	38 16	9	16	34	20	23	43	49	11	16 45
2	8	11	16	49	20	23	17	9	41 27	9	29	44	55	23	50	30	11	19 56
3	8	24	27	24	20	29	58	9	44 37	10	12	55	30	23	57	11	11	23 06
4	9	07	37	59	20	36	39	9	47 48	10	26	06	05	24	03	52	11	26 17
5	9	20	48	34	20	43	20	9	50 59	11	09	16	40	24	10	33	11	29 28
6	10	03	59	09	20	50	01	9	54 09	11	22	27	15	24	17	14	11	32 38
7	10	17	09	44	20	56	43	9	57 20	0	05	37	50	24	23	56	11	35 49
8	11	00	20	19	21	03	24	10	00 31	0	18	48	25	24	30	37	11	39 00
9	11	13	30	54	21	10	05	10	03 41	1	01	59	00	24	37	18	11	42 10
10	11	26	41	29	21	16	46	10	06 52	1	15	09	35	24	43	59	11	45 21
11	0	09	52	04	21	23	27	10	10 03	1	28	20	10	24	50	43	11	48 31
12	0	23	02	39	21	30	08	10	13 13	2	11	30	45	24	57	21	11	51 42
13	1	06	13	14	21	36	49	10	16 24	2	24	41	20	25	04	02	11	54 53
14	1	19	23	49	21	43	30	10	19 35	3	07	51	55	25	10	43	11	58 03
15	2	02	34	24	21	50	11	10	22 45	3	21	02	30	25	17	24	12	01 14
16	2	15	44	59	21	56	52	10	25 56	4	04	13	05	25	24	05	12	04 25
17	2	28	55	35	22	03	33	10	29 07	4	17	23	40	25	30	46	12	07 35
18	3	12	06	10	22	10	14	10	32 17	5	00	34	15	25	37	27	12	10 46
19	3	25	16	45	22	16	55	10	35 28	5	13	44	50	25	44	08	12	13 57
20	4	08	27	20	22	23	36	10	38 39	5	26	55	25	25	50	49	12	17 07
21	4	21	37	55	22	30	18	10	41 49	6	10	06	00	25	57	31	12	20 18
22	5	04	48	30	22	36	59	10	45 00	6	23	16	35	26	04	12	12	23 29
23	5	17	59	05	22	43	40	10	48 10	7	06	27	10	26	10	53	12	26 39
24	6	01	09	40	22	50	21	10	51 21	7	19	37	45	26	17	34	12	29 50
25	6	14	20	15	22	57	02	10	54 31	8	02	48	20	26	24	15	12	33 01
26	6	27	30	50	23	03	43	10	57 42	8	15	58	55	26	30	56	12	36 11
27	7	10	41	25	23	10	24	11	00 52	8	29	09	30	26	37	37	12	39 22
28	7	23	52	00	23	17	05	11	04 03	9	12	20	05	26	44	18	12	42 33
29	8	07	02	35	23	23	46	11	07 14	9	25	30	40	26	50	59	12	45 43
30	8	20	13	10	23	30	27	11	10 24	10	08	41	15	26	57	40	12	48 54
31	9	03	23	45	23	37	08	11	13 35	10	21	51	51	27	04	21	12	52 05

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DE LA LUNE
Pour les Jours de l'Année.

Années Communes ou Bissextiles.	SEPTEMBRE.		
	Moyen mouvement de la Lune.	Moyen Mouvem. de l'Apogée.	Nœud Ascendant Retrograde.
jours	*Sig.* D. M. S.	*S.* D. M. S.	D. M. S.
1	11 05 02 26	0 27 11 02	12 55 15
2	11 18 13 01	0 27 17 43	12 58 26
3	0 01 23 36	0 27 24 24	13 01 36
4	0 14 34 11	0 27 31 05	13 04 47
5	0 27 44 46	0 27 37 46	13 07 58
6	1 10 55 21	0 27 44 27	13 11 08
7	1 24 05 56	0 27 51 09	13 14 19
8	2 07 16 31	0 27 57 50	13 17 30
9	2 20 27 06	0 28 04 31	13 20 40
10	3 03 37 41	0 28 11 12	13 23 51
11	3 16 48 16	0 28 17 53	13 27 01
12	3 29 58 51	0 28 24 34	13 30 12
13	4 13 09 26	0 28 31 15	13 33 23
14	4 26 20 01	0 28 37 56	13 36 33
15	5 09 30 36	0 28 44 37	13 39 44
16	5 22 41 11	0 28 51 18	13 42 55
17	6 05 51 46	0 28 57 59	13 46 05
18	6 19 02 21	0 29 04 40	13 49 16
19	7 02 12 56	0 29 11 21	13 52 27
20	7 15 23 31	0 29 18 02	13 55 37
21	7 28 34 06	0 29 24 44	13 58 48
22	8 11 44 41	0 29 31 25	14 01 59
23	8 24 55 16	0 29 38 06	14 05 09
24	9 08 05 51	0 29 44 47	14 08 20
25	9 21 16 26	0 29 51 28	14 11 30
26	10 04 27 01	0 29 58 09	14 14 41
27	10 17 37 36	1 00 04 50	14 17 52
28	11 00 48 11	1 00 11 32	14 21 02
29	11 13 58 46	1 00 18 12	14 24 13
30	11 27 09 21	1 00 24 53	14 27 24

Années Communes ou Bissextiles.	OCTOBRE.		
	Moyen mouvement de la Lune.	Moyen Mouvem. de l'Apogée.	Nœud Ascendant Retrograde.
jours	*Sig.* D. M. S.	*S.* D. M. S.	D. M. S.
1	0 10 19 56	1 0 31 34	14 30 34
2	0 23 30 31	1 0 38 15	14 33 45
3	1 06 41 06	1 0 44 56	14 36 56
4	1 19 51 41	1 0 51 37	14 40 06
5	2 03 02 16	1 0 58 18	14 43 17
6	2 16 12 51	1 1 04 59	14 46 27
7	2 29 23 26	1 1 11 41	14 49 38
8	3 12 34 01	1 1 18 22	14 52 49
9	3 25 44 36	1 1 25 03	14 55 59
10	4 08 55 11	1 1 31 44	14 59 10
11	4 22 05 46	1 1 38 25	15 02 21
12	5 05 16 21	1 1 45 06	15 05 32
13	5 18 26 56	1 1 51 47	15 08 42
14	6 01 37 32	1 1 58 28	15 11 53
15	6 14 48 06	1 2 05 09	15 15 03
16	6 27 58 42	1 2 11 50	15 18 14
17	7 11 09 16	1 2 18 31	15 21 25
18	7 24 19 52	1 2 25 12	15 24 35
19	8 07 30 27	1 2 31 53	15 27 46
20	8 20 41 02	1 2 38 34	15 30 56
21	9 03 51 37	1 2 45 16	15 34 07
22	9 17 02 12	1 2 51 57	15 37 18
23	10 00 12 47	1 2 58 38	15 40 28
24	10 13 23 22	1 3 05 19	15 43 39
25	10 26 33 57	1 3 12 00	15 46 50
26	11 09 44 32	1 3 18 41	15 50 00
27	11 22 55 07	1 3 25 22	15 53 11
28	0 06 05 42	1 3 32 03	15 56 21
29	0 19 16 17	1 3 38 44	15 59 32
30	1 02 26 52	1 3 45 25	16 02 43
31	1 15 37 27	1 3 52 06	16 05 53

TABLES
DES
MOYENS MOUVEMENS
DE LA LUNE
Pour les Jours de l'Année.

NOVEMBRE.

Années Communes ou Bissextiles.	Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvem. de l'Apogée.				Nœud Ascendant Retrograde.		
JOURS	Sig.	D.	M.	S.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1	1	28	48	02	1	3	58	48	16	09	04
2	2	11	58	37	1	4	05	29	16	12	15
3	2	25	09	12	1	4	12	10	16	15	25
4	3	08	19	47	1	4	18	51	16	18	36
5	3	21	30	22	1	4	25	32	16	21	47
6	4	04	40	57	1	4	32	13	16	24	57
7	4	17	51	32	1	4	38	55	16	28	08
8	5	01	02	07	1	4	45	36	16	31	19
9	5	14	12	42	1	4	52	17	16	34	29
10	5	27	23	17	1	4	58	58	16	37	40
11	6	10	33	52	1	5	05	39	16	40	50
12	6	23	44	27	1	5	12	20	16	44	01
13	7	06	55	02	1	5	19	01	16	47	12
14	7	20	05	37	1	5	25	42	16	50	22
15	8	03	16	12	1	5	32	23	16	53	33
16	8	16	26	47	1	5	39	04	16	56	44
17	8	29	37	22	1	5	45	45	16	59	54
18	9	12	47	57	1	5	52	26	17	03	05
19	9	25	58	32	1	5	59	07	17	06	16
20	10	09	09	07	1	6	05	48	17	09	26
21	10	22	19	42	1	6	12	30	17	12	37
22	11	05	30	17	1	6	19	11	17	15	48
23	11	18	40	52	1	6	25	52	17	18	58
24	0	01	51	27	1	6	32	33	17	22	09
25	0	15	02	02	1	6	39	14	17	25	20
26	0	28	12	38	1	6	45	55	17	28	30
27	1	11	23	13	1	6	52	36	17	31	41
28	1	24	33	47	1	6	59	17	17	34	51
29	2	07	44	21	1	7	05	58	17	38	02
30	2	20	54	58	1	7	12	39	17	41	12

DECEMBRE.

Années Communes ou Bissextiles.	Moyen mouvement de la Lune.				Moyen mouvem. de l'Apogée.				Nœud Ascendant Retrograde.		
JOURS	Sig.	D.	M.	S.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1	3	04	05	33	1	7	19	20	17	44	23
2	3	17	16	08	1	7	26	01	17	47	34
3	4	00	26	43	1	7	32	42	17	50	44
4	4	13	37	18	1	7	39	23	17	53	55
5	4	26	47	53	1	7	46	04	17	57	06
6	5	09	58	28	1	7	52	45	18	00	16
7	5	23	09	03	1	7	59	27	18	03	27
8	6	06	19	38	1	8	06	08	18	06	38
9	6	19	30	13	1	8	12	49	18	09	48
10	7	02	40	48	1	8	19	30	18	12	59
11	7	15	51	23	1	8	26	11	18	16	10
12	7	29	01	58	1	8	32	52	18	19	20
13	8	12	12	33	1	8	39	33	18	22	31
14	8	25	23	08	1	8	46	14	18	25	42
15	9	08	33	43	1	8	52	55	18	28	52
16	9	21	44	18	1	8	59	36	18	32	03
17	10	04	54	53	1	9	06	17	18	35	14
18	10	18	05	28	1	9	12	58	18	38	24
19	11	01	16	03	1	9	19	39	18	41	35
20	11	14	26	38	1	9	26	20	18	44	46
21	11	27	37	13	1	9	33	02	18	47	56
22	0	10	47	48	1	9	39	43	18	51	07
23	0	23	58	23	1	9	46	24	18	54	18
24	1	07	08	58	1	9	53	05	18	57	28
25	1	20	19	33	1	9	59	46	19	00	39
26	2	03	30	08	1	10	06	27	19	03	50
27	2	16	40	43	1	10	13	08	19	07	00
28	2	29	51	18	1	10	19	49	19	10	11
29	3	13	01	53	1	10	26	30	19	13	21
30	3	26	12	28	1	10	33	11	19	16	32
31	4	09	23	03	1	10	39	52	19	19	43

EQUATIONS ANNUELLES,

OU

PREMIERES EQUATIONS

DES MOYENS MOUVEMENS,

DE LA LUNE, DE SON APOGÉE, ET DE SON NOEUD.

Anomalie moyenne du Soleil.

Anomalie moyenne. D.	O. Signe. ajoutez. Longitude. M. S.	O. Signe. ajoutez. Apogée. M. S.	O. Signe. ajoutez. Nœud. M. S.	I. ajoutez. Longitude. M. S.	I. ajoutez. Apogée. M. S.	I. ajoutez. Nœud. M. S.	II. ajoutez. Longitude. M. S.	II. ajoutez. Apogée. M. S.	II. ajoutez. Nœud. M. S.	Anomalie moyenne. D.
0	0 00	0 00	0 00	5 47	9 49	4 40	10 07	17 08	8 09	30
1	0 12	0 20	0 09	5 58	10 07	4 48	10 14	17 19	8 14	29
2	0 24	0 41	0 19	6 09	10 24	4 57	10 20	17 29	8 19	28
3	0 36	1 01	0 29	6 19	10 42	5 05	10 26	17 39	8 24	27
4	0 48	1 22	0 39	6 29	10 59	5 13	10 31	17 48	8 28	26
5	1 00	1 42	0 48	6 39	11 16	5 21	10 37	17 58	8 32	25
6	1 12	2 03	0-58	6 49	11 33	5 29	10 42	18 07	8 36	24
7	1 24	2 23	1 08	6 59	11 49	5 37	10 47	18 16	8 40	23
8	1 36	2 43	1 18	7 09	12 06	5 45	10 52	18 24	8 44	22
9	1 48	3 04	1 27	7 19	12 22	5 53	10 56	18 32	8 48	21
10	1 59	3 24	1 37	7 28	12 39	6 00	11 01	18 39	8 52	20
11	2 11	3 44	1 46	7 37	12 55	6 08	11 05	18 46	8 55	19
12	2 23	4 04	1 56	7 46	13 10	6 15	11 09	18 53	8 58	18
13	2 35	4 24	2 05	7 55	13 26	6 22	11 14	19 00	9 02	17
14	2 46	4 44	2 15	8 04	13 41	6 30	11 19	19 06	9 05	16
15	2 58	5 04	2 24	8 13	13 56	6 37	11 22	19 12	9 07	15
16	3 10	5 24	2 34	8 22	14 10	6 44	11 25	19 18	9 10	14
17	3 22	5 44	2 43	8 31	14 25	6 50	11 28	19 23	9 12	13
18	3 34	6 03	2 53	8 39	14 39	6 57	11 30	19 28	9 15	12
19	3 46	6 23	3 02	8 47	14 53	7 04	11 32	19 33	9 17	11
20	3 57	6 43	3 11	8 55	15 07	7 11	11 35	19 37	9 19	10
21	4 09	7 02	3 20	9 03	15 21	7 17	11 38	19 41	9 21	9
22	4 20	7 21	3 29	9 11	15 33	7 23	11 40	19 44	9 22	8
23	4 31	7 40	3 38	9 19	15 46	7 29	11 42	19 48	9 24	7
24	4 42	7 59	3 47	9 27	15 58	7 35	11 43	19 51	9 25	6
25	4 53	8 18	3 56	9 34	16 11	7 41	11 45	19 53	9 26	5
26	5 04	8 36	4 05	9 41	16 23	7 46	11 46	19 55	9 27	4
27	5 15	8 54	4 14	9 47	16 35	7 52	11 47	19 57	9 28	3
28	5 26	9 13	4 23	9 54	16 46	7 58	11 48	19 58	9 29	2
29	5 37	9 31	4 31	10 01	16 57	8 04	11 48	19 59	9 29	1
30	5 47	9 49	4 40	10 07	17 08	8 09	11 49	20 00	9 30	0
Anomalie moyenne.	Longitude. ôtez.	Apogée. ajoutez.	Nœud. ôtez.	Longitude. ôtez.	Apogée. ajoutez.	Nœud. ôtez.	Longitude. ôtez.	Apogée. ajoutez.	Nœud. ôtez.	Anomalie moyenne.
	XI.			X.			IX.			

Anomalie moyenne du Soleil.

EQUATIONS ANNUELLES,

OU

PREMIERES EQUATIONS

DES MOYENS MOUVEMENS,

DE LA LUNE, DE SON APOGE'E, ET DE SON NOEUD.

Anomalie moyenne du Soleil.

Anomalie moyenne. D.	III. ajoutez. Longitude. M. S.	III. ôtez. Apogée. M. S.	III. ajoutez. Nœud. M. S.	IV. ajoutez. Longitude. M. S.	IV. ôtez. Apogée. M. S.	IV. ajoutez. Nœud. M. S.	V. ajoutez. Longitude. M. S.	V. ôtez. Apogée. M. S.	V. ajoutez. Nœud. M. S.	Anomalie moyenne. D.
0	11 49	20 00	9 30	10 21	17 30	8 19	6 00	10 11	4 50	30
1	11 49	20 00	9 30	10 15	17 20	8 14	5 49	9 52	4 41	29
2	11 49	20 00	9 30	10 07	17 09	8 09	5 38	9 33	4 32	28
3	11 48	19 59	9 30	10 01	16 58	8 04	5 27	9 15	4 23	27
4	11 48	19 58	9 29	9 55	16 46	7 58	5 16	8 56	4 14	26
5	11 47	19 57	9 29	9 47	16 34	7 53	5 05	8 36	4 05	25
6	11 47	19 56	9 28	9 40	16 23	7 48	4 53	8 17	3 56	24
7	11 45	19 54	9 27	9 33	16 11	7 42	4 42	7 58	3 47	23
8	11 44	19 51	9 26	9 26	15 58	7 35	4 30	7 38	3 38	22
9	11 42	19 49	9 25	9 19	15 45	7 29	4 18	7 18	3 29	21
10	11 41	19 46	9 24	9 11	15 32	7 23	4 06	6 58	3 19	20
11	11 39	19 42	9 22	9 02	15 18	7 16	3 54	6 38	3 09	19
12	11 36	19 38	9 20	8 54	15 04	7 09	3 43	6 18	2 59	18
13	11 34	19 34	9 18	8 46	14 50	7 03	3 31	5 58	2 50	17
14	11 31	19 30	9 16	8 37	14 36	6 56	3 19	5 38	2 40	16
15	11 29	19 25	9 14	8 28	14 21	6 49	3 07	5 17	2 30	15
16	11 25	19 20	9 12	8 20	14 06	6 42	2 54	4 56	2 20	14
17	11 22	19 14	9 09	8 11	13 51	6 35	2 42	4 35	2 10	13
18	11 19	19 08	9 06	8 01	13 35	6 27	2 30	4 14	2 00	12
19	11 15	19 02	9 03	7 52	13 20	6 20	2 18	3 54	1 50	11
20	11 11	18 55	8 59	7 43	13 04	6 12	2 05	3 33	1 40	10
21	11 06	18 48	8 56	7 34	12 48	6 04	1 52	3 12	1 30	9
22	11 02	18 41	8 52	7 24	12 31	5 56	1 40	2 51	1 20	8
23	10 58	18 33	8 49	7 14	12 15	5 49	1 28	2 30	1 10	7
24	10 53	18 25	8 45	7 01	11 58	5 41	1 15	2 08	1 00	6
25	10 48	18 17	8 41	6 53	11 41	5 33	1 02	1 46	0 50	5
26	10 43	18 08	8 37	6 43	11 23	5 24	0 49	1 25	0 40	4
27	10 38	17 59	8 33	6 33	11 05	5 16	0 37	1 04	0 30	3
28	10 32	17 50	8 28	6 22	10 47	5 08	0 25	0 43	0 20	2
29	10 26	17 40	8 23	6 11	10 29	4 59	0 12	0 21	0 10	1
30	10 21	17 30	8 19	6 00	10 11	4 50	0 00	0 00	0 00	0
Anomalie moyenne.	Longitude. ôtez.	Apogée. ajoutez.	Nœud. ôtez.	Longitude. ôtez.	Apogée. ajoutez.	Nœud. ôtez.	Longitude. ôtez.	Apogée. ajoutez.	Nœud. ôtez.	Anomalie moyenne.
	VIII.			VII.			VI.			

Anomalie moyenne du Soleil.

TABLE
qui sert à trouver
LES PLUS GRANDES
D'ENTRE LES SECONDES
EQUATIONS
DU MOYEN MOUVEMENT,
& les plus grandes
VARIATIONS
DE LA LUNE.

Anomalie moyenne du Soleil.		La plus grande Equation.	La plus grande Variation.	Anomalie moyenne du Soleil.	
S.	D.	M. S.	M. S.	S.	D
O.	00	3 33	33 04	XII.	00
	10	3 33	33 05		20
	20	3 34	33 12		10
I.	00	3 34	33 21	XI.	00
	10	3 35	33 34		20
	20	3 37	33 50		10
II.	00	3 38	34 09	X.	00
	10	3 40	34 30		20
	20	3 42	34 52		10
III.	00	3 44	35 15	IX.	00
	10	3 46	35 37		20
	20	3 48	36 00		10
IV.	00	3 50	36 20	VIII.	00
	10	3 51	36 39		20
	20	3 53	36 55		10
V.	00	3 54	37 08	VII.	00
	10	3 55	37 18		20
	20	3 56	37 24		10
VI.	00	3 56	37 25	VI.	00
Anomalie moyenne du Soleil.		La plus grande Equation.	La plus grande Variation.	Anomalie moyenne du Soleil.	

TABLE
DE LA SECONDE
EQUATION
DU MOYEN MOUVEMENT.

Argument annuel.	ôtez en descendant. Argument annuel, ou distance du Soleil à l'Apogée de la Lune. O.d.VI. M. S.	I. VII. M. S.	II. VIII M. S.	D	Argument annuel.
0	0 00	3 15	3 15	30	30
1	0 08	3 19	3 11	29	29
2	0 16	3 22	3 06	28	28
3	0 23	3 25	3 02	27	27
4	0 31	3 28	2 57	26	26
5	0 39	3 31	2 52	25	25
6	0 47	3 34	2 47	24	24
7	0 54	3 36	2 41	23	23
8	1 02	3 38	2 36	22	22
9	1 09	3 40	2 30	21	21
10	1 17	3 42	2 24	20	20
11	1 24	3 43	2 18	19	19
12	1 31	3 44	2 12	18	18
13	1 38	3 44	2 05	17	17
14	1 46	3 45	1 59	16	16
15	1 52	3 45	1 52	15	15
16	1 59	3 45	1 46	14	14
17	2 05	3 44	1 38	13	13
18	2 12	3 44	1 31	12	12
19	2 18	3 43	1 24	11	11
20	2 24	3 42	1 17	10	10
21	2 30	3 40	09	9	9
22	2 36	3 38	1 02	8	8
23	2 41	3 36	0 54	7	7
24	2 47	3 34	0 47	6	6
25	2 52	3 31	0 39	5	5
26	2 57	3 28	0 31	4	4
27	3 02	3 25	0 24	3	3
28	3 06	3 22	0 16	2	2
29	3 11	3 19	0 08	1	1
30	3 15	3 15	0 00	0	0
Argum. annuel.	XI. V.	X. IV.	IX. III.	Argum. annuel	
	Argument annuel.				
	ajoutez en montant.				

TABLE
DE LA TROISIEME
EQUATION
DU MOYEN MOUVEMEMT.

D. du Sol. au Nœud.	ôtez en descendant. Argument ou distance du Soleil au Nœud. O.d.VI. M. S.	I. VII. M. S.	II. VIII M. S.	D	D. du Sol. au Nœud.
0	0 00	0 41	0 41	30	30
1	0 01	0 41	0 40	29	29
2	0 03	0 42	0 39	28	28
3	0 05	0 43	0 38	27	27
4	0 06	0 43	0 37	26	26
5	0 08	0 44	0 36	25	25
6	0 10	0 45	0 35	24	24
7	0 11	0 45	0 34	23	23
8	0 13	0 45	0 32	22	22
9	0 14	0 46	0 31	21	21
10	0 16	0 46	0 30	20	20
11	0 17	0 46	0 29	19	19
12	0 19	0 47	0 27	18	18
13	0 20	0 47	0 26	17	17
14	0 22	0 47	0 25	16	16
15	0 23	0 47	0 23	15	15
16	0 25	0 47	0 22	14	14
17	0 26	0 47	0 20	13	13
18	0 27	0 47	0 19	12	12
19	0 29	0 46	0 17	11	11
20	0 30	0 46	0 16	10	10
21	0 31	0 46	0 14	9	9
22	0 32	0 45	0 13	8	8
23	0 34	0 45	0 11	7	7
24	0 35	0 44	0 10	6	6
25	0 36	0 44	0 08	5	5
26	0 37	0 43	0 06	4	4
27	0 38	0 43	0 05	3	3
28	0 39	0 42	0 03	2	2
29	0 40	0 41	0 01	1	1
30	0 41	0 41	0 00	0	0
D. du Sol. au N.	XI. V.	X. IV.	IX. III.	D. du Sol. au N.	
	Distance du Soleil au Nœud.				
	ajoutez en montant.				

La Table du milieu a été calculée pour l'unique cas auquel la plus grande d'entre les secondes Equations eſt moyenne, ſçavoir 3′ 45″: on en pourra conſtruire, ſi l'on veut, deux autres pour 3′ 33″ & 3′ 56″. Mais on voit du premier coup d'œil que ſi, dans les octans, ou à 45° de l'Argument annuel, la différence eſt de 12″ à 11″ entre la moyenne & la plus petite ou la plus grande Equation, elle doit etre préciſément de 6″ à 5″½ à 15° de l'Argument annuel.

TABLE
DE
L'EQUATION DE L'APOGE'E
DE LA LUNE.

Ajoutez en descendant.

Argument annuel, ou distance du Soleil à l'Apogée de la Lune.

Argument annuel.	Sign. O. VI.	Différence	I. VII.	Différence	II. VIII.	Différence.	Argument annuel.
D.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D.
0	0 00 00		9 28 08		11 40 14		30
		21 04		14 15		9 20	
1	0 21 04		9 42 23		11 30 54		29
		21 04		13 46		10 25	
2	0 42 08		9 56 09		11 20 29		28
		21 02		13 16		11 30	
3	1 03 10		10 09 25		11 08 59		27
		21 00		12 44		12 36	
4	1 24 10		10 22 09		10 56 23		26
		20 57		12 12		13 42	
5	1 45 07		10 34 21		10 42 41		25
		20 52		11 38		14 48	
6	2 05 59		10 45 59		10 27 53		24
		20 47		11 03		15 53	
7	2 26 46		10 57 02		10 12 00		23
		20 41		10 26		16 58	
8	2 47 27		11 07 28		9 55 02		22
		20 35		9 49		18 04	
9	3 08 02		11 17 17		9 36 58		21
		20 28		9 10		19 08	
10	3 28 30		11 26 27		9 17 50		20
		20 19		8 30		20 12	
11	3 48 49		11 34 57		8 57 38		19
		20 10		7 48		21 15	
12	4 08 59		11 42 45		8 36 23		18
		19 59		7 05		22 15	
13	4 28 58		11 49 50		8 14 08		17
		19 49		6 22		23 14	
14	4 48 47		11 56 12		7 50 54		16
		19 37		5 36		24 13	
15	5 08 24		12 01 48		7 26 41		15
		19 24		4 48		25 10	
16	5 27 48		12 06 36		7 01 31		14
		19 10		4 02		26 03	
17	5 46 58		12 10 38		6 35 28		13
		18 56		3 12		26 53	
18	6 05 54		12 13 50		6 08 35		12
		18 40		2 21		27 41	
19	6 24 34		12 16 11		5 40 54		11
		18 23		1 28		28 26	
20	6 42 57		12 17 39		5 12 28		10
		18 07		0 36		29 08	
21	7 01 04		12 18 15		4 43 20		9
		17 48		0 19		29 48	
22	7 18 52		12 17 56		4 13 32		8
		17 28		1 15		30 25	
23	7 ,36 20		12 16 41		3 43 07		7
		17 08		2 13		30 54	
24	7 53 28		12 14 28		3 12 13		6
		16 46		3 10		31 20	
25	8 10 14		12 11 18		2 40 53		5
		16 23		4 10		31 43	
26	8 26 37		12 07 08		2 09 10		4
		16 01		5 11		32 01	
27	8 42 38		12 01 57		1 37 09		3
		15 36		6 12		32 15	
28	8 58 14		11 55 45		1 04 54		2
		15 10		7 14		32 25	
29	9 13 24		11 48 31		0 32 29		1
		14 43		8 17		32 29	
30	9 28 07		11 40 14		0 00 00		0
Argument annuel.	V. XI.	Différence	IV. X.	Différence	III. IX.	Différence	Argument annuel.

Argument annuel, ou distance du Soleil à l'Apogée de la Lune.

Otez en montant.

TABLES
DE L'EQUATION DU NŒUD,
ET DE L'INCLINAISON DE L'ORBITE
DE LA LUNE

Distance du Soleil au Nœud ascendant.

Distance du Soleil au Nœud.	0. Sign. VI. Equation du Nœud additive.			VI. Inclinaison.			I. Equation du Nœud additive.			VII. Inclinaison.			II. Equation du Nœud additive.			VIII. Inclinaison.			Distance du Soleil au Nœud.
D.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D	M.	S.	D.
0	0	00	00	5	17	30	1	16	39	5	13	00	1	18	41	5	04	00	30
1	0	03	03	5	17	30	1	18	13	5	12	44	1	17	07	5	03	44	29
2	0	06	06	5	17	29	1	19	41	5	12	27	1	15	27	5	03	29	28
3	0	09	08	5	17	27	1	21	03	5	12	10	1	13	41	5	03	13	27
4	0	12	10	5	17	25	1	22	20	5	11	53	1	11	49	5	02	58	26
5	0	15	11	5	17	22	1	23	31	5	11	35	1	09	57	5	02	43	25
6	0	18	11	5	17	18	1	24	36	5	11	17	1	07	48	5	02	29	24
7	0	21	09	5	17	13	1	25	35	5	10	59	1	05	40	5	02	15	23
8	0	24	06	5	17	08	1	26	22	5	10	41	1	03	28	5	02	02	22
9	0	27	02	5	17	04	1	27	14	5	10	23	1	01	11	5	01	49	21
10	0	29	56	5	16	58	1	27	54	5	10	04	0	58	49	5	01	36	20
11	0	32	48	5	16	51	1	28	28	5	09	44	0	56	22	5	01	24	19
12	0	35	37	5	16	43	1	28	56	5	09	25	0	53	51	5	01	13	18
13	0	38	24	5	16	35	1	29	17	5	09	07	0	51	15	5	01	02	17
14	0	41	09	5	16	27	1	29	31	5	08	48	0	48	35	5	00	52	16
15	0	43	51	5	16	18	1	29	38	5	08	30	0	45	52	5	00	42	15
16	0	46	29	5	16	08	1	29	39	5	08	12	0	43	05	5	00	33	14
17	0	49	05	5	15	58	1	29	34	5	07	53	0	40	15	5	00	25	13
18	0	51	37	5	15	47	1	29	23	5	07	35	0	37	22	5	00	17	12
19	0	54	05	5	15	36	1	29	05	5	07	16	0	34	26	5	00	09	11
20	0	56	30	5	15	24	1	28	41	5	06	57	0	31	27	5	00	02	10
21	0	58	51	5	15	11	1	28	10	5	06	38	0	28	25	4	59	56	9
22	1	01	08	5	14	58	1	27	33	5	06	19	0	25	21	4	59	52	8
23	1	03	21	5	14	45	1	26	49	5	06	01	0	22	15	4	59	47	7
24	1	05	29	5	14	31	1	25	58	5	05	43	0	19	07	4	59	42	6
25	1	07	33	5	14	17	1	25	01	5	05	25	0	15	58	4	59	38	5
26	1	09	33	5	14	02	1	23	57	5	05	07	0	12	48	4	59	35	4
27	1	11	27	5	13	47	1	22	47	5	04	50	0	09	37	4	59	33	3
28	1	13	16	5	13	31	1	21	31	5	04	38	0	06	25	4	59	31	2
29	1	15	00	5	13	16	1	20	09	5	04	16	0	03	13	4	59	30	1
30	1	16	39	5	13	00	1	18	41	5	04	00	0	00	00	4	59	30	0
Distance du Soleil au Nœud.	Equation Soustractive.			Inclinaison.			Equation Soustractive.			Inclinaison.			Equation Soustractive.			Inclinaison.			Distance du Soleil au Nœud.
	V.			XI.			IV.			X.			III.			IX.			

Distance du Soleil au Nœud ascendant.

TABLE
DES PLUS GRANDES EQUATIONS
QUI REPONDENT AUX DIFFERENTES EXCENTRICITE'S
DE L'ORBITE LUNAIRE.

Argument annuel, ou distance du Soleil à l'Apogée de la Lune.

Argument annuel.	Sign. O. VI.	Différence	I. VII.	Différence	II. VIII.	Différence.	Argument annuel.
D.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D.
0	7 39 30	00 03	7 04 54	02 12	5 45 28	02 40	30
1	7 39 27	00 07	7 02 42	02 16	5 42 48	02 37	29
2	7 39 20	00 11	7 00 26	02 19	5 40 11	02 35	28
3	7 39 09	00 17	6 58 07	02 22	5 37 36	02 32	27
4	7 38 52	00 22	6 55 45	02 24	5 35 04	02 29	26
5	7 38 30	00 27	6 53 21	02 27	5 32 35	02 26	25
6	7 38 03	00 31	6 50 54	02 30	5 30 09	02 23	24
7	7 37 32	00 37	6 48 24	02 32	5 27 46	02 19	23
8	7 36 55	00 41	6 45 52	02 34	5 25 27	02 14	22
9	7 36 14	00 46	6 43 18	02 36	5 23 13	02 10	21
10	7 35 28	00 51	6 40 42	02 39	5 21 03	02 06	20
11	7 34 37	00 55	6 38 03	02 41	5 18 57	02 01	19
12	7 33 42	00 59	6 35 22	02 42	5 16 56	01 56	18
13	7 32 43	01 05	6 32 40	02 43	5 15 00	01 51	17
14	7 31 38	01 08	6 29 57	02 45	5 13 09	01 47	16
15	7 30 30	01 14	6 27 12	02 46	5 11 22	01 40	15
16	7 29 16	01 18	6 24 26	02 47	5 09 42	01 34	14
17	7 27 58	01 22	6 21 39	02 48	5 08 08	01 28	13
18	7 26 36	01 27	6 18 51	02 48	5 06 40	01 21	12
19	7 25 09	01 31	6 16 03	02 49	5 05 19	01 15	11
20	7 23 38	01 35	6 13 14	02 49	5 04 04	01 09	10
21	7 22 03	01 39	6 10 25	02 49	5 02 55	01 02	9
22	7 20 24	01 43	6 07 36	02 49	5 01 53	00 55	8
23	7 18 41	01 47	6 04 47	02 49	5 00 58	00 48	7
24	7 16 54	01 50	6 01 58	02 48	5 00 10	00 41	6
25	7 15 04	01 55	5 59 10	02 48	4 59 29	00 33	5
26	7 13 09	01 59	5 56 22	02 46	4 58 56	00 26	4
27	7 11 10	02 02	5 53 36	02 44	4 58 30	00 19	3
28	7 09 08	02 06	5 50 52	02 43	4 58 11	00 11	2
29	7 07 02	02 08	5 48 09	02 41	4 58 00	00 04	1
30	7 04 54		5 45 28		4 57 56		0
Argument annuel.	V. XI.	Différence	IV. X.	Différence	III. IX.	Différence	Argument annuel.

Argument annuel, ou distance du Soleil à l'Apogée de la Lune.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DE LA LUNE.

ôtez en descendant.

Anomalie moyenne de la Lune.

O. *Signe.*

Anomalie moyenne de la Lune. D.	Excentricité 43619 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 52336 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 61048 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 66800 D. M. S.	Diff. M. S.	Anomalie moyenne de la Lune. D.
0	0 00 00	4 58	0 00 00	5 53	0 00 00	6 48	0 00 00	7 24	30
1	0 04 58	4 58	0 05 53	5 54	0 06 48	6 48	0 07 24	7 24	29
2	0 09 56	4 58	0 11 47	5 53	0 13 36	6 48	0 14 48	7 23	28
3	0 14 54	4 57	0 17 40	5 53	0 20 24	6 48	0 22 11	7 23	27
4	0 19 51	4 57	0 23 33	5 53	0 27 12	6 47	0 29 34	7 22	26
5	0 24 48	4 56	0 29 26	5 52	0 33 59	6 47	0 36 56	7 22	25
6	0 29 44	4 56	0 35 18	5 51	0 40 46	6 46	0 44 18	7 22	24
7	0 34 40	4 55	0 41 09	5 51	0 47 32	6 45	0 51 40	7 21	23
8	0 39 35	4 55	0 47 00	5 51	0 54 17	6 45	0 59 01	7 20	22
9	0 44 30	4 54	0 52 51	5 50	1 01 02	6 44	1 06 21	7 19	21
10	0 49 24	4 54	0 58 41	5 49	1 07 46	6 43	1 13 40	7 18	20
11	0 54 18	4 53	1 04 30	5 47	1 14 29	6 42	1 20 58	7 17	19
12	0 59 11	4 52	1 10 17	5 47	1 21 11	6 40	1 28 15	7 16	18
13	1 04 03	4 51	1 16 04	5 46	1 27 51	6 39	1 35 31	7 14	17
14	1 08 54	4 49	1 21 50	5 44	1 34 30	6 38	1 42 45	7 13	16
15	1 13 43	4 48	1 27 34	5 43	1 41 08	6 37	1 49 58	7 12	15
16	1 18 31	4 47	1 33 17	5 42	1 47 45	6 35	1 57 09	7 09	14
17	1 23 18	4 46	1 38 59	5 40	1 54 20	6 33	2 04 18	7 08	13
18	1 28 04	4 45	1 44 39	5 38	2 00 53	6 31	2 11 26	7 06	12
19	1 32 49	4 43	1 50 17	5 37	2 07 24	6 30	2 18 32	7 03	11
20	1 37 32	4 42	1 55 54	5 35	2 13 54	6 27	2 25 35	7 02	10
21	1 42 14	4 40	2 01 29	5 33	2 20 21	6 25	2 32 37	7 00	9
22	1 46 54	4 39	2 07 02	5 31	2 26 46	6 23	2 39 37	6 57	8
23	1 51 33	4 37	2 12 33	5 29	2 33 09	6 21	2 46 34	6 54	7
24	1 56 10	4 35	2 18 02	5 27	2 39 30	6 19	2 53 28	6 52	6
25	2 00 45	4 33	2 23 29	5 25	2 45 49	6 16	3 00 20	6 50	5
26	2 05 18	4 31	2 28 54	5 23	2 52 05	6 13	3 07 10	6 47	4
27	2 09 49	4 28	2 34 17	5 21	2 58 18	6 11	3 13 57	6 44	3
28	2 14 17	4 26	2 39 38	5 18	3 04 29	6 08	3 20 41	6 40	2
29	2 18 43	4 25	2 44 56	5 15	3 10 37	6 05	3 27 21	6 37	1
30	2 23 08		2 50 11		3 16 42		3 33 58		0

Anomal. moyenne de la Lune.

XI. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.

ajoutez en montant.

Anomal. moyenne de la Lune.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DE LA LUNE.

ôtez en descendant.

Anomalie moyenne de la Lune.

I. *Signe.*

Anomalie moyenne de la Lune. D.	Excentricité 43619 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 52336 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 61045 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 66800 D. M. S.	Diff. M. S.	Anomalie moyenne de la Lune. D.
0	2 23 08		2 50 22		3 16 42		3 33 58		30
1	2 27 30	4 22	2 55 23	5 12	3 22 45	6 03	3 40 33	6 35	29
2	2 31 50	4 20	3 00 32	5 09	3 28 45	6 00	3 47 05	6 32	28
3	2 36 07	4 17	3 05 39	5 07	3 34 42	5 56	3 53 33	6 28	27
4	2 40 22	4 15	3 10 44	5 05	3 40 34	5 53	3 59 58	6 25	26
5	2 44 35	4 13	3 15 46	5 02	3 46 24	5 50	4 06 19	6 21	25
6	2 48 45	4 10	3 20 44	4 58	3 52 10	5 46	4 12 36	6 17	24
7	2 52 52	4 07	3 25 39	4 55	3 57 52	5 42	4 18 50	6 14	23
8	2 56 56	4 04	3 30 31	4 52	4 03 31	5 39	4 25 01	6 11	22
9	3 00 57	4 01	3 35 20	4 49	4 09 06	5 35	4 31 07	6 06	21
10	3 04 56	3 59	3 40 05	4 45	4 14 38	5 32	4 37 09	6 02	20
11	3 08 52	3 56	3 44 47	4 42	4 20 05	5 27	4 43 06	5 57	19
12	3 12 45	3 53	3 49 25	4 38	4 25 29	5 24	4 48 59	5 53	18
13	3 16 34	3 49	3 54 00	4 35	4 30 48	5 19	4 54 48	5 49	17
14	3 20 20	3 46	3 58 31	4 31	4 36 04	5 16	5 00 33	5 45	16
15	3 24 03	3 43	4 02 58	4 27	4 41 15	5 11	5 06 14	5 41	15
16	3 27 43	3 40	4 07 21	4 23	4 46 22	5 07	5 11 49	5 35	14
17	3 31 19	3 36	4 11 41	4 20	4 51 24	5 02	5 17 19	5 30	13
18	3 34 52	3 33	4 15 56	4 15	4 56 22	4 58	5 22 45	5 26	12
19	3 38 22	3 30	4 20 07	4 11	5 01 15	4 53	5 28 05	5 20	11
20	3 41 48	3 26	4 24 14	4 07	5 06 04	4 49	5 33 21	5 16	10
21	3 45 10	3 22	4 28 17	4 03	5 10 48	4 44	5 38 32	5 11	9
22	3 48 28	3 18	4 32 16	3 59	5 15 27	4 39	5 43 38	5 06	8
23	3 51 43	3 15	4 36 10	3 54	5 20 01	4 34	5 48 38	5 00	7
24	3 54 54	3 11	4 40 00	3 50	5 24 30	4 29	5 53 32	4 54	6
25	3 58 01	3 07	4 43 45	3 45	5 28 54	4 24	5 58 21	4 49	5
26	4 01 04	3 03	4 47 26	3 41	5 33 12	4 18	6 03 05	4 44	4
27	4 04 03	2 59	4 51 02	3 36	5 37 25	4 13	6 07 43	4 38	3
28	4 06 58	2 55	4 54 33	3 31	5 41 33	4 08	6 12 14	4 31	2
29	4 09 49	2 51	4 57 59	3 26	5 45 35	4 02	6 16 40	4 26	1
30	4 12 35	2 46	5 01 21	3 22	5 49 31	3 56	6 21 00	4 20	0

X. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.

ajoutez en montant.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DE LA LUNE.

ôtez en descendant.

Anomalie moyenne de la Lune.

II. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.	Excentricité 43619	Diff.	Excentricité 52316	Diff.	Excentricité 61045	Diff.	Excentricité 66800	Diff.	Anomalie moyenne de la Lune.
D	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D.
0	4 12 35		5 01 27		5 49 31		6 21 00		30
		2 43		3 10		3 51		4 14	
1	4 15 18		5 04 37		5 53 22		6 25 14		29
		2 38		3 12		3 46		4 08	
2	4 17 56		5 07 49		5 57 08		6 29 22		28
		2 34		3 06		3 39		4 01	
3	4 20 30		5 10 55		6 00 47		6 33 23		27
		2 29		3 01		3 33		3 55	
4	4 22 59		5 13 56		6 04 20		6 37 18		26
		2 25		2 57		3 28		3 50	
5	4 25 24		5 16 53		6 07 48		6 41 08		25
		2 21		2 51		3 22		3 43	
6	4 27 45		5 19 44		6 11 10		6 44 51		24
		2 16		2 45		3 16		3 36	
7	4 30 01		5 22 29		6 14 26		6 48 27		23
		2 11		2 40		3 09		3 29	
8	4 32 12		5 25 09		6 17 35		6 51 56		22
		2 07		2 35		3 03		3 22	
9	4 34 19		5 27 44		6 20 38		6 55 18		21
		2 02		2 29		2 56		3 16	
10	4 36 21		5 30 13		0 23 34		6 58 34		20
		1 57		2 23		2 51		3 09	
11	4 38 18		5 32 36		6 26 25		7 01 43		19
		1 52		2 18		2 44		3 01	
12	4 40 10		5 34 54		6 29 09		7 04 44		18
		1 48		2 12		2 37		2 54	
13	4 41 58		5 37 06		6 31 46		7 07 38		17
		1 43		2 06		2 31		2 47	
14	4 43 41		5 39 12		6 34 17		7 10 25		16
		1 38		2 00		2 24		2 40	
15	4 45 19		5 41 12		6 36 41		7 13 05		15
		1 33		1 55		2 17		2 34	
16	4 46 52		5 43 07		6 38 58		7 15 39		14
		1 28		1 49		2 11		2 26	
17	4 48 20		5 44 56		6 41 09		7 18 05		13
		1 23		1 43		2 04		2 17	
18	4 49 43		5 46 39		6 43 13		7 20 22		12
		1 17		1 37		1 57		2 10	
19	4 51 00		5 48 16		6 45 10		7 22 32		11
		1 12		1 31		1 50		2 03	
20	4 52 12		5 49 47		6 47 00		7 24 35		10
		1 08		1 24		1 43		1 56	
21	4 53 20		5 51 11		6 48 43		7 26 31		9
		1 02		1 18		1 35		1 48	
22	4 54 22		5 52 29		6 50 18		7 28 19		8
		0 57		1 13		1 28		1 40	
23	4 55 19		5 53 42		6 51 46		7 29 59		7
		0 52		1 06		1 21		1 32	
24	4 56 11.		5 54 48		6 53 07		7 31 31		6
		0 47		1 00		1 14		1 24	
25	4 56 58		5 55 48		6 54 21		7 32 55		5
		0 41		0 53		1 07		1 16	
26	4 57 39		5 56 41		6 55 28		7 34 11		4
		0 36		0 47		0 59		1 09	
27	4 58 15		5 57 28		6 56 27		7 35 20		3
		0 31		0 41		0 52		1 00	
28	4 58 46		5 58 09		6 57 19		7 36 20		2
		0 25		0 34		0 45		0 52	
29	4 59 11		5 58 43		6 58 04		7 37 12		1
		0 20		0 28		0 37		0 44	
30	4 59 31		5 59 11		6 58 41		7 37 56		0

IX. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.

ajoutez en montant.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DE LA LUNE.

ôtez en descendant.

Anomalie moyenne de la Lune.

III. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.	Excentricité 43619	*Diff.*	Excentricité 52336	*Diff.*	Excentricité 61045	*Diff.*	Excentricité 66800	*Diff.*	Anomalie moyenne de la Lune.
D.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D M S.	M. S.	D.
0	4 59 31		5 59 11		6 58 41		7 37 56		30
	4 59 45	0 14	5 59 32	0 21	6 59 10	0 29	7 38 31	0 35	29
2	4 59 54	0 09	5 59 47	0 15	6 59 32	0 22	7 38 58	0 27	28
3	4 59 57	0 03	5 59 55	0 08	6 59 47	0 15	7 39 17	0 19	27
4	4 59 55	0 02	5 59 56	0 01	6 59 53	0 06	7 39 29	0 12	26
5	4 59 47	0 08	5 59 51	0 05	6 59 52	0 01	7 39 31	0 02	25
6	4 59 34	0 13	5 59 39	0 12	6 59 44	0 08	7 39 26	0 05	24
7	4 59 16	0 18	5 59 21	0 18	6 59 28	0 16	7 39 11	0 15	23
8	4 58 52	0 24	5 58 57	0 24	6 59 04	0 24	7 38 48	0 23	22
9	4 58 22	0 30	5 58 26	0 31	6 58 31	0 33	7 38 16	0 32	21
10	4 57 47	0 35	5 57 48	0 38	6 57 51	0 40	7 37 36	0 40	20
11	4 57 06	0 41	5 57 03	0 45	6 57 04	0 47	7 36 47	0 49	19
12	4 56 20	0 46	5 56 11	0 52	6 56 08	0 56	7 35 50	0 57	18
13	4 55 28	0 52	5 55 12	0 59	6 55 05	1 03	7 34 44	1 06	17
14	4 54 30	0 58	5 54 07	1 05	6 53 54	1 11	7 33 29	1 15	16
15	4 53 27	1 03	5 52 56	1 11	6 52 35	1 19	7 32 06	1 23	15
16	4 52 19	1 08	5 51 38	1 18	6 51 08	1 27	7 30 35	1 31	14
17	4 51 05	1 14	5 50 13	1 25	6 49 33	1 35	7 28 55	1 40	13
18	4 49 45	1 20	5 48 41	1 32	6 47 51	1 42	7 27 05	1 50	12
19	4 48 20	1 25	5 47 02	1 39	6 46 00	1 51	7 25 07	1 58	11
20	4 46 49	1 31	5 45 16	1 46	6 44 02	1 58	7 23 01	2 06	10
21	4 45 13	1 36	5 43 24	1 52	6 41 55	2 07	7 20 46	2 15	9
22	4 43 31	1 42	5 41 26	1 58	6 39 41	2 14	7 18 23	2 23	8
23	4 41 44	1 47	5 39 21	2 05	6 37 19	2 22	7 15 50	2 33	7
24	4 39 52	1 52	5 37 09	2 12	6 34 50	2 29	7 13 09	2 41	6
25	4 37 54	1 58	5 34 50	2 19	6 32 13	2 37	7 10 19	2 50	5
26	4 35 50	2 04	5 32 25	2 25	6 29 28	2 45	7 07 20	2 59	4
27	4 33 41	2 09	5 29 53	2 32	6 26 34	2 54	7 04 13	3 07	3
28	4 31 27	2 14	5 27 15	2 38	6 23 33	3 01	7 00 57	3 16	2
29	4 29 08	2 19	5 24 31	2 44	6 20 24	3 09	6 57 33	3 24	1
30	4 26 43	2 25	5 21 40	2 51	6 17 08	3 16	6 54 02	3 31	0

IV. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.

ajoutez en montant.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DE LA LUNE

ôtez en descendant.

Anomalie moyenne de la Lune.

I V. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.	Excentricité 43619	Diff.	Excentricité 52336	Diff.	Excentricité 61045	Diff.	Excentricité 66800	Diff.	Anomalie moyenne de la Lune.
D.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D.
0	4 26 43		5 21 40		6 17 08		6 54 02		30
		2 30		2 58		3 24		3 41	
1	4 24 13		5 18 42		6 13 44		6 50 21		29
		2 35		3 04		3 32		3 50	
2	4 21 38		5 15 38		6 10 12		6 46 31		28
		2 41		3 10		3 39		3 57	
3	4 18 57		5 12 28		6 06 33		6 42 34		27
		2 46		3 17		3 46		4 06	
4	4 16 11		5 09 11		6 02 47		6 38 28		26
		2 50		3 23		3 54		4 14	
5	4 13 21		5 05 48		5 58 53		6 34 14		25
		2 56		3 29		4 02		4 22	
6	4 10 25		5 02 19		5 54 51		6 29 52		24
		3 00		3 35		4 09		4 31	
7	4 07 25		4 58 44		5 50 42		6 25 21		23
		3 06		3 41		4 16		4 40	
8	4 04 19		4 55 03		5 46 26		6 20 41		22
		3 11		3 47		4 23		4 47	
9	4 01 08		4 51 16		5 42 03		6 15 54		21
		3 16		3 53		4 31		4 55	
10	3 57 52		4 47 23		5 37 32		6 10 59		20
		3 20		4 00		4 38		5 02	
11	3 54 32		4 43 23		5 32 54		6 05 57		19
		3 25		4 05		4 45		5 10	
12	3 51 07		4 39 18		5 28 09		6 00 47		18
		3 30		4 11		4 51		5 19	
13	3 47 37		4 35 07		5 23 18		5 55 28		17
		3 35		4 16		4 58		5 26	
14	3 44 02		4 30 51		5 18 20		5 50 02		16
		3 39		4 22		5 06		5 33	
15	3 40 23		4 26 29		5 13 14		5 44 29		15
		3 43		4 28		5 12		5 39	
16	3 36 40		4 22 01		5 08 02		5 38 50		14
		3 48		4 33		5 18		5 48	
17	3 32 52		4 17 28		5 02 44		5 33 02		13
		3 53		4 39		5 25		5 56	
18	3 28 59		4 12 49		4 57 19		5 27 06		12
		3 57		4 44		5 31		6 03	
19	3 25 02		4 08 05		4 51 48		5 21 03		11
		4 00		4 49		5 37		6 10	
20	3 21 02		4 03 16		4 46 11		5 14 53		10
		4 05		4 54		5 45		6 17	
21	3 16 57		3 58 22		4 40 26		5 08 36		9
		4 09		5 00		5 50		6 24	
22	3 12 48		3 53 22		4 34 36		5 02 12		8
		4 13		5 05		5 56		6 30	
23	3 08 35		3 48 17		4 28 40		4 55 42		7
		4 17		5 09		6 02		6 35	
24	3 04 18		3 43 08		4 22 38		4 49 01		6
		4 21		5 14		6 07		6 43	
25	2 59 57		3 37 54		4 16 31		4 42 24		5
		4 25		5 19		6 13		6 50	
26	2 55 32		3 32 35		4 10 18		4 35 34		4
		4 28		5 23		6 19		6 56	
27	2 51 04		3 27 12		4 03 59		4 28 38		3
		4 32		5 28		6 24		7 02	
28	2 46 32		3 21 44		3 57 35		4 21 36		2
		4 35		5 33		6 29		7 07	
29	2 41 57		3 16 11		3 51 06		4 14 29		1
		4 39		5 36		6 35		7 13	
30	2 37 18		3 10 35		3 44 31		4 07 16		0

VII. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.

ajoutez en montant.

Anomalie moyenne de la Lune.

Anomalie moyenne de la Lune.

TABLES
DE
L'EQUATION DU CENTRE
DE LA LUNE.

Ôtez en descendant.

Anomalie moyenne de la Lune.

V. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune. D.	Excentricité 43619 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 52336 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 61045 D. M. S.	Diff. M. S.	Excentricité 66800 D. M. S.	Diff. M. S.	Anomalie moyenne de la Lune. D.
0	2 37 18		3 10 35		3 44 31		4 07 16		30
1	2 32 36	4 42	3 04 55	5 40	3 37 51	6 40	3 59 57	7 19	29
2	2 27 51	4 45	2 59 10	5 45	3 31 06	6 45	3 52 33	7 24	28
3	2 23 02	4 49	2 53 22	5 48	2 24 17	6 49	3 45 04	7 29	27
4		4 51		5 52		6 54		7 35	
5	2 18 11		2 47 30		3 17 23		3 37 29		26
6	2 13 17	4 54	2 41 34	5 56	3 10 25	6 58	3 29 49	7 40	25
7	2 08 20	4 57	2 35 34	6 00	3 03 22	7 03	3 22 04	7 45	24
8		5 00		6 03		7 06		7 50	
9	2 03 20		2 29 31		2 56 16		3 14 14		23
10	1 58 17	5 03	2 23 25	6 06	2 49 05	7 11	3 06 20	7 54	22
11	1 53 12	5 05	2 17 16	6 09	2 41 51	7 14	2 58 22	7 58	21
12		5 07		6 12		7 18		8 03	
13	1 48 05		2 11 04		2 34 33		2 50 19		20
14	1 42 55	5 10	2 04 49	6 15	2 27 11	7 22	2 42 13	8 06	19
15	1 37 43	5 12	1 58 31	6 18	2 19 47	7 24	2 34 03	8 10	18
16		5 14		6 20		7 28		8 13	
17	1 32 29		1 52 11		2 12 19		2 25 50		17
18	1 27 13	5 16	1 45 48	6 23	2 04 48	7 31	2 17 34	8 16	16
19	1 21 55	5 18	1 39 22	6 26	1 57 14	7 34	2 09 14	8 20	15
20		5 20		6 27		7 37		8 23	
21	1 16 35		1 32 55		1 49 37		2 00 51		14
22	1 11 14	5 21	1 26 25	6 30	1 41 57	7 40	1 52 25	8 26	13
23	1 05 51	5 23	1 19 54	6 31	1 34 16	7 41	1 43 56	8 29	12
24		5 24		6 33		7 44		8 32	
25	1 00 27		1 13 21		1 26 32		1 35 24		11
26	0 55 01	5 26	1 06 46	6 35	1 18 47	7 45	1 26 51	8 33	10
27	0 49 34	5 27	1 00 10	6 36	1 10 59	7 48	1 18 16	8 35	9
28		5 28		6 38		7 49		8 37	
29	0 44 06		0 53 32		1 03 10		1 09 39		8
30	0 38 38	5 28	0 46 53	6 39	0 55 19	7 51	1 01 00	8 39	7
31	0 33 08	5 30	0 40 13	6 40	0 47 27	7 52	0 52 19	8 41	6
32		5 30		6 41		7 53		8 41	
33	0 27 38		0 33 32		0 39 34		0 43 38		5
34	0 22 07	5 31	0 26 50	6 42	0 31 41	7 53	0 34 56	8 42	4
35	0 16 35	5 32	0 20 08	6 42	0 23 46	7 55	0 26 13	8 43	3
36		5 31		6 42		7 55		8 44	
37	0 11 04		0 13 26		0 15 51		0 17 29		2
38	0 05 32	5 32	0 06 43	6 43	0 07 55	7 56	0 08 45	8 44	1
39	0 00 00	5 32	0 00 00	6 43	0 00 00	7 55	0 00 00	8 45	0

VI. *Signes.*

Anomalie moyenne de la Lune.

ajoutez en montant.

TABLES
DE LA VARIATION
DE LA LUNE.

ajoutez en descendant.

Distance de la Lune au Soleil.

O. & VI. *Signes.*

La plus grande Variation.

Distance de la Lune au Soleil. D.	33′ M. S.	Diff. M. S	34′ M. S.	Diff. M. S.	35′ M. S.	Diff. M. S.	36′ M. S.	Diff. M. S.	37′ M. S.	Diff. M. S.	D.
0	0 00		0 00		0 00		0 00		0 00		30
1	1 09	1 09	1 11	1 11	1 13	1 13	1 15	1 15	1 17	1 17	29
2	2 18	1 09	2 22	1 11	2 26	1 13	2 31	1 16	2 35	1 18	28
3	3 27	1 09	3 33	1 11	3 39	1 13	3 46	1 15	3 52	1 17	27
4	4 36	1 08	4 44	1 10	4 52	1 13	5 01	1 14	5 09	1 16	26
5	5 44	1 07	5 54	1 10	6 05	1 11	6 15	1 14	6 25	1 16	25
6	6 51	1 06	7 04	1 10	7 16	1 12	7 29	1 14	7 41	1 16	24
7	7 59	1 07	8 14	1 10	8 28	1 11	8 43	1 12	8 57	1 15	23
8	9 06	1 06	9 24	1 10	9 39	1 11	9 55	1 12	10 12	1 15	22
9	10 12	1 05	10 30	1 08	10 49	1 09	11 07	1 12	11 26	1 13	21
10	11 17	1 04	11 38	1 06	11 58	1 08	12 19	1 10	12 39	1 12	20
11	12 21	1 04	12 44	1 06	13 06	1 08	13 29	1 09	13 51	1 12	19
12	13 25	1 03	13 50	1 04	14 14	1 06	14 38	1 09	15 03	1 10	18
13	14 28	1 01	14 54	1 04	15 20	1 06	15 47	1 07	16 13	1 09	17
14	15 29	1 01	15 58	1 02	16 26	1 04	16 54	1 06	17 22	1 08	16
15	16 30	0 59	17 00	1 01	17 30	1 03	18 00	1 05	18 30	1 07	15
16	17 29	0 58	18 01	1 00	18 33	1 01	19 05	1 03	19 37	1 07	14
17	18 27	0 57	19 01	0 58	19 34	1 01	20 08	1 02	20 41	1 04	13
18	19 24	0 57	19 59	0 57	20 34	1 00	21 10	1 02	21 45	1 04	12
19	20 19	0 55	20 56	0 57	21 33	0 59	22 10	1 00	22 47	1 02	11
20	21 13	0 54	21 51	0 55	22 30	0 57	23 08	0 58	23 47	1 00	10
21	22 05	0 52	22 45	0 54	23 25	0 55	24 05	0 57	24 46	0 59	9
22	22 56	0 51	23 37	0 52	24 19	0 54	25 01	0 56	25 42	0 56	8
23	23 44	0 48	24 28	0 51	25 11	0 52	25 54	0 53	26 37	0 55	7
24	24 31	0 47	25 16	0 48	26 00	0 49	26 45	0 51	27 30	0 53	6
25	25 17	0 46	26 03	0 47	26 49	0 49	27 35	0 50	28 21	0 51	5
26	26 00	0 43	26 48	0 45	27 35	0 46	28 22	0 47	29 09	0 48	4
27	26 42	0 42	27 30	0 42	28 19	0 44	29 07	0 45	29 56	0 47	3
28	27 21	0 39	28 11	0 41	29 01	0 42	29 50	0 43	30 40	0 44	2
29	27 59	0 38	28 50	0 39	29 41	0 40	30 32	0 42	31 23	0 43	1
30	28 35	0 36	29 27	0 37	30 19	0 38	31 11	0 39	32 03	0 40	0

XI. & V. *Signes.*

Distance de la Lune au Soleil.

ôtez en montant.

TABLES
DE LA VARIATION
DE LA LUNE.

ajoutez en descendant.

Distance de la Lune au Soleil.

I. & VII. *Signes.*

La plus grande Variation.

D.	33′ M. S.	Diff. M. S.	34′ M. S.	Diff. M. S.	35′ M. S.	Diff. M. S.	36′ M. S.	Diff. M. S.	37′ M. S.	Diff. M. S.	D.
0	28 35		29 27		30 19		31 11		32 03		30
1	29 08	0 33	30 01	0 34	30 54	0 35	31 47	0 36	32 40	0 37	29
2	29 40	0 32	30 34	0 33	31 28	0 34	32 22	0 35	33 16	0 36	28
3	30 09	0 29	31 04	0 30	31 59	0 31	32 53	0 31	33 48	0 32	27
4	30 36	0 27	31 32	0 28	32 27	0 28	33 23	0 30	34 18	0 30	26
5	31 01	0 25	31 57	0 25	32 53	0 26	33 50	0 27	34 46	0 28	25
6	31 23	0 22	32 20	0 23	33 17	0 24	34 14	0 24	35 11	0 25	24
7	31 44	0 21	32 41	0 21	33 39	0 22	34 37	0 23	35 34	0 23	23
8	32 02	0 18	33 00	0 19	33 58	0 19	34 56	0 19	35 55	0 21	22
9	32 17	0 15	33 16	0 16	34 14	0 16	35 12	0 16	36 11	0 16	21
10	32 30	0 13	33 29	0 13	34 28	0 14	35 26	0 14	36 26	0 15	20
11	32 41	0 11	33 40	0 11	34 40	0 12	35 38	0 12	36 38	0 12	19
12	32 49	0 08	33 49	0 09	34 48	0 08	35 48	0 10	36 48	0 10	18
13	32 55	0 06	33 55	0 06	34 55	0 07	35 55	0 07	36 54	0 06	17
14	32 59	0 04	33 59	0 04	34 59	0 04	35 59	0 04	36 59	0 05	16
15	33 00	0 01	34 00	0 01	35 00	0 01	36 00	0 01	37 00	0 01	15
16	32 59	0 01	33 59	0 01	34 59	0 01	35 59	0 01	36 59	0 01	14
17	32 55	0 04	33 55	0 04	34 55	0 04	35 55	0 04	36 54	0 05	13
18	32 49	0 06	33 49	0 06	34 48	0 07	35 48	0 07	36 48	0 06	12
19	32 41	0 08	33 40	0 09	34 40	0 08	35 39	0 09	36 38	0 10	11
20	32 30	0 11	33 29	0 11	34 28	0 12	35 27	0 12	36 26	0 12	10
21	32 17	0 13	33 15	0 14	34 14	0 14	35 12	0 15	36 11	0 15	9
22	32 02	0 15	33 00	0 15	33 58	0 16	34 55	0 17	35 55	0 06	8
23	31 44	0 18	32 41	0 19	33 39	0 19	34 36	0 19	35 34	0 21	7
24	31 23	0 21	32 20	0 21	33 17	0 22	34 14	0 22	35 11	0 23	6
25	31 01	0 22	31 57	0 23	32 53	0 24	33 50	0 24	34 46	0 25	5
26	30 37	0 24	31 32	0 25	32 27	0 26	33 23	0 27	34 18	0 28	4
27	30 10	0 27	31 04	0 28	31 59	0 28	32 53	0 30	33 48	0 30	3
28	29 41	0 29	30 34	0 30	31 28	0 31	32 21	0 32	33 16	0 32	2
29	29 10	0 31	30 01	0 33	30 54	0 34	31 47	0 34	32 40	0 36	1
30	28 35	0 35	29 27	0 34	30 19	0 35	31 11	0 36	32 03	0 37	0

IV. & X. *Signes.*

Distance de la Lune au Soleil.

ôtez en montant.

TABLES
DE LA VARIATION
DE LA LUNE.

ajoutez en descendant.

Distance de la Lune au Soleil.

La plus grande Variation.

II. & VIII. *Signes.*

D.	33′ M.	33′ S.	Diff. M.	Diff. S.	34′ M.	34′ S.	Diff. M.	Diff. S.	35′ M.	35′ S.	Diff. M.	Diff. S.	36′ M.	36′ S.	Diff. M.	Diff. S.	37′ M.	37′ S.	Diff. M.	Diff. S.	D.
0	28	35			29	27			30	19			31	11			32	03			30
1	27	59	0	36	28	50	0	37	29	41	0	38	30	32	0	39	31	23	0	40	29
2	27	21	0	38	28	11	0	39	29	01	0	40	29	50	0	42	30	40	0	43	28
3	26	42	0	39	27	30	0	41	28	19	0	42	29	07	0	43	29	56	0	44	27
4	26	00	0	42	26	48	0	42	27	35	0	44	28	32	0	45	29	09	0	47	26
5	25	17	0	43	26	03	0	45	26	49	0	46	27	35	0	47	28	21	0	48	25
6	24	31	0	46	25	16	0	47	26	00	0	47	26	45	0	50	27	30	0	51	24
7	23	44	0	47	24	28	0	48	25	11	0	49	25	54	0	51	26	37	0	53	23
8	22	56	0	48	23	37	0	51	24	19	0	52	25	01	0	53	25	42	0	55	22
9	22	05	0	51	22	45	0	52	23	25	0	54	24	05	0	56	24	46	0	56	21
10	21	13	0	52	21	51	0	54	22	30	0	55	23	08	0	57	23	47	0	59	20
11	20	19	0	54	20	56	0	55	21	33	0	57	22	10	0	58	22	47	1	00	19
12	19	24	0	55	19	59	0	57	20	34	0	59	21	10	1	00	21	45	1	02	18
13	18	27	0	57	19	01	0	58	19	34	1	00	20	08	1	01	20	41	1	03	17
14	17	29	0	58	18	01	1	00	18	33	1	01	19	05	1	03	19	37	1	04	16
15	16	30	0	59	17	00	1	01	17	30	1	03	18	00	1	04	18	30	1	06	15
16	15	29	1	01	15	58	1	02	16	26	1	04	16	54	1	06	17	22	1	07	14
17	14	28	1	01	14	54	1	04	15	20	1	06	15	47	1	07	16	13	1	09	13
18	13	25	1	03	13	50	1	04	14	14	1	06	14	38	1	09	15	03	1	10	12
19	12	21	1	04	12	44	1	06	13	06	1	08	13	29	1	10	13	51	1	12	11
20	11	17	1	04	11	38	1	07	11	58	1	09	12	19	1	12	12	39	1	13	10
21	10	12	1	05	10	31	1	07	10	49	1	10	11	07	1	12	11	26	1	14	9
22	9	06	1	06	9	24	1	10	9	39	1	11	9	55	1	14	10	12	1	15	8
23	7	59	1	07	8	14	1	10	8	28	1	12	8	43	1	14	8	57	1	16	7
24	6	51	1	07	7	04	1	10	7	16	1	11	7	29	1	14	7	41	1	16	6
25	5	44	1	08	5	54	1	10	6	05	1	13	6	15	1	14	6	25	1	16	5
26	4	36	1	09	4	44	1	11	4	52	1	13	5	01	1	15	5	09	1	17	4
27	3	27	1	09	3	33	1	11	3	39	1	13	3	46	1	15	3	52	1	17	3
28	2	18	1	09	2	22	1	11	2	26	1	13	2	31	1	16	2	35	1	18	2
29	1	09	1	09	1	11	1	11	1	13	1	13	1	15	1	17	1	17	1	17	1
30	0	00			0	00			0	00			0	00			0	00			0

III. & IX. *Signes.*

Distance de la Lune au Soleil.

ôtez en montant.

Distance de la Lune au Soleil.

TABLE
DE LA SIXIEME EQUATION DE LA LUNE.

Somme des Distances, &c.

Somme des Distances de la Lune au Soleil, & de l'Apogée de la Lune à l'Apogée du Soleil.

ajoutez en descendant.

O. *Signe.*	I.	II
ôtez en descendant.		
VI.	VII.	VIII.

D.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	D.
0	0	00	1	05	1	53	30
1	0	02	1	07	1	54	29
2	0	04	1	09	1	55	28
3	0	07	1	11	1	56	27
4	0	09	1	13	1	57	26
5	0	11	1	14	1	58	25
6	0	13	1	16	1	59	24
7	0	16	1	18	2	00	23
8	0	18	1	20	2	01	22
9	0	20	1	22	2	01	21
10	0	22	1	23	2	02	20
11	0	25	1	25	2	03	19
12	0	27	1	27	2	03	18
13	0	29	1	29	2	04	17
14	0	31	1	30	2	05	16
15	0	34	1	32	2	05	15
16	0	36	1	34	2	06	14
17	0	38	1	35	2	07	13
18	0	40	1	37	2	07	12
19	0	42	1	38	2	08	11
20	0	44	1	40	2	08	10
21	0	47	1	41	2	08	9
22	0	49	1	42	2	09	8
23	0	51	1	44	2	09	7
24	0	53	1	45	2	09	6
25	0	55	1	47	2	09	5
26	0	57	1	48	2	10	4
27	0	59	1	49	2	10	3
28	1	01	1	50	2	10	2
29	1	03	1	51	2	10	1
30	1	05	1	53	2	10	0

V.	IV.	III.
ajoutez en montant.		
XI.	X.	IX.
ôtez en montant.		

Somme des Distances de la Lune au Soleil, & de l'Apogée de la Lune à l'Apogée du Soleil.

Somme des Distances, &c.

Somme des Distances, &c.

TABLE
DE LA SEPTIEME EQUATION DE LA LUNE.

Dist. de la Lune au Soleil.

DISTANCE DE LA LUNE AU SOLEIL.

ôtez en descendant.

O. *Signe.*	I.	II.
ajoutez en descendant.		
VI.	VII.	VIII.

D.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	D.
0	0	00	1	10	2	01	30
1	0	02	1	12	2	02	29
2	0	05	1	14	2	04	28
3	0	07	1	16	2	05	27
4	0	10	1	18	2	06	26
5	0	12	1	20	2	07	25
6	0	15	1	22	2	08	24
7	0	17	1	24	2	09	23
8	0	19	1	26	2	10	22
9	0	22	1	28	2	11	21
10	0	24	1	30	2	12	20
11	0	27	1	32	2	12	19
12	0	29	1	34	2	13	18
13	0	31	1	35	2	14	17
14	0	34	1	38	2	15	16
15	0	36	1	39	2	15	15
16	0	39	1	42	2	16	14
17	0	41	1	42	2	16	13
18	0	43	1	44	2	17	12
19	0	46	1	46	2	17	11
20	0	48	1	47	2	18	10
21	0	50	1	49	2	18	9
22	0	52	1	50	2	19	8
23	0	55	1	52	2	19	7
24	0	57	1	53	2	19	6
25	0	59	1	55	2	20	5
26	1	02	1	56	2	20	4
27	1	04	1	58	2	20	3
28	1	06	1	59	2	20	2
29	1	08	2	00	2	20	1
30	1	10	2	01	2	20	0

V.	IV.	III.
ôtez en montant.		
XI.	X.	IX.
ajoutez en montant.		

DISTANCE DE LA LUNE AU SOLEIL.

Dist. de la Lune au Soleil.

REDUCTIONS
DES LIEUX DE LA LUNE
AU PLAN DE L'ECLIPTIQUE.

ôtez en descendant.

Argument de la Latitude ou Distance de la Lune au Nœud Ascendant.

Argument de la Latitude.	O. Sign. Inclinaison de l'Orb. 5° 0′	O. Sign. Inclinaison de l'Orb. 5° 6′	VI. Inclinaison de l'Orb. 5° 12′	VI. Inclinaison de l'Orb. 5° 18′	I. Inclinaison de l'Orb. 5° 0′	I. Inclinaison de l'Orb. 5° 6′	VII. Inclinaison de l'Orb. 5° 12′	VII. Inclinaison de l'Orb. 5° 18′	II. Inclinaison de l'Orb. 5° 0′	II. Inclinaison de l'Orb. 5° 6′	VIII. Inclinaison de l'Orb. 5° 12′	VIII. Inclinaison de l'Orb. 5° 18′	Argument de la Latitude.
D.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	D.
0	0 00	0 00	0 00	0 00	5 40	5 54	6 08	6 22	5 41	5 55	6 09	6 23	30
1	0 14	0 14	0 15	0 16	5 47	6 01	6 15	6 30	5 34	5 47	6 01	6 15	29
2	0 27	0 29	0 30	0 31	5 53	6 07	6 22	6 37	5 26	5 39	5 53	6 07	28
3	0 41	0 43	0 44	0 46	5 59	6 13	6 28	6 44	5 18	5 31	5 44	5 57	27
4	0 55	0 57	0 59	1 01	6 04	6 19	6 34	6 50	5 10	5 22	5 35	5 48	26
5	1 08	1 11	1 13	1 16	6 09	6 24	6 39	6 55	5 02	5 13	5 25	5 38	25
6	1 22	1 25	1 28	1 31	6 14	6 29	6 44	7 00	4 53	5 03	5 15	5 28	24
7	1 35	1 38	1 42	1 46	6 18	6 33	6 48	7 04	4 43	4 53	5 05	5 17	23
8	1 48	1 52	1 57	2 01	6 21	6 37	6 52	7 08	4 34	4 43	4 55	5 06	22
9	2 01	2 06	2 11	2 16	6 24	6 40	6 56	7 12	4 23	4 33	4 44	4 55	21
10	2 14	2 19	2 25	2 31	6 27	6 43	6 59	7 15	4 13	4 23	4 33	4 44	20
11	2 27	2 32	2 38	2 45	6 29	6 45	7 01	7 17	4 02	4 12	4 22	4 32	19
12	2 40	2 45	2 52	2 59	6 31	6 47	7 03	7 19	3 51	4 00	4 10	4 20	18
13	2 52	2 58	3 05	3 13	6 32	6 48	7 04	7 21	3 40	3 49	3 58	4 07	17
14	3 04	3 11	3 18	3 27	6 33	6 49	7 05	7 22	3 29	3 37	3 45	3 54	16
15	3 16	3 24	3 32	3 41	6 33	6 49	7 05	7 22	3 17	3 24	3 32	3 41	15
16	3 28	3 37	3 46	3 54	6 33	6 49	7 05	7 22	3 05	3 11	3 18	3 27	14
17	3 40	3 49	3 58	4 07	6 32	6 48	7 04	7 21	2 53	2 58	3 05	3 13	13
18	3 51	4 00	4 10	4 20	6 31	6 47	7 03	7 19	2 40	2 45	3 52	2 59	12
19	4 02	4 12	4 22	4 32	6 29	6 45	7 01	7 17	2 28	2 32	2 38	2 45	11
20	4 12	4 23	4 33	4 44	6 27	6 43	6 59	7 15	2 15	2 19	2 25	2 31	10
21	4 23	4 33	4 44	4 55	6 25	6 40	6 56	7 12	2 02	2 06	2 11	2 16	9
22	4 33	4 43	4 55	5 06	6 22	6 38	6 52	7 08	1 49	1 52	1 57	2 01	8
23	4 43	4 53	5 05	5 17	6 18	6 34	6 48	7 05	1 35	1 38	1 42	1 46	7
24	4 52	5 03	5 15	5 28	6 14	6 30	6 45	7 01	1 22	1 25	1 28	1 31	6
25	5 01	5 13	5 25	5 38	6 10	6 25	6 40	6 56	1 08	1 11	1 13	1 16	5
26	5 09	5 22	5 35	5 48	6 05	6 20	6 35	6 51	0 55	0 57	0 59	1 01	4
27	5 18	5 31	5 44	5 57	6 00	6 14	6 29	6 45	0 41	0 43	0 44	0 46	3
28	5 26	5 39	5 53	6 06	5 54	6 08	6 23	6 38	0 27	0 29	0 30	0 31	2
29	5 33	5 47	6 01	6 14	5 47	6 02	6 16	6 31	0 14	0 14	0 15	0 16	1
30	5 40	5 54	6 08	6 22	5 41	6 55	6 09	6 23	0 00	0 00	0 00	0 00	0
Argument de la Latitude.	V.		XI.		IV.		X.		III.		IX.		Argument de la Latitude.

Argument de la Latitude ou Distance de la Lune au Nœud Ascendant.

ajoutez en montant.

TABLES
DE
LA LATITUDE DE LA LUNE.

Latitudes Boreales ou Australes.

Argument de la Latitude.

O. & VI. *Signes.*

Argument de la Latitude.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 0′	Diff.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 6′	Diff.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 12′	Diff.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 18′	Diff.	Argument de la Latitude.
D.	D M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D.
0	0 00 00	5 14	0 00 00	5 20	0 00 00	5 27	0 00 00	5 33	30
1	0 05 14	5 14	0 05 20	5 20	0 05 27	5 27	0 05 33	5 32	29
2	0 10 28	5 14	0 10 40	5 20	0 10 54	5 26	0 11 05	5 32	28
3	0 15 42	5 14	0 16 00	5 19	0 16 20	5 25	0 16 37	5 32	27
4	0 20 55	5 13	0 21 19	5 19	0 21 45	5 25	0 22 09	5 32	26
5	0 26 08	5 12	0 26 38	5 19	0 27 10	5 25	0 27 41	5 31	25
6	0 31 20	5 12	0 31 57	5 18	0 32 35	5 24	0 33 12	5 30	24
7	0 36 32	5 11	0 37 15	5 18	0 37 59	5 24	0 38 42	5 30	23
8	0 41 43	5 10	0 42 33	5 16	0 43 23	5 22	0 44 12	5 29	22
9	0 46 53	5 09	0 47 49	5 15	0 48 45	5 21	0 49 41	5 28	21
10	0 52 02	5 08	0 53 04	5 14	0 54 06	5 21	0 55 09	5 27	20
11	0 57 10	5 08	0 58 18	5 14	0 59 27	5 20	1 00 36	5 25	19
12	1 02 18	5 06	1 03 32	5 13	1 04 47	5 19	1 06 01	5 24	18
13	1 07 24	5 05	1 08 45	5 11	1 10 06	5 17	1 11 25	5 24	17
14	1 12 29	5 04	1 13 56	5 10	1 15 23	5 16	1 16 49	5 23	16
15	1 17 33	5 03	1 19 06	5 08	1 20 39	5 15	1 22 12	5 21	15
16	1 22 36	5 01	1 24 14	5 07	1 25 54	5 13	1 27 33	5 19	14
17	1 27 37	5 59	1 29 21	5 05	1 31 07	5 11	1 32 52	5 17	13
18	1 32 36	4 58	1 34 26	5 04	1 36 18	5 09	1 38 09	5 15	12
19	1 37 34	4 55	1 39 30	5 02	1 41 27	5 08	1 43 24	5 13	11
20	1 42 29	4 54	1 44 32	5 01	1 46 35	5 06	1 48 37	5 11	10
21	1 47 23	4 53	1 49 33	4 57	1 51 41	5 04	1 53 48	5 10	9
22	1 52 16	4 50	1 54 30	4 56	1 56 45	5 02	1 58 58	5 08	8
23	1 57 06	4 48	1 59 26	4 54	2 01 47	4 59	2 04 06	5 05	7
24	2 01 54	4 45	2 04 20	4 51	2 06 46	4 57	2 09 11	5 03	6
25	2 06 39	4 44	2 09 11	4 49	2 11 43	4 54	2 14 14	5 00	5
26	2 11 23	4 41	2 14 00	4 47	2 16 37	4 52	2 19 14	4 58	4
27	2 16 04	4 38	2 18 47	4 44	2 21 29	4 50	2 24 12	4 55	3
28	2 20 42	4 36	2 23 31	4 41	2 26 19	4 47	2 29 07	4 53	2
29	2 25 18	4 33	2 28 12	4 38	2 31 06	4 44	2 34 00	4 50	1
30	2 29 51		2 32 50		2 35 50		2 38 50		0

V. & XI. *Signes.*

Argument de la Latitude.

Latitudes Boreales ou Australes.

Argument de la Latitude.

TABLES
DE
LA LATITUDE DE LA LUNE.

Latitudes Boreales ou *Australes.*

Argument de la Latitude.

I. & VII. *Signes.*

Argument de la Latitude. D.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 0′ D. M. S.	Diff. M. S.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 6′ D. M. S.	Diff. M. S.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 12′ D. M. S.	Diff. M. S.	Inclinaison de l'Orbite. 5° 18′ D. M. S.	Diff. M. S.	Argument de la Latitude. D.
0	2 29 51	4 31	2 32 50	4 37	2 35 50	4 42	2 38 50	4 47	30
1	2 34 22	4 28	2 37 27	4 33	2 40 32	4 38	2 43 37	4 44	29
2	2 38 50	4 25	2 42 00	4 30	2 45 10	4 36	2 48 21	4 40	28
3	2 43 15	4 22	2 46 30	4 27	2 49 46	4 33	2 53 01	4 38	27
4	2 47 37	4 19	2 50 57	4 25	2 54 19	4 29	2 57 39	4 35	26
5	2 51 56	4 15	2 55 22	4 21	2 58 48	4 26	3 02 14	4 31	25
6	2 56 11	4 13	2 59 43	4 18	3 03 14	4 22	3 06 45	4 28	24
7	3 00 24	4 09	3 04 01	4 14	3 07 36	4 19	3 11 13	4 24	23
8	3 04 33	4 06	3 08 15	4 10	3 11 55	4 16	3 15 37	4 20	22
9	3 08 39	4 01	3 12 25	4 07	3 16 11	4 12	3 19 57	4 17	21
10	3 12 42	3 59	3 16 32	4 04	3 20 23	4 09	3 24 14	4 13	20
11	3 16 41	3 55	3 20 36	4 00	3 24 32	4 05	3 28 27	4 10	19
12	3 20 36	3 52	3 24 36	3 56	3 28 37	4 01	3 32 37	4 06	18
13	3 24 28	3 48	3 28 32	3 53	3 32 38	3 57	3 36 43	4 02	17
14	3 28 16	3 44	3 32 25	3 49	3 36 35	3 53	3 40 45	3 57	16
15	3 32 00	3 40	3 36 14	3 45	3 40 28	3 49	3 44 42	3 54	15
16	3 35 40	3 37	3 39 59	3 40	3 44 17	3 44	3 48 36	3 50	14
17	3 39 17	3 32	3 43 39	3 36	3 48 01	3 41	3 52 26	3 45	13
18	3 42 49	3 28	3 47 15	3 32	3 51 42	3 37	3 56 11	3 41	12
19	3 46 17	3 24	3 50 47	3 29	3 55 19	3 33	3 59 52	3 36	11
20	3 49 41	3 21	3 54 16	3 25	3 58 52	3 28	4 03 28	3 32	10
21	3 53 02	3 16	3 57 41	3 20	4 02 20	3 24	4 07 00	3 27	9
22	3 56 18	3 11	4 01 01	3 15	4 05 44	3 19	4 10 27	3 23	8
23	3 59 29	3 07	4 04 16	3 11	4 09 03	3 15	4 13 50	3 18	7
24	4 02 36	3 03	4 07 27	3 06	4 12 18	3 10	4 17 08	3 14	6
25	4 05 39	2 58	4 10 33	3 02	4 15 28	3 05	4 20 22	3 09	5
26	4 08 37	2 53	4 13 35	2 57	4 18 33	3 00	4 23 31	3 04	4
27	4 11 30	2 49	4 16 32	2 52	4 21 33	2 56	4 26 35	2 59	3
28	4 14 19	2 45	4 19 24	2 48	4 24 29	2 51	4 29 34	2 54	2
29	4 17 04	2 40	4 22 12	2 43	4 27 20	2 46	4 32 28	2 50	1
30	4 19 44		4 24 55		4 30 06		4 35 18		0

IV. & X. *Signes.*

Argument de la Latitude.

Latitudes Boreales ou *Australes.*

TABLES
DE
LA LATITUDE DE LA LUNE.

Latitudes Boreales ou Auſtrales.

Argument de la Latitude.

II. & VIII. *Signes.*

Argument de la Latitude.	Inclinaiſon de l'Orbite. 5° 0′	Diff.	Inclinaiſon de l'Orbite. 5° 6′	Diff.	Inclinaiſon de l'Orbite. 5° 12′	Diff.	Inclinaiſon de l'Orbite. 5° 18′	Diff.	Argument de la Latitude.
D.	D M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.	D.
0	4 19 44		4 24 55		4 30 06		4 35 18		30
		2 34		2 38		2 42		2 45	
1	4 22 18		4 27 33		4 38 48		4 38 03		29
		2 31		2 33		2 37		2 40	
2	4 24 49		4 30 06		4 35 25		4 40 43		28
		2 25		2 28		2 31		2 34	
3	4 27 14		4 32 34		4 37 56		4 43 17		27
		2 20		2 23		2 26		2 28	
4	4 29. 34		4 34 57		4 40 22		4 45 45		26
		2 16		2 19		2 20		2 23	
5	4 31 50		4 37 16		4 42 42		4 48 08		25
		2 10		2 13		2 16		2 18	
6	4 34 00		4 39 29		4 44 58		4 50 26		24
		2 06		2 08		2 11		2 13	
7	4 36 06		4 41 37		4 47 09		4 52 39		23
		2 00		2 03		2 05		2 08	
8	4 38 06		4 43 40		4 49 14		4 54 47		22
		1 56		1 58		2 00		2 02	
9	4 40 02		4 45 38		4 51 14		4 56 49		21
		1 50		1 52		1 55		1 57	
10	4 41 52		4 47 30		4 53 09		4 58 46		20
		1 45		1 47		1 49		1 52	
11	4 43 37		4 49 17		4 54 58		5 00 38		19
		1 40		1 42		1 44		1 46	
12	4 45 17		4 50 59		4 56 42		5 02 24		18
		1 35		1 37		1 38		1 40	
13	4 46 52		4 52 36		4 58 20		5 04 04		17
		1 29		1 31		1 33		1 35	
14	4 48 21		4 54 07		4 59 53		5 05 39		16
		1 24		1 26		1 27		1 29	
15	4 49 45		4 55 33		5 01 20		5 07 08		15
		1 19		1 20		1 22		1 24	
16	4 51 04		4 56 53		5 02 42		5 08 32		14
		1 14		1 15		1 16		1 18	
17	4 52 18		4 58 08		5 03 58		5 09 50		13
		1 08		1 09		1 11		1 12	
18	4 53 26		4 59 17		5 05 09		5 11 02		12
		1 02		1 04		1 06		1 06	
19	4 54 28		5 00 21		5 06 15		5 12 08		11
		0 58		0 59		1 00		1 01	
20	4 55 26		5 01 20		5 07 15		5 13 09		10
		0 52		0 53		0 54		0 56	
21	4 56 18		5 02 13		5 08 09		5 14 05		9
		0 46		0 48		0 49		0 50	
22	4 57 04		5 03 01		5 08 58		5 14 55		8
		0 41		0 42		0 43		0 43	
23	4 57 45		5 03 43		5 09 41		5 15 38		7
		0 36		0 36		0 37		0 37	
24	4 58 21		5 04 19		5 10 18		5 16 15		6
		0 30		0 31		0 31		0 32	
25	4 58 51		5 04 50		5 10 49		5 16 47		5
		0 25		0 25		0 25		0 26	
26	4 59 16		5 05 15		5 11 14		5 17 13		4
		0 19		0 20		0 20		0 20	
27	4 59 35		5 05 35		5 11 34		5 17 33		3
		0 14		0 14		0 14		0 15	
28	4 59 49		5 05 49		5 11 48		5 17 48		2
		0 08		0 08		0 09		0 09	
29	4 59 57		5 05 57		5 11 57		5 17 57		1
		0 03		0 03		0 03		0 03	
30	5 00 00		5 06 00		5 12 00		5 18 00		0

III. & IX. *Signes.*

Argument de la Latitude.

Latitudes Boreales ou Auſtrales.

Argument de la Latitude.

TABLES
DES
DEMI-DIAMETRES DE LA LUNE
qui répondent aux différentes Excentricités.

Anomalie moyenne de la Lune.	La plus gr. Equation. 5° 43619 Demidiametre de la Lune. M. S.	Differences. S.	La plus gr. Equation. 6° 52336 Demidiametre de la Lune. M. S.	Differences. S.	La plus gr. Equation. 7° 61045 Demidiametre de la Lune. M. S.	Differences. S.	La plus gr. Equation 7° 39′½ 66800 Demidiametre de la Lune. M. S.	Differences. S.	Anomalie moyenne de la Lune.
O. 0	15 04		14 57		14 49		14 44		XII. 0
6	15 04	0	14 57	0	14 50	1	14 44	0	24
12	15 05	1	14 58	1	14 51	1	14 45	1	18
18	15 06	1	14 59	1	14 52	1	14 46	1	12
24	15 07	1	15 00	1	14 53	2	14 47	1	6
I. 0	15 09		15 02		14 55		14 50		XI. 0
6	15 11	2	15 05	3	14 58	3	14 54	4	24
12	15 13	2	15 07	2	15 01	3	14 57	3	18
18	15 16	3	15 10	3	15 05	4	15 01	4	12
24	15 19	3	15 14	4	15 09	4	15 05	4	6
II. 0	15 22		15 18		15 13		15 10		X. 0
6	15 26	4	15 22	4	15 18	5	15 15	5	24
12	15 30	4	15 26	5	15 23	5	15 19	4	18
18	15 34	4	15 31	5	15 28	5	15 26	7	12
24	15 38	4	15 36	5	15 34	6	15 33	7	6
III. 0	15 42		15 41		15 40		15 39		IX. 0
6	15 46	4	15 46	5	15 46	6	15 45	6	24
12	15 51	5	15 52	6	15 52	6	15 52	7	18
18	15 55	4	15 57	5	15 58	6	15 59	7	12
24	15 59	4	16 02	5	16 05	7	16 06	7	6
IV. 0	16 03		16 07		16 11		16 13		VIII. 0
6	16 07	4	16 12	5	16 17	6	16 19	6	24
12	16 11	4	16 17	5	16 22	5	16 25	6	18
18	16 15	4	16 21	4	16 27	5	16 30	5	12
24	16 18	3	16 25	4	16 31	4	16 35	5	6
V. 0	16 21		16 28		16 35		16 40		VII. 0
6	16 23	2	16 31	3	16 39	4	16 44	4	24
12	16 25	2	16 33	2	16 42	3	16 47	3	18
18	16 26	1	16 35	2	16 44	2	16 49	2	12
24	16 27	1	16 36	1	16 45	1	16 50	1	6
VI. 0	16 27	0	16 36	0	16 45	0	16 51	1	VI. 0
Anomalie moyenne de la Lune.									Anomalie moyenne de la Lune.

On a supposé le Demi-diametre de la Lune dans ses moyennes Distances aux Tems des Sisigies de 15′ 43″½. Si l'on en ôte 13″½, le reste 15′ 30″ sera le Demi-diametre de la Lune au Tems des Quadratures; ce qui ne différe qu'insensiblement de ceux que M. Newton avoit établi, sçavoir 15′ 31″½ dans les Quadratures, & 15′ 45″ au Tems des Sisigies.

TABLES
DES PARALLAXES HORISONTALES
DE LA LUNE
qui répondent aux différentes Excentricités.

Anomalie moyenne de la Lune.	La plus gr. Equation. 5° 43619 Parallaxe horisontale de la Lune. M. S.	Différences. S.	La plus gr. Equation. 6° 52336 Parallaxe horisontale de la Lune. M. S.	Différences. S.	La plus gr. Equation. 7° 61045 Parallaxe horisontale de la Lune. M. S.	Différences. S.	La plus gr. Equation. 7° 39′½ 66800 Parallaxe horisontale de la Lune. M. S.	Différences. S.	Anomalie moyenne de la Lune.
O. 0	54 40	0	54 12	1	53 46	1	53 29	1	XII. 0
6	54 40	2	54 13	3	53 47	2	53 30	3	24
12	54 42	4	54 16	4	53 49	4	53 33	4	18
18	54 46	5	54 20	5	53 53	7	53 37	7	12
24	54 51	6	54 25	7	54 00	8	53 44	9	6
I. 0	54 57	7	54 32	9	54 08	10	53 53	10	XI. 0
6	55 04	9	54 41	10	54 18	11	54 03	12	24
12	55 13	9	54 51	11	54 29	13	54 15	14	18
18	55 22	11	55 02	13	54 42	15	54 29	16	12
24	55 33	12	55 15	14	54 57	16	54 45	17	6
II. 0	55 45	13	55 29	15	55 13	17	55 02	19	X. 0
6	55 58	14	55 44	16	55 30	19	55 21	20	24
12	56 12	14	56 00	17	55 49	19	55 41	21	18
18	56 26	15	56 17	18	56 08	21	56 02	23	12
24	56 41	15	56 35	18	56 29	21	56 25	23	6
III. 0	56 56	16	56 53	19	56 50	22	56 48	24	IX. 0
6	57 12	16	57 12	19	57 12	22	57 12	24	24
12	57 28	16	57 31	19	57 34	22	57 36	24	18
18	57 44	15	57 50	19	57 56	22	58 00	25	12
24	57 59	15	58 09	18	58 18	22	58 25	24	6
IV. 0	58 14	14	58 27	18	58 40	22	58 49	23	VIII. 0
6	58 28	14	58 45	16	59 01	21	59 12	21	24
12	58 42	12	59 01	15	59 21	20	59 33	22	18
18	58 54	11	59 16	14	59 39	18	59 54	18	12
24	59 05	10	59 30	12	59 55	16	60 12	16	6
V. 0	59 15	8	59 42	11	60 10	15	60 28	15	VII. 0
6	59 23	7	59 53	8	60 22	12	60 43	10	24
12	59 30	5	60 01	6	60 32	10	60 53	8	18
18	59 35	3	60 07	3	60 39	7	61 01	5	12
24	59 38	1	60 10	2	60 43	4	61 06	2	6
VI. 0	59 39		60 12		60 45	2	61 08		VI. 0

Anomalie moyenne de la Lune.

Dans les Tables publiées en 1680, Flamsteed a fait la Parallaxe horisontale de la Lune aux tems de ſes moyennes diſtances & dans les Siſigies de 58′ 2″½ : M. Newton l'admet de 57′ 30″, mais celle qu'on ſuppoſe ici de 57′ 2″½, paroît confirmée par les grandes Latitudes Auſtrales & Boréales de la Lune qui ont été obſervées en France depuis 7 à 8 ans.

TABLE
DE LA CORRECTION
DES DEMI-DIAMETRES
ET DES PARALLAXES HORISANTALES
DE LA LUNE.

Distance de la Lune au Soleil.	La Lune Apogée. Demi-Diametre.	La Lune Apogée. Parallaxe horiſont.	La Lune Périgée. Demi-Diametre.	La Lune Périgée. Parallaxe horiſont.	Distance de la Lune au Soleil.
O°. VI. 00	00″	00″	00″	00″	00 VI. XII.
10	02	08	02	09	20
20	04	16	05	18	10
I. VII. 00	06	23	07	26	00 V. XI.
10	08	30	09	34	20
20	10	35	11	41	10
II. VIII. 00	11	40	12	46	00 IV. X.
10	12	44	13	50	20
20	13	46	14	52	10
III. IX. 00	13	46	14	53	00 III. IX.

Cette correction eſt toujours ſouſtractive, & par conſéquent doit être retranchée, ſoit du Demi-Diametre, ſoit de la Parallaxe horiſontale.

TABLE
DE
L'AUGMENTATION
DU DEMI-DIAMETRE
HORISONTAL
DE LA LUNE.

Distance de la Lune au zénit.	La Lune Apogée. Demi-Diametre.	La Lune Périgée. Demi-Diametre.	Hauteur de la Lune ſur l'horiſon.
90	00″	00″	00
80	02	03	10
70	05	06	20
60	07	09	30
50	09	12	40
40	11	14	50
30	12	16	60
20	13	17	70
10	14	18	80
00	14	18	90

Cette correction eſt additive, à cauſe que le Demi-Diametre de la Lune augmente à meſure qu'elle s'éleve ſur l'horiſon.

TABLE
De l'angle que forme avec l'Ecliptique, dans les Eclipſes, l'orbite apparente de la Lune.

Mouvement Horaire de la Lune au Soleil.

Signes. O.&VI.	27′ D.M.	28′ D.M.	29′ D.M.	30′ D.M.	31′ D.M.	32′ D.M.	33′ D.M.	34′ D.M.	35′ D.M.	36′ D.M.	*Signes.* XI.&V.
0°	5 46	5 45	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	30″
1	5 46	5 45	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	29
2	5 46	5 45	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	28
3	5 46	5 45	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	27
4	5 45	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	26
5	5 45	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	25
6	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	5 35	24
7	5 44	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	5 35	23
8	5 43	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	5 35	5 34	22
9	5 42	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	5 35	5 34	5 33	21
10	5 41	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	5 35	5 34	5 33	5 32	20
11	5 40	5 39	5 38	5 37	5 36	5 35	5 34	5 33	5 32	5 31	19
12	5 39	5 38	5 37	5 36	5 35	5 34	5 33	5 32	5 31	5 30	18

TABLE
DES
DES MOYENS MOUVEMENS
DE LA LUNE
Pour les Heures, Minutes & Secondes.

Heures.	Moyen Mouvement. D. M. S.	Apogée. M. S.	Nœud. M. S.	Min.	Moyen Mouvement. M. S. Sec. Tierc.	Apogée. Sec. Tierc.	Nœud. Sec. Tierc.	Min.	Moyen Mouvement. M. S. Sec. Tierc.	Apogée. Sec. Tierc.	Nœud. Sec. Tierc.
1	0 32 56	0 17	0 08	1	0 33	0	0	31	17 01	9	4
2	1 05 53	0 33	0 16	2	1 06	1	0	32	17 34	9	4
3	1 38 49	0 50	0 24	3	1 39	1	0	33	18 07	9	4
4	2 11 46	1 07	0 32	4	2 12	1	1	34	18 40	9	4
5	2 44 42	1 24	0 40	5	2 45	1	1	35	19 13	9	5
6	3 17 39	1 40	0 48	6	3 18	2	1	36	19 46	10	5
7	3 50 35	1 57	0 56	7	3 51	2	1	37	20 19	10	5
8	4 23 32	2 14	1 04	8	4 24	2	1	38	20 52	10	5
9	4 56 28	2 30	1 12	9	4 56	2	1	39	21 25	11	5
10	5 29 24	2 47	1 19	10	5 29	3	1	40	21 58	11	5
11	6 02 21	3 04	1 27	11	6 02	3	1	41	22 31	11	6
12	6 35 18	3 20	1 35	12	6 35	3	2	42	23 04	12	6
13	7 08 14	3 37	1 43	13	7 08	4	2	43	23 36	12	6
14	7 41 10	3 54	1 51	14	7 41	4	2	44	24 09	12	6
15	8 14 07	4 11	1 59	15	8 14	4	2	45	24 42	13	6
16	8 47 03	4 27	2 07	16	8 47	4	2	46	25 15	13	6
17	9 20 00	4 44	2 15	17	9 20	5	2	47	25 48	13	6
18	9 52 56	5 01	2 23	18	9 53	5	2	48	26 21	13	6
19	10 25 53	5 18	2 31	19	10 26	6	3	49	26 54	14	6
10	10 58 49	5 34	2 39	20	10 59	6	3	50	27 27	14	7
21	11 31 46	5 51	2 47	21	11 32	6	3	51	28 00	14	7
22	12 04 42	6 08	2 55	22	12 05	6	3	52	28 33	14	7
23	12 37 39	6 24	3 03	23	12 38	6	3	53	29 06	15	7
24	13 10 35	6 41	3 11	24	13 11	7	3	54	29 39	15	7
25	13 43 32	6 58	3 19	25	13 44	7	3	55	30 12	15	7
26	14 16 28	7 14	3 27	26	14 16	7	3	56	30 45	16	7
27	14 49 24	7 31	3 35	27	14 49	8	4	57	31 18	16	8
28	15 22 21	7 48	3 43	28	15 22	8	4	58	31 51	16	8
29	15 55 17	8 05	3 51	29	15 55	8	4	59	32 24	16	8
30	16 28 15	8 21	3 59	30	16 28	8	4	60	32 56	17	8

Pour connoître le véritable Mouvement Horaire, soit dans les Eclipses, soit pour tout autre instant proposé, l'opération la plus certaine, quoique longue & penible, sera de calculer trois fois le lieu de la Lune, c'est-à-dire d'abord pour le moment proposé, ensuite pour une heure avant ou après l'instant qui répond à ce premier calcul. M. Newton l'admet dans les Siligies de 33′ 32″½ la Lune étant dans ses moyennes distances, mais dans les Quadratures de 32′ 12″.

Des Inégalités de la Lune au tems des Siſigies.

ON a fait voir il y a déja long-tems, qu'au lieu de publier tant de Tables Aſtronomiques différentes, il eut peut-être mieux valu s'en tenir aux anciennes qu'on auroit corrigées (de même que l'a pratiqué Flamſteed pour celles d'Horoxius ſur la Lune) puiſqu'on eſt continuellement fatigué dans l'étude de l'Aſtronomie, lorſqu'il s'agit de comparer tant de Tables les unes aux autres, & de découvrir les cauſes des changemens ou Equations qu'on y a fait entrer. C'étoit-là le projet de quelques uns des plus anciens Aſtronomes de l'Académie des Sciences & qui avoient déja commencé à le mettre en exécution ; mais la théorie des Planetes paroiſſant peut-être encore trop imparfaite, on a cru devoir s'en écarter dans la ſuite. Il ſemble néantmoins que ceux qui ſe ſont le plus appliqués à conſtruire les Tables de la Lune n'ont gueres connu, au tems des Siſigies, que la ſeule Equation découverte par Hipparque ; car la ſeconde & troiſieme inégalité de cet Aſtre n'ayant plus lieu au tems des Nouvelles & Pleines Lunes, on n'en pouvoit faire uſage que dans les ſituations de la Lune qui répondent aux autres phaſes. Il eſt à remarquer cependant qu'on a ſouvent confondu, ou même qu'on n'a pas aſſez diſtingué ces deux inégalités ; que dans la plûpart des Tables on a négligé l'Equation du Nœud, introduite par Kepler (laquelle s'étend juſqu'à $1^{o}\frac{1}{2}$ dans les octans), comme auſſi de faire l'inclinaiſon de l'orbite Lunaire, ſur le plan de l'Ecliptique, de $18'$ plus grande, quand les nœuds ſont dans les Siſigies, que lorſqu'ils ſe trouvent dans les Quadratures, conformément aux découvertes qui en ont été faites par Tycho & qui ont été confirmées par Kepler.

Au reſte depuis le tems de Tycho-Brahé on avoit ſenti, comme nous l'avons dit, la néceſſité d'employer une nouvelle Equation du tems, dans le calcul du lieu de la Lune; mais Flamſteed ayant diſcuté fort au long cette matiere, il ſemble qu'elle ait été décidée dès l'an 1673, ou du moins très-peu de tems après lorſque M. Halleï entreprit de la développer, attribuant cette Equation non pas au tems, mais au Moyen Mouvement de la Lune, comme on le peut voir en conſultant ce qui eſt inféré à la fin de ſon Catalogue des Etoiles Auſtrales.

Nous avons aſſez expliqué d'où dépendoit cette Equation, auſſi-bien que celles du Moyen Mouvement, ſoit du Nœud, ſoit de l'Apogée, qui ne doivent plus être négligées dans les calculs. Ainſi nous n'inſiſterons pas davantage ſur ce ſujet, non plus que ſur deux autres Equations du Moyen Mouvement de la Lune * bien moins ſenſibles que celle dont on vient de parler, mais dont on ne ſçauroit gueres ſe diſpenſer de faire uſage.

L'orbite de la Lune n'étant pas véritablement une Ellipſe, à cauſe de l'action du Soleil qui détourne à chaque

* Ces deux Equations ſont fondées ſur ce que l'Action du Soleil ſur la Lune eſt la plus grande & par conſéquent dilate davantage l'orbite, lorſque le grand axe de cette orbite ſe trouve dans la ligne des Siſigies, comme auſſi lorſque la ligne des Nœuds vient à s'y rencontrer. Cela doit arriver deux fois chaque année, à cauſe du mouvement réel de la Terre attribué au Soleil, lequel parcourant la circonférence de l'Ecliptique rencontre ſucceſſivement l'Apogée & le Périgée de la Lune, ou ſon Nœud aſcendant & deſcendant, à chaque révolution ſur le grand orbe. On doit bien remarquer ici, 1° que quand le grand Axe ou le Nœud ſont dans les Siſigies ou dans les Quadratures, ces Equations ſont nulles : 2° que la ſeconde & troiſiéme Table de la p. 166. ont été calculées pour l'unique cas auquel la Terre ſe trouve dans ſes moyennes diſtances au Soleil; en ſorte que s'il arrive pour lors que le grand Axe ou le Nœud de la Lune ſe rencontre dans les octans, les plus grandes Equations moyennes ſeront de 3′ 45″ & de 0′ 47″. D'ailleurs la Terre étant dans ſon Aphélie la premiere de ces deux Equations ne ſçauroit s'étendre (lorſque le grand Axe eſt dans les octans) que juſqu'à 3′ 34″ & la ſeconde (la ligne des Nœuds étant dans les octans) qu'à 0′ 45″: enfin la Terre étant au Périhélie elles doivent augmenter juſqu'à 3′ 56″ & 0′ 49″; car elles augmentent ou diminuent dans la raiſon renverſée des cubes de la diſtance de la Terre au Soleil. Dans tous les autres cas ces Equations ſont à la plus grande, comme le ſinus de deux fois la diſtance de l'Axe ou du Nœud à la plus proche Siſigie ou Quadrature, eſt au rayon ou ſinus total, & c'eſt ſur ce principe que les deux Tables ont été calculées.

instant cette Planete de la route qu'elle devroit suivre dans chaque révolution périodique autour de la Terre, on a proposé de ramener cette orbite à différentes Ellipses, en supposant une excentricité variable* & admettant un mouvement réel dans le lieu de l'Apogée. Cette idée a paru d'autant plus naturelle & la forme de calculer les lieux de la Lune selon cette Méthode, d'autant plus commode, quà l'aide de ces deux suppositions on ne sçauroit gueres s'écarter sensiblement de l'orbite véritable. Mais on en approchera encore plus exactement si l'on a égard

PLANCHE II. *Fig.* A.

*Qu'on suppose la moyenne distance de la Lune à la Terre divisée en 100000, & la Terre étant en *T*, soit *TC* l'Excentricité moyenne de l'orbite lunaire de 5505 parties. Si l'on prolonge *TC* jusqu'en *B*, ensorte que *CB* soit le sinus de 12° 18' ou de la plus grande Equation de l'Apogée pour un rayon *TC*, & si l'on décrit du centre *C* & de l'intervalle *CB* le cercle *BDA*, ce cercle sera celui sur la circonférence duquel, doit être placé le centre de l'orbite lunaire; de maniere qu'il pourra parcourir la circonférence de ce cercle suivant l'ordre des lettres *BDA*.

Ainsi pour découvrir dans un tems quelconque l'Equation de l'Apogée sans avoir recours à la Table page 167, comme aussi l'Excentricité & par conséquent la plus grande Equation de l'orbite lunaire, on sera l'angle *BCD* égal à deux fois l'argument annuel, c'est-à-dire, à deux fois la distance du vrai lieu du Soleil à l'Apogée de la Lune déja corrigé (par la Table, pag. 164 & suiv.) ce qui donnera l'angle *CTD* égal à l'Equation de l'Apogée que l'on cherche: on connoîtra aussi dans le même Triangle *CTD* le côté *TD* qui sera l'Excentricité correspondante au tems proposé, c'est-à-dire, qui convient à l'Ellipse dont le grand Axe répondroit précisément au lieu de l'Apogée qu'on vient de déterminer.

On voit par là que l'orbite actuelle de la Lune étant connue, puisqu'on vient de découvrir le lieu de son Apogée & son Excentricité, il sera aisé de calculer selon la Méthode de M. Newton (qui sera expliquée ci-après au Chap. XXIV), l'Equation du centre qui répond au moyen mouvement de la Lune pour l'instant proposé. Les quatre Tables de la pag. 170 & suiv. ont été calculées suivant cette Méthode; mais comme il n'est pas possible de calculer autant de Tables qu'il se trouve d'Excentricités différentes, ceux qui se proposeront de connoître l'Equation du centre de la Lune plus exactement qu'en se servant de quelques unes des quatre Tables dont nous venons de parler, ou bien qui ne voudront pas déduire l'Equation, en prenant des parties proportionnelles entre les deux Tables les plus prochaines, pourront en ce cas avoir recours à la Méthode de M. Newton.

Le lieu de la Lune ainsi corrigé par l'Equation du centre ne differera pas beaucoup du véritable dans les Sisigies & le calcul qu'on en aura fait se trouve (à certaines corrections près qu'on n'a pu se dispenser d'y faire entrer) entierement semblable à celui dont on s'est servi pour connoître le vrai lieu du Soleil.

Mais parce que dans tout ce que l'on vient d'établir au sujet de l'Equation du centre de la Lune ou de ses différentes Excentricités on a supposé la Terre dans sa moyenne distance au Soleil, & que cette Equation ou Excentricité doit varier selon que la Terre s'approche ou s'éloigne du Soleil. Il reste donc à parler de la seconde Equation du centre que M. Newton a introduite.

à une seconde ou nouvelle Equation du centre que M. Newton a introduite & dont il explique la cause dans le 3e Livre des Principes Mathématiques de sa Philosophie.

La plus grande Equation du lieu de l'Apogée avoit été établie autrefois par Flamsteed de 11° 47′ $\frac{1}{2}$. Mais M. Newton l'a augmentée & s'est assuré qu'elle devenoit plus conforme aux Observations lorsqu'on la suppose de 12° 18′.

La premiere des deux Tables de la page 179 étant donc une seconde Equation du centre, il ne faut pas la confondre avec l'autre Table intitulée, Septiéme Equation de la

Lorsque la Terre est dans son Périhélie, l'action du Soleil étant alors plus grande à l'égard de la Lune, que dans les moyennes distances, le centre de l'orbite lunaire doit donc se mouvoir avec plus de viteſſe autour du point *C*: par une raiſon toute contraire ce centre aura moins de viteſſe au tems de l'Aphelie & cela en raiſon réciproque des cubes de la diſtance du Soleil à la Terre. Mais l'Equation du centre du Soleil étant compriſe dans l'argument annuel, la viteſſe du centre de l'orbite lunaire doit ſe trouver déja dans la raiſon réciproque des quarrés de la diſtance de la Terre au Soleil. Or afin de faire mouvoir ce centre encore plus vite & cela dans la raiſon ſimple, mais inverſe, de la diſtance de la Terre au Soleil, il faut mener du centre *D* la droite *DE* vers le lieu de l'Apogée de la Lune & qui ſoit parallele à *TC*; enſuite on prendra l'angle *EDF* égal à l'excès de l'argument annuel déterminé ci-deſſus, ſur la diſtance de l'Apogée de la Lune au Périgée du Soleil & cela en comptant toujours ſuivant l'ordre des Signes: ou bien on prendra l'angle *CDF* égal au complement à 360 degré de l'Anomalie vraie du Soleil. On fera enſuite *DF* eſt à *DC* comme la double Excentricité de l'orbe terreſtre eſt à la moyenne diſtance du Soleil à la Terre, & de plus comme le mouvement moyen diurne du Soleil relativement à l'Apogée de la Lune eſt au mouvement moyen du Soleil compté du lieu de ſon Aphélie, c'eſt à-dire, comme 33 $\frac{1}{3}$ eſt à 1000, & comme 51′.27″ 16‴ eſt à 59′ 8″ 10‴, en un mot comme 3 eſt à 100. On aura donc ainſi la poſition du point *F*, où il faut imaginer préſentement le centre de l'orbite lunaire qu'on peut ſuppoſer en mouvement dans la circonférence d'un nouvel Epicicle: ce centre doit y achever ſa révolution préciſément dans le même-tems que le point *D* parcourt la circonférence du cercle *DABD*. Par là on ſatisfera à ce qui a été propoſé ci-deſſus, ſçavoir que le centre de l'orbite lunaire ſoit mû dans une courbe donnée autour du point *C*, & cela à peu de choſe près dans la raiſon réciproque des cubes de la diſtance du Soleil à la Terre.

On peut, ſi l'on veut, ſe ſervir de l'aproximation donnée par M. Newton pour connoître la ſeconde Equation du centre. Cette ſeconde Equation eſt à très-peu-près comme le ſinus de l'angle que la droite *DF* forme avec la ligne tirée du point *F* à la Lune: dans la moyenne diſtance de la Terre au Soleil, elle peut s'étendre juſqu'à 2′ 25″ lorſqu'elle eſt la plus grande. Quant à l'angle que forme continuellement cette droite *DF* avec la ligne tirée du point *F* à la Lune, on le trouve, ſoit en retranchant l'angle *EDF* de l'Anomalie moyenne de la Lune, ſoit en ajoutant la diſtance de la Lune au Soleil à la diſtance de l'Apogée de la Lune à l'Apogée du Soleil. Enfin ſelon ces mêmes principes on pourra conſtruire une autre Table ſemblable à la premiere des deux de la page 179, ſi l'on fait comme le rayon eſt au ſinus de l'angle dont on vient de parler, ainſi 2′ 25″, ſont à la ſeconde Equation du centre de la Lune que l'on cherche.

De la septiéme Equation ou seconde Variation de la Lune.

Lune & qui n'est autre chose qu'une correction de la Variation. La 7e Equation n'a lieu, selon cette derniere Table, que hors les tems des Sisigies & principalement au tems des Quadratures. On peut donc la désigner sous le nom de 2e Variation de la Lune, puisqu'il est vrai de dire que, toutes choses égales, la Variation découverte par Tycho dans les octans, n'est pas la même dans les Croissans ou vers la Nouvelle Lune, qu'avant ou après la Pleine Lune.

M. Newton ayant augmenté de 15″ la seconde Equation du centre de la Lune, dans le 3e Liv. des Princip. Mathem. de sa Philosophie, & ayant donné la Méthode de la calculer avec plus d'exactitude qu'en se servant de la Table qui en avoit été construite selon les Elémens publiés dans l'Astronomie de Gregori, il paroît nécessaire de rapporter aussi la meilleure Méthode de calculer la seconde Variation, au cas que l'on veuille déterminer le lieu de la Lune (dans ses moyennes distances*) avec un peu plus de précision. Mais nous devons avertir auparavant qu'au lieu de supposer la Variation de la Lune, lorsque la Terre est Apogée ou Périgée, comme elle se trouve dans la premiere Table page 166, M. Newton l'a établie en dernier lieu de 33′ 14″ & 37′ 11″.

* *Dans les autres cas la sixiéme & septiéme Equation varient de plus en méme raison que les Parallaxes.*

La seconde Variation a pour origine l'action du Soleil sur la Lune qui fait varier son orbite selon les diverses positions du grand Axe ou de l'Apogée de la Lune à l'égard du Soleil. Pour la calculer, on fera comme le Rayon est au Sinus verse de la distance de l'Apogée de la Lune au Périgée du Soleil (comptée selon l'ordre des Signes), ainsi 2′ sont à un quatrieme Terme: ensuite comme le Rayon est au Sinus de la distance de la Lune au Soleil, ainsi le quatriéme Terme trouvé plus 1′, à la seconde Variation ou septiéme Equation de la Lune. Au reste les Observations n'ont pas encore fait connoître si les quantités 2′ & 1′ doivent être diminuées ou augmentées de quelques secondes.

Maniere de calculer la seconde variation, plus exactement qu'en se servant de la seconde Table intérée p. 179.

CHAPITRE

CHAPITRE ONZIEME.

Des Eclipſes de Soleil & de Lune.

S'IL y a quelque choſe dans l'Aſtronomie qui puiſſe nous faire connoître les plus grands efforts de l'eſprit humain, lorſqu'il s'agit de choſes très-ſubtiles & qui demandent le plus de ſagacité, c'eſt aſſurément la Théorie des Eclipſes de Soleil & de Lune, c'eſt, dis-je, la juſteſſe avec laquelle on eſt parvenu depuis long-tems à les calculer & à les prédire. Nous voilà donc arrivés à cette partie de l'Aſtronomie ſi ſublime & ſi digne d'occuper les plus excellens eſprits : rien ne paroît d'abord plus difficile à bien traiter ; mais l'explication claire & ſimple qu'on en va donner fera bientôt connoître que les regles en ſont certaines & inconteſtables.

Des Eclipſes. Ce que c'eſt.

Le mot d'*Eclipſe* vient du mot grec ἐκλείπω, qui ſignifie manquer, tomber en défaillance, &c. Lorſque la Lune eſt pleine & que ſa lumiere eſt fort éclatante, s'il arrive qu'elle rencontre l'ombre de la Terre, & qu'elle ſe trouve dépouillée de cette lumiere ſi vive qu'elle reçoit du Soleil ; alors ou cet Aſtre ſemble s'éteindre, ou paroît totalement manquer dans le Ciel. On peut dire à peu près la même choſe à l'égard du Soleil que l'on voit 15 jours avant & après s'obſcurcir peu à peu ou diſparoître entierement ; ce qui ne peut arriver que quand la Lune paſſe entre le Soleil & la Terre. Or l'on conçoit aſſez maintenant ce que nous devons entendre par le mot d'Eclipſe de Soleil & de Lune ; nous entrerons néantmoins ici dans quelques détails particuliers.

Réflexions ſur l'ombre que jettent les corps opaques.

Il faut d'abord faire attention que tout Corps opaque expoſé à la lumiere du Soleil jette perpétuellement ſon

ombre vers la partie opposée. Cette ombre n'est autre chose qu'un espace qui manque de lumiere ; ce qui vient de ce que le Corps opaque absorbe, ou du moins arrête tous les rayons du Soleil qui couvrent environ la moitié de sa superficie. Ainsi la Terre étant un Corps opaque, il est évident qu'elle doit jetter son ombre vers la partie opposée au Soleil ; & que la Lune lorsqu'elle traversera cet espace, perdra nécessairement la lumiere qu'elle recevoit du Soleil : en un mot il faut qu'elle soit obscurcie pendant tout le tems de cette traversée. De plus la figure de la Terre étant à très-peu près sphérique, il faut que son ombre prenne une des trois formes suivantes, sçavoir ou une forme cylindrique, ce qui supposeroit que la Terre est égale en grosseur au Soleil, ou bien la figure d'un cone tronqué qui va en augmentant, ce qui arriveroit si la Terre étoit plus grosse que le Soleil ; dans l'un ou l'autre de ces deux cas, l'ombre de la Terre s'étendroit à l'infini & par conséquent les Planetes supérieures, comme *Mars*, *Jupiter* & *Saturne*, seroient successivement éclipsées. Enfin l'ombre de la Terre pourroit prendre aussi la figure d'un cone & diminuer peu à peu en s'éloignant. Or c'est ce troisieme cas que nous voyons arriver, puisque les Planetes supérieures ne sont jamais éclipsées, & que l'on sçait d'ailleurs que la Terre est moins grosse que le Soleil.

Des différentes figures d'ombres.

PLANCHE II. *Fig.* 16 & 17.

Fig. 18.

Le Soleil est beaucoup plus grand que la Terre.

Il suit aussi de ce que nous venons de dire, que la Lune doit être beaucoup plus petite que la Terre puisqu'en effet le diametre de la Lune est contenu environ trois fois dans l'ombre de la Terre ; car il est évident qu'à cette distance le diametre de l'ombre qui va toujours en diminuant, est beaucoup plus petit que n'est le diametre de la Terre ; aussi ce dernier contient-t-il environ quatre fois le diametre de la Lune.

PLANCHE III. *Fig.* 1.

Soit maintenant *S* le Soleil, *T* la Terre, *ABC* le cone



Dheulland Sculp.

d'ombre de la Terre : il eſt évident qu'on ne peut tirer aucunes lignes droites du Soleil à tel point qu'on voudra de l'eſpace *ABC*, puiſqu'elles rencontreront la Terre, laquelle n'étant point tranſparente, doit néceſſairement arrêter ces lignes droites ou rayons qui, comme l'on voit, ne peuvent ni remplir ni éclairer l'eſpace *ABC*. Or il ſuit de là que ſi la Lune au tems de ſon oppoſition au Soleil, vient à traverſer cet eſpace, elle ſera pour lors entierement plongée dans les ténebres, & que par conſéquent il y aura Eclipſe au moment de la Pleine Lune.

Dans quel tems arrivent les Eclipſes de Lune, & celles du Soleil.

Il arrive à peu près la même choſe au tems de la Nouvelle Lune lorſque l'ombre conique de cette Planete, qui eſt directement oppoſée au Soleil, vient à rencontrer la Terre ; car alors les Obſervateurs qui ſe trouvent dans le lieu de la Terre où l'on voit la Lune en conjonction avec le Soleil, c'eſt-à-dire, dans le lieu où tombe la pointe du cone de l'ombre de la Lune, ſont plongés pour quelques momens dans une nuit obſcure, de maniere qu'ils ceſſent de voir le Soleil pendant tout le tems que cette ombre emploie à traverſer le lieu qu'ils habitent. Il faut cependant remarquer que comme la Lune eſt beaucoup plus petite que la Terre, ſon ombre n'en ſçauroit jamais couvrir toute la ſuperficie ; mais ſeulement une partie comme *BC*, laquelle eſt tout-à-fait plongée dans les ténebres : car il ſe répand continuellement ſur tout le reſte de la ſurface de la Terre une quantité ſuffiſante de rayons venans d'une partie plus ou moins grande du diſque du Soleil, & qui ſuffiſent pour éclairer les lieux où ils tombent. Auſſi doit-on appercevoir de ces mêmes lieux le Soleil plus ou moins éclipſé, ſelon qu'on ſe trouve plus ou moins près du cone d'ombre de la Lune. Par exemple, ceux qui habitent vers *P*, apperçoivent le Soleil à moitié éclipſé : mais ceux qui habitent depuis *M* juſqu'en *N*, ne ſe trouvent plus ſitués comme il convient pour

PLANCHE III, *Fig.* 2.

L'Eclipſe du Soleil ne paroît pas de la même maniere par toute la Terre ; car les uns l'obſervent totale, lorſque d'autres ou ne l'obſervent que partiale, ou ne s'en apperçoivoient aucunement.

appercevoir la moindre marque ſenſible de l'Eclipſe.

On voit encore très-clairement qu'il n'eſt pas poſſible qu'il y ait jamais d'Eclipſe de Lune dans d'autre tems que dans des Pleines Lunes, c'eſt-à-dire, lorſque la Lune eſt en oppoſition avec le Soleil ; ni qu'il y ait d'Eclipſe de Soleil, ou plutôt de Terre, que dans les Nouvelles Lunes, lorſque cette Planete paroît en conjonction avec le Soleil. Mais comme il y a dans chaque Mois une Nouvelle & Pleine Lune, on demandera peut-être pourquoi on n'y obſerve pas régulierement deux ſortes d'Eclipſes ? C'eſt ce que nous allons tâcher d'expliquer ; comme auſſi pourquoi il y a des Eclipſes totales & des Eclipſes partiales dont la grandeur ſe trouve varier à l'infini. Je dis donc en premier lieu, que ſi la Lune n'avoit point d'autre orbite que l'Ecliptique, c'eſt-à-dire, que ſi ſa révolution périodique ne s'achevoit point tous les Mois autour de la Terre dans un plan différent de celui que parcourt la Terre chaque année dans l'Ecliptique autour du Soleil, aſſurément l'axe de l'ombre terreſtre ne pouvant jamais ſortir de ce même plan, il y auroit à chaque Pleine Lune une Eclipſe totale & centrale. Il en ſeroit de même à chaque nouvelle Lune & ces Eclipſes ſeroient encore plus ſenſibles dans le cas où la Lune eſt le plus proche qu'elle puiſſe être de la Terre ; car ſon ombre venant à tomber exactement au milieu de la ſurface de la Terre qui eſt tournée du côté du Soleil, y obſcurciroit le plus grand eſpace. Mais parce qu'on a fait voir ci-devant que le plan de l'orbite de la Lune étoit incliné à celui de l'Ecliptique, & que ces deux plans ne ſe rencontroient que dans une ſeule ligne ou ſection commune, laquelle doit paſſer par le centre de la Terre, il eſt évident que la Lune ne ſe trouvera plus dans le plan de l'Ecliptique, que lorſqu'elle paſſera vers l'une ou l'autre extrémité de cette ligne, c'eſt-à-dire, lorſqu'elle ſe trou-

Pourquoi la Lune & le Soleil ne ſont pas éclipſés chaque mois.

vera dans ſes nœuds ; il s'enſuit donc que toutes les fois que le lieu de la Pleine Lune ſe rencontrera dans la ligne des nœuds, l'axe de l'ombre terreſtre paſſera pour lors par le centre de la Lune, & que l'Eclipſe ſera totale & centrale. Soit un cercle *MN* qui repréſente la coupe ou ſection perpendiculaire du cone de l'ombre terreſtre, ſoit auſſi une partie de l'orbite de la Lune repréſentée par *CD*. Cette portion de ſon orbite que la Lune parcourt au tems de ſon oppoſition n'étant pas d'une grandeur bien conſidérable, on peut ſans erreur ſenſible la repréſenter par une ligne droite. Imaginons encore que la droite *BGA* repréſente une partie de l'Ecliptique. Cela ſuppoſé, ſi l'on conçoit maintenant le centre de la Lune au point *F*, ſçavoir au premier inſtant qu'elle commence à entrer dans l'ombre, & ſi l'on obſerve enſuite ce même centre au point *E* où la Lune doit paroître ſortir entierement de l'ombre, ce centre aura néceſſairement paſſé au point *G* dans l'axe de l'ombre de la Terre, & c'eſt-là préciſément ce que l'on appelle Eclipſe totale & centrale. Ces ſortes d'Eclipſes n'arrivent donc que quand les centres de la Lune & de l'ombre ſe rencontrent préciſément dans l'un ou l'autre nœud, ce qui eſt un cas fort rare. Il faut auſſi remarquer que la plus grande durée d'une Eclipſe de Lune ſe doit connoître par le tems que le centre de la Lune emploie à parcourir l'arc *EF* qui eſt égal à 3 ou 4 diametres de Lune, ou environ deux degrés. Cet arc *EF* repréſente le mouvement de la Lune par rapport à celui de l'ombre de la Terre ; & ce mouvement ne s'acheve ordinairement que dans l'eſpace d'environ quatre heures.

PLANCHE III. *Figure* 3.

Des Eclipſes totales & centrales.

Il n'eſt pas moins évident qu'il peut y avoir auſſi pluſieurs Eclipſes totales, mais qui ne ſeront pas centrales. Cela doit varier à tel point qu'il peut arriver que le nœud de la Lune, non ſeulement ne ſe trouvera pas dans l'axe, mais même qu'il pourroit être entierement hors de

PLANCHE III. *Figure* 4.

Des Eclipſes partiales.

PLANCHE III. *Fig. 5 & 6.*

l'ombre, comme on le peut voir dans la figure. Enfin le nœud de la Lune peut être ſi éloigné de l'ombre, qu'il n'y aura qu'une petite partie de ſon diſque qui y ſera plongée : & alors il y aura une Eclipſe partiale, qui ſera plus ou moins grande, ſelon que le nœud ſera plus ou moins proche de l'ombre de la Terre. Cependant ſi ce nœud en eſt éloigné au moment de la Pleine Lune, d'un peu plus de treize degrés, alors la diſtance de la Lune à l'Ecliptique ſera trop grande pour que ſon diſque apparent puiſſe rencontrer ou effleurer l'ombre terreſtre : on voit donc par là pourquoi les Eclipſes de Lune arrivent ſi rarement. Mais il eſt tems de parler des Eclipſes de Soleil, de celles, dis-je, qu'on devroit plutôt nommer des Eclipſes de Terre.

Des Eclipſes de Terre.

Nous venons de voir tout à l'heure comment l'ombre de la Terre jettée ſur la Lune, doit y produire les Eclipſes totales ou partiales que l'on y obſerve de tems en tems ; ce n'eſt donc que par un effet à très-peu près ſemblable que la Lune, lorſqu'elle jette ſon ombre ſur la Terre, forme une Eclipſe de Terre : toute la différence qui s'y trouve vient uniquement de ce que la Lune étant beaucoup plus petite que la Terre, ſon ombre n'en ſçauroit couvrir toute la ſurface, mais ſeulement une très-grande partie de cette même ſurface. Ainſi il n'y aura que ceux qui habitent cette partie de la Terre qui ſe trouveront dans les ténebres; enſorte que la Lune venant à jetter ſon ombre dans une fort petite étendue, on y verra diſparoître le Soleil. C'eſt la raiſon pourquoi on nomme ce phénomene Eclipſe de Soleil, quoiqu'improprement, puiſque le Soleil ne manque point pour cela de lumiere. En effet il la conſerve toujours avec le même éclat, ce ſont au contraire les régions de la Terre où l'ombre vient à ſe répandre, qui en manquent effectivement, & ce ſont elles qui ſont véritablement éclipſées.

Mais pour mieux faire entendre cette théorie des Eclipſes, il faut auparavant rechercher ici les véritables grandeurs des cones formés par l'ombre de la Terre & de la Lune. C'eſt ce que nous nous propoſons de détailler, lorſque nous aurons établi quelques ſuppoſitions ou demandes néceſſaires pour y parvenir.

Les lignes tirées du centre du Soleil à la ſurface de la Terre doivent être regardées comme ſenſiblement paralleles.

Je ſuppoſe donc que deux lignes droites, ou deux rayons qui partent du centre du Soleil, & qui aboutiſſent à différens points de la ſurface de la Terre, ſoient regardés comme deux lignes exactement paralleles. Car deux lignes ſont cenſées paralleles lorſqu'elles ne peuvent ſe rencontrer qu'à une diſtance infinie. Or la diſtance de la Terre au Soleil eſt ſi grande par rapport aux plus grands intervalles donnés des deux lignes dont nous venons de parler; cette diſtance, dis je, eſt ſi grande par rapport au diametre de la Terre, que ce diametre ne peut être regardé que comme un point en comparaiſon d'un éloignement auſſi conſidérable. C'eſt auſſi ce dont tous les Aſtronomes conviennent aujourd'hui, puiſque ſelon le calcul de leurs obſervations, le diametre de la Terre vû du Soleil paroîtroit ſous un angle ſi petit, qu'à peine peut-il être ſenſible à l'œil. Ainſi la Terre n'eſt vûe du Soleil que comme un point imperceptible; & en vertu de cette diſtance preſqu'immenſe, toutes les lignes tirées du centre du Soleil à la ſurface de la Terre ſont cenſées, non pas géométriquement, mais du moins phyſiquement paralleles. Cette ſuppoſition paroît d'autant plus légitime qu'on ſçait d'ailleurs (*Euclide*, *liv.* 1. *Prop.* 29.) que lorſqu'une ligne droite tombe ſur deux autres & forme les deux angles intérieurs égaux à deux droits, ces lignes ſont pour lors paralleles entre elles. Or ſuppoſons que le diametre de la Terre ſoit repréſenté par la ligne AB, & que le centre du Soleil ſoit en C, ſi l'on tire les deux lignes AC, BC, les trois angles A, B, C, du triangle ſont

PLANCHE III. *Fig.* 7.

égaux à deux droits : mais parce que l'angle *C* eſt infiniment petit ou égal à zero, la Terre n'étant vûe du Soleil que comme un point imperceptible, il faut néceſſairement que les deux angles *A* & *B* faſſent entre eux une ſomme préciſément égale à deux droits, & que par conſéquent les lignes droites *AC*, *BC*, ſoient ſenſiblement paralleles. Il en eſt de même de deux fils à plomb ou de deux filets déliés ſuſpendus librement & chargés d'un poids par en bas, & que l'on appelle communément *Pendules ſimples ;* on regarde ces fils comme paralleles entre eux ; cependant ſi l'on fait attention à ce qui arriveroit en les prolongeant chacuns ſuivant leurs directions, on trouvera qu'ils devroient concourir vers le centre de la Terre, c'eſt-à-dire, à ce point où tendent généralement tous les Corps qui tombent.

Ce que nous venons de dire à l'égard de la Terre, peut s'appliquer à plus forte raiſon à la Lune dont le diametre a un rapport beaucoup plus petit que n'eſt celui de la Terre, relativement à la diſtance du Soleil. Mais il y a plus, les lignes tirées du centre du Soleil aux deux points qui nous paroiſſent auſſi éloignés que ſont les centres de la Terre ou de la Lune, doivent encore être regardés comme paralleles ; & généralement deux lignes tirées du centre du Soleil, l'une à la ſurface de la Terre, & l'autre à celle de la Lune, ne different pas ſenſiblement d'être parallelles, puiſque l'angle qu'elles forment au Soleil eſt fort petit, & qu'il diminue tellement depuis les Quadratures juſqu'aux Siſigies qu'il devient même preſqu'inſenſible : on peut même fort bien calculer toutes les phaſes des Eclipſes ſans y avoir égard, ou ſans que cela influe ſur les quantités que l'on détermine par les calculs ordinaires. Mais il eſt à propos de donner encore ici le Lemme ſuivant, dont la démonſtration eſt fort ſimple.

Si

Si les deux lignes AE, BF *touchent le cercle ABC, & ſi des deux points d'attouchement l'on tire au centre du cercle les rayons AD, BD, l'angle au centre formé par ces deux rayons, ſera égal à celui que forment extérieurement les deux Tangentes.* PLANCHE III, Fig. 8.

Pour le démontrer on doit conſidérer que dans le Quadrilatere *GADB*, la ſomme de tous les angles eſt égale à quatre droits : mais parce que chacun des deux angles *A* & *B* eſt droit, les angles *AGB*, & *D* ſeront donc égaux à deux droits. D'ailleurs les deux angles (*Euclide*, *Liv.* 1 *Prop.* 13) *AGB*, *AGF* ſont auſſi égaux à deux droits ; l'angle *D* ſera donc égal à l'angle *AGF*.

Méthode pour meſurer l'angle du cone de l'ombre. PLANCHE III, *Fig. 9.*

Soit maintenant le globe terreſtre repréſenté par le cercle *ABK* ; ſi l'on regarde la ligne *CM* comme tirée du centre de la Terre à celui du Soleil, & qu'on lui éleve perpendiculairement le diametre de la Terre *CB*, alors la ligne droite *BF* tirée de *B* au centre du Soleil, doit être regardée, ſelon ce que nous avons dit ci-deſſus, comme parallele à *CM*. Faiſant donc l'angle *BCD* égal au demi-diametre apparent du Soleil, c'eſt-à-dire à l'angle ſous lequel l'on obſerve de la Terre le demi-diametre du Soleil, & menant par le point *D* la tangente *DG* ; il eſt évident par le Lemne précédent, que l'angle *GEF* ſera égal à l'angle *BCD*, c'eſt-à-dire au demi-diametre apparent du Soleil ; & partant comme la ligne *BF* prolongée paſſeroit par le centre du Soleil, la droite *GED* doit toucher néceſſairement la circonférence de ſon diſque : mais elle touche auſſi la Terre au point *D*, & étant prolongée, elle rencontre la droite *MCH* au point *H*, enſorte que l'angle *DHC* eſt la moitié de l'angle que forme le cone d'ombre ; il ſuit donc que puiſque *FE* eſt parallele à *MH*, l'angle *DHC* ſera égal à l'angle *GEF*, (*Eucl. liv.* 1 *Prop.* 29.) c'eſt-à-dire, au demi-diametre apparent du Soleil. Ainſi l'angle total formé par le cone d'ombre doit être regardé comme égal au diametre apparent du Soleil.

Les angles des cones d'ombres sont égaux dans toutes les Sphéres qui n'excedent point de beaucoup la Terre en grosseur.

On peut démontrer la même chose pour la Lune & même généralement pour toutes les spheres opaques dont le diametre n'excede pas considérablement le diametre de la Terre ; car le diametre du Soleil étant toujours supposé le même, tous les angles de ces cones d'ombre seront égaux entre eux, ces cones, dis-je, ne formeront par conséquent que des figures parfaitement semblables, ce que l'on peut encore démontrer de la maniere suivante.

PLANCHE III. *Fig.* 10.

Soit, par exemple, *AGF* le Soleil, *DHE* la Terre ou telle autre sphere qu'on voudra, qui n'excede pas trop la Terre en grosseur ; soit aussi *SC* la ligne qui joint les centres du Soleil & de la Terre, & *AD* une ligne droite qui les touche & qui étant prolongée rencontre la ligne *SC* au point *M*. Alors l'angle *AMS* représentera la moitié de l'angle du cone d'ombre : & comme l'angle extérieur *ADS* du triangle *SDM* est égal aux deux intérieurs opposés *DMS* & *DSM;* que d'ailleurs l'angle *DSM*, celui sous lequel le diametre de la Terre est vû du Soleil, est comme imperceptible ou égal à zero (la Terre n'étant vûe du Soleil que comme un point) l'angle *DMS* qui est le demi-angle du cone d'ombre sera donc égal à l'angle *ADS*, c'est-à-dire, au demi-diametre apparent du Soleil.

CHAPITRE DOUZIEME.

De la Penombre, & du cone qu'elle forme. La Méthode d'en mesurer la hauteur, comme aussi les diametres apparens des ombres de la Terre & de la Lune.

Ce que c'est que la Pénombre.

NOUS n'avons traité jusqu'ici que de l'ombre véritable qui est jettée continuellement par des Corps opaques, tels que la Terre ou la Lune qui se trouvent dans ce vaste espace où le Soleil lance une multitude presqu'infinie de rayons de lumiere : mais il arrive aussi

qu'aux environs de cette ombre, il se trouve quelque espace couvert d'une lumiere plus ou moins foible. C'est cet espace qu'on appelle communément *la Pénombre:* la raison est qu'on n'y reçoit qu'une partie des rayons du Soleil, l'autre étant interceptée par la Terre ou par la Lune; d'où l'on voit que cette Pénombre est plus ou moins forte, selon que le lieu proposé est plus ou moins proche de la véritable ombre; & c'est ce qui paroîtra encore plus évident par le moyen de la figure à laquelle on va appliquer le discours suivant.

Soit le Soleil *AEIG*, & *HED* une sphere opaque quelconque, telle que seroit par exemple celle de la Lune: soit aussi tirée la ligne *SC* par les centres du Soleil & de la Lune, de même que la ligne *FDO* qui touche le bord inférieur du Soleil & le bord supérieur de la Lune: on tirera encore la ligne *AHP* qui touche le bord supérieur du Soleil & le bord inférieur de la Lune, ensorte que ces deux dernieres lignes coupent la ligne *SC* au point *I*; alors le point *I* demeurant immobile, si l'on suppose que les lignes droites *IDO*, *IHP* soient prolongées indéfiniment & qu'étant emportées d'un mouvement conique autour de l'axe *IM*, elles demeurent néanmoins tangentes à la circonférence ou à la surface de la Lune, leur mouvement produira une surface conique indéfinie *PHDO*, laquelle outre la vraie ombre, renfermera un autre espace tel que *ODM*, *PHM;* or c'est dans cet espace qu'une partie plus ou moins grande des rayons du disque du Soleil ne sçauroit parvenir, parce qu'ils sont interceptés par le corps opaque de la Lune. Voilà donc ce qu'on nomme *la Pénombre*, ce même espace étant d'autant moins éclairé qu'on s'approche vers *X* ou *Y*, c'est-à-dire, vers les extrémités de la vraie ombre; car les autres lieux plus éloignés, comme *V* & *N* sont plus éclairés ou reçoivent plus de rayons. Mais puisque

PLANCHE III. *Fig.* 11.

l'on voit assez que les lieux qui sont en *Y* & *X* apperçoivent beaucoup moins du disque éclairé du Soleil, que ceux qui sont plus éloignés de l'axe du cone d'ombre, il est évident que si la Terre vient à traverser quelquefois cet espace, il arrivera nécessairement que certains points comme *S* de sa superficie, se trouveront totalement plongés dans les ténebres (enforte que les Observateurs qui s'y rencontreront, verront une Eclipse totale de Soleil) pendant que ceux qui se trouveront un peu hors du cone d'ombre, c'est-à-dire, dans le cone formé par la Pénombre comme en *Q*, n'appercevront en ce cas qu'une partie de la lumiere ou du disque du Soleil, l'autre partie leur étant cachée par le disque de la Lune. La preuve en est manifeste si l'on tire de ce point *Q* la ligne *QD* tangente à la Lune, & que de ce même point *Q* immobile, on donne autour de la Lune un mouvement conique à la tangente *QD* prolongée indéfiniment vers le Soleil; car la portion du cone qu'on aura décrite retranchera la partie du disque du Soleil, qui paroîtra du point *Q* entierement cachée, ou pour mieux dire éclipsée par la Lune.

Comment on peut connoître les dimensions du cone qui forme la Pénombre.

PLANCHE III. *Fig.* 12.

On peut connoître les dimensions exactes du cone qui forme la Pénombre de la maniere suivante. Soit le cercle *HDL* qui représente une Sphere opaque telle que la Lune, du centre de laquelle on ait tiré à celui du Soleil la ligne *SC*: si l'on éleve perpendiculairement à cette ligne le demi-diametre de la Lune *CB*, si par le point *B* l'on mene la tangente *BF* & que l'on fasse enfin l'angle *BCD* égal au demi-diametre apparent du Soleil, la tangente *DG* menée par le point *D*, formera, selon le Lemme que nous avons démontré ci-dessus, l'angle *FEG* égal à l'angle *BCD*, c'est-à-dire au demi-diametre apparent du Soleil: mais parce que la ligne *EF* est dirigée au centre du Soleil, il s'ensuit que la ligne *EG* touchera son bord supérieur. Or puisqu'elle touche en même tems le

bord de la Lune, si l'on suppose cette ligne emportée d'un mouvement conique autour de la Lune & du point *I* immobile, elle décrira nécessairement un cone qui sera celui de la Pénombre. Il faut à présent considérer que les angles alternes *FEI*, *EIC* sont égaux entre eux à cause des paralleles *EF*, *CS*: mais puisque l'angle *EIC* est la moitié de l'angle du cone de la Pénombre, il suit que la moitié de l'angle de la Pénombre sera toujours égale au demi-diametre apparent du Soleil. Ainsi l'on voit clairement que le cone d'ombre & que la partie de la Pénombre qui se trouve entre le Soleil & la Sphere opaque, sont toujours deux figures égales & parfaitement semblables, puisque leurs bases & leurs angles sont égaux entre eux.

Hauteur du cone d'ombre de la Terre. PLANCHE III, *Fig.* 13.

Voici comme on trouve la hauteur du cone d'ombre de la Terre. Soit *CT* le demi-diametre de la Terre, & *TM* la hauteur du cone d'ombre. Si l'on prend *TM* pour sinus total, *CT* sera le sinus de l'angle *TMC* qui est la moitié de l'angle du cone, & par conséquent égal au demi-diametre apparent du Soleil, c'est-à-dire, d'environ 16′ dans sa moyenne distance à la Terre; on fera donc comme le sinus de 16′ est au sinus total, ainsi le demi-diametre de la Terre à un quatrieme terme; & l'on aura *TM* de 214,8 demi-diametres terrestres; au lieu que lorsque la Terre est dans sa plus grande distance au Soleil, c'est-à-dire lorsque le demi-diametre apparent du Soleil, ou le demi-angle du cone d'ombre est de 15′ 50″, alors la longueur du cone d'ombre est 217 demi-diametres terrestres. Maintenant puisque le diametre de la Terre est au diametre de la Lune comme 100 est à 28, le même rapport subsistera entre les cones d'ombre de la Terre & de la Lune; car ce sont des figures parfaitement semblables, & par conséquent la moyenne hauteur du cone d'ombre de la Lune sera de 59, 36 demi-diametres terrestres. D'où l'on voit que si la distance de la Lune à la Terre ex-

Hauteur du cone d'ombre de la Lune.

cede sa moyenne distance qui est à peu près de 60 demi-diametres, la pointe du cone d'ombre de la Lune n'arrivera point jusqu'à la Terre, & dans ce cas l'Eclipse qui pourroit être centrale, ne sçauroit plus être totale. On verra pour lors un anneau lumineux autour de la Lune, ensorte quelle paroîtra par conséquent plus petite que le Soleil. Ces sortes d'Eclipses annulaires arrivent toujours lorsqu'au tems des Nouvelles Lunes l'anomalie moyenne de la Lune est moindre que trois signes ou plus grande que neuf signes ; car dans l'un ou l'autre cas il ne sçauroit y avoir d'Eclipse totale, puisque dans ces degrés d'anomalie la distance de la Lune à la Terre excede sa moyenne distance.

On détermine ici quelle est la plus grande quantité de la surface de la Terre qui puisse être plongée dans l'ombre.

Pour trouver aussi qu'elle est la plus grande partie de la surface de la Terre qui puisse être plongée dans l'ombre de la Lune ; prenons d'abord le Soleil à sa plus grande distance de la Terre, afin d'avoir le cone d'ombre de la Lune le plus long qu'il soit possible, sçavoir à très-peu-près 60 demi-diametres de la Terre : supposons aussi la Lune dans sa plus petite distance à la Terre, afin qu'elle traverse la plus grande largeur d'ombre qu'il est possible ; supposons, dis-je, la Lune à environ 56 demi-diametres terrestres.

PLANCHE III. *Fig.* 14.

Soit *L* le globe de la Lune, *ABD* la Terre dont *T* est le centre, *LM* la hauteur du cone d'ombre d'environ 60 demi-diametres terrestres, *LT* la distance de la Lune à la Terre d'environ 56 demi-diametres terrestres. On aura donc *TM* égal à quatre demi-diametres terrestres ; c'est pourquoi *TB* sera à *TM* comme 1 est à 4 : mais comme *TB* est à *TM*, ainsi le Sinus de l'angle *TMB* sera au Sinus de l'angle *TBM*, & parce que l'angle *TMB* est de 15′ 50″, donc l'angle *TBM* sera de 63′ 13″, & partant l'angle extérieur *ATB* qui est égal aux deux intérieurs *TMB*, *TBM*, sera de 79′ : or cet angle est mesuré par

l'arc *AB*, dont le double *BAC* sera de 158′ ou de 2° 38′, c'est-à-dire d'environ 65 lieues ou de 180 milles d'Angleterre. Nous supposons ici que l'axe de l'ombre passe exactement par le centre de la Terre; car si ce même axe étoit oblique à la surface de la Terre, alors le cone d'ombre de la Lune traverseroit avec plus ou moins d'obliquité la surface de la Terre & n'y formeroit plus un cercle, mais un ovale ou ellipse plus ou moins allongée.

On détermine aussi la plus grande quantité possible de la surface de la Terre, qui dans un même instant peut se trouver enveloppée dans la Pénombre. PLANCHE III, *Fig.* 15.

Si l'on demande quelle est la plus grande étendue de la surface de la Terre qui puisse être, pour ainsi dire, enveloppée dans un même-tems par la Pénombre, voici de quelle maniere on pourroit procéder pour répondre à cette question. Supposons le plus grand diametre apparent du Soleil dans son périhélie de 16′ 23″, & soit *ABD* la Terre, *L* la Lune, & par conséquent *AMB* la moitié de l'angle du cone de la Pénombre de 16′ 23″; on aura, selon ce qui a été dit ci-dessus, la hauteur du cone *LM* de $58\frac{1}{2}$ demi-diametres terrestres. De plus si l'on prend la Lune dans son Apogée, c'est-à-dire dans sa plus grande distance à la Terre, laquelle se trouve égale à 64 demi-diametres terrestres, la somme de ces deux distances *TL*, *LM*, c'est-à-dire *TM* sera de $122\frac{1}{2}$ demi-diametres de la Terre, & partant *TM* sera à *TB*, comme $122\frac{1}{2}$ est à 1. Or selon ce que l'on démontre dans la Trigonometrie *TB* est à *TM* comme le Sinus de l'angle *TMB* de 16′ 23″ est au Sinus de l'angle *MBN* qui sera par conséquent de 35° 42′. Si l'on ôte donc de cet angle extérieur, l'angle intérieur *TMB* égal à 16′ 23″ l'autre intérieur *MTB* ou l'arc *AB* sera d'environ 35° 25′, & par conséquent l'arc *CAB*, qui en est le double, sera de 70° 50′, c'est-à-dire d'environ 1770 de nos lieuës ou 4900 milles d'Angleterre.

Puisque le cone d'ombre de la Terre peut s'étendre

au-delà de l'orbite de la Lune, & qu'étant traverſé par un plan perpendiculaire, il s'y forme un cercle qui eſt proprement ce que nous appellons l'ombre terreſtre, il eſt néceſſaire de bien déterminer ſous quel angle cette ombre ou ſection circulaire pourroit être vue du centre de la Terre. Soit donc *T* le centre de la Terre, *CMT* la moitié de l'angle du cone de l'ombre, *FGH* ſa ſection circulaire qu'on ſuppoſe faite dans l'orbe de la Lune par un plan perpendiculaire & dont le diametre eſt *FH*. Il faut d'abord calculer la hauteur *TM* du cone d'ombre par le moyen de la moitié de l'angle *CMT*, qui eſt connu. Ce qui étant déterminé & la diſtance *TL* de la Lune à la Terre étant donnée, on aura par conſéquent la valeur de *ML*. Or l'angle *FML* étant égal au demi-diametre apparent du Soleil, & les angles ſous leſquels on voit un même objet étant réciproquement comme les diſtances de cet objet, on aura donc comme *TL* eſt à *ML*, ainſi l'angle donné *FML* ſera à l'angle *FTL* que l'on cherche.

Diametre apparent de l'ombre terreſtre.

PLANCHE III. *Fig.* 13.

On peut encore trouver cet angle *FTL* par une autre Méthode; car étant donnée la diſtance *FT* de la Lune à la Terre & le demi-diametre de la Terre *CT*, on aura l'angle *CFT* qui eſt celui ſous lequel on verroit de la Lune le demi-diametre de la Terre, lequel ne differe pas ſenſiblement de celui qu'on nomme *la Parallaxe horiſontale*. Or l'angle *CFT* qui eſt extérieur par rapport au triangle *TFM* eſt égal aux deux intérieurs oppoſés, & partant ſi l'on ôte de ce même angle *CFT* qui eſt connu, l'angle *FMT* qui eſt donné, le reſte ſera l'autre angle *FTM* ou *FTL*, c'eſt-à-dire l'angle ou le demi-diametre apparent de l'ombre que l'on ſe propoſoit de découvrir. A l'égard du demi-diametre apparent de la Terre vu de la Lune, c'eſt-à-dire ſa parallaxe horiſontale, les Tables Aſtronomiques la donnent pour les différentes diſtances de la Lune à la Terre.

Autre Méthode de déterminer le diametre apparent de l'ombre terreſtre.

Parallaxe horiſontale de la Lune.

Soit

Soit maintenant ☊ *L* la partie de l'orbite de la Lune que cet Aſtre parcourt vers les tems de ſon oppoſition au Soleil, & que nous ſuppoſerons ici être une ligne droite ; ce qui ne ſçauroit produire d'erreur, parce que nous n'en conſidérons qu'une très-petite étendue : imaginons auſſi un plan qui paſſe par cette ligne, & qui étant perpendiculaire à l'Ecliptique nous y déſigne la ſection commune repréſentée par ☊ *M*. Il faut abaiſſer du lieu de la Lune *L*, la perpendiculaire *LG* & décrire le cercle *FMO*, qui repréſentera l'ombre de la Terre dont le centre doit être au point *G* au moment de la Pleine Lune : cela ſuppoſé *LG* repréſentera la latitude de la Lune ou ſa diſtance à l'Ecliptique, & cette ligne *LG* ne ſçauroit différer beaucoup de la plus petite diſtance de la Lune au centre de l'ombre. Or il eſt évident que ſi la latitude *LG* de la Lune ſurpaſſe la ſomme des demi-diametres de l'ombre & de la Lune, alors cette Planete doit éviter totalement & paſſer au-delà de l'ombre, & par conſéquent il n'y aura point d'Eclipſe pour cette fois au tems de la Pleine Lune. Mais ſi la latitude *LG* eſt préciſément égale à la ſomme de ces demi-diametres, alors l'ombre de la Terre doit effleurer ſeulement le bord de la Lune, mais ſans pouvoir l'entamer encore ſenſiblement. Il n'y a donc que les cas auſquels la latitude *LG* eſt moindre que la ſomme des demi-diametres apparens de l'ombre & de la Lune, où il doit y avoir une Eclipſe : elle ſera partiale ſi la latitude excede la différence de ces mêmes demi-diametres. Enfin l'Eclipſe ſera totale ſi la latitude de la Lune eſt moindre que la différence qui ſe trouve entre les demi-diametres apparens de la Lune & de l'ombre terreſtre. Ces diverſes circonſtances ont fait penſer à quelques Aſtronomes à établir le Terme de toutes les Eclipſes poſſibles. Car ce terme étant connu, toutes les fois qu'aux tems des Pleines Lunes la diſtance de

Circonſtances qui limitent les principaux cas auſquels doivent arriver les Eclipſes de Lune.

PLANCHE III. *Fig.* 16, 17 & 18.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Les termes Ecliptiques. Ce que c'eſt.

la Lune à ſon nœud ſera plus petite que le nombre des degrés & minutes qui convient à ce terme, alors on peut aſſurer qu'il y aura une Eclipſe, & qu'au contraire il n'y en aura pas ſi la diſtance de la Lune à ſon nœud eſt un peu plus grande. Soit donc ☊ *S* une partie de la circonférence de l'Ecliptique, & ☊ *L* une partie de l'orbite de la Lune, *SL* la latitude de la Lune au moment de ſon oppoſition au Soleil, & qui ſoit telle que le bord du diſque apparent de cette Planete effleure ſeulement l'ombre de la Terre: ſoit enfin ☊ le lieu du nœud, enſorte que l'angle *L*☊*S* repréſente l'inclinaiſon de l'orbite de la Lune ſur le plan de l'Ecliptique, ſçavoir d'environ 5°. Or puiſque la latitude *LS* de la Lune à l'inſtant que ſon bord effleure l'ombre eſt de 66′, & qu'on connoît de plus l'angle *L*☊*S*, on aura par conſéquent dans le triangle rectangle *LS*☊ la valeur du côté ☊*S*, ou la diſtance du nœud au point de l'Ecliptique qui eſt oppoſé au vrai lieu du Soleil, ſçavoir 754′ ou de 12°, 34′. D'où l'on voit que ſi la diſtance du nœud à ce point oppoſé au Soleil ou bien au centre de la Lune à l'inſtant qu'elle eſt pleine, ſurpaſſe les 12° 34′ qu'on vient de déterminer, il ne ſçauroit en ce cas y avoir aucune Eclipſe, la Lune paſſant au-delà du cone d'ombre de la Terre.

PLANCHE III. *Fig.* 19.

Diametre apparent de l'ombre lunaire vue de la Lune.

Soit auſſi le centre de la Lune au point *L*, le cone de ſon ombre *DME*; il doit arriver ici de même que pour l'ombre de la Terre, ſçavoir que le plan qui traverſera ce cone perpendiculairement, y formera une ſection circulaire. Or puiſque le demi-diametre de ce cercle repréſente le demi-diametre de l'ombre, il faut faire voir que l'angle ſous lequel il eſt vu de la Lune eſt égal à la différence des demi-diametres apparens du Soleil & de la Lune vus de la Terre. Soit donc l'angle *LPD* le demi-diametre apparent de la Lune, lequel eſt égal aux deux intérieurs *PLM*, *PML*; il eſt évident que l'angle *PLM* ou *PLT* qui eſt le

PLANCHE III. *Fig.* 20.

demi-diametre apparent de l'ombre vu de la Lune sera égal à l'angle *LPD* moins l'angle *LMP*, c'est-à-dire qu'il sera toujours égal au demi-diametre apparent de la Lune moins le demi-diametre apparent du Soleil.

Diametre apparent de la Pénombre. PLANCHE III. *Fig.* 21.

Soit enfin *L* le centre de la Lune, *AMB* le cone de la Pénombre qui environne la Terre, *MT* l'axe de ce cone qu'il faut supposer traversé par un plan perpendiculaire dont la section sera un cercle. Ce cercle est, comme nous l'avons déja vu, ce qu'on appelle la Pénombre, dont le demi-diametre est *AT*: l'angle sous lequel *AT* est vu de la Lune est *TLA* qui étant extérieur par rapport au triangle *LMA* est par conséquent égal aux deux intérieurs opposés *LAM*, *LMA*: mais l'angle *LMA* est le demi-angle du cone & partant ne différe pas du demi-diametre apparent du Soleil: d'ailleurs *MAL* ou *CAL* est égal au demi-diametre apparent de la Lune vu de la Terre; il suit donc que le demi-diametre apparent de la Pénombre vu de la Lune sera égal à la somme des demi-diametres apparens de la Lune & du Soleil.

La Route apparente de la Lune à l'égard du Soleil.

Au reste si dans les Nouvelles ou Pleines Lunes aux tems des Eclipses, le Soleil n'avoit point ce mouvement apparent que l'on observe chaque jour d'Occident en Orient, & qui est causé par le mouvement propre de la Terre sur son orbite, *la Route de la Lune à l'égard du Soleil* seroit exactement la même que celle qui convient à l'inclinaison de son orbite sur le plan de l'Ecliptique. Mais parce que dans le même intervalle de tems que la Lune nous paroît s'avancer sur son orbite, le Soleil s'avance aussi, quoique beaucoup moins vîte, à très-peu-près du même sens, ou sur le plan de l'Ecliptique; la route apparente de la Lune à l'egard du Soleil doit donc être différente de celle qu'elle décrit réellement dans son orbite, & partant la ligne qui désigne cette route, aura une plus grande inclinaison sur le plan de l'Ecliptique.

PLANCHE III. *Fig.* 22. Soit par exemple ☊ *A* une partie de l'orbite de la Lune, ☊ le point de l'Ecliptique où s'eſt faite la vraie conjonction du Soleil & de la Lune : il eſt évident que ſi la Lune décrit dans un certain eſpace de tems la partie ☊ *L* de ſon orbite & que le Soleil par ſon mouvement apparent ſur le plan de l'Ecliptique, s'avance pendant le même tems de la quantité ☊ *S*, la ligne *SL* ſera la route apparente de la Lune à l'égard du Soleil. En effet on démontre dans la Méchanique que ſi deux corps quelconques ſont pouſſés avec différentes forces vers un même côté, le mouvement relatif de ces deux corps, c'eſt-à-dire le mouvement dont l'un paroît s'éloigner à l'égard de l'autre, ſera le même que ſi ce dernier demeuroit actuellement dans un repos parfait & que l'autre fût pouſſé ſeulement à la différence de leurs viteſſes. Si l'on tire donc par le lieu de la Lune *L* la parallele à l'Ecliptique *BL*, ſur laquelle on abbaiſſe la perpendiculaire ☊ *B*, il eſt évident que quand la Lune décrit la partie ☊ *L* de ſon orbite, alors ſon mouvement par rapport à l'Ecliptique doit être meſuré par l'eſpace *BL* : faiſant donc *L l* égal à *S* ☊, & tirant la ligne ☊ *l*, cette ligne ſera parallele à *SL*, & le mouvement de la Lune à l'égard du Soleil ſera le même que ſi l'on eût vu le Soleil immobile au ☊ & que la Lune ne ſe fût avancée à l'égard de l'Ecliptique qu'avec la viteſſe *B l* égale à la différence des deux viteſſes de la Lune & du Soleil. Mais puiſque les angles *B L* ☊ & *B l* ☊ ſont fort petits, on peut les ſuppoſer réciproquement dans un même rapport que les côtés *B l*, *BL*, & l'on aura comme la différence des mouvemens du Soleil & de la Lune conſidérés ſur le plan de l'Ecliptique, eſt au mouvement de la Lune réduit à l'Ecliptique, ainſi l'angle que forment les plans de l'Ecliptique & de l'orbite de la Lune, ſera à l'angle *B l* ☊ ou ſon égal *l* ☊ *E* ou *L S E* qui eſt l'angle d'inclinaiſon apparente ſur l'Ecliptique formé par la route de la Lune à l'égard du Soleil.

On connoîtra auſſi par ce moyen l'angle que doit former, avec cette Route de la Lune à l'égard du Soleil, le cercle de Latitude mené par un point quelconque de l'Ecliptique ; car dans le triangle ſphérique rectangle qui eſt formé par ces trois côtés, ſçavoir l'Ecliptique, la route de la Lune, & le cercle de latitude: on connoît 1° l'angle de l'inclinaiſon apparente ſur l'Ecliptique de la route de la Lune à l'égard du Soleil, on connoît auſſi la diſtance du cercle de latitude au nœud ; & partant l'on trouvera par la Trigonométrie ſphérique l'autre angle aigu que l'on cherche.

CHAPITRE TREIZIEME.

Où l'on conſidere la projection de l'ombre de la Lune ſur le diſque de la Terre.

SI l'on ſuppoſe qu'une ligne droite eſt projettée ſur un plan qui lui eſt parallele, ou que l'on imagine pluſieurs lignes droites perpendiculairement abbaiſſées de chaque partie de cette ligne ſur le plan parallele, leur rencontre avec ce plan y déterminera la vraie projection que l'on cherche ; enſorte que cette projection ſera une ligne droite égale & parallele à la ligne droite propoſée. Car puiſque les perpendiculaires abbaiſſées des extrémités de la ligne droite propoſée ſur le plan donné ſont néceſſairement égales & paralleles, il faut donc que les deux lignes droites qui aboutiſſent à leurs extrémités ſoient auſſi égales & paralleles. Or il ſuit de là que ſi deux lignes droites qui concourent ou qui forment un angle quelconque, ſont néantmoins toutes deux paralleles à un plan donné, leur projection ne ſçauroit être autrement repréſentée que par deux autres lignes ſemblablement inclinées,

ou qui formeront un angle précisément égal à celui des deux premieres. Cette vérité découle assez naturellement de ce qui est démontré à la Proposition 10e de l'onzieme livre d'Euclide ; mais il suit encore de ce que nous venons d'établir, que si une figure plane quelconque est projettée sur un plan qui lui est parallele, sa projection doit toujours être une figure semblable & parfaitement égale. Ce qui étant une fois accordé,

Il ne reste plus qu'à considérer quelle doit être la projection d'une ligne qui est inclinée à l'égard du plan sur lequel on la projette. Or je dis que si l'on abbaisse de chaque point de cette ligne des perpendiculaires sur le plan donné, il y aura un même rapport entre la ligne droite proposée & sa projection, que du cosinus de l'angle d'inclinaison au sinus total. Soit *AB* une ligne proposée & inclinée comme l'on voudra à l'égard du plan donné *DE* : si l'on abaisse des points *A* & *B* les perpendiculaires *Aa*, *Bb*, la droite *ab* sera la projection de la ligne *AB*, & si l'on tire par le point *B* la ligne *BC* perpendiculaire à *Aa* & qui la rencontre au point *C*, l'on aura *BC* égale à *ab* : mais *BC* est à *AB* comme le cosinus de l'angle *ABC* est au sinus total ; on aura donc *ab* est à *AB* comme le cosinus de l'angle d'inclinaison est au sinus total. Il suit encore que toute figure plane qui sera perpendiculaire au plan de projection, ne sçauroit être autrement projettée que selon une ligne droite ; car toutes les perpendiculaires qu'on abbaisseroit des différens points de cette figure, doivent de nécessité tomber dans la section commune, qui, comme l'on sçait, est nécessairement une ligne droite. Cette sorte de projection des lignes & des figures qui se fait par des perpendiculaires abbaissées sur un plan, se nomme *la Projection Orthographique*.

PLANCHE III. *Fig.* 23.

Ce que l'on entend par la Projection Orthographique.

Présentement imaginons un plan qui passe par le centre de la Terre, & qui soit tel que la ligne droite qui joint

les centres de la Terre & du Soleil lui ſoit perpendiculaire : il eſt clair que ce plan formera à la ſurface de la Terre un cercle qui ſéparera l'hémiſphere éclairé d'avec celui qui eſt dans l'ombre. Or c'eſt préciſément le cercle que nous avons nommé ci-deſſus le Terme de la lumiere & de l'ombre. Qu'il nous ſoit donc permis de l'appeller actuellement *le Diſque de la Terre*, puiſqu'auſſi-bien c'eſt le plan qui ſeroit directement expoſé à l'œil de l'Obſervateur ſitué dans la Lune * au moment de ſa conjonction au Soleil, c'eſt-à-dire quand elle ſe trouve dans la ligne droite qui joint les centres de la Terre & du Soleil. On conçoit aſſez d'ailleurs comment l'Equateur terreſtre, ſes paralleles, ſes deux Poles & tous les autres points de la ſurface de la Terre, doivent être projettés ſur ce plan, & l'on doit regarder enfin comme paralleles toutes les lignes droites ou rayons qui partent du centre du Soleil & qui ſe terminent à la ſurface de la Terre : mais auſſi puiſque la ligne droite qui joint les centres de la Terre & du Soleil eſt exactement perpendiculaire au plan du diſque, il ſuit que toutes les autres lignes tirées du centre du Soleil à quelque point que ce ſoit de la ſurface de la Terre, ſeront par conſéquent perpendiculaires au même plan. De plus à cauſe de la rotation ou du mouvement diurne de la Terre autour de ſon axe, toutes les Régions de la Terre,

Le diſque de la Terre.

Projection orthographique faite ſur le diſque.

* Cette maniere de conſidérer les Eclipſes au tems des Nouvelles Lunes comme des Eclipſes de Terre a été inventée par *Kepler* & miſe ſucceſſivement en pratique par *Bouillaud*, *Wreen*, *Caſſini*, *Halleï*, *Flamſteed* & *de la Hire*. Voyez ſur-tout le IV. Chapitre du quatriéme Livre de l'Aſtronomie Philolaïque, publiée par Bouillaud en 1645, où l'on prétend que dans l'ancienne maniere de calculer les Eclipſes du Soleil, le calcul eſt ſi long & ſi pénible à cauſe des parallaxes qui changent à chaque inſtant, qu'on a bien de la peine à ſe réſoudre à l'entreprendre, d'autant qu'il s'agit d'un travail plein d'ennui & fort ingrat ; au lieu qu'en traitant ces Eclipſes comme des Eclipſes de Terre on évite la Parallaxe, comme il arrive aux Eclipſes de Lune. En effet dans ces dernieres la Parallaxe de l'ombre à meſure qu'elle varie, étant toujours la même que celle de la Lune, celle-ci ne ſçauroit donc cauſer d'embarras ni d'obſtacles, & c'eſt ce qui fait que de toutes les régions de la Terre d'où l'on apperçoit la Lune, l'Eclipſe paroît préciſément de la même grandeur. Il en doit donc être de même des Eclipſes de Terre, ſi l'on ſuppoſe pour un moment que l'œil du Spectateur qui les obſerve ſoit placé dans la Lune.

les Villes, & généralement tous les lieux remarquables paroîtront, vûs de la Lune, décrire chacun leurs traces sur le disque apparent : en effet le mouvement diurne leur fait décrire en 24 heures ou l'Equateur ou ses paralleles. De plus si Soleil est dans l'Equateur au tems de l'observation d'une Eclipse, toutes ces traces ou cercles paralles seront alors projettés en lignes droites paralleles, sur le plan du disque, puisque dans cette situation ils sont tous perpendiculaires à ce plan. Dans les autres cas où le Soleil est hors de l'Equateur, la projection de ces cercles sera une ellipse plus ou moins ouverte, & l'Observateur placé dans la Lune la verra décrire à chaque lieu sur le plan du disque. Considérant donc comme immobile un de ces cercles qui aboutissent aux deux Poles, c'est-à-dire, le Meridien terrestre dont le plan prolongé passeroit par le centre du Soleil, on pourra donc regarder le plan de ce cercle comme un Méridien universel; desorte que le moment auquel chaque lieu de la Terre traversera ce plan, sera celui où les Habitans compteront le vrai midi. De même lorsqu'un lieu quelconque de la Terre sera parvenu, par le mouvement diurne, à la circonférence occidentale du disque, alors les habitans de ce lieu verront le Soleil se lever, & ce sera aussi le premier instant auquel l'Observateur placé dans la Lune l'appercevra sur la circonférence du disque terrestre : ensuite ce même lieu paroîtra s'éloigner & s'avancer peu à peu vers l'Orient. Mais lorsqu'après le passage au Méridien ce lieu sera devenu plus oriental que le Soleil, les habitans verront pour lors cet Astre s'avancer vers l'Occident, de maniere qu'étant enfin parvenu à la circonférence occidentale du disque, les mêmes habitans verront le Soleil se coucher, alors même que l'Observateur placé dans la Lune verra ce lieu disparoître pour entrer dans la partie obscure ou invisible de la surface de la Terre.

Supposition que l'on peut faire d'un Méridien universel.

La



Theullard Sculp.

La grandeur apparente du disque de la Terre se mesure communément par l'angle sous lequel on appercevroit son diametre du centre de la Lune : cet angle est aussi ce que l'on nomme la parallaxe horisontale de la Lune. D'ailleurs si du centre de la Lune on abbaisse une perpendiculaire sur le plan de l'Ecliptique, pour avoir la mesure de sa distance à ce plan, cette ligne sera, comme l'on voit, parallele au plan du disque terrestre, & partant la projection s'en fera par une ligne droite égale & parallele. Ainsi l'angle sous lequel on appercevroit de la Lune cette perpendiculaire projettée sur le disque, sera égal à l'angle sous lequel on appercevroit cette ligne du centre de la Terre. Car deux lignes égales vues de distances égales, doivent nécessairement paroître sous des angles égaux.

La grandeur apparente du disque.

Il est encore évident que l'on peut considérer comme une ligne droite, cette petite partie de la route de la Lune à l'égard du Soleil, qui au moment de l'Eclipse se trouve projettée sur le disque : sa projection, dis-je, sera une autre ligne droite égale, qui formera avec le cercle de latitude le même angle que celui qui est compris dans le Ciel entre le cercle de latitude & la route de la Lune à l'égard du Soleil. Ainsi le centre de la Pénombre doit donc paroître parcourir cette ligne projettée sur le plan du disque terrestre.

La route de la Lune à l'égard du Soleil, projettée sur le plan du disque.

Soit maintenant le disque de la Terre représenté par le cercle *DKG* dont le demi-diametre soit divisé en autant de parties qu'il y a de minutes & de secondes dans la Parallaxe horisontale de la Lune, c'est-à-dire dans l'angle sous lequel on appercevroit du centre de la Lune le demi-diametre de la Terre. Soit *NT* la distance de la Lune au plan de l'Ecliptique au moment de la Nouvelle Lune, ou plutôt soit *NT* sa projection qu'il faut aussi concevoir divisée en autant de parties ou minutes & secondes, qu'il s'en trouve dans la latitude de la Lune. Soient enfin ☊ *K*

PLANCHE IV. *Fig.* 1.

La latitude de la Lune projettée sur le plan du disque.

une partie de l'Ecliptique, ♌ *l* la route apparente de la Lune à l'égard du Soleil, l'une & l'autre projettées sur le plan du disque : il est clair que si du centre *T* on abbaisse, sur la trace du centre de l'ombre, la perpendiculaire *TV*, cette ligne sera la mesure de la plus petite distance entre les centres du disque & de l'ombre de la Lune. C'est pourquoi l'on décrira du point *V* comme centre, un petit cercle dont le demi-diametre sera égal à l'excès du diametre apparent de la Lune sur celui du Soleil. Ce cercle représentera l'ombre véritable de la Lune, puisqu'en effet on a fait voir que cette même ombre vue de la Lune étoit égale à la différence des diametres apparens du Soleil & de la Lune. De plus si l'on décrit le cercle *HM* concentrique au premier, & dont le demi-diametre *VM* soit au demi-diametre du disque, comme la somme des demi-diametres apparens de la Lune & du Soleil, est au demi-diametre apparent de la Terre, c'est-à-dire à la Parallaxe horisontale de la Lune, ce cercle *HM* représentera l'espace qu'occupe la Pénombre de la Lune, au moment de la plus petite distance de cet Astre au centre du disque de la Terre ; car on a fait voir ci-dessus que le demi-diametre apparent de la Pénombre, doit être tel qu'on vient de le représenter. Or il est aisé de reconnoître ici que toutes les fois que ce cercle n'arrivera pas jusqu'à la circonférence du disque, il n'y aura point en ce cas d'Eclipse de Soleil ; ou pour s'expliquer plus clairement, si la distance *VT* surpasse la somme des demi-diametres apparens du disque & de la pénombre, si elle est, dis-je, plus grande que la somme des demi-diametres apparens du Soleil, de la Lune & de la Parallaxe horisontale, on sera pour lors assuré qu'il n'y aura point d'Eclipse de Soleil. Mais si cette distance *VT* est précisément égale à la somme dont nous venons de parler, alors la Pénombre doit effleurer le disque de la Terre sans néantmoins l'entamer.

Quels sont les cas auſquels la Terre ne doit point être éclipſée.

Enfin si VT est moindre que cette même somme, c'est-à-dire si VT est moindre que VM & TR, la Pénombre pour lors s'étendra sur une partie du disque de la Terre, & les habitans qui occuperont en ce cas le segment $RZMY$ verront pour lors une Eclipse partiale du Soleil.

Dans quels cas doivent arriver les Eclipses partiales. PLANCHE IV. *Fig.* 2.

Mais si la plus petite distance des centres TV est moindre que la différence des demi-diametres du disque & du petit cercle de la Pénombre, c'est-à-dire, si cette distance est plus petite que la différence des demi-diametres du Soleil, de la Lune & de la Parallaxe horisontale, alors le petit cercle de l'ombre, ou qui est au milieu de la Pénombre, couvrira successivement divers endroits du disque de la Terre, de maniere qu'en les parcourant, il y aura pour chacuns de ces endroits une Eclipse totale de Soleil, qui par conséquent sera observée de tous les habitans de ces mêmes lieux. Il faut bien remarquer ici que les Eclipses totales du Soleil ne sont jamais de longue durée, parce que le cercle de l'ombre est toujours très-petit; ce qui vient de ce que le diametre apparent de la Lune ne sçauroit jamais excéder de beaucoup le diametre apparent du Soleil; car cet excès ou différence ne va gueres qu'à deux minutes: c'est pourquoi le plus grand espace que l'ombre occupe sur la surface de la Terre doit se trouver parcouru par l'ombre en près de quatre minutes d'heures. Il est vrai que l'on a observé quelquefois qu'elle y a demeuré un peu plus de quatre minutes; mais ce n'est que dans certaines circonstances favorables, sçavoir quand le lieu éclipsé est emporté directement du même sens que l'ombre par la rotation de la Terre autour de son axe.

Eclipses totales. PLANCHE IV. *Fig.* 3.

On peut encore, de même que nous l'avons pratiqué pour les Eclipses de Lune, déterminer ici les termes des Eclipses de Soleil, c'est-à-dire la plus grande distance où la Lune puisse être de son nœud, pour qu'il y ait à peine

Les Termes écliptiques,

Eclipſe, ou que la Pénombre effleure le diſque vers les tems de la conjonction de la Lune au Soleil. Soit *ROG* le diſque de la Terre, ☊*TK* la ligne qui repréſente la ſection commune du plan de l'Ecliptique & du plan du diſque terreſtre. Soit de même ☊*N* la route apparente de la Lune à l'égard du Soleil projettée ſur le diſque : ſoit enfin *TV* la plus petite diſtance entre les centres de l'ombre & du diſque, égale à la ſomme des demi-diametres du diſque & de la Pénombre. Dans le triangle ☊*TV*, on connoît le côté *TV*, qui dans le cas où il eſt le plus grand qu'il eſt poſſible, n'excede pas $94\frac{1}{2}$ minutes : d'ailleurs l'angle ☊ eſt au moins de 5° 30′ : c'eſt pourquoi l'on trouvera le côté ☊*T* de 986′, c'eſt-à-dire de 16° 26′ : or comme c'eſt alors que la Pénombre effleure le diſque terreſtre ſans l'entamer, on eſt donc fondé à dire qu'il faut qu'au tems de la Nouvelle Lune ſa diſtance au nœud ſoit tout au plus de 16° 26′ pour qu'il y ait Eclipſe du Soleil.

PLANCHE IV. *Fig.* 4.

PLANCHE IV. *Fig.* 5.

Suppoſons, comme ci-devant, que le cercle *RKG* repréſente le diſque de la Terre, ☊*TK* la partie de l'Ecliptique qui eſt projettée ſur le plan du diſque ; ☊*l* la route apparente du centre de la Pénombre ſur le plan du diſque terreſtre ; il eſt évident que *TN* ſera la latitude de la Lune au moment de la conjonction, & *TV* la plus petite diſtance des centres de l'ombre & du diſque. Soit donc le cercle *OPQ* la Pénombre qui s'avance ſucceſſivement depuis le point *D* ſelon *V* & *N* juſqu'en *l*, & ſoit au milieu de la Pénombre le petit cercle qui repréſente la véritable ombre. Si l'on connoît le tems vrai de la conjonction de la Lune au Soleil, ou, ce qui eſt la même choſe, le moment auquel le centre de la Pénombre doit arriver au point *N*, ce qui ſe peut déduire des Tables Aſtronomiques, l'on aura par conſéquent le vrai moment auquel le centre de l'ombre arrivera au point *V*, c'eſt-à-dire l'heure du milieu de l'Eclipſe. Car dans le Triangle rectangle

TVN on connoît la latitude de la Lune *TN* & l'angle *TNV* que le cercle de latitude forme avec la route apparente de la Lune à l'égard du Soleil, on connoîtra donc le côté *VN* de même que le côté *TV*. Mais puisque le mouvement de la Lune au Soleil est donné par les Tables, on connoîtra par ce moyen le tems que le centre de l'ombre employe à parcourir l'espace *VN*. L'ajoutant donc ou le soustrayant, selon les différens cas, du tems de la conjonction, on en déduira par conséquent le tems du milieu de l'Eclipse. De plus dans le Triangle rectangle *DTV* on connoît *DT* qui est la somme des demi-diametres du disque & de la pénombre, on connoît aussi *TV* qui est la plus petite distance des centres & que l'on vient de déterminer ci-dessus ; on pourra donc, comme ci-dessus, calculer la valeur de *DV*, & par conséquent le tems que l'ombre doit employer à parcourir l'arc *DV*; ce qui donnera la demi-durée de l'Eclipse à l'égard du disque de la Terre. Connoissant ainsi le premier instant auquel la Pénombre doit commencer à entamer le disque terrestre, par une opération semblable l'on déterminera le tems auquel elle doit en sortir tout-à-fait.

Maniere de déterminer l'instant du milieu de l'Eclipse du Soleil.

Calcul de la demi-durée de l'Eclipse.

Maintenant étant donné le vrai lieu du Soleil dans l'Ecliptique pour un tems déterminé, il sera facile de sçavoir quel est le point de la surface de la Terre qui pour lors a le Soleil au zénith, c'est-à-dire, où cet Astre doit paroître vertical, ou dans le point du Ciel le plus élevé: en un mot qui est à plomb au-dessus de ce lieu. Car sa latitude ou hauteur du Pole sera nécessairement égale à la distance du Soleil à l'Equateur, c'est-à-dire, à sa déclinaison, & cette déclinaison est déterminée dès que l'on connoît par le calcul le vrai lieu du Soleil. Quant à la longitude de ce lieu, il faut la conclurre relativement à celle du Méridien des Tables Astronomiques dont on se

Calcul du lieu de la Terre qui doit être à plomb au-dessous du Soleil à tel instant donné qu'on voudra.

sert. Il ne faut pour cela que convertir en degrés, à raison de quinze degrés pour chaque heure & de quinze minutes de degrés pour une minute d'heure, la différence du tems écoulé depuis midi. Par exemple, si l'on demande la longitude du lieu qui a le Soleil à son zénith lorsque nous comptons à Paris $9\frac{1}{2}$ heures du matin; il faut d'abord prendre la différence de $9^h\ 30'$ à 12^h qui est $2^h\ 30'$: or cet intervalle de tems répond à $37°\ 30'$, à raison de $15°$ pour chaque heure; il s'ensuit donc que la longitude du lieu que l'on cherche est de $37°\frac{1}{2}$ à l'orient du Méridien de Paris.

De l'élévation du Pole sur le plan du disque. PLANCHE IV. *Fig. 6.*

Supposant encore, comme ci-dessus, que le cercle *FRK* représente le disque de la Terre, & que la ligne *FTK* soit la projection d'une partie de l'Ecliptique sur ce disque, si l'on y éleve par le centre la perpendiculaire *TR*, elle représentera la projection de l'axe de l'Ecliptique dont le Pole sera au point *R*. Soit aussi le point *P* le Pole de la Terre projetté sur le plan de ce même disque, & imaginons que par les points *T* & *P* on fasse passer un cercle *TPS* qui sera en ce cas le Méridien que nous avons nommé ci-devant Méridien universel; il s'ensuit que l'élévation du Pole sur le plan du disque sera toujours égale à la déclinaison du Soleil: car l'arc du cercle compris entre le Soleil & la circonférence du disque est ici de $90°$, mais l'arc du même Méridien compris entre l'Equateur & le Pole étant aussi de $90°$, si l'on ôte de ces deux Quarts-de-Cercle, qui sont égaux, la partie commune *TP*, il doit rester la distance du Soleil à l'Équateur égale à *PS*, qui sera l'élévation du Pole sur le plan du disque.

Il faut bien remarquer que quand le Soleil paroît en ♑, ♒, ♓, ♈, ♉, ♊, c'est-à-dire quand la Terre parcourt les six autres Signes opposés de l'Ecliptique, alors le point *S*, où le Méridien rencontre la circonférence du disque, tombe toujours à la droite du Pole de l'Eclipti-

que, * & qu'au contraire dans les six Signes opposés ce point tombe à la gauche du même Pole. Cette projection des axès est renversée à l'égard de celle que nous verrions se faire dans l'orbe de la Lune sur un plan parallele à celui du disque de la Terre, ou sur le plan auquel la ligne qui joint les centres de la Terre & du Soleil, se trouveroit perpendiculaire.

Position du Méridien qui passe par le Soleil.

Pour connoître l'angle *RTS* où l'arc du disque *RS* compris entre le Pole de l'Ecliptique & le Méridien universel, dans le Triangle sphérique rectangle *RSP*, on connoît *RP* qui est la distance du Pole de l'Ecliptique au Pole de l'Equateur, sçavoir $23^{o}\frac{1}{2}$. On connoît aussi le côté *PS* égal à la déclinaison du Soleil. On aura donc par la Trigonométrie le côté *RS* ou bien l'angle *RTS* dont l'arc *RS* est la mesure. Enfin si l'on prend sur *TS* dont la position vient d'être déterminée, la ligne *TP* égale au cosinus de la déclinaison du Soleil, dans la supposition que *TS* est le rayon, le point *P* déterminera le lieu où doit être projetté le Pole de l'Equateur.

Détermination du lieu de la Terre où la Pénombre doit commencer à paroître.

Pour trouver présentement le lieu de la Terre *Q* où la Pénombre commence à toucher le disque terrestre, c'est-à-dire le lieu où le Soleil au moment de son lever doit commencer à paroître éclipsé vers le haut de sa circonférence, il faut tirer par le Pole, le Méridien *PQ*, c'est-à-dire qui passe par le point *Q* où la Pénombre doit commencer à toucher le disque : car puisque l'on connoît dans le Triangle rectangle & rectiligne *DTV*, les côtés *DT*, *TV*, on trouvera par conséquent la valeur de l'angle *DTV*; ensuite selon les différens cas y ajoutant ou soustrayant l'angle *VTP*, qui est la somme ou la diffé-

* C'est-à-dire que l'œil placé dans le Soleil & considérant le disque de la Terre lorsqu'elle est en ♎ verroit l'axe *B A* à la droite de l'axe de l'Ecliptique; au lieu que la *Fig.* 18 de la *Planche* 1. nous le représenteroit vers la gauche, ou dans une situation contraire, si l'on ne faisoit attention que le disque doit se présenter ici à nos yeux, tel qu'il seroit vû du Soleil, c'est-à-dire par sa partie éclairée & non pas par celle qui est dans l'ombre.

rence des angles connus VTN, NTP, l'on aura l'angle DTP que l'on cherche. C'eſt pourquoi dans le Triangle rectangle ſphérique SPQ dont les côtés ſe trouvent ſur la ſurface du Globe terreſtre, puiſque le côté SP eſt égal à la déclinaiſon du Soleil; & que l'arc SQ eſt meſuré par l'angle STQ qui vient d'être connu, on aura donc la valeur de l'arc PQ complément de la latitude du lieu Q que l'on cherche. On calculera de même l'angle SPQ, ou l'angle QPT qui eſt ſon ſupplément à deux droits, & qui meſure la différence des Méridiens entre le lieu Q & celui où le Soleil eſt vertical au moment donné: & comme ce dernier lieu a été déterminé ci-deſſus, le point Q ſera donc connu, puiſque ſa vraie longitude & latitude ſont déterminées ſur le Globe terreſtre.

Maniere de déterminer la poſition du lieu où la véritable ombre commencera à paroître à un inſtant donné.

On ſe ſervira de la même méthode pour découvrir quel eſt le lieu de la Terre où l'ombre totale doit commencer à ſe répandre: enfin l'on obſervera à peu près les mêmes regles pour trouver le lieu de la Terre M qui doit entrer dans l'ombre à certain moment donné, ſoit avant ou après le milieu de l'Eclipſe. Car puiſque l'on ſuppoſe le tems donné ou l'heure connue, il eſt évident que par le moyen du mouvement horaire de la Lune au Soleil, on connoîtra la ligne droite MV, & par conſéquent le point M du diſque qui répond alors au centre de l'ombre. C'eſt pourquoi dans le Triangle rectangle VMT étant donné les côtés MV, VT, on aura la valeur du côté MT, comme auſſi celle de l'angle MTV, à laquelle ſi l'on ajoute, ou bien ſi l'on en ôte, l'angle donné VTP, on pourra connoître ainſi la valeur de l'angle MTP: or MT eſt le ſinus de l'arc d'un cercle vertical qui paſſeroit par le zénith du point M & par celui du lieu qui eſt à plomb au-deſſous du Soleil, dans la ſuppoſition que le ſinus total eſt le demi-diametre du diſque. Si l'on fait donc comme le demi-diametre du diſque eſt à MT, ainſi le ſinus total

total à un quatrieme terme : ce ſera le ſinus d'un arc qui répond à la diſtance du Soleil au zénith du point *M* : ainſi dans le Triangle ſphérique *MPT* qui eſt ſur la ſurface de la Terre, on connoît l'arc de la diſtance *PT* du Soleil au Pole, on connoît auſſi l'arc dont *MT* eſt le ſinus, qui eſt la diſtance du Soleil au zénith, & l'angle *MTP* ; on aura donc l'arc *MP* qui eſt le complément de la latitude du lieu, & l'angle *MPT* qui ſera la différence des Méridiens que l'on cherche entre le point *M* & le lieu de la Terre qui eſt à plomb au-deſſous du Soleil : mais on a trouvé ci-deſſus la différence des Méridiens entre le lieu de la Terre qui eſt à plomb au-deſſous du Soleil & le lieu du Méridien des Tables ſur leſquelles on calcule ; l'on aura donc la vraie différence en longitude entre le Méridien des Tables & le lieu *M* dont il falloit déterminer la poſition. Enfin ſi on calcule de cette maniere un grand nombre de points par où doit paſſer le centre de l'ombre, & que l'on faſſe paſſer une ligne par tous ces points, ce ſera la trace de l'ombre ſur la ſurface de la Terre.

Maniere de connoître la quantité du Soleil qui doit être éclipſée. PLANCHE IV, *Fig.* 7.

La quantité dont le Soleil doit paroître éclipſé pour un moment donné ſe peut connoître, ſi l'on a la vraie poſition du lieu que l'Obſervateur occupe pour lors à l'égard de la Pénombre, ou du moins ſi l'on a ſa diſtance au centre de l'ombre. Soit *ASB* le diametre du Soleil parallele au diametre *EF* de la Pénombre : ſi l'on tire la droite *MCB* qui touche la Lune & qui ſe termine à l'extrémité du diametre du Soleil vers la droite, & la ligne *FCA* qui touche le Soleil vers l'autre extrémité du même diametre à la gauche, on aura l'angle *ACB* égal au diametre apparent du Soleil, & les Triangles *ACB*, *MCF* ſeront ſemblables. Soit donc un Obſervateur placé au point *G* de la Pénombre, de maniere que le rayon tiré de ſon œil au Soleil ſoit repréſenté par la ligne droite *GCP*,

qui touche le globe de la Lune & qui se terminant au disque apparent de ce corps lumineux, détermine le point *P* qui sépare la partie visible d'avec la partie *AP* qui paroît éclipsée : il est clair que puisque la droite *GP* passe à très-peu-près par le sommet commun *C* de deux Triangles semblables & opposés, elle divisera leurs bases *AB*, *MF*, sensiblement dans un même rapport. On aura donc *AP* est à *AB*, comme *GF* est à *MF*; c'est-à-dire que la partie éclipsée du Soleil, ou la quantité de l'Eclipse pour un moment donné sera au diametre apparent du Soleil, comme la distance du lieu de l'Observateur à la circonférence de la Pénombre est au demi-diametre de la Pénombre moins le demi-diametre de l'ombre.

La quantité de l'Eclipse mesurée en doigts ou douziémes parties.

Les Astronomes divisent communément dans les Eclipses le diametre du Soleil de même que celui de la Lune en douze parties égales qu'ils appellent doigts. Ils s'en servent pour mesurer la quantité de l'Eclipse, & c'est ainsi qu'ils ont coutume de dire que l'Eclipse est de tel ou de tel nombre de doigts, lorsqu'il s'en manque telle ou telle douzieme partie au diametre apparent tant de la Lune que du Soleil.

La situation d'un lieu sur le disque étant donnée pour un instant déterminé, on peut trouver au même instant la phase de l'Eclipse.

PLANCHE IV. *Fig.* 8.

Si l'on a déterminé une fois la situation d'un lieu sur le disque de la Terre pour une certaine heure proposée & que l'on veuille connoître quelle sera pour lors la phase ou la quantité de l'Eclipse dans ce même lieu, voici de quelle maniere on y doit procéder. Soit le point *S* la situation donnée du lieu sur le disque terrestre, on trouvera d'abord pour le moment donné, la situation *M* du centre de la Pénombre, & cela dans la trace qu'elle doit décrire sur le disque. Ensuite posant la pointe du compas à ce centre & d'un intervalle égal au demi-diametre apparent de la Lune, on décrira le cercle *AFL* : enfin du centre *S* & de l'intervalle *SB* égal au demi-diametre du Soleil, on décrira le cercle *EBF* qui rencontrera le cer-

cle *EFL* en *E* & *F*. Or l'espace *EBFA* compris entre ces deux cercles déterminera la quantité dont le Soleil doit paroître éclipsé à l'Observateur situé au point *S*. Car si l'on prolonge le demi-diametre *MA* de la Lune jusqu'à ce que *AD* qui passe par le centre *S* se trouve égale au demi-diametre du Soleil ou égale à *BS*, on aura la droite *MD* égale à la somme des demi-diametres apparens du Soleil & de la Lune, & partant égale au demi-diametre de la Pénombre : c'est pourquoi *SD* sera la distance du lieu donné à la circonférence de la Pénombre. Mais puisque *BS* est égale à *AD*, il faut par conséquent que *AB* soit égale à *SD*. Ainsi faisant *AN* égale au demi-diametre apparent du Soleil, ensorte que *MN* représente la différence des demi-diametres du Soleil & de la Lune ; il s'ensuit que puisqu'on a démontré que *DS* est à *DN* comme la quantité de l'Eclipse est au diametre apparent du Soleil ; l'on aura donc le même rapport entre *AB* & *DN*, *AB* étant égal à *DS* ; & par conséquent il faut conclurre que si *DN* représente le diametre du Soleil, *AB* pourra représenter exactement la partie qui est éclipsée à l'instant proposé.

Ceci doit encore nous conduire à déterminer la position des pointes des cornes par rapport à la ligne verticale : car si l'on tire le cercle verticale *TSG*, les arcs *GE*, *GF*, représenteront la vraie distance des pointes des cornes à l'extrémité supérieure du diametre vertical du Soleil.

Enfin si l'on veut sçavoir avec quelle viteſſe l'ombre de la Lune doit parcourir le disque de la Terre, il faut observer premierement que la route apparente de la Lune à l'égard du Soleil, est continuellement projettée sur le disque en une ligne droite égale & parallele, & que par conséquent la viteſſe du centre de l'ombre sur le disque, est égale à celle de la Lune sur la route qu'elle doit paroître

décrire à l'égard du Soleil. Or le mouvement apparent de la Lune à l'égard du Soleil eſt d'environ $30'\frac{1}{2}$ par heure; & partant l'eſpace que le centre de la Pénombre parcourt à chaque heure ſur le diſque terreſtre, eſt égal aux $30'\frac{1}{2}$ du mouvement obſervé dans l'orbe de la Lune. D'ailleurs la moyenne diſtance de la Lune à la Terre, ou le demi-diametre moyen de ſon orbe étant d'environ 60 demi-diametres terreſtres : il s'enſuit que 1′ de l'orbite de la Lune répond à 60′ de la ſurface de la Terre, c'eſt-à-dire à un degré d'un grand cercle, lequel ſelon nos meſures eſt de 25 lieues de France ou 69 milles d'Angleterre. D'où l'on tire à proportion un peu plus de 760 lieues ou 2104 milles d'Angleterre pour les $30'\frac{1}{2}$ déterminées ci-deſſus. Tel eſt l'eſpace que parcourt l'ombre ſur le diſque de la Terre à chaque heure. Mais quoique ce ſoit-là aſſez exactement la valeur de l'eſpace parcouru par l'ombre ſur le diſque terreſtre, néantmoins il ſe trouve que cet eſpace eſt en effet plus petit, ſoit pour un lieu particulier ſoit pour telle ville que ce ſoit ſituée ſur la ſurface du diſque : car pendant que l'ombre ſe meut de l'Occident vers l'Orient par ſon mouvement propre, tous les points du diſque ſe meuvent ſenſiblement à cauſe de la rotation de la Terre autour de ſon axe d'Occident en Orient ; & quoique ce dernier mouvement ſoit beaucoup plus lent que l'autre, il doit néantmoins détruire un peu la viteſſe de l'ombre.

CHAPITRE QUATORZIEME.

Où l'on expose la Méthode nouvelle de calculer les Eclipses du Soleil qui doivent être visibles pour un lieu donné.

APRE'S avoir traité d'une maniere générale les principaux Phénomenes des Eclipses du Soleil, après avoir, dis-je, expliqué de quelle maniere un Observateur placé dans la Lune pourroit parvenir à déterminer d'une maniere universelle l'entrée ou la sortie du disque terrestre dans l'ombre, comme aussi le tems du milieu de l'Eclipse; il reste à considérer desormais les autres cas particuliers qui nous regardent. Car le commencement ou la fin d'une Eclipse telle qu'on vient de la déterminer au Chapitre précédent ne peuvent convenir qu'à ceux qui se trouvent alors vers les bords ou vers la circonférence du disque apparent de la Terre; encore faut-il qu'ils se trouvent peu éloignés de la trace que décrit l'ombre sur le disque. Il n'y a donc qu'un très-petit nombre d'habitans qui pourroient observer les phases telles que nous les avons déja déterminées; car quant aux autres régions situées vers l'intérieur du disque, on n'y sçauroit encore voir l'Eclipse, quoique déja commencée ailleurs, & cela parce qu'il se passe un intervalle de tems assez considérable avant que la Pénombre y puisse parvenir. En effet le commencement de l'Eclipse pour chaque lieu particulier doit se faire, lorsque la Pénombre vient à le rencontrer, de même que la fin n'y sçauroit être apperçue qu'après que la Pénombre a traversé ce lieu, c'est-à-dire au moment qu'elle en sort. Il est donc évident que selon les diverses situations des lieux sur le disque, la durée de l'E-

Le commencement ou la fin d'une Eclipse calculée suivant la méthode générale ne sçauroit gueres être observé que d'un très-petit nombre d'habitans situés aux extrémités du disque apparent de la Terre.

Les tems qui doivent désigner le com-

mencement, la fin & la durée d'une Eclipse, sont différens selon les diverses régions situées sur le disque terrestre.

clipse sera plus ou moins grande, & qu'il en sera de même de la quantité dont le Soleil paroîtra éclipsé, puisque la grandeur apparente des phases dépend absolument de la distance du lieu à la trace de l'ombre sur le disque terrestre.

C'est pourquoi si l'on veut déterminer les phases d'une Eclipse pour un lieu particulier, on y pourra employer la Méthode nouvelle qui est exempte de ces calculs si compliqués & si pénibles, où l'on fait entrer les Parallaxes & dont on faisoit autrefois tant d'usage, sur-tout avant que d'avoir imaginé cette nouvelle voie plus abrégée. Je suppose donc que le demi-cercle *AEB* représente la moitié du disque terrestre qui est éclairé du Soleil, *E* le Pole de l'Ecliptique, *P* celui de l'Equateur, qu'on nomme autrement le Pole de la Terre. Il a été dit ci-devant que chaque point de la surface est emporté d'un instant à l'autre par le mouvement diurne, & qu'ainsi chaque point décrit en un jour un cercle parallele à l'Equateur. On a expliqué de plus comment tous les paralleles, hors les tems des Equinoxes, sont inclinés à l'égard du plan du disque : or il suit de là que leur projection étant des ellipses, elles représenteront la trace que chaque lieu paroîtra décrire, vu de la Lune, sur le plan du disque terrestre. Soit donc *F XII D* une portion d'ellipse qui représente le parallele d'un lieu donné, & sur la circonférence de laquelle sont déja projettés les cercles horaires, ou du moins les points où ces cercles horaires rencontrent le parallele. Je suppose aussi que ces points soient *VI*, *VII*, *VIII*, *IX*, *X*, *XI*, *XII*, *I*, *II*, *III*, *IV*, *V*, *VI*, & que le lieu proposé soit à six heures du matin au point *VI*; à 7^h en *VII*, à 8^h en *VIII*, à 9^h en *IX*, & ainsi de suite.

PLANCHE IV. *Fig. 9.*

Projection de tous les paralleles à l'Equateur en autant d'ellipses sur le disque terrestre.

Soit enfin *CT* une partie de la trace du centre de la Pénombre, laquelle se trouve, par exemple, à deux heures

au point 2, à trois heures en 3, à quatre heures en 4, & ainſi de ſuite : il eſt donc évident qu'à deux heures le lieu donné ſur le diſque ſe trouvera au point *II* de ſon parallele, & partant que ſa diſtance au centre de l'ombre ſera 2*II*. Si l'on veut rapporter cette diſtance à la trace que décrivent l'ombre ou la Pénombre, on abaiſſera du point *II* la perpendiculaire *IIL*, & la diſtance du lieu donné au centre de l'ombre conſidérée de cette maniere, ſera 2*L* ; de ſorte que le point *L* ſera le point correſpondant du lieu donné réduit à la trace de l'ombre ſur le diſque. Mais à trois heures le centre de l'ombre s'étant avancé au point 3, & le lieu du parallele juſqu'au point *III*, leur diſtance ſera 3*III*, elle ſera donc plus petite que n'étoit la précédente. A quatre heures le centre de l'ombre étant au point 4, & le lieu donné au point *IV* ſur ſon parallele, l'ombre ſe trouvera encore plus près du lieu donné qu'auparavant, & même il s'en faut alors bien peu que l'Eclipſe ne commence ; ou, ce qui eſt la même choſe, que la circonférence de la Pénombre ne rencontre le lieu donné ſur le diſque. A 5 heures le centre de l'ombre étant au point 5, & le lieu donné s'étant avancé au point *V* de ſon parallele, ce lieu ſera pour lors plongé plus avant dans la Pénombre ; c'eſt-à-dire, qu'il ſera encore plus près du centre de l'ombre que dans les trois cas précédens. Mais enfin à ſix heures, le centre de l'ombre s'étant avancé juſqu'en 6, c'eſt-à-dire, un peu plus à l'Orient que n'eſt le lieu donné, qui pour lors occupe le point *VI* de ſon parallele, le centre de l'ombre aura donc paſſé au-delà du lieu donné, de ſorte que l'inſtant auquel l'on aura remarqué la plus petite diſtance entre le centre de l'ombre & le lieu donné, ſeroit arrivé entre cinq ou ſix heures du ſoir ; car après cet inſtant la diſtance du lieu au centre de l'ombre doit devenir plus grande, juſqu'à ce qu'enfin la circonférence de la Pénombre venant à s'avancer ſur le lieu.

La poſition du lieu réduite à la trace de l'ombre.

donné & à le quitter, on y observe dans ce moment la véritable fin de l'Eclipse. Or il est tems que nous donnions ici la méthode de déterminer dans ces cas particuliers le commencement, le milieu, la fin & les autres phases des Eclipses ; mais il est nécessaire avant toutes choses de résoudre les deux Problemes suivans.

PROBLEME I.

Trouver sur le Disque de la Terre la situation d'un lieu quelconque, pour tel moment donné que l'on voudra.

Recherche du lieu que doit occuper une ville, ou un point quelconque sur le disque, dans un tems donné.

PLANCHE IV. *Fig.* 10. *Voyez aussi la Fig.* B.

Soit *AEB* le demi-cercle qui représente la moitié du disque terrestre exposé directement au Soleil, *AB* une partie de l'Ecliptique projettée sur le disque, & dont l'axe est *SE*, *E* le Pole de l'Ecliptique, *SP* la ligne droite qui représente la projection de l'axe de la Terre, & par conséquent *P* la projection du Pole du Monde. On fera comme le sinus total est au sinus de la latitude du lieu, ainsi *SP* est à *SH*, & le point *H** sera la projection du centre du parallele à l'Equateur, dont la circonférence doit passer par le lieu proposé. Pour trouver ce lieu on élevera par le point *H* perpendiculairement à *SP*, la droite *HG* égale au demi-diametre du parallele ou au sinus de la distance au Pole du lieu donné : cette ligne sera la moitié du grand axe de l'ellipse qui doit représenter la projection du parallele du lieu. Maintenant ** si l'on fait comme le sinus total

* Dans la Fig. A (Planche IV.) si l'on prend *PS*, *Sh* ou *SÆ* pour sinus total, la ligne *hs* ou son égale *HS* sera le sinus de la latitude mesurée par l'arc du Méridien *hÆ*.

** Selon ce qui a été démontré ci-dessus page 214 le sinus total est au cosinus de l'inclinaison du parallele, qui est la même chose que le sinus de l'élévation du Pole sur le plan du disque, comme *GH* est à *HL*. De plus, il est évident, si l'on fait attention aux termes de la 3e analogie, que si *HG* est le demi-diametre du parallele du lieu projetté sur le plan du disque ; c'est-à-dire, que si *HG* est le sinus d'un arc de 90°, ou de l'arc de 6 heures (qui est le quart de la circonférence du parallele), il doit s'ensuivre que *HQ* sera le sinus de l'angle du Cercle horaire & du Méridien. Ayant donc ainsi déterminé sur le diametre du parallele le point *Q* où tomberoit la perpendiculaire abbaissée du lieu proposé, il ne s'agit plus que de découvrir sur le plan de projection le point *R*, ou la distance *RQ*, à l'égard de ce lieu.

est

eſt au ſinus de l'élévation du Pole ſur le plan du diſque, ainſi GH eſt à HL, la ligne HL ſera la moitié du petit axe de l'ellipſe, qu'on pourra par conſéquent décrire ſi l'on veut. Prenant donc ſur GH la ligne HQ qui ait un même rapport à GH que celui du ſinus de l'angle du Cercle horaire & du Méridien au ſinus total, on élevera par le point Q la perpendiculaire QR ſur la ligne HG, & l'on ſera enſuite comme le ſinus total eſt au coſinus de l'angle que fait le Cercle horaire avec le Méridien, ainſi GH à un quatrieme Terme. On nommera D ce quatrieme Terme, & faiſant enfin comme le ſinus total eſt au ſinus de l'élévation du Pole ſur le plan du diſque, ainſi la quantité D eſt à une autre : cette derniere quantité déterminera QR, & le point R ſera ſur le diſque la ſituation du lieu qu'il s'agiſſoit de trouver pour le tems propoſé.

Autrement, en ne ſe ſervant que du Cercle horaire.

Soit AOB la moitié du diſque de la Terre éclairé du Soleil, P le Pole du Monde, SP le Méridien, qu'on a appellé univerſel, pour le diſtinguer des cercles horaires, & qui prolongé, rencontre au point G la circonférence du diſque, FPO la ſituation du cercle horaire pour un moment donné quelconque. Dans le Triangle ſphérique rectangle PGO, on a PG qui eſt la hauteur du Pole ſur le plan du diſque, & l'angle GPO que fait le Cercle ho- PLANCHE IV. *Fig.* 11.

Pour cet effet, ſoit pris ſur HL prolongée, Hg égale à HG, & du point H comme centre ſoit décrit l'arc de cercle Grg, lequel vaut un quart de la circonférence, puiſque l'angle GHg eſt droit. Soit encore élevé au point Q la perpendiculaire QRr, laquelle rencontre le cercle au point r & l'arc de l'ellipſe, qui repréſente le parallele du lieu donné, au point R. On voit d'abord que puiſque HQ eſt le ſinus de l'angle compris entre le Cercle horaire & le Méridien, Qr en ſera le coſinus ; la ligne Qr ſera donc le quatrieme terme, de l'avant derniere analogie, qu'on a nommé D : mais par la propriété ſi connue de l'ellipſe, on a $gH : HL :: Qr : QR$, ou bien $GH : HL :: Qr$ ou $D : QR$. Or les deux premiers termes de cette proportion, ou les deux demi-axes de l'ellipſe, ſont entr'eux (ſelon la ſeconde analogie) comme le ſinus total eſt au ſinus de l'élévation du Pole ſur le diſque ; il eſt donc vrai de dire que les lignes D ou Qr & QR ſeront dans le même rapport ; & partant, que le point R ſera la ſituation du lieu qu'on s'eſt propoſé de déterminer ſur le plan du diſque. *Voyez la fig. C de la Planche IV.*

PLANCHE IV. *Fig.* 11.

raire avec le Méridien ; l'on aura donc l'angle *GOP* qui ſera l'inclinaiſon du Cercle horaire ſur le plan du diſque, comme auſſi les deux arcs *PO*, *GO*, & partant on connoîtra le lieu du point *O* où le cercle horaire coupe la circonférence du diſque. Maintenant ſi l'on tire la droite *SO*, elle repréſentera la commune ſection des plans du cercle horaire & du diſque terreſtre. Soit donc *FP* la diſtance du lieu donné au Pole, ou le complément de la laritude du lieu : ſi l'on prend *SO* pour rayon, *SQ* ſera le ſinus d'un arc, dont le complément eſt *FO*, égal à la ſomme des deux arcs donnés *FP* & *PO*. Si l'on ſuppoſe auſſi que *D* * eſt égal au coſinus de l'arc dont le ſinus eſt *SQ*, on pourra élever à ce point *Q* la perpendiculaire *QR* ſur *OS*, enſorte qu'elle ſoit à *D* comme le coſinus de l'angle d'inclinaiſon du cercle horaire ſur le plan du diſque eſt au Rayon & le point *R* ſera le lieu, dont on demande la poſition ſur le diſque au tems propoſé. De la même maniere on trouvera pour tout autre inſtant d'autres poſitions du lieu ſur le diſque, leſquels ſe rencontreront tous dans la circonférence d'une ellipſe, qui ſera la vraie projection du Parallele. La démonſtration de ces méthodes eſt fondée ſur les loix de la Projection Orthographique.

PROBLEME II.

Trouver au tems d'une Eclipſe du Soleil la ſituation du centre de la Pénombre ſur le Diſque pour un moment donné quelconque.

PLANCHE IV. *Fig.* 9.

Soit comme ci-deſſus *AEB* la moitié du diſque de la Terre éclairé du Soleil, *SE* l'axe de l'Ecliptique, *CL* la trace du centre de la Pénombre décrite ſur le plan

* La propriété générale de l'ellipſe donne encore *D* eſt à *QR* comme la moitié du grand Axe *SO* eſt à la moitié du petit Axe, de l'ellipſe prolongée *OPF* ; mais il eſt ** évident que les deux demi-Axes ſont entr'eux comme le ſinus total eſt au coſinus de l'angle d'inclinaiſon du Cercle horaire ſur le plan. Donc, &c.

** *Voyez ce qui a été démontré page* 214.

du disque, & qui rencontre l'axe de l'Ecliptique au point *N*: il est évident que lorsque le centre de la Pénombre est en *N*, on doit alors observer le vrai moment de la conjonction de la Lune & du Soleil: or comme ce tems est donné par les Tables Astronomiques aussi-bien que le mouvement horaire de la Lune au Soleil, on fera comme la Parallaxe horisontale, est au mouvement horaire de la Lune à l'égard du Soleil, ainsi le demi-diametre du disque, à un quatrieme terme qui sera *M*, & cette ligne *M* sera l'espace que le centre de l'ombre doit parcourir sur le disque en une heure. On fera aussi comme l'intervalle qui répond à une heure, est à l'intervalle de tems qui s'écoule entre le moment véritable de la conjonction & celui pour lequel on cherche la situation du centre de l'ombre sur le disque, ainsi la ligne *M* trouvée ci-dessus, est à une autre. Ce quatrieme terme fera connoître, pour l'instant proposé, la distance du centre de la Pénombre (mesurée sur la trace qu'elle parcourt) au point *N* de la vraie conjonction. De cette maniere la position du centre de l'ombre sera toujours facile à déterminer pour un tems donné. Supposons que le tems proposé précede immédiatement la vraie conjonction & soit, par exemple, quatre heures du soir: on fera, comme l'intervalle d'une heure est à l'intervalle de tems écoulé entre quatre heures du soir & le moment de la vraie conjonction, ainsi la quantité *M* est à un quatrieme terme *N* 4, & le point 4 sera le vrai lieu du centre de l'ombre sur le disque à quatre heures du soir. Il faut prendre maintenant les lignes ou intervalles 4-3, 3-2 & 4-5, 5-6, chacune égales à la ligne *M*, & l'on déterminera ainsi les points 2, 3, 4, 5, 6, qui désignent le lieu qu'occupera le centre de la Pénombre aux heures qui s'y rapportent.

Présentement que nous avons construit les deux Pro-

Calcul du commencement de l'Eclipse pour un lieu déterminé.

PLANCHE IV. *Fig.* 12.

blemes précédens, soit *AEB* la moitié du disque terrestre, *CT* la trace de l'ombre sur le plan du disque & qui rencontre l'axe de l'Ecliptique au point *N*, c'est-à-dire, dans le lieu que doit occuper l'ombre au moment de la vraie conjonction de la Lune & du Soleil. Supposant d'ailleurs que le tems donné qui précede celui de la conjonction, soit deux heures du soir & que l'on ait marqué sur la trace de l'ombre tous les lieux où son centre doit se trouver à 1, 2, 3, 4, & 5 heures, comme aussi la situation du lieu donné sur son parallele aux mêmes heures *I*, *II*, *III*, *IV*, & *V*: il est évident qu'à une heure la distance de l'ombre à l'égard du lieu proposé sera *1I*: c'est pourquoi si l'on applique cette distance sur une échelle de parties égales pour connoître sa valeur en nombres, & que l'on en ôte le demi-diametre de la Pénombre, l'on aura par le moyen de la même échelle la distance du lieu donné à la circonférence de la Pénombre: de même si l'on prend encore à deux heures la distance du lieu donné, qui pour lors est en *II*, à la circonférence de la Pénombre, la différence de ces deux distances (car on suppose, par exemple, que dans ces deux cas la Pénombre est plus occidentale que le lieu donné) sera le progrès apparent ou le mouvement horaire de la Pénombre à l'égard du lieu proposé. On fera donc comme le mouvement horaire de la Pénombre qu'on vient de trouver est à la distance du lieu donné à la circonférence de la Pénombre à deux heures, ainsi une heure ou 60 minutes à un quatrieme Terme: ce quatrieme Terme sera ce qu'il faut ajouter au tems donné, sçavoir à deux heures du soir, pour avoir le vrai tems auquel la circonférence de la Pénombre rencontrera le lieu proposé; ce qui donnera par conséquent le commencement de l'Eclipse.

Calcul de l'instant auquel arrive la

Si l'on abbaisse présentement du lieu proposé *II* la perpendiculaire *IIa* sur la trace de l'ombre, il est clair que

quand le centre de l'ombre ſera parvenu au point 2, la diſtance Réduite du lieu donné au centre de l'ombre ſera 2 *a*: ſemblablement à trois heures du ſoir le lieu propoſé s'étant avancé juſqu'en *III*, & ayant abbaiſſé une autre perpendiculaire *III b* ſur la trace de l'ombre, la diſtance réduite du lieu donné au centre de l'ombre ſera 3 *b*. Or il eſt clair que la différence de ces deux diſtances réduites, donne le mouvement horaire de l'ombre à l'égard du lieu Réduit, & que cette différence ſe peut connoître par le moyen de l'échelle. On fera donc comme le mouvement horaire de l'ombre à l'égard du lieu réduit, eſt à la diſtance de ce lieu au centre de l'ombre à 3 heures du ſoir, ainſi une heure ou 60 minutes à un quatrieme Terme; ce dernier Terme donnera le tems qu'il faut ajouter à trois heures pour avoir le milieu de l'Eclipſe, ou le tems qui doit répondre à très-peu-près au moment de la plus grande obſcurité.

plus grande quantité de l'Eclipſe.

Maintenant je ſuppoſe qu'à Quatre heures le centre de l'ombre ſe ſoit avancé juſqu'en 4 & le lieu propoſé juſqu'au point *IV* de ſon parallele: meſurant cette diſtance ſur une échelle, & prenant ſa différence au demi-diametre de la Pénombre, puiſque dans le cas préſent, c'eſt cette diſtance qui ſe trouve la plus petite, l'on aura la diſtance du lieu donné au bord occidental de la Pénombre; ce qui fera connoître la quantité dont ce bord eſt plus à l'occident que le lieu propoſé. Enſuite à cinq heures l'ombre s'étant avancée juſqu'en 5 & le lieu donné juſqu'en *V*, leurs diſtances 5 *V* eſt alors plus grande que le demi-diametre de la Pénombre, & le bord occidental de la Pénombre ſe trouve plus vers l'Orient que le lieu donné. C'eſt pourquoi la Pénombre aura paſſé au-delà de ce lieu, & l'on aura dû y appercevoir la fin de l'Eclipſe. Donc ſi de la diſtance 5 *V* on ôte le demi-diametre de la Pénombre, le reſte ſera la diſtance occidentale du bord de la Pénombre au lieu

Calcul de l'heure à laquelle doit arriver la fin de l'Eclipſe.

donné. Or puiſque dans le premier cas ce bord étoit plus occidental que le lieu, & que dans l'autre il eſt plus oriental, la ſomme des deux diſtances qu'on vient de trouver, ſera le mouvement relatif de l'ombre par rapport au lieu propoſé dans l'eſpace d'une heure ou 60 minutes. On fera donc, comme cette même ſomme eſt à la diſtance du bord occidental de la Pénombre au lieu propoſé à 4 heures du ſoir, ainſi l'intervalle de tems qui répond à une heure ou 60 minutes, eſt à un quatrieme Terme : ce quatrieme Terme étant ajouté à quatre heures du ſoir, donnera le vrai moment auquel le bord occidental de la Pénombre doit quitter le lieu propoſé, c'eſt-à-dire, l'heure de la fin de l'Eclipſe.

Autre détermination encore plus exacte.

Si l'on propoſoit de déterminer le commencement, la fin, & les autres phaſes de l'Eclipſe avec une plus grande préciſion, alors au lieu des deux heures que l'on a choiſies, par exemple, avant la conjonction, on pourroit prendre des intervalles encore plus petits, comme d'une demi-heure ou d'un quart-d'heure &c immédiatement avant la conjonction; & dans ce cas il faudroit déterminer le mouvement de l'ombre relativement au lieu propoſé dans l'eſpace d'une demi-heure ou d'un quart-d'heure, &c. Car ce mouvement n'étant pas égal ni uniforme, moins il s'écoulera de tems dans les intervalles que l'on a choiſis pour ce calcul, moins il y aura d'erreur ſenſible, parce que l'erreur ne ſçauroit gueres influer qu'à proportion du tems qui s'écoule, ſur-tout ſi ce mouvement relatif croît ou diminue ſuivant une aſſez grande progreſſion.

Car il eſt bien certain que le mouvement de l'ombre ſur la trace qu'elle décrit n'eſt pas tout-à-fait uniforme: mais du moins pourroit-on, ſans commettre une erreur bien conſidérable, le ſuppoſer tel dans un auſſi petit intervalle de tems qu'eſt celui des Eclipſes. Il n'en eſt pas de même à l'égard du lieu propoſé ſur le diſque de la Terre: ſon

mouvement eſt fort rallenti proche des bords & très-rapide vers le milieu du diſque. Or l'on vient de ſuppoſer dans le calcul précédent que le mouvement relatif de l'ombre à l'égard du lieu étoit conſtamment égal & uniforme, & que le milieu de l'Eclipſe ou la plus grande proximité du centre de l'ombre & du lieu propoſé, arrivoit quand la ligne qui les joint tombe perpendiculairement ſur la trace que décrit l'ombre. Mais parce que ni l'une ni l'autre de ces deux ſuppoſitions n'eſt exactement vraie, il en doit réſulter quelque erreur dont il faut tenir compte : voici donc de quelle maniere on peut découvrir cette erreur & en faire la correction dans tous les cas où l'on le jugera néceſſaire. On calculera d'abord le vrai lieu du centre de l'ombre pour le moment auquel l'Eclipſe commence, & qu'on ſuppoſe déja déterminé par la premiere Méthode. On cherchera auſſi pour le même inſtant la ſituation du lieu propoſé ſur le diſque. Enſuite on décrira du centre de l'ombre le cercle où ſe termine la Pénombre ; & ſi la circonférence de ce cercle paſſe par le lieu propoſé, alors le vrai commencement de l'Eclipſe ſera préciſément le même que par le premier calcul. Mais s'il y a quelque différence notable, on prendra en ce cas la diſtance du lieu donné à la circonférence de la Pénombre. Enſuite on fera une regle de proportion comme ci-deſſus, en y employant le mouvement relatif de l'ombre à l'égard du lieu qui répond à un petit intervalle de tems tel qu'une demi-heure, par exemple, & l'on aura par ce moyen le véritable commencement de l'Eclipſe. Semblablement on corrigera l'erreur, s'il y en a, qui s'eſt gliſſée dans la premiere recherche que l'on aura faite du moment auquel arrive la fin de l'Eclipſe. Au reſte par cette nouvelle Méthode de calculer les Eclipſes de Soleil, on peut déterminer au moins auſſi exactement les phaſes que par la Méthode des Anciens,

Moyens de corriger les grandes erreurs preſqu'inévitables dans la premiere forme de calcul.

où le calcul se faisoit en y employant les Parallaxes. Car on suppose même dans l'ancienne Méthode que le mouvement apparent de la Lune est égal & uniforme pendant un certain intervalle de tems, ce qui n'est pas plus exact que de supposer sur le disque un mouvement uniforme de la part du lieu proposé. En effet le mouvement apparent de la Lune n'est-il pas sujet à diverses inégalités causées par la Parallaxe, laquelle augmente ou diminue, comme l'on sçait, presque à chaque instant?

La plus grande quantité de l'Eclipse déterminée.

Si après avoir déterminé le lieu de l'ombre pour le tems qui répond au milieu de l'Eclipse, on décrit de ce point comme centre un cercle dont le diametre soit égal au diametre de la Lune; & de même, que du lieu proposé comme centre, on décrive encore un autre cercle qui ait un diametre égal à celui du Soleil, l'espace compris entre les deux intersections de ces cercles déterminera la plus grande quantité de l'Eclipse.

Mais parce que cette Méthode de mesurer les lignes & les distances par le moyen d'une échelle ne paroîtra peut-être pas suffisante à ceux qui voudroient parvenir à une bien plus grande précision, on peut y suppléer en employant au lieu du compas & de l'échelle, le calcul trigonométrique, & conservant néantmoins les mêmes principes que ci-dessus. On y procédera suivant la maniere que nous allons enseigner.

Maniere de calculer trigonométriquement les distances entre l'ombre & le lieu donné.

Soit, comme ci-devant, *AEB* la moitié du disque de la Terre, *P* le Pole de l'Equateur, *CNT* la route ou la trace du centre de l'ombre sur le disque: le point 2 la place de l'ombre pour un tems donné, & au même instant *II* un lieu quelconque sous un parallele proposé. Soit aussi *SE* l'axe de l'Ecliptique qui coupe la trace de l'ombre au point *N*, il est certain que *SN* sera la latitude de la Lune au tems de la vraie conjonction. C'est pourquoi si du centre de l'ombre & du lieu proposé, on tire au centre du

PLANCHE V. *Fig.* 1.

disque


Fig. 1
Fig. 2.
Fig. 3
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig 6
Fig. 7.
Fig 8
Fig 9
Fig 10.
Fig 11
Fig. A
Fig. B.
Fig. C.
Fig. 12.
Occident
Orient

diſque les lignes droites $2S$, IIS, & qu'on joigne auſſi par une ligne droite les points 2, II, dans le Triangle rectiligne $2NS$, on connoît NS qui eſt la latitude de la Lune, & $2N$ qui eſt la diſtance meſurée (ſur ſa propre route) du centre de l'ombre au point de la conjonction: de plus l'angle $2NS$ eſt l'inclinaiſon de la route ou de la trace apparente de la Lune avec le cercle de latitude. On aura donc par la Trigonométrie le côté $2S$ auſſi-bien que l'angle $2SN$. Enſuite dans le Triangle ſphérique $PSII$ on connoît PS qui eſt le complément de la déclinaiſon du Soleil, & PII qui eſt le complément de la latitude du lieu, on connoît encore $SPII$ qui eſt l'angle du cercle horaire & du Méridien. On aura donc l'arc SII, qui eſt la diſtance du Soleil au zénith, dont le ſinus ſera égal à la diſtance SII, en prenant SE pour rayon. Il eſt encore aiſé de concevoir que la réſolution du même Triangle fera connoître l'angle $PSII$, lequel ajouté ou retranché de l'angle connu PSE, fera connoître l'angle $NSII$: or ce dernier étant ajouté à l'angle $2SN$ dont on a trouvé la valeur ci-deſſus, la ſomme ſera l'angle total $2SII$. Enfin dans le Triangle rectiligne $2SII$ on a $2S$, IIS, & l'angle compris $2SII$, on trouvera donc par la Trigonométrie rectiligne la diſtance $2II$ que l'on cherchoit. On voit d'ailleurs que pour calculer par cette Méthode, il n'eſt pas néceſſaire de connoître d'abord la ſituation de l'ombre ni du lieu donné à l'égard du diſque, puiſque l'on y pourroit parvenir uniquement par le calcul.

Ceci nous fournit encore une autre Méthode de trouver la ſituation d'un lieu ſur le diſque pour un tems donné quelconque, puiſqu'en réſolvant le Triangle $PSII$, on connoîtra l'angle PSH & la diſtance SII.

Les Eclipſes du Soleil ne ſont pas moins propres que les Eclipſes de Lune à faire découvrir les longitudes ſur terre. Il ſuffit pour cette recherche qu'on ait obſervé dans

Les Eclipſes du Soleil ſervent encore à déterminer les longitudes ſur Terre.

PLANCHE IV. *Fig.* 12.

chaque lieu dont on cherche la longitude, le commencement ou la fin d'une même Eclipse. Je suppose, par exemple, qu'à 5 heures du soir on ait observé l'une de ces deux phases : il faudra décrire du point *V* qu'occupe en ce moment le lieu donné sur le disque, & d'un intervalle égal au demi-diametre de la Pénombre, deux arcs de cercles qui coupent de part & d'autre la trace que l'ombre décrit sur le disque. Soit donc l'un des points où se fait la section en *d* : ce sera le lieu qu'occupe le centre de l'ombre au commencement ou à la fin de l'Eclipse observée : c'est pourquoi l'on mesurera par le moyen de l'échelle la distance *Nd*, qui étant connue par ce moyen aussi-bien que le mouvement horaire de la Lune au Soleil, l'on aura par conséquent le tems vrai de la conjonction relativement au Méridien du lieu. Ensuite si dans tout autre lieu quelconque on a observé le commencement ou la fin de l'Eclipse, on aura de la même maniere le vrai moment de conjonction relativement au Méridien de ce lieu : or la différence de ces deux tems réduite en parties de l'Equateur, donnera la différence en longitude que l'on cherche entre les deux lieux proposés.

Dans la pratique ordinaire il est à propos de donner au moins dix pouces au demi-diametre du disque, & ce nombre est d'autant plus commode qu'on peut avoir une échelle de cette longueur divisée en mille parties par des transversales. Ce dernier nombre peut être aussi pris pour celui qui répond au rayon des Tables, ensorte que la latitude de la Lune & toutes les autres lignes dont on veut connoître les dimensions seront exprimées relativement aux mêmes parties. Car si l'on fait, par exemple, comme la Parallaxe horisontale de la Lune réduite en secondes, est à la latitude de la Lune, ainsi 1000 est à un quatrieme Terme ; & qu'on prenne sur l'échelle l'intervalle *SN* égal à ce quatrieme Terme connu, cette ligne représentera la

latitude de la Lune sur le disque, & observant la même regle dans la recherche des autres lignes, on en déterminera la vraie longueur relativement au demi-diametre du disque.

Nous avons enfin expliqué assez au long la nouvelle Méthode de déterminer pour un lieu donné quelconque, le commencement, la fin & les autres phases des Eclipses du Soleil. Nous y sommes parvenus sans avoir besoin de ces calculs si pénibles & si embarrassans où l'on fait entrer les Parallaxes, pour en déduire le lieu apparent de la Lune dans le Ciel à l'égard d'un lieu proposé, ou qui servent à trouver pour chaque instant le lieu visible de cet Astre. Or quoique plusieurs Astronomes se servent encore de l'ancienne Méthode, il semble néantmoins qu'indépendamment de diverses autres considérations, ils sont toujours comme obligés de reconnoître que cette derniere est beaucoup plus facile & pour le moins aussi exacte que celle qu'ils ont employé jusqu'à ce jour. Effectivement en se servant de l'ancienne Méthode, il est certain que les différentes situations de l'Ecliptique qui varie à chaque instant à l'égard de l'horison, produisent dans les mouvemens apparens de la Lune considérés tant en longitude qu'en latitude, une inégalité assez considérable, eu égard à son vrai mouvement; de plus les Parallaxes de la Lune changent, comme l'on sçait, à mesure que cet Astre s'éleve ou s'abbaisse sur l'horison, de sorte que si l'on n'y fait attention presqu'à chaque instant, on risque de tomber dans des erreurs assez considérables.

Mais si l'on veut essayer néantmoins de pratiquer l'ancienne Méthode de calculer les Eclipses par les Parallaxes, puisqu'elle est même encore en usage parmi les Astronomes, nous allons tâcher de l'expliquer le plus succinctement qu'il sera possible. Pour cet effet nous supposerons d'abord que l'on se soit mis un peu au fait des différentes especes de Parallaxes; ce que l'on apprendra, si l'on

veut plus en détail, soit en lisant ce qui en a été dit dans presque tous les Livres d'Astronomie, soit dans le Traité particulier que nous donnerons au vingt-deuxieme Chapitre de cet Ouvrage. Or quand on sçait une fois distinguer ces Parallaxes, il ne reste pas grande difficulté pour bien entendre les principes sur lesquels est fondée l'ancienne Méthode de calculer les Eclipses.

La conjonction véritable de la Lune au Soleil differe souvent très-sensiblement de la conjonction apparente.

Il faut déterminer en premier lieu en se servant des Tables Astronomiques, la conjonction apparente & la trace visible de la Lune dans le Ciel; car il y a presque toujours une différence considérable entre la vraie conjonction & la conjonction apparente: elles peuvent se faire à notre égard dans des tems bien différens. Si l'on veut sçavoir la raison pourquoi ces deux conjonctions different entre elles, c'est que le lieu de la Lune que nous observons dans le Ciel n'est presque jamais le même que son lieu vrai, ou que le lieu de la Lune vu du centre de la Terre. Nous rendrons peut-être ceci encore plus évident par la figure suivante. Soit un demi-cercle *CAB* qui représente l'hémisphere terrestre, *T* le centre de la Terre, d'où tirant une ligne droite *TL* au centre de la Lune *L*, cette même ligne prolongée parvienne au centre du Soleil & se termine en *S*. Puisque dans ce moment les centres du Soleil & de la Lune sont vus du centre de la Terre, dans une même ligne droite; l'œil qui seroit placé à ce centre doit les rapporter au même point du Ciel, & appercevoir ainsi l'instant de leur vraie conjonction. Mais un autre Observateur qui se trouveroit dans le même-tems au point *A* de la surface de la Terre, rapportera les centres du Soleil & de la Lune à différens points du Ciel: leur distance apparente dans le Ciel sera l'arc *SE* qui en est à peu près la mesure. Or le point *S* du Ciel où va se terminer la droite *TL* qui passe par les centres de la Lune & du Soleil, se nomme le véritable lieu de la Lune, au lieu que le point

PLANCHE V. *Fig.* 2.

E du Ciel où va se terminer la droite *AL* qui passe par les points *A* & *L*, se nomme le lieu apparent de la Lune. Ainsi ces deux points *S* & *E* sont comme l'on voit très-différens, & l'arc *SE* qui en mesure la distance, ou ce qui est la même chose, qui donne la différence entre le lieu vrai & le lieu apparent de la Lune, est ce que l'on nomme la Parallaxe. D'ailleurs en comparaison de la distance presqu'immense du Ciel étoilé où ces lignes se terminent, l'intervalle *TL* qui est compris entre les centres de la Lune & la Terre, se réduit à rien, ou du moins ne sçauroit être plus sensible, & partant l'arc *SE* sera précisément de même grandeur, soit que l'œil se trouve en *T*, soit qu'il se trouve en *L*; d'où il suit que l'arc *SE* peut bien passer pour la mesure exacte de l'angle *SLE* ou de son opposé au sommet *ALT*. Mais parce que l'angle *ALT* est celui sous lequel l'on verroit du centre de la Lune le demi-diametre de la Terre *AT*, on peut donc conclurre que la Parallaxe de la Lune est toujours égale à l'angle sous lequel on verroit du centre de cet Astre le demi-diametre de la Terre. On doit remarquer ici que cet angle est le plus grand qu'il est possible lorsque de l'Astre on apperçoit directement le rayon de la Terre qui se termine au lieu proposé, c'est-à-dire, lorsque l'angle *LAT* est droit, & que par conséquent la Lune est à l'horison; ce qui prouve, comme l'on voit, que de toutes les Parallaxes que nous observons, la Parallaxe horisontale est la plus grande: au contraire si la Lune s'élevoit jusqu'au zénith en *F*, l'angle *ALT* se réduiroit à rien, ou seroit totalement détruit; de sorte que le lieu vrai & le lieu apparent de la Lune, seroient précisément les mêmes dans le Ciel: mais ce cas est unique, & il ne peut jamais y avoir que cette seule situation où la Parallaxe soit anéantie.

Puisque la Parallaxe d'un Astre est toujours égale, comme nous venons de le démontrer, à l'angle sous le-

La Parallaxe du Soleil est insensible.

quel on verroit du centre de cet Aſtre le demi-diametre de la Terre, il s'enſuit que le Soleil ne doit avoir aucune Parallaxe ſenſible: car comme nous l'avons répété tant de fois, la Terre vue du Soleil ne doit paroître que comme un point imperceptible, & par conſéquent elle ne ſçauroit être vue ſous aucun angle ſenſible. Mais quant à la Parallaxe de la Lune, il arrive le plus ſouvent, quand cet Aſtre eſt à l'horiſon, que ſa Parallaxe ſurpaſſe un degré, ſurtout lorſque la Lune eſt Périgée ou dans ſa plus petite diſtance au centre de la Terre.

Il ſuit encore de ce que nous venons d'expliquer ci-deſſus que les Parallaxes de la Lune ſoit horiſontales, ſoit de hauteurs, font toujours paroître ſon lieu moins élevé, c'eſt-à-dire à une plus grande diſtance du zénith, qu'on ne l'obſerveroit en effet du centre de la Terre. Mais le changement apparent dans la hauteur de la Lune influe en même-tems ſur ſa longitude & ſa latitude; car la Parallaxe abbaiſſant le centre de cet Aſtre, & par conſéquent faiſant varier ſon vrai lieu à l'égard de l'Ecliptique, il faut de néceſſité que la longitude & latitude apparente du centre de la Lune different auſſi plus ou moins à chaque inſtant, de la véritable.

PLANCHE V. *Fig.* 3. Soit, par exemple, le cercle *HCZ* le Méridien, c'eſt-à-dire, un cercle qui paſſe par le zénith & par les Poles du monde, *Z* le zénith, *HED* l'horiſon du lieu propoſé, *CE* l'Ecliptique où ſe trouve pour un inſtant donné le centre de la Lune ſans aucune latitude, en ſorte que ſon vrai lieu ſoit en *L*. Suppoſons auſſi un cercle vertical *ZT* qui paſſe par le centre de la Lune, comme il eſt certain que la Parallaxe abbaiſſe la Lune dans le cercle vertical ou de hauteur, ſon lieu apparent ſera donc plus éloigné du zénith que ſon lieu vrai. Soit le lieu apparent *o* & par conſéquent la Parallaxe de hauteur exprimée par *L o*. Il faut ſuppoſer maintenant un cercle *om* perpendiculaire

à l'Ecliptique, qui partant du lieu apparent de la Lune o, soit terminé sur l'Ecliptique en m: ce point m sera le lieu apparent de la Lune réduit à l'Ecliptique, & l'arc $L\,m$ sera la Parallaxe de la Lune en longitude, c'est-à-dire, la distance entre le lieu vrai & le lieu apparent réduite à l'Ecliptique: enfin l'arc $o\,m$ qui mesure la distance du centre de la Lune à l'Ecliptique, sera dans ce cas la Parallaxe en latitude.

La Parallaxe de longitude.

La Parallaxe de latitude.

C'est pourquoi lorsqu'on voudra déterminer par le moyen des Parallaxes le tems des principales phases d'une Eclipse de Soleil pour un lieu donné, il faudra chercher pour le tems proposé en se servant des Tables Astronomiques, les vrais lieux de la Lune & du Soleil; ensuite on réduira le lieu vrai de la Lune à son lieu apparent dans le Ciel, ce qui se doit pratiquer en calculant les Parallaxes qui conviennent à chaque instant au lieu vrai, & les appliquant ensuite à la longitude & à la latitude de la Lune; ce qui étant une fois connu, voici la Méthode de déterminer le tems du commencement & de la fin, comme aussi la quantité des phases de l'Eclipse.

Soit $p\,k$ une partie de l'Ecliptique, s le lieu du Soleil au moment de la vraie conjonction, l le lieu apparent de la Lune réduit à l'Ecliptique pour le même instant, $l\,o$ la latitude apparente de la Lune, $l\,s$ sa longitude apparente à l'égard du Soleil. Il faut aussi connoître, peu de tems avant la vraie conjonction, le lieu apparent p de la Lune réduit à l'Ecliptique & sa latitude apparente $p\,q$: ensuite on tirera la ligne $q\,o$, qui prolongée, rencontrera l'Ecliptique au point k, & la ligne $q\,k$ sera la route apparente de la Lune à l'égard du Soleil. Présentement dans le Triangle rectangle $q\,n\,o$, on a $o\,n$ qui est la différence des deux longitudes apparentes de la Lune à l'égard du Soleil, on connoît aussi $q\,n$ différence en latitude correspondante. On aura donc par la Trigonométrie rectiligne

PLANCHE V. Fig. 4.

l'angle *q o n* ou *q k p* qui eſt l'inclinaiſon de la route apparente de la Lune à l'égard de l'Ecliptique. Et parce que l'on peut avoir en même tems la valeur du côté *q o*, on conclurra par ce moyen celle des lignes *o t*, *t k* & *s k*; car *p l* eſt à *q o* comme *l s* eſt à *o t*: & dans le Triangle rectangle *o l k*, puiſque l'on connoît *o l* & l'angle *k*, on aura par conſéquent la valeur de *o k* & *l k*; & partant auſſi celle des lignes *t k*, *s k* & *s t*. Or lorſque le centre de la Lune ſera parvenu en *t*, l'on obſervera dans cet inſtant la conjonction apparente de la Lune au Soleil: c'eſt pourquoi ſi l'on fait comme *q o* eſt à *o t*, ou bien comme *p l* eſt à *l s*, ainſi le tems que la Lune emploie à parcourir la ligne *o q* eſt à un quatrieme terme. Ce quatrieme terme ſera le tems écoulé entre la conjonction vraie & l'apparente. Abbaiſſant donc du point *s*, ſur la route apparente de la Lune, la perpendiculaire *s m*, dans le Triangle rectangle *s k m*, on connoît le côté *s k* & l'angle *k*, on connoîtra donc *s m* qui eſt la plus petite diſtance viſible des centres du Soleil & de la Lune. Si cette diſtance eſt plus grande que la ſomme des demi-diametres du Soleil & de la Lune, il eſt certain qu'il n'y aura pour cette fois aucune Eclipſe: mais ſi cette diſtance eſt plus petite, on en prendra la différence, qui étant réduite en doigts, à raiſon de 12 pour le Diametre du Soleil, donnera la plus grande quantité de l'Eclipſe pour le lieu propoſé. De même étant donné le côté *s m* & l'angle *t s m* qui eſt égal à l'angle *k*, on aura dans le Triangle rectangle *t m s* le côté *t m*; ce qui fera connoître le tems que la Lune emploie à parcourir la partie *t m* de ſa route apparente, c'eſt-à-dire, le tems qui doit s'écouler entre la conjonction apparente de la Lune au Soleil & le moment qui répond à la plus grande quantité de l'Eclipſe.

Mais voici enfin de quelle maniere on découvrira l'heure

l'heure à laquelle l'Eclipſe doit paroître commencer. Soit, comme ci-devant, pk une partie de l'Ecliptique, s le centre du Soleil, qk la route apparente de la Lune, sm la plus petite diſtance apparente des centres de la Lune & du Soleil : on tirera du centre du Soleil à la route apparente de la Lune, la droite sq, en ſorte qu'elle ſoit préciſément égale à la ſomme des demi-diametres apparens de la Lune & du Soleil. Or il eſt évident que lorſque le centre de la Lune ſera en q, ſon bord commencera à entamer le diſque apparent du Soleil, ce qui donnera par conſéquent le commencement de l'Eclipſe. Mais dans le Triangle rectangle qsm étant donnés, qs & sm, on aura par conſéquent l'angle d'incidence qsm, comme auſſi la valeur du côté qm ; on aura donc par ce moyen le tems que la Lune emploie à parcourir l'eſpace qm de ſa route apparente, qui étant enfin retranché du tems de la plus grande obſcurité, donnera l'heure vraie du commencement de l'Eclipſe. PLANCHE V. *Fig.* 5.

On trouvera de la même maniere le tems de la fin de l'Eclipſe. Mais il faut faire attention qu'il eſt néceſſaire de trouver auparavant la route apparente de la Lune, qui n'eſt plus la même, après la conjonction, que celle que l'on a employée pour déterminer le commencement de l'Eclipſe, ou les autres phaſes qui l'ont ſuivie. Car il eſt certain que l'inclinaiſon apparente de la route de la Lune à l'égard du Soleil, change à chaque inſtant, à cauſe de la Parallaxe qui varie continuellement, ſur-tout lorſque la hauteur de la Lune ne demeure plus la même, & que cet Aſtre monte ou deſcend ſur notre horiſon. Il faut donc chercher au moins dans l'eſpace d'une heure, ou, pour plus grande exactitude, dans de plus petits intervalles de tems immédiatement après la conjonction, la longitude apparente de la Lune à l'égard du Soleil, comme auſſi ſa latitude apparente, & de cette maniere

l'on trouvera l'inclinaiſon apparente de la Lune à l'égard de l'Ecliptique, & le mouvement de la Lune à l'égard du Soleil : ce qui étant enfin connu, il ſera facile de trouver la fin de l'Eclipſe en faiſant les mêmes opérations que nous avons indiquées ci-deſſus, pour trouver le commencement de l'Eclipſe.

Si l'on demande auſſi quelle eſt la phaſe de l'Eclipſe qui doit répondre à un certain tems propoſé, on cherchera pour cet inſtant le lieu de la Lune dans ſa route apparente, & de ce point comme centre & d'un intervalle égal au demi-diametre de la Lune, l'on décrira la circonférence d'un cercle : ſemblablement du lieu du Soleil comme centre, on décrira un autre cercle dont le rayon doit être égal au demi-diametre du Soleil, & l'interſection de ces deux cercles déterminera la phaſe de l'Eclipſe, ou la quantité dont le Soleil eſt éclipſé auſſi-bien que l'inclinaiſon des pointes des cornes qui répondent au tems propoſé.

Avant que de finir ce chapitre des Eclipſes du Soleil & de la Lune, il ne ſera pas inutile de faire quelques remarques au ſujet d'un Phénomene aſſez ſingulier, & dont il eſt facile d'expliquer la véritable cauſe.

Dans les Eclipſes totales de Lune, même dans celles qu'on nomme centrales (parce que le centre de la Lune paſſe exactement au centre de l'ombre) on s'apperçoit preſque toujours que cet Aſtre eſt éclairé d'une lumiere, très-foible à la vérité, mais du moins aſſez vive pour que l'on ne puiſſe pas perdre de vue la Lune pendant tout le tems de ſon immerſion dans l'ombre. Or il doit d'abord paroître ſurprenant que la Lune ait cette lumiere : auſſi quelques-uns pour expliquer cette apparence, ont-ils prétendu que cette lumiere étoit propre ou particuliere à la Lune même, ou bien que c'étoit la lumiere des Planetes & des Etoiles fixes qui ſe trouvoit réfléchie par

la Lune. On voit par-là qu'ils ont imaginé ces deux causes ; parce qu'ils étoient obligés de reconnoître que le corps opaque de la Terre qui se trouve dans la ligne droite entre la Lune & le Soleil, arrêtoit entierement tous les rayons du Soleil, & que par conséquent tout ce qui se trouve dans le cone d'ombre devoit être plongé dans une obscurité profonde. Mais il est inutile de nous arrêter à réfuter ces deux opinions. La vraie cause de ce phénomene a été découverte peu de tems après que l'on a connu les Réfractions Astronomiques. La Terre étant environnée de l'air ou d'une athmosphere sphérique qui est fort épaisse, & qui a une puissance réfractive, cette Athmosphere brise continuellement ou détourne de leur vraie direction les rayons du Soleil ; car tous les rayons y sont rompus, dès qu'ils y entrent obliquement, & qu'ils passent d'un milieu plus rare dans un plus dense. Mais comme parmi ces rayons, il arrive que les uns souffrent une plus grande réfraction que les autres, il s'ensuit qu'une partie assez considérable doit se détourner très-sensiblement pour se répandre dans l'ombre de la Terre ; ce qui produit par conséquent cette lumiere foible que l'on observe sur la Lune dans les Eclipses totales. La seule inspection de la Figure suffit pour faire connoître la maniere dont se répandent les rayons du Soleil après les deux différentes réfractions qu'ils éprouvent en traversant l'athmosphere terrestre. PLANCHE V. *Fig. 6.*

Remarquez que l'Athmosphere peut détourner les rayons du Soleil, de maniere qu'ils se brisent en s'approchant de l'axe du cone depuis la surface de la Terre jusqu'à la hauteur de 12 à 15 lieues au-dessus. Or comme il n'est pas possible que ces Rayons rompus se répandent vers l'axe de l'ombre, sans que le cone d'ombre ou le diametre du disque en soit augmenté ; il s'ensuit que dans le calcul des Eclipses on ne doit point considérer l'Athmosphere comme transparente, mais plutôt comme une couche de matiere opaque qui environneroit la Terre & augmenteroit, pour ainsi dire, son diametre d'environ $\frac{1}{196}$, il sera donc nécessaire dans le calcul des Eclipses de Lune d'augmenter d'une minute le diametre de l'ombre, qu'on aura déja calculé selon la Méthode expliquée ci-dessus.

Le Paſſage de Mercure dans le Soleil étant donné, déterminer ſon orbite*, &c.

PLANCHE V. Fig. A.

S eſt le centre du Soleil, *AB* un diametre repréſentant l'Ecliptique indéfiniment prolongé, *C* eſt l'entrée de Mercure dans le Soleil, *D* ſa ſortie.

Par *C* tirez au-dedans du cercle la droite *CE* parallele à *AB*, & égale au chemin que le Soleil a fait dans tout le tems du paſſage *CD*, puis joignez *DE*, & la prolongez juſqu'à ce qu'elle rencontre l'Ecliptique en *N*.

Je dis 1°. Que *DN*, eſt l'orbite de Mercure & que ſon obliquité eſt *DNA*.

2°. Que *NE*, *ND*, ſont les diſtances entre Mercure & le Nœud pour le commencement & pour la fin du paſſage *CD*.

3°. Que *NS*, eſt la diſtance entre le Nœud & le centre du Soleil, pour la fin du paſſage.

Soit achevé le Parallélogramme *CEDG*.

DEMONSTRATION.

CD, eſt décrite dans le Soleil par la compoſition de deux mouvemens droits & uniformes, l'un propre à Mercure dans ſon orbite contre l'ordre des Signes, & l'autre qui eſt propre au Soleil, mais qui peut être imaginé dans Mercure, ſuppoſé que le Soleil demeure arrêté pendant que l'orbite de Mercure conſervant toujours ſa même obliquité ſera portée contre l'ordre des Signes, & qu'ainſi Mercure outre ſon mouvement propre en aura un ſecond qui ſera meſuré par la droite *CE* qui eſt donnée de gran-

* Cette Addition qui contient un Mémoire très-ſuccinct lû à l'Académie des Sciences le 27 Fevrier 1677 par M. Picard (& qui n'avoit pas encore été publié) pourra peut-être ſervir à faire connoître dans quel tems on a commencé à tenir compte du mouvement horaire de la Terre ou du Soleil, ſoit dans les Eclipſes, ſoit dans les conjonctions des Planetes, pour en déduire leurs Routes apparentes ſur le diſque.

deur & de position, aussi-bien que CD; & par conséquent au Parallélogramme $CEDG$; par la science des mouvemens composés, la droite DE déterminera la direction, & mesurera la viteſſe du mouvement propre de Mercure dans son orbite.

Notez qu'ayant prolongé CG jusqu'à ce qu'elle coupe le cercle en H, la moitié de la différence des arcs H, A; CB, mesurera l'obliquité DNA, laquelle excede celle de la ligne DC, de la moitié de l'arc DH.

PREMIERE PROPOSITION.

Le Paſſage de Venus ou de Mercure dans le Soleil étant donné par obſervation, déterminer l'obliquité de leur orbite.*

* *Ceci a été lû le 13 Mars 1677.*

S eſt le centre du Soleil, NS, l'Ecliptique, CD le paſſage de Mercure rétrograde de C en D. PLANCHE V. *Fig.* B.

Par le point d'entrée C, soit menée dans le disque du Soleil, la droite CE parallele à NS, & égale au chemin que le Soleil aura fait durant le tems du paſſage CD, & soit jointe DE.

Au Triangle CED, les côtés étant donnés, l'angle CED sera donc connu.

Or si EM perpendiculaire à NS, n'excede pas environ $6'$, la droite DE prolongée jusqu'à ce qu'elle rencontre l'Ecliptique déterminera le Nœud N, dont l'obliquité DNS, sera égale au supplément de l'angle CED.

Mais si EM excede $6'$, il faudra en ce cas considérer NEM comme un Triangle sphérique rectangle, pour trouver par le calcul l'angle oblique N, qui sera l'obliquité de NED, orbite de Mercure.

Pour le démontrer soit achevé le Parallélogramme $CEDG$, & soit prolongée GC jusqu'à ce qu'elle rencontre l'Ecliptique en O.

Dans la fig. B qu'on voit ici, Mercure rétrograde s'éloigne

du Nœud de son orbite, pendant que le Soleil tend à ce même Nœud; mais nous pouvons conserver les mêmes apparences en supposant que le Soleil demeure arrêté, & que ce soit l'orbite de Mercure qui par un mouvement contraire, mais égal à celui du Soleil, soit transporté de OG à ND, pendant que Mercure s'éloignant du Nœud de son orbite, fera un chemin égal à la différence des lignes OC, ND. Or dans cette supposition Mercure aura deux mouvemens qui sont représentés par les lignes CG, CE, & qui en composeront un troisieme dans la Diagonale CD. Donc au Parallélogramme $CEDG$, la Diagonale CD, & le côté CE étant donnés de grandeur & de position, le reste sera connu.

Sur quoi il est à remarquer que plus la raison du mouvement du Soleil comparé avec celui de Mercure vu de la Terre sera grande, plus la ligne du passage CD sera inclinée à l'Ecliptique, en sorte que la différence entre la vraie obliquité de l'orbite, & celle du passage vu, peut aller à deux degrés & demi, supposé que l'orbite soit inclinée d'environ six degrés.

SECONDE PROPOSITION.

Un lieu de Mercure dans le Soleil étant donné par les Tables, déterminer la ligne visible du passage entier.

Cette Proposition est l'inverse de la précédente.

PLANCHE V. *Fig.* C.

Soit F le lieu de Mercure dans le Soleil, N le Nœud de l'orbite de Mercure, FS la latitude de Mercure.

Si le Triangle NFS, est si petit qu'il puisse passer pour rectiligne, l'angle SFN sera le complément de l'angle N. Mais si NF distance du Nœud excede un degré, au Triangle sphérique rectangle NFS, on trouvera NFS par le calcul.

Cela supposé, soit menée FH indéfinie & parallele à l'E-

cliptique, contre l'ordre des Signes ; puis ayant fait l'angle *SFK* égal au supplément de *SFN*, ou ce qui est la même chose, ayant fait l'angle *HFK* égal au complément du même angle *SFN*, retranchez les droites *FH*, *FK*, en sorte que, comme le mouvement du Soleil, est au mouvement de Mercure vu de la Terre, ainsi *FH*, soit à *FK*. Le Parallélogramme *FK*, *LH*, étant achevé, la Diagonale *FL* prolongée de part & d'autre autant qu'il sera de besoin, & coupant le cercle aux points *C*, *D*, déterminera le passage visible de Mercure dans le Soleil ; ce qui s'ensuit clairement de ce que nous avons démontré.

Remarques touchant les Eclipses du Soleil & de la Lune.

Bien que la composition des mouvemens ne fasse pas un effet si sensible dans les Eclipses du Soleil & de la Lune, que dans les passages de Venus & de Mercure dans le Soleil, elle ne doit pas néantmoins être négligée, principalement lorsqu'il s'agit de corriger les Tables sur les Observations. Car pour commencer par les Eclipses du Soleil, prenant la chose à la maniere de ceux qui dans l'hypothese de la Terre mobile supposent que l'œil du Spectateur soit dans le Soleil, on doit considérer la Lune comme rétrograde qui va vers la Terre, pendant que la Terre va vers elle (de même que nous avons considéré Mercure à l'égard du Soleil), de sorte que la ligne décrite par le passage visible du centre de la Lune dans le disque de la Terre n'est pas l'orbite de la Lune, mais une ligne plus inclinée à l'Ecliptique, d'une différence qui peut aller à 24 minutes.

Et dans les Eclipses de la Lune, si l'on considere les mouvemens de la Lune, & de l'ombre de la Terre, qui sont tous deux directs, on trouvera que la ligne du passage visible du centre de la Lune dans l'ombre de la Terre est moins inclinée à l'Ecliptique que la vraie orbite.

PLANCHE V. *Fig.* D.

BAD eſt parallele à l'Ecliptique, ou l'Ecliptique même, *AC* eſt l'orbite de la Lune. Mais au lieu que l'ombre de la Terre eſt portée de *D* vers *A*, ſi nous ſuppoſons qu'elle demeure arrêtée, il faudra faire mouvoir l'orbite *AC*, de *A* vers *D*, contre l'ordre des Signes, pendant que la Lune directe s'avancera de *A* en *C*; de ſorte que la ligne du mouvement compoſé ſera *AE*, Diagonale du Parallélogramme *CADE*, dans lequel *AC* eſt à *AD*, comme le mouvement de la Lune eſt à celui du Soleil: or plus la raiſon du mouvement du Soleil à celui de la Lune ſera grande, plus l'angle *BAE* ſera grand, la différence *CAE* pouvant monter à 28 minutes.

Ceux qui voudront repréſenter les Eclipſes du Soleil à la maniere ancienne, auroient une ſemblable compoſition de mouvemens à conſidérer, outre le mouvement des Parallaxes qui regarde le mouvement journalier; ce qu'il n'eſt pas néceſſaire d'expliquer plus au long.

Les Aſtronomes n'employent aujourd'hui qu'une ſeule & unique Table de l'inclinaiſon de la route apparente de la Lune avec le plan de l'Ecliptique, en ſorte que dans les Eclipſes, ſoit de Lune, ſoit du Soleil, l'angle d'inclinaiſon de la route apparente eſt toujours plus grand que celui de l'inclinaiſon véritable de l'orbite de la Lune, cet angle pouvant être quelquefois de 5° 46'. Pour cet effet au lieu de ſuppoſer dans les Eclipſes de Terre, comme au diſcours précédent, l'œil dans le Soleil, ils le placent dans l'orbe de la Lune & dans la ligne droite qui joint les centres de la Terre & du Soleil, enſorte que la projection de la route apparente de la Lune ſur le plan du diſque, doit ſe faire comme il a été expliqué ci-deſſus, *page 217.*

CHAPITRE

CHAPITRE QUINZIEME.

Où l'on considere les différens Phénomenes qui sont occasionnés par le mouvement de la Terre, & par celui des deux Planetes inférieures Venus & Mercure.

JUSQU'ICI nous avons tâché de développer les principaux mouvemens de la Terre & de la Lune, sans presqu'omettre aucuns des différens Phénomenes qui en résultent. La Lune n'est pas cependant une Planete du premier ordre, elle ne doit être mise qu'au second rang, puisqu'elle ne tourne autour du Soleil, qui est le centre de notre Systeme planétaire, qu'autant que la Terre, dont elle est le Satellite, s'y meut chaque année par son mouvement périodique, sur le plan de l'Ecliptique.

Les six Planetes du premier ordre.

Quant aux Planetes du premier ordre, qui sont renfermées dans notre Systeme solaire, elles tournent toutes autour du Soleil au nombre de six, sçavoir Mercure ☿, Venus ♀, la Terre ♁, Mars ♂, Jupiter ♃, & Saturne ♄. Il s'agit donc présentement d'expliquer ici leurs mouvemens & les phénomenes qui en dépendent: sur quoi il faut d'abord se ressouvenir qu'on a démontré aux Chapitres précédens que les orbites de Mercure & de Venus sont les plus proches du Soleil & que ces mêmes orbites l'environnant, toutes deux se trouvent néantmoins renfermées dans celle de la Terre. Mais d'autant que Venus & Mercure achevent leurs révolutions dans un espace de tems bien moins considérable que ne fait la Terre, il doit s'ensuivre que ces deux Planetes vues du Soleil paroîtront dans le Ciel plus ou moins éloignées de la Terre,

selon les diverses circonstances, & qu'elles paroîtront aussi quelquefois en conjonction ou en opposition à l'égard de la Terre. D'ailleurs leur mouvement périodique étant plus rapide que n'est celui de la Terre, l'Observateur placé dans le Soleil s'appercevra immédiatement après la conjonction, qu'elles s'en écarteront très-sensiblement, qu'elles seront bientôt plus orientales & que le mouvement de la Terre se fera plus lentement, en un mot avec bien moins de rapidité.

Deux sortes de conjonctions, des Planetes inférieures, avec le Soleil.

Mais il n'est pas moins évident que si l'on observe chaque jour ces deux Planetes de la surface de la Terre, il faut nécessairement qu'elles nous paroissent s'éloigner plus ou moins du Soleil, jusqu'à ce qu'elles se trouvent en conjonction avec cet Astre. Or il faut bien distinguer ici deux sortes de conjonctions apparentes des deux Planetes inférieures à notre égard: elles sont en conjonction avec le Soleil, non seulement lorsque l'une ou l'autre Planete vue du Soleil paroissent en conjonction avec la Terre, mais aussi lorsqu'elles y paroissent en opposition. Soit le Soleil en *S*, *ABTC* l'orbite de la Terre, *FHV* l'orbite de Venus, la Terre au point *T*, & Venus au point *V* sçavoir dans la ligne droite qui joint les centres de la Terre & du Soleil: il est clair que dans cette situation Venus sera vue du Soleil en conjonction avec la Terre, & qu'en même-tems le Soleil vu de la Terre, doit paroître en conjonction avec Venus.

PLANCHE V. *Fig. 7.*

Mais si la Terre se trouve encore au point *T* lorsque Venus est en *F*, alors ces deux Planetes vues du Soleil paroîtront en opposition, c'est-à-dire, dans des points du Ciel diamétralement opposés, & au contraire nous observerons de la Terre, Venus dans sa conjonction au Soleil. Remarquez que dans le premier cas, des deux conjonctions dont nous venons de parler, Venus est à peu près au milieu entre la Terre & le Soleil, au lieu que dans le

ſecond cas c'eſt le Soleil qui ſe trouve entre la Terre & Venus. La premiere de ces deux conjonctions ſe nomme Inférieure, & la ſeconde s'appelle la conjonction Supérieure.

On voit encore qu'après l'une ou l'autre conjonction, quoique Venus s'écarte continuellement du Soleil, elle ne ſçauroit cependant nous paroître s'en éloigner que juſqu'à un certain point. C'eſt la raiſon pourquoi nous ne la voyons jamais en oppoſition au Soleil, ou qu'elle ne ſçauroit s'en écarter de 90° ni de 60°. Enfin la plus grande élongation de cet Aſtre arrive lorſque la ligne qui joint les centres de Venus & de la Terre devient tangente à l'orbite de Venus, c'eſt-à-dire, vers les points *D*; car auſſi-tôt que Venus s'avance un peu au-delà dans ſon orbite comme en *H*, alors ſon lieu apparent dans le Ciel paroît moins diſtant du Soleil qu'auparavant. Il eſt donc vrai de dire que depuis la conjonction de cette Planete juſqu'à ce qu'elle ſoit parvenue en *D*, ſon lieu, vu de la Terre, doit paroître augmenter continuellement ſa diſtance à l'égard du Soleil; mais que lorſqu'elle a paſſé ce terme, elle doit paroître s'en approcher de jour en jour. De plus entre ces deux mouvemens apparens de Venus, dont l'un eſt direct & l'autre rétrograde, il eſt néceſſaire que cette Planete devienne quelque tems ſtationnaire à l'égard du Soleil; or dans ce cas le mouvement diurne apparent de Venus à l'égard des Etoiles ſera égal à celui du Soleil & c'eſt auſſi pour lors que l'arc d'un grand cercle de la Sphere compris entre les centres de Venus & du Soleil meſurera le nombre de degrés qui répondent à la diſtance que l'on nomme communément *la plus grande élongation de la Planete au Soleil.*

L'Elongation de la Planete au Soleil.

Il faut pourtant remarquer que ce n'eſt que dans le cas d'une orbite exactement circulaire & dont le Soleil ſeroit au centre, que la plus grande élongation de la Pla-

La plus grande élongation n'arrive pas toujours lorſ-

qu'on apperçoit la Planete dans la tangente tirée de la Terre à son orbite.

nete au Soleil doit se faire lorsque la ligne droite tirée du centre de la Terre à cette Planete devient tangente à son orbite : car il peut arriver dans un orbe elliptique qu'aussitôt après que la Planete est passée au-delà de la ligne droite qui est tirée de la Terre au point d'attouchement, sa distance au Soleil augmente encore, quoique pendant le même tems les distances soit du Soleil, soit de la Planete à la Terre ne changent pas, ou même quoique réellement elles diminuent d'une quantité assez sensible, comme il sera aisé de s'en convaincre si l'on se donne la peine de tracer une ellipse, selon la Méthode enseignée ci-dessus, & si l'on dispose, par exemple, son plus grand axe de maniere qu'il soit incliné sous un certain angle aigu à la ligne droite tirée du point d'attouchement au foyer de l'orbite. Car il sera facile de former deux Triangles, dont celui qui aura sa base sur le grand axe s'appuira sur un plus grand angle, que celui qui aura pour base la ligne droite tirée du foyer de l'ellipse au point d'attouchement. Mais parce que les orbites des Planetes sont à très-peu-près circulaires, on peut bien négliger ces différences qui sont presqu'insensibles.

La plus grande élongation de Venus au Soleil, c'est-à-dire l'angle *STD*, a été déterminé par Observation d'environ 48 degrés ; ainsi dans la supposition que son orbite est circulaire, on peut calculer la distance de Venus au Soleil, si l'on connoît une fois celle du Soleil à notre égard ; autrement l'on aura le rapport de ces deux distances ; car *ST* est à *SD* comme le sinus total est au sinus de l'angle *STD* qui est égal à la plus grande élongation observée.

On peut aussi remarquer que pendant tout l'intervalle de tems que Venus emploie à parcourir une partie de son orbite depuis sa conjonction supérieure (ou sa plus grande distance à la Terre) jusqu'à sa conjonction infé-

rieure, c'eſt-à-dire, juſqu'à ſa plus petite diſtance à notre égard ; cette Planete doit néceſſairement nous paroître plus orientale que le Soleil : & alors Venus doit paroître ſe coucher chaque jour un peu plus tard. Or c'eſt dans ce tems-là qu'on l'obſerve le ſoir & c'eſt cette même Planete qu'anciennement on a nommée *Veſperus*, parce qu'elle annonce la fin du jour ou le commencement de la nuit. Au contraire lorſque Venus paſſe de ſa conjonction inférieure à ſa conjonction ſupérieure, elle eſt plus occidentale que le Soleil : elle ſe couche pour lors avant cet Aſtre, de maniere que le ſoir on ne ſçauroit plus l'appercevoir au couchant, mais elle ſe leve chaque jour avant le Soleil : elle paroît pour lors de même que l'Aurore régulierement tous les matins. Enfin c'eſt cette même Etoile qu'on nommoit anciennement *Phoſphorus*, c'eſt-à-dire, l'avant-courriere ou le premier flambeau de la lumiere & du jour.

Suppoſons préſentement que l'on obſerve du Soleil la conjonction de Venus & de la Terre, c'eſt-à-dire, que ces deux Planetes, ſituées dans les points *V* & *T* de leurs orbites, paroiſſent répondre au même point de l'Ecliptique, & qu'enſuite Venus ayant achevé une révolution périodique, ſe trouve encore au même point *V* de ſon orbite, il eſt très-certain qu'alors la Terre n'aura pas à beaucoup près achevé ſa révolution autour du Soleil ; c'eſt pourquoi il ſera néceſſaire que Venus, qui ſe meut plus rapidement, parcourre encore une partie de ſa ſeconde révolution pour qu'on la voie du Soleil dans la ligne droite qui eſt tirée à la Terre, & qui déſignera ſa conjonction à l'égard du Soleil. Soit donc cette ligne droite *S L M* dont il faut trouver la poſition, c'eſt-à-dire, on demande le vrai lieu *L* & *M* de Venus & de la Terre ſur leurs orbites, lorſque Venus reparoîtra en conjonction avec la Terre ; de ſorte qu'il s'agit de déterminer la quantité de l'angle au Soleil *V S M* ou de l'arc *V D L* que Venus doit parcourir, outre ſa ré-

volution périodique de 360° pour rencontrer une seconde fois la ligne droite tirée au centre de la Terre, puiſque celle-ci a dû s'avancer depuis la conjonction précédente. Pour cet effet il faut conſidérer que les mouvemens angulaires de la Terre & de Venus autour du Soleil qui répondent à un même intervalle de tems, ſont entre eux réciproquement comme les tems de leurs révolutions périodiques. On aura donc, comme le tems de la révolution périodique de la Terre, eſt au tems de la révolution périodique de Venus, ainſi le mouvement angulaire de Venus, lequel a pour meſure 360° ou la circonférence du cercle plus l'arc que la Terre a parcouru entre deux conjonctions immédiates, eſt au mouvement angulaire de la Terre qui répond à l'arc dont nous venons de parler. Mais par diviſion des rapports, l'on aura, comme la différence des tems péridioques de la Terre & de Venus, eſt au tems périodique de Venus, ainſi la circonférence entiere de 360°, eſt à un quatrieme Terme qui ſera l'arc que l'on cherche, c'eſt-à-dire, la vraie meſure de l'angle que la Terre aura parcourru à l'égard du Soleil entre deux conjonctions immédiates. Par exemple, la Terre fait ſa révolution en 365 jours 6 heures ou environ, c'eſt-à-dire en 8766 heures: on ſçait auſſi que Venus fait la ſienne en 224 jours & 16 heures, c'eſt-à-dire en 5392 heures: or la différence de ces deux nombres eſt 3374 heures. On fera donc, comme 3374 heures ſont à 5392, ainſi 360° à un quatrieme Terme, & l'on trouvera 575° qui valent une révolution & demie plus 35°; de ſorte qu'il faudra que Venus parcourre encore une demi-révolution plus 35°, & tout le tems écoulé ſera un an & 218 jours. Il eſt donc évident que ſi l'on obſerve aujourd'hui une conjonction inférieure de Venus avec le Soleil, le retour de cette Planete au Soleil dans une conjonction ſemblable telle que l'inférieure, ne ſçauroit arriver

Maniere de déterminer le tems qui doit s'écouler entre deux conjonctions de même eſpece.

qu'après un an sept mois & douze jours: d'où il suit enfin que si la premiere de ces deux conjonctions inférieures a été observée au commencement du *Belier*, l'autre conjonction doit se faire vers le septieme degré du *Scorpion*. Il faudra suivre aussi la même regle à l'égard de toute autre situation quelconque de Venus, comme de deux conjonctions supérieures ou deux positions semblables de cette Planete à l'égard du Soleil, c'est-à-dire pour qu'elle puisse revenir à une semblable élongation donnée.

Autre Méthode de résoudre le Probleme.

Les Astronomes se servent communément d'une autre forme de calcul lorsqu'il s'agit de résoudre ce Probleme ou quelques autres semblables, tels que sont, par exemple, les conjonctions moyennes de la Lune à l'égard du Soleil. Car ils cherchent premierement le moyen mouvement diurne de la Terre à l'égard du Soleil, & de même celui de Venus vu du Soleil. La différence de ces deux mouvemens est ce qu'ils appellent le mouvement de Venus à l'égard de la Terre. Ainsi le moyen mouvement diurne de la Terre étant $59' 8''$, & celui de Venus de $1° 36' 8''$, leur différence est $37'$, ce qui donne par conséquent l'espace, dont on verroit du Soleil chaque jour, Venus s'éloigner de la Terre, ou celui dont on la verroit chaque jour s'en approcher. Si l'on fait donc, comme $0° 37'$ sont à $360°$ ou $21600'$, ainsi un jour est à un quatrieme Terme, l'on aura l'intervalle de tems que Venus doit paroître employer à parcourir $360°$ relativement à la Terre, c'est-à-dire, l'intervalle de tems compris jusqu'à son retour à une même conjonction, que l'on trouvera par conséquent de 583 jours.

Dans les deux calculs précédens nous n'avons employé que les moyens mouvemens de la Terre & de Venus pour déterminer l'intervalle de tems compris immédiatement entre les deux conjonctions de même espece; & de cette maniere nous avons limité les retours des con-

jonctions moyennes : mais parce que la Terre & Venus ſe meuvent autour du Soleil dans des orbes elliptiques, & que leurs mouvemens ſont ſucceſſivement accélérés ou retardés, il ſuit de là que les vraies conjonctions pourront arriver quelquefois un peu plutôt & d'autres fois un peu plus tard que ſelon le calcul précédent. Voici la Méthode de déterminer le tems des conjonctions vraies, lorſqu'on ſçait une fois celui qui répond aux conjonctions moyennes. Soit *ABC* l'Ecliptique, le point *A* celui qui répond au lieu de la moyenne conjonction. On calculera pour le même tems par les Tables Aſtronomiques le vrai lieu de Venus réduit à l'Ecliptique, & qui ſera, par exemple, en *D* de la circonférence : on déterminera de même le vrai lieu *T* de la Terre, & partant l'on aura la diſtance *DT* entre les lieux de Venus & de la Terre. Mais parce que l'on peut connoître auſſi par les mêmes Tables la différence des mouvemens vrais ou angulaires de ces deux Planetes pour un tems quelconque propoſé, comme de ſix heures, par exemple ; on ſçaura par ce moyen la juſte quantité dont Venus s'approche ou s'éloigne de la Terre pendant un intervalle de ſix heures. C'eſt pourquoi l'on fera, comme la différence de ces deux mouvemens eſt à l'arc *DT*, ainſi l'intervalle de tems donné de ſix heures eſt à un quatrieme Terme ; ce quatrieme Terme ſera le tems que l'on cherche & qui doit être compris entre la conjonction vraie & la conjonction moyenne. On ajoutera donc ce dernier tems trouvé, ou bien on le retranchera de celui qui répond à la moyenne conjonction, ſelon que Venus eſt orientale ou occidentale, & l'on aura enfin l'heure de la vraie conjonction.

PLANCHE V. *Fig.* 8.

La diſtance de Venus à la Terre doit changer continuellement.

Lorſque l'on jette les yeux ſur la figure où ſont repréſentées les orbites de la Terre & de Venus, il eſt facile de reconnoître que la diſtance de Venus à la Terre doit varier continuellement & même d'une quantité très-ſenſible à notre égard ;

PLANCHE V. *Fig.* 7.

égard; car la plus grande distance de Venus à la Terre arrive lorsque cette Planete est dans sa conjonction supérieure avec le Soleil, & sa plus petite au contraire lorsqu'elle se trouve dans sa conjonction inférieure. Or ces deux distances sont très-différentes l'une de l'autre, puisqu'il s'en faut le diametre entier, de l'orbite de Venus, que cette Planete ne soit aussi près de nous dans l'une de ces deux conjonctions que dans l'autre. Mais la distance de Venus à la Terre dans sa conjonction supérieure avec le Soleil étant à sa distance à la Terre dans sa conjonction inférieure environ comme 6 est à 1: il s'ensuit donc que Venus est six fois plus près de la Terre au tems de la derniere de ces deux conjonctions qu'au tems de la précédente, & que par conséquent sa grosseur ou plutôt son diametre apparent doit nous paroître augmenté d'environ six fois. L'on considerera pourtant que la plus grande & la plus petite distance de Venus à la Terre, n'arrive pas toujours à chaque conjonction supérieure & inférieure, parce que l'excentricité des deux orbites peut y apporter quelque différence sensible. En effet la plus grande distance de Venus à la Terre ne doit arriver (au tems de la conjonction supérieure) que dans le cas où la Terre & Venus sont aphélies; & quant à la plus petite distance de Venus à la Terre au temps de la conjonction inférieure, ce n'est que quand Venus se trouve aphélie, & qu'en même tems la Terre est dans son perihélie.

Considérant aussi que la Planete de Venus est un corps sphérique, opaque, qui n'a d'autre lumiere que celle qu'elle emprunte du Soleil & qui nous est réfléchie; il s'ensuit qu'on ne sçauroit l'appercevoir que par l'hémisphere tourné du côté du Soleil, car il n'est pas possible de distinguer l'autre hémisphere, puisqu'il est entiérement dans l'ombre ou privé de lumiere, étant opposé au Soleil. C'est pour cette raison que s'il arrive jamais que la Terre se trouve

directement située devant l'hémisphere obscur de Venus, on ne pourra plus l'observer dans les cieux, à moins que ce ne soit lorsqu'elle passe sur le disque du Soleil, auquel cas elle nous paroîtroit comme une tache ronde, mais fort noire qui parcourt son disque & qui le traverse: au contraire si c'est l'hémisphere éclairé qui est directement tourné vers la Terre, alors le disque de Venus paroîtra entierement lumineux & d'une rondeur parfaite. Mais dans tout autre cas ce disque sera plus ou moins altéré, & doit être observé sous différentes phases, de la même maniere qu'il arrive dans chaque mois à la Lune que nous voyons en Croissant, en Quartiers, puis augmenter successivement en lumiere jusqu'au tems de son opposition où elle devient Pleine, la circonférence de son disque se trouvant en ce cas parfaitement circulaire à notre égard.

Les phases de Venus.

PLANCHE V. *Fig. 9.*

Soit *ABCDEFG* l'orbite de Venus, *TL* une partie de celle de la Terre, soit aussi le lieu de la Terre en *T* & celui de Venus en *A* dans sa conjonction supérieure au Soleil. On voit d'abord que dans cette situation nous devons appercevoir de la Terre tout l'hémisphere de Venus qui est éclairé du Soleil. Venus sera donc dans cette position semblable à la Pleine Lune, c'est-à-dire, que la rondeur de son disque sera parfaite à notre égard. Mais lorsque Venus changera de situation par rapport à la Terre & au Soleil, & qu'elle s'avancera, par exemple, jusqu'en *B*, alors une partie de l'hémisphere obscur sera tournée vers nous, & partant le disque de Venus nous paroîtra altéré dans sa circonférence, ensorte que ce ne sera plus un cercle parfait: ensuite Venus continuant à s'avancer, & étant enfin parvenue jusqu'en *C*, il ne sera gueres possible d'observer de la Terre qu'environ la moitié de l'hémisphere éclairé, l'autre moitié du disque étant cachée de la même maniere qu'on l'observe à l'égard de la Lune aux premiers ou aux derniers Quartiers. Enfin Venus étant

parvenue en *D*, il ne reſtera plus qu'une petite portion de l'hémiſphere éclairé tournée vers la Terre. Or parce que Venus eſt un corps rond, comme nous l'avons déja fait remarquer ci-deſſus, & que d'ailleurs à cauſe de ſa grande diſtance ce globe ne ſçauroit nous paroître autrement que comme un diſque plan, il ſuit de là que la plus petite partie de l'hémiſphere éclairé, qui ſeule nous ſera viſible, doit paroître alors ſous la forme d'un Croiſſant dont les pointes ſeront oppoſées au Soleil. Il n'eſt pas moins évident que s'il étoit poſſible d'appercevoir Venus au point *E* dans ſa conjonction inférieure avec le Soleil, on ne pourroit reconnoître tout au plus que ſon hémiſphere obſcur : ainſi c'eſt-là le cas où elle ne ſe voit plus ſi ce n'eſt lorſqu'elle paſſe ſur le Soleil. Il arrive cependant en cette occaſion un phénomene bien merveilleux, ſur-tout par ſa rareté, puiſqu'il n'a été encore obſervé qu'une ſeule fois depuis la découverte des lunettes. Au reſte il eſt inutile, à ce qu'il ſemble, de nous arrêter plus long-tems à rapporter ſucceſſivement les différens cas où l'on doit retrouver dans le reſte de la révolution les mêmes phaſes, quoique dans un ſens contraire à celles que nous venons de reconnoître ci-deſſus. Car il eſt évident que quand Venus paſſera de *F* en *G* & *H*, on s'appercevra qu'en *F* Venus paroît en Croiſſant, au point *G* en Quartier, & enfin en *H* preſque ronde, c'eſt-à-dire, à quelque altération près.

Enfin quoiqu'il ne ſoit pas poſſible de remarquer ces phaſes de Venus à la vue ſimple, il eſt néantmoins très-certain qu'on les découvre, même avec les lunettes d'approche les plus ordinaires. Ainſi lorſque Copernic long-tems avant la découverte des lunettes d'approche, renouvella l'ancien Syſteme de Pythagore, & qu'après l'avoir répandu par toute l'Europe, les Aſtronomes eurent bientôt reconnu avec ce grand homme le mouvement de la Terre & des autres Planetes autour du Soleil, cet Aſtre étant

Copernic avoit prédit, ce qui a été obſervé dans la ſuite ſur les phaſes de Venus, c'eſt-à-dire, auſſi-tôt après l'inventiondes lunettes d'approche.

alors regardé comme immobile au centre de leurs révolutions; il s'éleva tout-à-coup beaucoup de Philosophes contre cette opinion, & l'une des principales objections qui ait été proposée contre le mouvement de la Terre & de toutes les Planetes autour du Soleil, c'est que dans cette nouvelle hypothese Venus devroit paroître à chaque révolution avoir précisément les mêmes phases que la Lune : or à cela Copernic ne pouvoit répondre autre chose, sinon qu'elle les avoit en effet, & même qu'il ne falloit pas desespérer qu'un jour les Astronomes ne pussent en rendre un témoignage authentique. En effet cette prédiction de Copernic fut confirmée peu de tems après, lorsque le célebre Galilée, profitant de la découverte qui venoit de se faire des lunettes d'approche ou du théleſcope, observa le premier les phases de Venus semblables à celles de la Lune; de sorte qu'ayant aussi-tôt fait connoître ce phénomene à tous les Philosophes, l'on fut enfin obligé de conclurre avec Galilée que rien ne pouvoit mieux confirmer le systeme de Copernic ou des Pythagoriciens, que cette observation des phases de Venus.

Autre détermination plus exacte des phases de Venus.

PLANCHE V. *Fig.* 10.

Présentement si l'on tire des lignes droites du centre du Soleil aux centres de la Terre & d'une Planete telle que Venus, en sorte qu'elles forment le triangle TSO, & si par le centre de la Planete on fait passer deux plans, de maniere que les lignes droites TO, SO leur soient perpendiculaires, il est évident que l'un de ces deux plans séparera l'hémisphere visible de la Planete de celle qui ne sçauroit être apperçue de la Terre. Et de même que l'autre plan séparera l'hémisphere éclairé de celui qui est dans l'ombre : on aura donc l'angle SOP dont le sommet est centre de la Planete & qui est extérieur à l'égard du triangle TSO, égal à l'angle mOq qui a pour mesure l'arc mq, du demi-cercle éclairé qui seul peut être apperçu de la Terre. Car l'angle SOr est égal à l'angle pOm, puisque l'un

& l'autre angle eſt droit ou de 90°, de plus l'angle rOP eſt égal à l'angle pOq ces deux angles étant oppoſés au ſommet: ſi l'on prend donc la différence entre ces angles égaux, l'on aura l'angle SOP égal à l'angle mOq qui a pour meſure l'arc mq. C'eſt pourquoi la partie ou l'arc mq du demi-cercle éclairé de la Planete, & qui ſeule peut être apperçue de la Terre, a donc pour meſure l'angle SOP: mais cet arc mq vu de la Terre eſt projetté de maniere qu'il paroît égal à ſon ſinus verſe, comme on l'a déja démontré dans les Chapitres précédens à l'égard de la Lune & de ſes phaſes. Il ſuit donc enfin que la partie lumineuſe de Venus que nous voyons de la Terre, eſt à ſon diſque entier & lumineux (toutes choſes d'ailleurs égales) comme le ſinus verſe de l'angle extérieur qui a ſon ſommet au centre de Venus, eſt au diametre du cercle qui eſt à la ſurface de Venus.

Quoique le diſque de Venus nous paroiſſe entierement éclairé, lorſque cette Planete parvient au point A de ſon orbite, la Terre étant en T, cependant ce n'eſt jamais dans cette ſituation que ſa lumiere devient la plus vive ou plus abondante: ſon plus grand éclat n'arrive que longtems après, parce qu'étant au point A ſa diſtance devient trop grande à l'égard de la Terre. Ainſi c'eſt la trop grande diſtance de Venus à la Terre qui eſt cauſe que la force de ſa lumiere diminue d'une part, dans un plus grand rapport que la quantité de lumiere n'augmente de l'autre, c'eſt-à-dire, à meſure que nous voyons ſous un plus grand angle ſon diſque éclairé. Car la lumiere de Venus décroit conſtamment en raiſon doublée ou comme les quarrés de ſes diſtances à meſure que celles-ci augmentent; au lieu que la partie éclairée, que nous appercevons ſucceſſivement un peu plus grande juſqu'à ce que le diſque nous paroiſſe entierement lumineux, ne croît autrement que dans la raiſon des ſinus verſes de l'angle extérieur qui eſt à la

La lumiere de Venus n'eſt pas la plus éclatante lorſqu'elle eſt Pleine ou que ſon diſque nous paroît dans toute ſa rondeur.

Planete. Le plus grand éclat de Venus n'arrive donc pas, comme l'on voit, lorſque la Planete eſt au point *A*, mais aux environs du point *O* de ſon orbite. Je ſuppoſe, par exemple, que Venus ſoit quatre fois plus proche de la Terre au point *O* que lorſqu'elle étoit en *A*, il eſt évident qu'une même partie du diſque lumineux de Venus ſera ſeize fois plus grande : ainſi quoique nous ne puiſſions gueres appercevoir (lorſque Venus eſt en *O*) qu'environ la quatrieme partie de ſon diſque éclairée; il eſt cependant vrai de dire que ſon éclat eſt bien plus augmenté à cauſe de ſa proximité, qu'il ne doit être affoibli par la perte que nous faiſons du diſque entier & qui dépend de la diminution apparente de ſes phaſes.

Dans quelle ſituation Venus doit paroître plus vive & plus éclatante.

Enfin ſi l'on veut connoître plus préciſément quelle doit être la ſituation de Venus pour qu'elle nous paroiſſe dans ſon plus grand éclat, on peut voir *dans les Tranſactions Philoſophiques* N° 349 la ſolution qu'a donnée de ce probleme le célebre Aſtronome M. Hallei. Ce ſçavant Mathématicien a démontré que ce cas arrive, ſoit avant, ſoit après la conjonction inférieure, lorſque l'élongation de Venus au Soleil eſt d'environ 40 degrés, c'eſt-à-dire, lorſqu'on ne voit ſeulement que la quatrieme partie du diſque : auſſi apperçoit-on pour lors cette Planete en plein jour à la vue ſimple, lors même que le Soleil eſt dans ſes plus grandes hauteurs ſur l'horiſon. Il n'y a rien aſſurément de plus digne de notre attention, ni de plus étonnant que cette lumiere éclatante de Venus, qui même quoiqu'elle ne lui ſoit pas propre (puiſque ce n'eſt qu'une lumiere empruntée du Soleil qu'elle nous réfléchit) eſt néantmoins ſi vive & lancée avec tant de force, qu'elle eſt ſupérieure à celle de Jupiter & de la Lune lorſque ces Planetes ſont à pareilles diſtances, c'eſt-à-dire, à mêmes degrés d'élongation au Soleil. Car ſi l'on compare leur lumiere à celle de Venus, à la vérité celle-ci devroit

paroître moins conſidérable parce que leurs diametres apparens ſurpaſſent celui de Venus ; mais d'un autre côté la lumiere de Jupiter ou de la Lune paroît ſi foible qu'elle n'étincelle jamais, ſur-tout celle de Jupiter qui tire un peu ſur la couleur duplomb ; ce qui eſt bien éloigné de l'éclat avec lequel Venus lance cette vive lumiere qui ſemble nous éblouir preſqu'à chaque inſtant.

Le plan de l'orbite de Venus n'eſt pas le même que celui de l'Ecliptique, mais en differe ſenſiblement.

Si le plan de l'orbite de Venus étoit préciſément le même que celui de l'Ecliptique, nous ne verrions jamais Venus dans le Ciel s'écarter de part ou d'autre de l'Ecliptique ; mais parce que ſon mouvement bien obſervé nous a fait reconnoître qu'elle peut s'en écarter, ſoit au Nord, ſoit au Midi de $3^{\circ}\ 24'$, il faut néceſſairement que ſon orbite y ſoit inclinée ſous cet angle ; & d'autant qu'elle coupe le plan de l'Ecliptique, en ſorte que la commune ſection, qu'on nomme autrement *la ligne des nœuds* paſſe par le centre du Soleil, il s'enſuit que Venus ne ſçauroit paroître dans le plan de l'Ecliptique étant vue du Soleil ou de la Terre, ſi ce n'eſt uniquement lorſqu'elle ſe trouve dans l'un ou l'autre nœud. Ces points ſont déterminés, comme l'on ſçait, par le prolongement qui ſe fait de part & d'autre de la commune ſection de l'Ecliptique & de l'orbite de Venus juſques dans le Ciel étoilé. Dans tous les autres points de l'orbite, Venus paroîtra plus ou moins éloignée de l'Ecliptique, de maniere que ſi l'on continue d'obſerver du Soleil cette Planete, lorſqu'elle a paſſé l'un ou l'autre de ſes nœuds ou lorſqu'elle en ſera éloignée de 90°, on la verra dans ſa plus grande diſtance de l'Ecliptique.

PLANCHE V. Fig. 11.

Soit un cercle TAB qui repréſente le plan de l'Ecliptique, $LnVN$ l'orbite de Venus qu'on ſuppoſe couper le plan de l'Ecliptique ſelon la ligne Nn : il faut concevoir ici que la moitié NLn de l'orbite s'éleve ſur le plan de l'Ecliptique, pendant que l'autre moitié NVn s'abaiſſe

PLANCHE V. *Fig.* 11. au dessous de ce plan. Lorsque Venus est, par exemple, au point *N* de son orbite, cette Planete se trouve alors dans le plan de l'Ecliptique : mais si elle s'avance un peu au-delà, comme en *P*, elle doit pour lors paroître au-dessus & s'en écarter de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle parvienne au point *L*; car étant éloignée pour lors de 90° de l'un ou l'autre nœud, c'est-à-dire l'arc *NL* étant le quart de la circonférence d'un cercle, Venus y paroîtra dans sa plus grande distance du plan de l'Ecliptique. C'est ce point *L* & son opposé *V* que l'on a nommé *les Limites*, puisque si la Planete se trouve un peu plus près du point *n* que du point *N*, elle paroîtra en ce cas se rapprocher de l'Ecliptique. Maintenant si d'un point quelconque *P* de l'orbite, on abaisse sur le plan de l'Ecliptique la perpendiculaire *PE*, & qu'on tire sur ce plan la ligne *SE*, il est clair que l'angle *PSE* mesurera la distance de Venus à l'Ecliptique. Cet angle se nomme la latitude *Heliocentrique*, c'est-à-dire, la latitude telle qu'on l'observeroit du Soleil. Voici la Méthode de calculer cette latitude lorsqu'on connoît une fois le vrai lieu de la Planete dans son orbite. Soit *NE* un arc de l'Ecliptique, *P* le lieu de la Planete que l'on suppose connu dans le Ciel étoilé, aussi bien que le vrai lieu *N* de son nœud, *NP* l'arc de son orbite qu'on suppose aussi prolongée dans le Ciel : si l'on imagine un plan perpendiculaire à l'Ecliptique & qui passe par le centre de la Planete, l'arc *PE* de ce cercle, compris entre la Planete & le plan de l'Ecliptique sera sa vraie distance à ce plan, & par conséquent, sera la mesure de l'angle *PSE* ou *PNE*; car dans le Triangle sphérique *PNE* rectangle en *E*, on connoît le côté *NP* qui est la distance de la Planete à son nœud; on connoît aussi l'angle *N* qui est l'inclinaison donnée du plan de l'orbite sur le plan de l'Ecliptique; on aura donc par la Trigonometrie le côté *PE*, c'est-à-dire, la latitude héliocentrique

La latitude Héliocentrique.

Voyez le Triangle sphérique qui est à côté de la figure 11.

Fig. 11.

que

que l'on cherche. Cette latitude héliocentrique d'une Planete eſt toujours exactement la même lorſque la Planete revient au même point de ſon orbite, elle ne ſouffre pas le moindre changement, en un mot elle n'eſt ſujette à aucune variation. Mais il n'eſt pas de même de la *Latitude Géocentrique*, c'eſt-à-dite de la diſtance de la Planete à l'Ecliptique, telle que nous l'obſervons de la Terre; car quoique la Planete reparoiſſe préciſément au même point de ſon orbite, néantmoins cette latitude eſt plus ou moins grande ſelon les différentes diſtances ou les diverſes poſitions de la Terre à l'égard de la Planete. Je ſuppoſe que *BTAt* ſoit l'orbite de la Terre, *NPn* l'orbite de la Planete dont le vrai lieu eſt en *P*: on abbaiſſera de ce lieu ſur le plan de l'Ecliptique la perpendiculaire *PE*, & cette ligne, en quelqu'endroit que l'on ſuppoſe la Terre ſur ſon orbite, ſera toujours la ſoutendante de l'angle qui meſure la latitude géocentrique. Soit donc la Terre au point *T*, c'eſt-à-dire, le plus proche qu'il eſt poſſible de Venus en *P* (ce qui arrive lorſque Venus paroît preſque dans ſa conjonction inférieure avec le Soleil); la latitude géocentrique de cette Planete, aura donc pour meſure l'angle *PTE*. Mais ſi au contraire la Terre ſe trouve en *t*, de maniere que Venus paroiſſe dans ſa conjonction ſupérieure avec le Soleil, cette Planete étant alors dans ſa plus grande diſtance de la Terre, ſa latitude géocentrique ſera meſurée par l'angle *PtE*, qui eſt beaucoup plus petit que l'angle *PTE*, puiſque la diſtance *Pt* ſurpaſſe beaucoup la diſtance *PT*. On doit concevoir la même choſe à l'égard de *Mercure*; d'où l'on voit que la latitude apparente de ces Planetes, toutes choſes d'ailleurs égales, deviendra d'autant plus grande à notre égard qu'elles s'approcheront de la Terre; & qu'au contraire cette latitude doit paroître diminuer à meſure qu'elles s'en éloigneront. C'eſt auſſi pour cette raiſon que la latitude géocentrique de

La latitude Géocentrique.

PLANCHE V. Fig. 12.

Venus paroît quelquefois surpasser sa plus grande latitude héliocentrique, sçavoir lorsque Venus passe entre le Soleil & la Terre; auquel cas elle se trouve plus près de la Terre que du Soleil. Mais il n'en est pas de même à l'égard de Mercure; car comme dans ses conjonctions inférieures il est toujours beaucoup plus proche du Soleil que de la Terre, sa latitude géocentrique doit toujours paroître plus petite que sa latitude héliocentrique. Cette derniere peut monter quelquefois, lorsque Mercure est dans ses limites, à 7 degrés ou environ, & telle est l'inclinaison du plan de son orbite sur le plan de l'Ecliptique.

Le Zodiaque. Ce que c'est.

Comme il n'y a donc aucune Planete dont l'orbite ne soit inclinée au plan de l'Ecliptique, la commune section de chaque orbite avec ce plan étant néantmoins une ligne droite qui passe toujours par le centre du Soleil, il arrive delà que les Planetes ne sçauroient jamais paroître, à chaque révolution périodique, que deux fois seulement dans le plan de l'Ecliptique, sçavoir lorsqu'elles se trouvent dans l'un ou l'autre nœud. Dans tout autre cas elles s'éloignent de plus en plus de ce plan, jusqu'à ce qu'étant enfin passées au-delà des limites (où l'on doit les observer, comme nous l'avons dit, dans leurs plus grandes latitudes) elles commencent à s'approcher successivement de ce plan de la même maniere qu'elles ont paru s'en écarter auparavant. Or si l'on imagine dans le Ciel une Bande ou un espace en forme d'Anneau applati, large d'environ 20 degrés, au milieu duquel passe la circonférence de l'Ecliptique, cette bande ou Zone renfermera nécessairement toutes les routes que peuvent décrire les Planetes dans le Ciel. Or cette Zone a été nommée par les Astronomes le *Zodiaque*, à cause des divers animaux qui forment la plus grande partie des Constellations qui occupent cette région du Ciel. Au reste la Terre parcourt exactement la route qu'elle s'est comme frayée au milieu

de cet espace, & nous regardons cette Route comme la principale, parce qu'elle est la circonférence du plan de l'Ecliptique dont la Terre ne s'écarte jamais, ou plutôt parce que nous n'en voyons jamais sortir le Soleil; au lieu que la Lune peut s'en écarter d'environ $5^{\circ}\frac{1}{3}$, & les autres Planetes encore davantage. Enfin puisque leurs plus grandes latitudes, soit au Midi, soit au Septentrion, ne vont jamais à dix degrés, il s'ensuit que leurs mouvemens seront toujours compris & comme renfermés dans ce peu d'espace qui a pour limites celles que l'on donne au Zodiaque.

Mouvemens apparens de Venus en longitude, ou dans le Zodiaque.

Jusqu'ici nous n'avons gueres considéré que le mouvement de Venus à l'égard du Soleil, ou les phases de cette Planete relativement aux situations du Soleil & de la Terre; mais le mouvement apparent de Venus à notre égard, n'étant pas suffisamment développé dans ce qui vient d'être expliqué ci-dessus, il paroît nécessaire d'en exposer ici les principaux phénomenes. Soit donc ABC l'orbite de Venus, TGF celle de la Terre, & le cercle MLO le Zodiaque qu'on suppose dans le Ciel étoilé. Soit aussi la Terre en T, & Venus en A proche sa conjonction supérieure: il est évident qu'étant vue de la Terre elle paroîtra pour lors répondre au point L du Zodiaque. Mais si l'on suppose que la Terre demeure en repos pendant que Venus continue à se mouvoir & qu'elle parcourt l'arc AB de son orbite, en ce cas on lui verroit décrire l'arc LM du Zodiaque; au lieu que la Terre ayant en effet un mouvement réel pendant ce même intervalle de tems, & parcourant l'arc TH dans le même tems que Venus s'avance jusqu'au point B de son orbite, l'on appercevra, de ce point H, Venus au point N du Zodiaque, c'est-à-dire, qu'elle nous paroîtra avoir décrit dans le Ciel l'arc entier LMN. De cette maniere elle paroîtra plus vers l'Orient que dans le cas précédent où l'on supposoit la Terre im-

PLANCHE V. *Fig.* 13.

Mouvement progressif & accéléré de Venus.

mobile. Enſuite Venus s'avançant juſqu'en *C* & la Terre en *G*, Venus paroîtra en ce cas dans la tangente menée de la Terre à ſon orbite & par conſéquent au point *O* du Ciel. Or dans cette ſituation le mouvement apparent de Venus ſera à peu près égal à celui du Soleil. Peu de tems après Venus, s'avançant de *C* vers *A*, & la Terre parcourant alors l'arc *G K*, Venus paroîtra enfin dans ſa conjonction inférieure avec le Soleil, & pour lors on la verra de la Terre répondre au point *P* du Zodiaque. Mais d'autant que Venus paroiſſoit d'abord répondre au point *O*, cette Planete aura donc paru rétrograder ſelon l'arc *O P*, c'eſt-à-dire, s'être avancée de l'Orient vers l'Occident, ou contre l'ordre des Signes: cependant elle paroiſſoit directe en *C*, lorſqu'elle avoit un mouvement à peu près ſemblable à celui du Soleil; mais puiſque lorſqu'elle s'eſt mue depuis *C* juſqu'en *A* on l'a vue rétrograder par un mouvement aſſez rapide, il faut donc que cette Planete n'ait paru avancer ni reculer dans quelque point intermédiaire entre *A* & *C*, c'eſt-à-dire qu'elle a dû paroître quelque tems ſtationnaire & reſter comme immobile au même point des cieux. De plus Venus étant parvenue en *E*, la Terre doit être en *F*, ainſi nous devons appercevoir cette Planete en *Q*, c'eſt-à-dire encore plus occidentale qu'auparavant, juſqu'à ce qu'elle ſe trouve une ſeconde fois dans la tangente de ſon orbite où commençant à paroître directe, elle s'avancera vers l'Orient, de même que le Soleil: Venus aura donc encore paru pendant ces deux mouvemens apparens, dont l'un eſt direct & l'autre rétrograde, n'en avoir aucun; c'eſt-à-dire qu'elle aura été obſervée ſtationnaire pendant quelques jours. Mais la Terre continuant de s'avancer juſqu'en *D*, pendant que Venus ſe meut juſqu'en *C*, alors le mouvement de Venus aura du paroître très-rapide, de ſorte qu'elle aura parcouru en très-peu de tems l'arc *Q R* du Zodiaque vers l'Orient, ou ſelon la ſuite des Signes;

Venus Rétrograde.

Venus Stationnaire.

d'où il suit que lorsque Venus paroîtra dans sa conjonction supérieure avec le Soleil, l'on observera toujours son mouvement direct ou selon l'ordre des Signes, & qu'au contraire il doit être rétrograde ou contre l'ordre des Signes, lorsque cette Planete nous paroîtra dans sa conjonction inférieure. — Dans quel cas Venus paroit directe. — Dans quel cas elle paroit rétrograde.

Il est aisé de concevoir, que tout ce que l'on vient de dire au sujet des mouvemens apparens de Venus, peut s'appliquer de la même maniere aux mouvemens de Mercure, avec cette seule différence, qu'après les deux conjonctions de Mercure au Soleil, ses mouvemens directs, stationnaires, & rétrogrades se succederont beaucoup plus fréquemment que ceux de Venus, parce que le mouvement de Mercure est des plus rapides, cette Planete ayant une orbite extrêmement petite à parcourir. De cette maniere Mercure doit rencontrer plus souvent la ligne droite tirée du Soleil à la Terre, que cela n'arrive pour Venus: d'ailleurs la plus grande digression de Mercure à l'égard du Soleil, n'est que d'environ 30°. Au reste il est constant que les mouvemens apparens de ces deux Planetes sont fort inégaux à notre égard, puisqu'elles nous doivent paroître successivement directes, stationnaires & rétrogrades. Mais l'on doit bien faire attention qu'il n'en seroit pas de même à l'égard d'un Observateur placé dans le Soleil: il verroit continuellement Venus & Mercure s'avancer sur leur orbite selon la suite des Signes; car telle est l'inégalité apparente que nous observons dans le mouvement de ces deux Planetes, qu'elle se réduit à un mouvement assez uniforme dès qu'on le considere comme se faisant autour du Soleil; ce qui prouve merveilleusement que ce n'est pas la Terre, mais le Soleil qui est le centre du mouvement des Planetes inférieures.

Enfin de même que l'on a démontré que l'orbite de la Terre n'est pas un cercle, mais une Ellipse, on peut — Les orbites de Venus, de Mercure &

des autres Planetes ſont des Ellipſes.

dire auſſi la même choſe des orbites de Venus, de Mercure, & de toutes les autres Planetes. Ces orbites elliptiques ont toutes un foyer commun qu'occupe perpétuellement le Soleil: & quoique ces mêmes Planetes ne ſe meuvent pas à chaque inſtant d'un mouvement égal & uniforme autour de ce foyer, néantmoins leur mouvement ſe fait conſtamment ſuivant une loi générale, laquelle ne ſçauroit être altérée; car elles parcourent tellement la circonférence de ces ellipſes, que chaque ligne tirée du centre de la Planete à celui du Soleil, décrit à chaque inſtant des aires proportionnelles aux tems écoulés, en ſorte que dans l'aphélie ces Planetes ſe meuvent un peu plus lentement qu'à l'ordinaire, & au contraire un peu plus rapidement dans leurs périhélies. Il eſt à remarquer néantmoins qu'il n'arrive pas à la ligne de leur aphélie la même choſe qu'à celle de l'apogée de la Lune; car ou cette ligne eſt fixe dans le Ciel étoilé, ou ſi elle ſe meut, c'eſt d'un mouvement ſi lent qu'à peine la vie d'un homme peut-elle ſuffire pour y appercevoir un changement bien ſenſible. On remarquera auſſi que l'orbite de Mercure eſt la plus Excentrique de toutes celles des Planetes, ſon excentricité étant à ſa diſtance moyenne comme 2051 eſt à 10000.


Fig. 1
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig A.
Fig B.
Fig C.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig D
Dheulland Sculp.

CHAPITRE SEIZIEME.

Du Mouvement des Planetes Supérieures, Mars, Jupiter & Saturne, & des Phénomenes qui en réſultent.

PUISQUE nous nous ſommes arrêtés dans le Chapitre précédent à expliquer les phénomenes que produiſent à notre égard les divers mouvemens de la Terre & des Planetes inférieures, il paroît convenable de développer ici, autant qu'il ſera poſſible, ceux qui appartiennent à chacune des trois Planetes ſupérieures. On ſuppoſera donc que *ABCT* ſoit l'orbite de la Terre, & que Mars, Jupiter & Saturne tournant autour du Soleil, chacuns dans ſon orbite achevent leurs révolutions dans des tems différens & à diverſes diſtances de cet Aſtre lumineux. Soit auſſi *PQV* une partie du Zodiaque, dans le Ciel étoilé où les Aſtronomes ſont obligés de rapporter les mouvemens des Planetes. Il paroît d'abord évident que ces mêmes Planetes vues du Soleil, doivent ſe trouver quelquefois en conjonction ou en oppoſition avec la Terre, c'eſt-à-dire que ſi l'on ſuppoſe l'une des trois Planetes, telle que Saturne, par exemple, en ♄, la Terre ſe trouvant alors au point *M* dans la ligne droite qui joint les centres de Saturne & du Soleil, l'une & l'autre Planete vue du Soleil ſera obſervée en ce cas en conjonction. La Terre peut encore ſe trouver dans la même ligne droite, mais de l'autre côté du Soleil comme en *B*, auquel cas l'on verra du Soleil la Terre & Saturne en oppoſition; ce qui formera une apparence toute contraire à celle que l'on obſerveroit de la Terre: car c'eſt alors que Saturne doit

PLANCHE VI. *Fig.* 1.

nous paroître dans sa conjonction au Soleil. Il n'est pas moins évident que les trois Planetes supérieures, vues de la Terre, peuvent nous paroître successivement former toutes sortes d'angles aigus ou obtus avec le Soleil, en sorte que leur élongation peut être de 180° ou n'aura point de terme; au contraire de ce qui s'observe dans les Planetes inférieures, puisque celles-ci ne peuvent jamais s'écarter du Soleil que d'une élongation limitée, comme nous l'avons démontré ci-dessus. En effet la Terre étant supposée au point *T*, il est clair qu'on peut tirer de ce point la droite *TP*, qui coupant les trois orbites, formera avec la droite *TS* tirée du centre du Soleil au centre de la Terre, l'angle donné *STP*; partant la Terre étant en ce lieu, & Saturne se trouvant, par exemple, en ce moment au point *F* de son orbite, son élongation au Soleil sera pour lors observée sous l'angle *STF*. Ensuite quand la Terre, vue du Soleil, se trouvera en conjonction avec quelqu'une des trois Planetes supérieures, cette même Planete vue de la Terre paroîtra au contraire en opposition * au Soleil, de maniere que nous appercevrons alors le Soleil & la Planete dans deux points du Ciel diamétralement opposés.

Méthode de déterminer le tems qu'une Planete supérieure doit employer depuis sa conjonction ou son opposition au Soleil, jus-

C'est pourquoi si l'on observoit, par exemple, du Soleil la conjonction de la Terre à une Planete supérieure, telle que Saturne, il est certain que peu de tems après cette conjonction, comme le mouvement angulaire de la Terre à l'égard du Soleil est beaucoup plus rapide que n'est celui de Saturne, on verroit du Soleil la Terre s'écarter de plus en plus chaque jour de la Planete. En effet

* Les Astronomes ont toujours été fort attentifs à observer les Planetes supérieures, aux tems de leur opposition au Soleil; car c'est alors le seul cas auquel elles paroissent de la Terre avoir la même longitude que si on les observoit du Soleil, c'est-à-dire, du foyer de leur orbite. Dans tout autre tems il faut réduire le Lieu observé de la Planete, au Lieu du Ciel où elle paroîtroit vue du Soleil: ce qui ne sçauroit se pratiquer facilement, parce qu'il faut supposer qu'on connoisse la distance du Soleil & de la Planete à la Terre ou la Parallaxe du grand orbe; au lieu que dans les oppositions des Planetes au Soleil, on connoît immédiatement par observation, la vraï longitude de la Planete.

la

la Terre par son moyen mouvement diurne parcourant un arc de 59′ 8″, au lieu que Saturne ne parcourt qu'un arc d'environ deux minutes, il s'ensuit que le mouvement diurne de la Terre à l'égard de Saturne, paroîtroit, vu du Soleil, d'environ 57′ 8″. Si l'on fait donc comme 57′ 8″ sont à 360°, ainsi un jour est à un quatrieme Terme, l'on aura par ce moyen le nombre de jours écoulés depuis une conjonction de la Terre à Saturne jusqu'à l'autre, sçavoir de 378 jours. On conçoit aussi fort aisément que puisque la Terre & Saturne, vus du Soleil, se trouvent en conjonction, le Soleil au contraire, vu de la Terre, paroîtra en même tems en opposition avec Saturne: d'où il suit que le nombre de jours écoulés entre les deux plus proches oppositions moyennes du Soleil & de Saturne sera d'environ 378 jours ou d'une année & 13 jours. La même regle a lieu encore pour le tems écoulé entre deux conjonctions moyennes de Saturne au Soleil, ou deux élongations quelconques, mais semblables. On aura dans tous ces cas-là environ 378 jours, en supposant les moyens mouvemens de la Terre & de Saturne tels qu'on les a rapportés ci-dessus. En un mot le tems écoulé entre une conjonction & l'opposition qui suit immédiatement après, est de 189 jours, ou la moitié de 378.

qu'à celle qui suit immédiatement cette conjonction ou opposition proposée.

Ayant calculé de la même maniere le tems écoulé entre les deux plus proches conjonctions ou oppositions de Jupiter au Soleil, on a trouvé un an & 33 jours. A l'égard de Mars quand on l'a observé une fois en opposition au Soleil, on ne doit pas l'attendre à l'opposition suivante qu'au bout de deux ans & 50 jours.

On remarquera que les Planetes supérieures au tems de leur opposition, ne se levent qu'au moment que le Soleil se couche, & ne se couchent que lorsqu'il se leve; qu'aussi-tôt après qu'elles ont passé le lieu de leur opposition au Soleil, elles paroissent alors orientales, & qu'el-

les ſont viſibles le ſoir, juſqu'au tems de la conjonction : car pour lors elles ſe levent & ſe couchent en même tems que le Soleil ; qu'au contraire après la conjonction elles deviennent occidentales & qu'on ne ſçauroit les appercevoir qu'avant le lever du Soleil, puiſqu'elles ſe couchent le ſoir quelque tems avant cet Aſtre, qui d'ailleurs nous les efface tout le jour. Elles ſont donc viſibles uniquement le matin, juſqu'à ce qu'étant parvenues à leurs oppoſitions, elles ſe levent enfin au moment du coucher du Soleil.

Les plans des orbites des Planetes ſupérieures ſont un peu inclinés à celui de l'Ecliptique.

On ne doit pas être étonné après ce que nous avons dit au ſujet des Planetes inférieures, de trouver les orbites des Planetes ſupérieures inclinées au plan de l'Ecliptique : mais comme la commune ſection de ce plan avec celui de chaque orbite eſt toujours une ligne droite qui paſſe par le Soleil, il y a donc autant de lignes des nœuds qu'il y a d'orbites, & les nœuds ſe trouvent par conſéquent placés aux points de la circonférence de l'Ecliptique où ſe terminent les extrémités de chaque ligne d'interſection. D'où l'on voit la raiſon pourquoi les Planetes ſupérieures ne ſçauroient paroître dans le plan de l'Ecliptique, à moins qu'elles ne ſe rencontrent préciſément aux nœuds. Dans tout autre point de la circonférence de leurs orbites, elles ſont plus ou moins éloignées de l'Ecliptique ; en un mot elles en paroîtront d'autant plus écartées, qu'elles s'approcheront des Limites, qui ſont les points, comme l'on ſçait, où elles ſe trouvent à diſtances égales de l'un & l'autre nœud. Or ces points ou limites dans leſquels les Planetes doivent paroître arrivées à leurs plus grandes latitudes héliocentriques, ſe trouvent éloignés du plan de l'Ecliptique de 2° 30′ pour Saturne, 1° 20′ pour Jupiter, & pour Mars 1° 52′. *Voyez les Tab. Carol. de Street.*

Les mêmes Tables Caroliines donnent 3° 24′ & 6° 54′ pour les plus grandes Latitudes de Venus & de Mercure; mais cette derniere doit être augmentée de 5′ à 6′, celle de Saturne de 1′, & celle de Mars diminuée d'environ 1′ ¼.

Il ſera facile de rechercher de la même maniere qu'on l'a pratiqué pour Venus & Mercure, la latitude

héliocentrique d'une Planete supérieure, lorsque son lieu, ou sa distance au nœud comptée sur son orbite sera donnée. Quant aux latitudes géocentriques ou distances apparentes de la Planete à l'Ecliptique vues de la Terre, elles dépendent toujours de la situation & de la distance de la Planete à la Terre. En effet une même latitude héliocentrique peut répondre à différentes latitudes apparentes, selon les diverses situations de la Terre à l'égard de la Planete. Car soit l'orbite de la Terre $T \mathfrak{h} t$, σNn l'orbite de Mars, qui est celle des Planetes supérieures qu'on se propose de considérer ici : puisque l'orbite de Mars est inclinée au plan de l'Ecliptique, on peut supposer que la section commune de ces deux plans, qui est la ligne des nœuds, soit représentée par Nn. Supposons d'abord la Terre en T & Mars en σ, de maniere que cette Planete paroisse en opposition au Soleil, alors abbaissant du point σ la perpendiculaire σE sur le plan de l'Ecliptique, cette perpendiculaire sera la soutendante de l'angle que nous appellons la Latitude géocentrique. Or dans le cas présent où la Terre est en T, entre le Soleil & la Planete, cette Latitude apparente ou géocentrique de Mars sera mesurée par l'angle σTE. Mais si l'on suppose ensuite la Terre au point t de son orbite, en sorte que Mars & le Soleil paroissent presqu'en conjonction, il s'ensuit que la latitude de Mars vue de la Terre, aura pour mesure l'angle σtE, lequel est bien moindre que l'angle σTE, puisque cet angle qui est fort petit se trouve diminué à très-peu de chose près dans la raison des distances, sçavoir de $T\sigma$ à $t\sigma$. On conçoit aussi que la Terre étant en T, la latitude géocentrique de Mars sera plus grande que la latitude héliocentrique, & au contraire la Terre étant en t. On expliquera de même les autres changemens qui doivent arriver à la latitude géocentique ou vue de la Terre selon les différentes situations de Mars ou de la Terre relativement

PLANCHE VI. Fig. 3.

au Soleil ; en sorte que, toutes choses d'ailleurs égales, la latitude géocentrique sera d'autant plus petite que Mars approchera de sa conjonction au Soleil, & au contraire d'autant plus grande, que cette Planete paroîtra s'avancer vers le lieu de son opposition.

Il est encore évident qu'aucune des trois Planetes supérieures ne paroîtra jamais, vue de la Terre, sur le disque du Soleil, comme il arrive quelquefois à l'égard de Mercure ou de Venus : il doit arriver au contraire qu'elles passeront au-delà du Soleil, en sorte que dans leurs conjonctions, toutes les fois qu'elles se trouveront aux nœuds, elles seront cachées par le disque du Soleil.

Le disque des Planetes supérieures n'est jamais sensiblement altéré dans sa rondeur.

Puisque chaque Planete a toujours une hémisphere tourné vers le Soleil, & qu'elle n'est lumineuse qu'autant qu'elle nous réfléchit les rayons de cet Astre, il s'ensuit que nous ne devons gueres observer de variétés dans les phases des Planetes supérieures dont le disque doit nous paroître rond, puisque la Terre est toujours vue de Jupiter ou de Saturne aux environs du Soleil. Mais si le disque de ces deux Planetes n'est jamais sensiblement altéré à notre égard, il n'en est pas de même à l'égard du disque de Mars, qui peut paroître tantôt plein & tantôt entamé * ; car faisant ses révolutions dans une orbite qui approche davantage de la Terre, il doit arriver que son hémisphere tourné vers le Soleil, sera quelquefois différent de celui qui est tourné vers nous ; de maniere que vers la Quadrature, c'est-à-dire, lorsque Mars paroissant à 90° du Soleil sera en R ou en N, la Terre étant en M ou en B, nous ne pourrons appercevoir qu'une certaine quantité de son hémisphere éclairé, & partant son disque sera altéré & paroîtra sous une phase différente de celle qu'on appercevoit, soit dans l'opposition, soit avant ou après sa conjonction au Soleil. On doit encore remarquer que vers le tems de l'opposition, Mars étant plein & en même-tems fort proche de la

* *Gibbosus.* Il en faut néantmoins excepter Mars dont le disque lumineux paroit un peu entamé lorsque cette Planete paroit à 90° du Soleil. PLANCHE VI. *Fig.* 1.

Terre, cette Planete paroîtra pour lors à nos yeux très-éclatante, parfaitement ronde, & beaucoup plus lumineuse que dans toute autre situation.

Les Planetes supérieures paroissent bien plus grandes au tems de leur opposition que vers leur conjonction au Soleil.

Cette différence d'éclat que nous venons de remarquer ici à l'égard de Mars convient aussi aux deux autres Planetes supérieures, qui paroissent en effet au tems de leur opposition beaucoup plus grandes & plus éclatantes que vers le tems de leur conjonction au Soleil. Car elles sont véritablement bien moins éloignées dans l'un de ces deux cas que dans l'autre, la différence de leurs distances étant alors égale au diametre du grand orbe, c'est-à-dire, au diametre de l'orbe que parcourt la Terre autour du Soleil. Il y a cependant cette considération à faire ici, sçavoir que la différence qui en résulte a un beaucoup plus grand rapport au diametre de l'orbite de Mars qu'à celui des deux autres Planetes; d'où l'on voit que la diminution de grandeur apparente depuis l'opposition jusqu'à la conjonction, doit être bien plus sensible dans Mars qu'à l'égard de Jupiter & de Saturne. Aussi Mars se trouve-t'il cinq fois plus près de nous dans son opposition au Soleil qu'au tems de sa conjonction; & parce que le disque & l'éclat d'un corps lumineux quelconque augmente en raison doublée ou comme les quarrés de ses distances à mesure qu'il s'approche de nous; il faut donc conclurre que Mars au tems de son opposition paroîtra vingt-cinq fois plus grand & plus lumineux que vers sa conjonction au Soleil.

Différences très-sensibles dans la chaleur que les Planetes reçoivent du Soleil.

Jupiter étant environ cinq fois plus éloigné du Soleil que n'en est la Terre, le diametre apparent du Soleil, vu de Jupiter, ne paroîtra gueres que sous un angle de 6′. Et si l'on suppose que le Soleil nous paroisse à peu près sous un angle d'un demi-degré ou d'environ 30′, un Spectateur placé dans Jupiter appercevroit le Soleil vingt-cinq fois * plus petit que nous le voyons; d'où il suit que cette

* 5 × 5;

Planete ne ſçauroit recevoir que la vingt-cinquieme partie de la lumiere & de la chaleur que nous recevons ſur la Terre. Mais auſſi puiſque Saturne eſt dix fois plus loin du Soleil que nous, le Soleil n'y doit donc paroître que ſous un angle de trois minutes, c'eſt-à-dire ſous un angle environ deux fois plus grand que celui ſous lequel nous obſervons Venus lorſqu'elle eſt périgée. Ainſi le diſque du Soleil vu de Saturne paroît cent fois * plus petit que nous ne le voyons : or la lumiere & la chaleur que Saturne reçoit du Soleil doivent diminuer dans la même raiſon. On voit par là que les régions ſituées ſous l'Equateur de Saturne ſeront moins échauffées que nos zones glaciales.

* *Quarré de 10, c'eſt-à-dire*, 10 × 10.

Les Planetes ſupérieures vues du Soleil paroiſſant régulierement chaque jour s'avancer du même ſens, c'eſt-à-dire, ſelon une loi conſtante, en conſervant l'égalité des aires proportionnelles aux tems, il doit donc arriver de là que leur mouvement angulaire autour du Soleil paroîtra un peu inégal; car étant comme retardées aux environs de l'aphélie, elles doivent ſe mouvoir un peu plus lentement, & au contraire leur viteſſe augmentant vers le périhélie, elles doivent accélérer leur mouvement. Mais ces mêmes Planetes vues de la Terre ſembleront aſſujetties, en parcourant le Zodiaque, à de prodigieuſes inégalités, puiſqu'elles ne s'avanceront pas toujours d'Occident en Orient, comme ſemble l'exiger la loi de leur mouvement réel. En effet elles paroîtront rallentir leurs viteſſes juſqu'à devenir ſtationnaires & même rétrogrades, comme ſi leur mouvement changeoit de direction, paroiſſant alors emportées d'un ſens contraire, c'eſt-à-dire, vers l'Occident: ces mêmes Planetes après avoir paru quelque tems rétrogrades deviendront enſuite ſtationnaires & continueront enfin à reprendre leur véritable route, en s'avançant d'Occident en Orient. Il faut bien remarquer que le mouvement de la

Le mouvement des Planetes conſidéré, non du Soleil, mais de la Terre, eſt tout-à-fait irrégulier.

Terre autour du Soleil, que l'on a prouvé ci-dessus, étant une fois supposé, ces variétés apparentes de mouvemens & de vitesses s'expliquent d'une maniere fort simple, ce qui n'arriveroit pas si l'on négligeoit d'avoir égard au mouvement & aux divers lieux qu'occupe la Terre sur son orbite.

Soit *PQO* une partie du Zodiaque, *ABCD* l'orbite de la Terre, *EMGXZ* l'orbite d'une Planete supérieure, telle que Saturne, par exemple, en sorte que la Terre étant en *A* & Saturne en *E*, cette Planete vue de la Terre paroisse répondre au point *O* du Zodiaque. Il est certain que si Saturne n'a aucun mouvement, en ce cas celui qui est particulier à la Terre & qui la transporte en *B*, nous feroit paroître Saturne au point *L* du Zodiaque, comme si cet Astre eût en effet parcouru l'arc *OL* d'Occident en Orient, ou selon la suite des Signes. Mais puisque dans l'espace de tems que la Terre emploie à se mouvoir depuis *A* jusqu'en *B*, Saturne au lieu de rester immobile, se trouve transporté par son propre mouvement de *E* en *M*, paroissant alors en conjonction au Soleil; cette Planete vue de la Terre aura semblé parcourir l'arc *OQ* du Zodiaque, lequel est bien plus grand que l'arc *OL*. On voit par là que les Planetes supérieures au tems de leurs conjonctions au Soleil, paroissent se mouvoir plus rapidement qu'elles ne doivent en effet, leurs accélérations ou vitesses apparentes étant alors composées de celle qui dépend de leur mouvement propre autour du Soleil, & de la vitesse avec laquelle la Terre se meut dans le demi-cercle opposé autour du même centre. Cette régle est générale pour toutes les Planetes, sçavoir que lorsqu'elles sont parvenues à la plus grande distance où elles peuvent se trouver à l'égard de la Terre, & qu'elles sont en même tems en conjonction avec le Soleil, alors leur vitesse apparente est plus grande, c'est-à-dire, que leur vitesse apparente surpasse celles qu'elles ont effectivement ou qu'on leur attribueroit

PLANCHE VI. *Fig.* 2.

Quand est-ce que les Planetes supérieures sont directes & que leur mouvement paroit s'accélérer?

si la Terre demeuroit pour lors immobile au même point de son orbe. Qu'on suppose présentement la Terre parvenue au point *C* pendant que Saturne a parcouru l'arc *MG*, nous verrons par conséquent cette Planete au point *R* du Zodiaque. Mais quand la Terre sera en *K* & Saturne en *H*, la Terre parcourant alors l'arc de son orbe qui ne differe pas beaucoup de sa tangente qui prolongée passeroit par Saturne (ou, ce qui revient au même, la ligne droite qui joint les centres de Saturne & de la Terre étant pour lors à peu près une tangente de l'orbe terrestre), il est certain que nous verrons en ce cas Saturne répondre presqu'au même point *P* du Zodiaque : cette Planete sera donc alors stationnaire & doit rencontrer plusieurs jours de suite à très-peu-près les mêmes Etoiles fixes.

Des tems auxquels les Planetes supérieures doivent paroître stationnaires.

Ensuite la Terre étant parvenue en *D*, & Saturne qui est en *X* paroissant alors en opposition au Soleil, on doit l'appercevoir au point *V* du Zodiaque, de maniere que Saturne semblera avoir rétrogradé selon l'arc *PV*. Il est donc évident que les Planetes supérieures au tems de leur opposition au Soleil sont rétrogrades, & que leur mouvement apparent se fait alors contre l'ordre des Signes. Mais la Terre étant en *A* & Saturne en *Z*, on le doit voir dans sa station ; c'est-à-dire, qu'au point *N* du Zodiaque, Saturne sera stationnaire, & cela pour la seconde fois. Enfin la Terre quittant cette situation, Saturne continuera à paroître s'avancer selon l'ordre des Signes, & son mouvement se fera à l'ordinaire d'Occident en Orient.

Ce que l'on vient d'expliquer ici à l'égard de Saturne peut s'appliquer facilement aux deux autres Planetes Jupiter & Mars : on voit par là la raison pourquoi elles nous doivent paroître tantôt directes, stationnaires & rétrogrades, ensuite stationnaires & directes. Mais il y a ceci à remarquer que Saturne paroît plus souvent rétrograde que Jupiter, & la raison en est très-simple, Saturne s'avançant beaucoup

beaucoup moins vîte chaque année sur son orbite, que Jupiter dont le mouvement propre est plus sensible : or il suit de là que la Terre doit l'appercevoir plutôt en opposition au Soleil, & par conséquent plus souvent rétrograde. On concevra aisément la même chose à l'égard de Jupiter, qui doit paroître plus souvent rétrograde que Mars, parce que celui-ci ayant plus de viteſſe & un mouvement plus rapide, doit parcourir en effet un plus grand espace, en sorte qu'il faut à Mars un tems incomparablement plus long qu'à Jupiter pour reparoître en opposition au Soleil.

Effet de la Parallaxe de l'orbe annuel dans les Planetes.

Présentement soit AC un arc de l'orbe terrestre dont AN est la tangente : on suppose, que selon cette tangente, l'on puisse observer de la Terre successivement les trois Planetes supérieures, sçavoir Mars en ♂, Jupiter en ♃, & Saturne en ♄ : Soit aussi $KLMN$ un arc du Zodiaque. Il est évident que le lieu de Mars, vu du Soleil, seroit au point K, lequel représente par conséquent son lieu vrai ou héliocentrique. Mais parce que la Terre est en A, nous rapporterons le lieu apparent de Mars au point N du Zodiaque : ainsi le point N sera son lieu vu ou apparent. Semblablement Jupiter vu du Soleil paroîtroit en L, c'est-à-dire, dans son lieu vrai, quoique de la Terre il paroisse en N. Enfin Saturne observé du Soleil qui est au foyer de son orbite, paroîtroit en M, mais son lieu apparent dans le Zodiaque vu de la Terre répondra au point N. Ainsi les arcs KN, LN, MN, qui sont les différences entre les lieux vrais & apparens, sont nommés les Parallaxes de l'orbe annuel à l'égard de chacune de ces Planetes. Menant donc par le point S la ligne SO parallele à AN, on aura les angles $A♂S$, $A♃S$, $A♄S$ égaux aux correspondans KSO, LSO, & MSO, lesquels ont pour mesure les arcs KO, LO, & MO. Car l'angle ANS est égal à l'angle NSO sous lequel on verroit du Ciel étoilé le demi-diametre de l'orbe terrestre : mais ce demi-

PLANCHE VI. *Fig.* 4.

diametre AS de l'orbe n'eſt qu'un point relativement à la diſtance des Etoiles fixes, ou, ce qui eſt la même choſe, ce demi-diametre vu des Etoiles fixes ne ſçauroit paroître ſous aucun angle ſenſible ; il eſt donc vrai de dire que l'angle NSO, ou l'arc NO qui en eſt la meſure, ſe réduit à rien dans le Ciel étoilé ; & partant les points N & O peuvent être pris pour un ſeul & même point ; d'où il ſuit que les arcs KO, LO, MO diffèrent à peine des arcs KN, LN, & MN, & meſureront par conſéquent les angles $A\odot S$, $A\sharp S$, $A\flat S$. Or comme ces angles repréſentent les demi-diametres apparens de l'orbite terreſtre, ou vus de chaque Planete, il eſt donc vrai de dire, à l'égard des Planetes ſupérieures, que la Parallaxe de l'orbe annuel eſt toujours l'angle ſous lequel le demi-diametre du grand orbe ſeroit vu de la Planete ; enſorte que plus une Planete ſupérieure ſera proche de la Terre, plus cet angle deviendra ſenſible. Ainſi dans Mars la Parallaxe de l'orbe annuel eſt plus grande que dans Jupiter, de même que dans Jupiter elle eſt plus grande que dans Saturne ; enfin elle eſt inſenſible dans les Etoiles fixes.

Au reſte les angles $A\odot S$, $A\sharp S$, $A\flat S$, ſont à très-peu de choſe près les plus grandes élongations de la Terre au Soleil, relativement à chacune des trois Planetes ſupérieures. Cet angle dans Mars eſt d'environ 42°, & partant la Terre vue de Mars doit s'écarter un peu moins du Soleil que ne nous le paroît Venus. Dans Jupiter la plus grande élongation de la Terre au Soleil paroît de 11°, ce qui n'eſt pas la moitié de la plus grande élongation qui a été obſervée juſqu'ici dans Mercure à l'égard du Soleil. Enfin dans Saturne cet angle parallactique, ou la plus grande élongation de la Terre au Soleil n'excede pas 6°, c'eſt-à-dire, qu'elle n'eſt pas le quart de la plus grande élongation que nous obſervons dans Mercure à l'égard

du Soleil. C'eſt pourquoi Mercure étant rarement viſible à notre égard, on doit juger que la Terre doit l'être encore bien moins vue de Saturne, en ſorte qu'il pourroit très-bien ſe faire qu'un Obſervateur placé dans Saturne ignoreroit fort long-tems que notre Terre exiſte, & qu'elle décrit une orbite autour du Soleil, la Terre étant une fort petite Planete que vraiſemblablement il ſeroit très-difficile d'y découvrir.

Les Arcs de rétrogradation ſont bien plus grands à notre égard dans Mars que dans Jupiter, & dans celui-ci encore plus grands que dans Saturne.

On peut dire auſſi que la quantité dont Mars paroît rétrograder, eſt bien plus conſidérable que celle qui convient à Jupiter, de même que celle-ci excede à ſon tour l'arc ſous lequel Saturne nous paroît rétrograde. Cela eſt fondé ſur deux cauſes, dont l'une eſt que Mars eſt plus près de la Terre que n'en eſt Jupiter, & celui-ci plus près que Saturne; l'autre cauſe vient de ce que la plus proche de ces trois Planetes eſt celle qui a le mouvement le plus rapide.

La Parallaxe de l'orbe annuel étant une fois connue dans chaque Planete, on a dès-lors leurs diſtances relatives à l'égard du Soleil.

La Parallaxe de l'orbe annuel étant une fois connue dans les Planetes, on a dès-lors le rapport de leurs diſtances à celle de la Terre au Soleil. Car ſuppoſons qu'à l'égard de Mars on connoiſſe l'angle $A \sigma S$, qui eſt la Parallaxe de l'orbe annuel dans cette Planete, comme il n'y a preſqu'aucune difficulté à déterminer l'autre angle $\sigma A S$, ſoit par obſervation, ſoit par le calcul, cet angle étant l'élongation de la Planete au Soleil, on pourra faire cette analogie. Comme le ſinus de la Parallaxe de l'orbe annuel eſt au ſinus de l'élongation de Mars au Soleil, ainſi SA diſtance de la Terre au Soleil, eſt à un quatrieme terme, qui ſera la diſtance de Mars au Soleil. On doit remarquer ici que cette Parallaxe du grand orbe qui nous fait paroître les Planetes s'avancer plus ou moins vîte dans le Ciel (puiſqu'elles ſemblent aller tantôt vers l'Orient & tantôt vers l'Occident) eſt l'unique cauſe d'une inégalité qui trouble leur mouvement réel, que tous les Aſtronomes ont enfin reconnue & qu'ils ont bien ſoin de

De la seconde inégalité dans les mouvemens apparens des Planetes, & que les Astronomes appellent inégalité optique.

distinguer, l'appellant *inégalité optique*, ou *inégalité seconde :* en effet elle doit être séparée de la premiere inégalité, laquelle est réelle & se trouve toujours dans les Planetes, puisque leur mouvement, comme on l'a suffisamment expliqué ci-dessus, est alternativement un peu accéléré ou retardé à chaque révolution périodique. Cette inégalité optique ou parallaxe disparoît néantmoins dans les conjonctions ou oppositions des Planetes au Soleil; ou du moins c'est dans ces cas-là principalement que les Astronomes ont coutume d'observer le lieu des Planetes, puisque leur longitude géocentrique est pour lors exactement la même que la longitude héliocentrique, ou qui seroit vue du foyer de la Planete.

Des Satellites de Jupiter & de Saturne.

Enfin les deux plus élevées de nos Planetes supérieures sont accompagnées de plusieurs Lunes ou Satellites, Jupiter en ayant quatre & Saturne cinq. Cette multitude de Lunes doit y produire un spectacle merveilleux. En effet chacun de ces Satellites faisant diverses révolutions autour de sa Planete principale, ne paroît pas s'en éloigner au-delà de certaines bornes, mais l'accompagne à mesure qu'elle tourne autour du Soleil; d'où il arrive que chaque fois qu'un Satellite approchera de son opposition au Soleil, il paroîtra sous des phases différentes de même que la Lune; car dans l'opposition le Satellite vu de la Planete principale, paroîtra en entier, son disque étant alors plein & très-lumineux : en un mot son disque doit s'altérer ensuite, paroître en Quartier, & enfin en Croissant, à mesure que ce Satellite approchera de sa conjonction, où il cessera de se montrer jusqu'à ce que vers le commencement d'une autre révolution synodique il reparoisse sous de nouvelles phases.

Quoique ces Satellites vus de la Terre ne semblent jamais s'écarter beaucoup de leur Planete principale, cependant on s'apperçoit qu'alternativement ils s'en éloi-

gnent & s'en approchent. Soit *ABT* l'orbe terreſtre dont le Soleil occupe le centre, *EF* un arc de l'orbite de Jupiter, cette Planete étant ſuppoſée en ♃ au centre des cercles que parcourent les quatre Lunes ou Satellites; il eſt évident que quand ces Satellites parcourent la partie inférieure de leur orbite *LMN*, ils paroîtront vus de la Terre ou du Soleil s'avancer vers l'Occident; & qu'au contraire lorſqu'ils parcourront la partie ſupérieure *GHK* de leurs orbites, ils paroîtront ſe mouvoir dans leur ſens naturel, c'eſt-à-dire vers l'Orient. Or lorſque ces Satellites paroiſſent ſe mouvoir vers l'Orient, il arrive que nous les perdrons deux fois de vue, étant cachés d'abord en *O* par l'interpoſition du corps de Jupiter, parce qu'ils ſont alors dans la ligne droite qui paſſe par les centres de la Terre & de Jupiter. Enſuite ils diſparoîtront dans l'ombre de Jupiter, ces ſecondes occultations étant proprement leurs véritables Eclipſes. Ce phénomene arrivera toutes les fois que Jupiter ſe trouvera directement entre ces Lunes & le Soleil, c'eſt-à-dire, au moment qu'elles ſeront pleines, ou plutôt lorſqu'elles ſeront entierement privées de lumiere, comme il arrive à notre Pleine Lune, qui s'éclipſe dans l'ombre de la Terre, lorſqu'au moment de ſon oppoſition au Soleil, elle n'a qu'une très-petite latitude. PLANCHE VI. *Fig.* 5.

Quand Jupiter eſt plus oriental que le Soleil, ou qu'on l'apperçoit vers le commencement de la nuit, la Terre étant, par exemple, en *A*, les Satellites paroiſſent alors ſe cacher derriere Jupiter, & cela à cauſe de leur conjonction apparente au diſque de cet Aſtre, ce qui arrive aſſez long-tems avant que ces Satellites entrent dans l'ombre: enſuite ils s'y plongent peu à peu. Mais au contraire quand Jupiter eſt plus occidental que le Soleil, c'eſt-à-dire, quand immédiatement après ſa conjonction cette Planete eſt ſortie de ſes rayons; en un mot lorſqu'on

l'observe le matin du côté de l'Orient, la Terre étant en ce cas en *B*, alors les Satellites paroissent entrer dans l'ombre de Jupiter, sçavoir en *V*, long-tems avant que de se cacher en *P* derriere le disque de Jupiter. Enfin lorsque ces Satellites ou Lunes sont rétrogrades à notre égard, c'est-à-dire, lorsque parcourant la partie inférieure de leur orbite, ils tendent vers l'Occident, alors ces Satellites ne se cachent plus qu'une fois, pour ainsi dire, sçavoir lorsqu'ils sont confondus avec le disque de Jupiter, sur lequel on ne les peut distinguer que très-difficilement chaque fois qu'ils le traversent. Au reste si du Soleil on les observoit dans leur conjonction inférieure avec Jupiter, ou, ce qui revient au même, si de Jupiter ces Satellites paroissoient passer sur le Soleil, leur ombre tomberoit pour lors nécessairement sur Jupiter, en sorte qu'une petite partie de la surface de cet Astre seroit éclipsée; de cette maniere ceux qui se trouveront dans les lieux du disque traversés par cette ombre, observeront une Eclipse de Soleil. Enfin nous ne répeterons pas ici quelles sont les distances ni les périodes des Satellites de Jupiter & de Saturne, puisque le détail s'en trouve au troisieme Chapitre.

Premiere utilité qu'on a retirée des Eclipses des Satellites de Jupiter.

Par les mouvemens observés & par les Eclipses des Satellites, on peut découvrir assez exactement la Parallaxe de l'orbe annuel, & par conséquent la distance de Jupiter au Soleil. Car soit *P O R* l'orbite du quatrieme Satellite, soit aussi la Terre au point *A* de son orbe, on observera le moment auquel ce Satellite se cache derriere Jupiter en *O*; c'est-à-dire, qu'en prenant le milieu des tems auxquels il disparoit & paroît alternativement derriere cet Astre, on connoîtra l'instant auquel ce Satellite s'est trouvé dans la ligne droite qui passe par les centres de la Terre & de Jupiter. De même observant le tems auquel le Satellite se trouve au milieu de l'ombre lorsqu'il est éclipsé en *V*, on aura par conséquent l'intervalle de tems qu'il aura em-

Les Astronomes s'en sont servis pour découvrir la Parallaxe de l'orbe annuel dans Jupiter, comme aussi la vraie distance de cette Planete au Soleil.

ployé à parcourir l'arc OV: or ſuppoſant d'ailleurs ſon mouvement autour de Jupiter égal ou uniforme, on connoîtra donc l'arc OV, puiſque ce Satellite acheve ſa révolution autour du Soleil en 402 heures qui répondent à 360°. Ainſi dans la ſuppoſition que le quatrieme Satellite ait employé 12 heures à ſe mouvoir de O en V, on fera comme 402 heures ſont à 12 heures, ainſi 360° à un quatrieme terme, ſçavoir 10° 44′: l'arc OV ſera donc de 10°44′. Mais l'arc OV eſt la meſure de l'angle $O\,\mathcal{Y}\,V$, ou de ſon oppoſé au ſommet $A\,\mathcal{Y}\,S$, qui eſt la meſure de la parallaxe de l'orbe annuel dans Jupiter. Connoiſſant donc cette Parallaxe, on réſoudra le Triangle $A\,\mathcal{Y}\,S$ dans lequel l'angle à $\mathcal{Y}$ eſt donné: on a de plus par obſervation l'angle en A, qui eſt l'élongation de Jupiter au Soleil vu de la Terre, l'on pourra donc réſoudre le Triangle en ſuppoſant le côté AS égal à la moyenne diſtance de la Terre au Soleil, de 100000; car tous les angles & un côté étant connus, on aura par la Trigonométrie rectiligne le côté $S\,\mathcal{Y}$ diſtance de Jupiter au Soleil, comme auſſi le côté $A\,\mathcal{Y}$, qui eſt la diſtance de cette Planete à la Terre. Que ſi l'on vouloit parvenir à connoître ces diſtances avec la plus grande exactitude, il faudroit réitérer un grand nombre de fois les Obſervations, & y employer les meilleures & même les plus grandes lunettes d'approche.

Le mouvement de la Lumiere ſe fait ſucceſſivement, & par conſéquent n'eſt pas inſtantané comme les Sectateurs de Deſcartes l'ont ſi long-tems prétendu.

Les Eclipſes des Satellites de Jupiter ont été d'une utilité merveilleuſe pour réſoudre l'une des plus belles queſtions de la Phyſique céleſte. Il s'agiſſoit de décider, *Si la lumiere étoit inſtantanée, ou ſi ſon mouvement devoit ſe faire ſucceſſivement.* Or il eſt démontré par les Eclipſes des Satellites, que c'eſt envain qu'on a prétendu que la lumiere étoit inſtantanée, quoique d'ailleurs ce mouvement ſoit très-rapide, la lumiere venant à nous avec une viteſſe qui doit nous étonner: en voici la démonſtration.

Si la lumiere ne venoit pas à nous ſucceſſivement,

mais qu'elle fût instantanée, il est évident que la Terre étant en *T* dans sa plus grande distance de Jupiter, on appercevroit l'Eclipse du Satellite au même instant que si la Terre étoit en *X*, c'est-à-dire, dans sa plus petite distance à Jupiter; puisque selon la supposition que l'on vient de faire, la lumiere se répandroit à des distances infinies & au même instant dans tous les espaces. Mais si au contraire la propagation de la lumiere se fait successivement ou d'une maniere qui nous soit sensible; il est évident qu'un Observateur placé en *X* étant plus près de Jupiter (de la distance *XT* égale au demi-diametre du grand orbe) qu'un autre placé en *T*, il appercevroit plutôt l'Eclipse du Satellite, qu'elle ne seroit observée du point *T*; en sorte que par le moyen de l'intervalle de tems écoulé & comparé à la distance *XT*, on connoîtroit la viteſſe de la lumiere qui convient à cette distance, laquelle répond à un tems déterminé, & à proportion le tems qui doit répondre à tout autre espace proposé. Or c'est précisément ce que les Observations ont fait découvrir, puisque toutes les fois que la Terre s'approche de Jupiter, les Eclipses des Satellites arrivent tous les jours un peu plutôt que quand elle s'en éloigne vers *T*. Car on s'apperçoit peu-à-peu d'une différence entre le calcul & les observations, qui devient assez considérable. Les Eclipses de Satellites ayant donc ainsi paru plusieurs années de suite anticiper chaque jour pendant près de six mois & retarder au contraire dans les autres saisons de l'année, M. de *Roëmer* * a été incontestablement le premier qui ait démontré que ce Phénomene établissoit

*Dans le Journal des Sçavans du 7 Décembre 1676 on lit ce qui suit, pag. 235 » La nécessité de cette nouvelle Equation du retardement de la Lumiere, est établie par toutes les Observations faites à l'Académie & à l'Observatoire depuis » 8 ans, & nouvellement elle a été confirmée par l'Emersion du premier Satellite » observé à Paris le 9 Novembre dernier à 5h 35' 45" du soir, 10 minutes plus » tard qu'on n'eut du l'attendre en la déduisant de celles qui avoient été observées » au Mois d'Août, lorsque la Terre étoit beaucoup plus proche de Jupiter; ce » que M de Roëmer avoit prédit à l'Académie dès le commencement de Sep- » tembre.

le

le mouvement successif de la lumiere. Et quoique depuis la découverte de l'Aberration des Etoiles fixes faite il y a environ vingt ans, cette fameuse question ait été pleinement décidée, il est cependant vrai de dire que la plupart des Astronomes & des Philosophes avoient depuis long-tems adopté la démonstration de M. de Roemer que l'on vient de rapporter. Car il faut sçavoir que l'on avoit déja établi une premiere inégalité apparente dans les retours des Satellites à l'ombre de Jupiter, laquelle répondoit à l'excentricité de Jupiter, & qui pouvoit produire une équation tantôt additive, & tantôt soustractive, dont la plus grande montoit à $0^h\ 39'\ 08''$, pour le premier Satellite, & pour les trois autres à $1^h\ 18'\ 35''$; $2^h\ 38'\ 27''\frac{1}{2}$; $6^h\ 10'\ 26''\frac{1}{2}$. Cette premiere inégalité dépendoit uniquement de l'excentricité, & devoit répondre à la plus grande équation du centre de Jupiter, laquelle étant de $5°\ 31'\frac{1}{2}$, lorsque cette Planete se trouve dans ses moyennes distances, il faut nécessairement que chaque Satellite parcourre dans son orbe un arc de pareille grandeur, lorsqu'il s'agit de réduire les conjonctions moyennes aux véritables. Le calcul de cet élément (& des autres équations pour le Ier Sat. pag. 310) est facile, puisque ces Satellites font leurs révolutions de 360°, dans les intervalles de tems qu'on a rapportés vers la fin du IIIe Chapitre. Or après avoir exposé la nécessité d'employer cette premiere inégalité à laquelle il faut toujours avoir égard dans le calcul des conjonctions des Satellites, comme aussi à l'équation du tems Astronomique (dont tous les Astronomes sont enfin convenus depuis que Flamsteed l'a démontrée en 1672, de la maniere qu'on le trouvera expliqué au Chapitre XXVI,) on trouve que M. Cassini assure dans un Discours publié en l'année 1693, en même tems que la seconde édition de ses Tables, « Qu'après » cette équation il reste encore d'autres inégalités dans les

Les deux démonstrations ingénieuses qu'en ont données MM. de Roemer & Bradlei.

L'excentricité de l'orbite de Jupiter, produit une premiere inégalité ou équation dans chaque retour des Satellites à l'ombre de Jupiter.

» mouvemens des Satellites de Jupiter, qui sont différentes » en chacun d'eux ». Il ajoute encore : » Dans la construc- » tion de mes premieres Tables le mouvement du quatrie- » me Satellite me parut plus égal que celui de tous les » autres, & le premier Satellite me parut approcher de » l'égalité du quatrieme. Je remarquai que dans le second » & le troisieme il y avoit des inégalités plus considéra- » bles; & j'avouai que dans les Ephémérides je m'étois » servi de certaines équations empiriques qui m'étoient » connues par les observations, sans que j'en eusse encore » pu découvrir les causes. M. de Roemer * expliqua très- » ingénieusement une de ces inégalités qu'il avoit obser- » vées pendant quelques années dans le premier Satellite, » par le mouvement successif de la lumiere, qui demande » plus de tems à venir de Jupiter à la Terre, lorsqu'il en » est plus éloigné, que lorsqu'il en est plus près; mais il » n'examina pas si cette hypothese s'accommodoit aux au- » tres Satellites ».

La seconde inégalité, dans les Eclipses ou retours du Ier Satellite à l'ombre de Jupiter, dépend du mouvement successif de la lumiere.

M. Hallei a répondu à ces derniers articles, n'ayant pu s'empêcher de témoigner son étonnement sur ce que M. Cassini nous dit : « Il m'est arrivé souvent qu'ayant éta- » bli les époques des Satellites dans les oppositions avec » le Soleil où les inégalités synodiques doivent cesser, » & les ayant comparées ensemble pour avoir le moyen » mouvement, lorsque je calculois sur ces époques & sur » ce moyen mouvement les Eclipses arrivées près de l'une » & de l'autre quadrature de Jupiter avec le Soleil; le » moyen mouvement calculé aux tems de ces quadratu- » res, s'est trouvé différer d'un degré entier ou un peu » plus, du vrai mouvement trouvé par les observations » immédiates; de sorte que les Satellites dans les quadra-

Cette seconde inégalité differe de la premiere, en ce qu'elle n'est pas proportionnelle aux tems des révolutions, étant exactement la même pour les trois autres Satellites.

* On ne sçauroit contester à M. de Roemer cette découverte, puisque le passage qu'on lui oppose de l'Histoire Latine de M. Duhamel, est non-seulement sans date * mais encore inintelligible. Il faudroit qu'on y lût conformément à la copie originale *Ex. gr. Emersio Primi* Proxima 16 *Novembris* (*anni* 1676) 10 *circiter minutis tardius* accidet *quàm indicat calculus qui eam vulgari modo deducti ex emersionibus factis statim post oppositionem Jovis*, mense Julio vel Augusto.

* *Voyez le Journal des Sçavans.*

» tures avoient environ un degré d'équation soustractive à » l'égard du moyen mouvement établi dans les opposi- » tions; d'où l'on pourroit inférer que cette équation seroit » doublée dans les conjonctions ».

Il suit de-là, selon M. Hallei, qu'au lieu de 14′, 10″, que M. Cassini a établi pour la seconde équation du premier Satellite dans les conjonctions, on auroit à proportion 28′ 27″ pour le second Satellite, & que pour les deux autres la seconde équation monteroit à 57′ 22″ & 2ʰ 14′ 07″; au lieu que si la seconde équation dépend du mouvement successif de la lumiere, elle sera la même pour tous les Satellites.

Calcul de la seconde inégalité, proposé par M. Hallei.

Or l'an 1676, l'émersion du troisieme Satellite de l'ombre de Jupiter observée à Paris le 14 Novembre à 6ʰ, 5′, 55″, de tems moyen, a été déterminée 43 jours, 0ʰ, 6′, 18″, après une semblable émersion qui se trouve avoir encore été observée par M. Cassini au commencement d'Octobre. Cet intervalle de tems surpasse six moyennes révolutions du Satellite de 8′ 22″: mais à cause de la Iʳᵉ équation & de la durée, &c. il en faut ôter 4′ 27″, de maniere qu'à peine reste-t-il 4′ pour la seconde équation, c'est-à-dire, environ $0'\frac{3}{4}$ de moins que selon le calcul du mouvement successif de la lumiere, ce qui peut être attribué facilement aux petites erreurs des observations. Mais au lieu de 4′ on auroit dû trouver, suivant les suppositions de M. Cassini, $18'\frac{2}{3}$, c'est-à-dire, l'intervalle entre les observations beaucoup plus grand d'environ un quart d'heure.

Cela paroît encore plus évident à l'égard du quatrieme Satellite, car selon les observations de Flamsteed faites à Greenvich en 1682 le 24 Septembre, vieux stile, à 17ʰ 32′, ou 30′ de tems moyen, le Satellite a paru sortir de l'ombre; & après un intervalle de 83ʲ 17ʰ 48′, sçavoir, le 17 Décembre on a observé une semblable émersion. Or si l'on suppose, selon M. Hallei, que le

Satellite a dû achever cinq moyennes révolutions en 83 jours $18^h\ 25'\frac{1}{2}$, il n'y auroit donc qu'un excès sur l'observation de $37'\frac{1}{2}$ à distribuer aux différentes inégalités qui ont dû affecter le Satellite. Il en faut d'abord attribuer $21'$ à la premiere équation, ce qui réduit à $18'\frac{1}{2}$ la seconde inégalité (d'autant que la durée de la derniere Eclipse a dû être plus grande, Jupiter approchant de son nœud descendant, & qu'ainsi au lieu de supposer $21'$ pour la premiere équation, on pourroit ne compter seulement que $19'$.) Et comme la Terre a dû approcher pendant ce tems-là de Jupiter d'un peu plus que le Rayon de son orbe, on auroit dû trouver $1^h\ 20'\frac{1}{2}$ d'excès, selon les suppositions de M. Cassini : mais puisqu'on n'a trouvé que $18'\frac{1}{2}$, cette différence, quoiqu'un peu trop grande, ne s'écarte pas beaucoup du calcul fondé sur la théorie de la succession de la lumiere. On remarquera que la plus grande équation possible du premier Satellite de Jupiter, qui convient au diametre de l'orbe terrestre, est selon M. Cassini, qui s'étoit fondé sur un grand nombre d'observations, de $14'\ 10''$; que M. de Roemer l'a faite beaucoup trop grande; & qu'enfin, selon la découverte de M. Bradlei, elle doit être exactement de $16',\ 15''$. Il est donc aisé de voir par le calcul rapporté ci-dessus, que la seconde équation est la même, tant à l'égard du premier que du quatrieme Satellite, & qu'elle dépend en effet du mouvement successif de la lumiere; car l'observation du mois de Décembre ayant été faite seulement une demi-heure avant le lever du Soleil, on peut attribuer, selon M. Hallei, une partie de l'erreur au défaut de l'observation, d'autant que la seconde équation, qui est celle de la lumiere, n'a dû être tout au plus que de $10'$, si l'on considere le chemin que la Terre a parcouru sur son orbe dans l'espace de près de 84 jours.

Il est difficile de s'accoutumer d'abord à comprendre

comment en si peu de tems la lumiere parcourt un si grand espace, sa viteſſe étant si prodigieuſe qu'elle ſurpaſſe preſqu'infiniment la viteſſe des corps que nous voyons ſe mouvoir avec le plus de rapidité. Sans donc nous arrêter à une comparaiſon trop vague que Keill a alléguée ſur la viteſſe de la lumiere, on peut calculer (*Planche II. Fig.* 3.) quel eſt l'eſpace *a b* que parcourt la Terre ſur ſon orbe pendant que la lumiere traverſe l'intervalle *c b* égal au rayon de l'orbe annuel; ce qui eſt facile, puiſque l'angle *b c a* eſt donné par l'obſervation de la plus grande aberration poſſible des Etoiles, ſçavoir, de 20″. On fera donc, comme le rayon, eſt à la tangente de 20″, ainſi *c b*, eſt à un quatrieme terme qui ſera la valeur de la petite tangente *a b* de l'orbe terreſtre, laquelle ſe trouve excéder un peu la dix-millieme partie de la moyenne diſtance de la Terre au Soleil *A B* ou *A b*, puiſqu'elle en eſt la $\frac{1}{10313}$ partie. C'eſt pourquoi la Terre parcourant 360° en 365 jours $\frac{1}{4}$, & à proportion un arc de 57°, 29575 (égal au rayon de l'orbe annuel) dans l'eſpace de 58 jours, 131 ou de 83709′, il s'enſuit que la $\frac{1}{10313}$ partie de ce dernier nombre, ſçavoir, 8′, 12 ou 8′ 7″$\frac{1}{2}$, ſera la viteſſe que la lumiere des Etoiles doit employer à traverſer le demi-diametre de l'orbe annuel.

Calcul de la viteſſe de la lumiere & du tems qu'elle emploie à traverſer le demi diametre de l'orbe annuel, ſelon la Théorie de l'aberration.

Quant aux Satellites de Saturne, M. Huygens qui découvrit d'abord celui qu'on nomme actuellement le quatrieme, en avoit ébauché la Théorie, & donné des Tables en 1659, dont les époques ont été corrigées dans la ſuite, & les moyens mouvemens un peu mieux déterminés. C'eſt ce même Satellite qui fit enfin connoître à M. Huygens la figure ou le vrai ſyſteme de l'anneau, & cela bien peu de tems après en avoir fait la découverte. M. Hallei en reſtitua auſſi le moyen mouvement par quelques obſervations des années 1682 & 1683; mais il s'eſt apperçu dans la ſuite qu'il le falloit ſuppoſer moins rapide d'environ

6′ par an, que dans les Tables qu'il en avoit d'abord publiées, & qui étoient déja un peu plus correctes que celles qu'on trouve dans le *Syſtema Saturnium*.

La Théorie générale des Satellites.

La méthode dont s'eſt ſervi M. Huygens pour déterminer le tems de la révolution périodique du Satellite de Saturne, & qu'il a démontrée dans ſon Livre, a dû s'appliquer de la même maniere aux autres Satellites: c'eſt pourquoi nous croyons devoir la rapporter ici.

On ſuppoſe que les Satellites décrivent autour de la Planete principale des cercles ou des orbites qui ne ſont pas ſenſiblement excentriques.

PLANCHE VI. *Fig.* A.

Soit *AFB* l'orbite de Saturne, *S* le Soleil, *a* le lieu de la Terre au moment que le Satellite a paru dans ſon Périgée ou dans ſa conjonction inférieure *P*; ſçavoir, le 23 Mars 1656; *b* le lieu de la Terre lorſqu'après 68 révolutions ce Satellite a paru encore dans ſa conjonction inférieure en *p* le 14 Mars 1659. Comme d'une conjonction inférieure à la ſuivante, M. Huygens avoit remarqué qu'il s'écouloit environ 16 jours, voici de quelle maniere il eſt parvenu à établir avec exactitude la révolution périodique de cette Planete. Ayant mené *AE* parallele à *Ba*, il eſt évident que ſi le Satellite, au lieu de paroître en *p*, eût été vu en *E*; il s'enſuivroit que dans l'eſpace de 1086 jours il auroit paru vu du centre de Saturne parcourir 68 fois ſon orbite relativement aux Etoiles fixes, puiſqu'en effet les lignes paralleles *Ba*, *AE*, doivent néceſſairement répondre au même point du Ciel. Mais comme le Satellite a décrit de plus l'arc *Ep*, qui contient autant de degrés que Saturne vu du Soleil (ou ce qui revient preſque au même, vu de la Terre) en a parcouru ſur ſon orbite dans l'eſpace d'environ trois années, ou de 1086 jours, & qu'ainſi l'angle *pAE* eſt ſenſiblement égal à celui que forment les lignes *aB*, *bA*, il eſt facile en conſultant les Ephémérides de trouver la valeur de l'arc *Ep*, qui étant, ſelon M. Huygens, de 40° 48′, on fera, ſi en 1068 jours le Satellite a achevé 68 révolutions, & de plus 40° 48′, c'eſt-à-dire, 24520° 48′, combien doit-il parcourir en un jour? On trouvera 22° 34′ 44″,

pour le mouvement diurne de Saturne à l'égard des Etoiles fixes. Si l'on fait encore, comme 24520° 48′, sont à 1086 jours, ainsi 360°, à un quatrieme terme ; on aura la révolution périodique du Satellite de $15^j\ 22^h\ 39'$. Enfin le moyen mouvement diurne de Saturne étant de 2′, M. Huygens établit le moyen mouvement diurne du Satellite vu du Soleil de 22° 32′ 44″, & sa révolution synodique de $15^j, 23^h, 13'$.

Dans le calcul on a négligé de réduire les lieux vus du Satellite aux longitudes qui doivent être comptées selon le plan de l'anneau, & non pas relativement au plan de l'Ecliptique ou de l'orbite de Saturne. Or pour que la méthode prise dans le cas le plus simple, tel qu'on vient de le proposer ci-dessus, fût absolument exacte, il auroit fallu choisir deux situations de Saturne en opposition au Soleil, où le Satellite paroissant, soit dans son Apogée, soit dans son Périgée, se fût trouvé en même tems à mêmes distances des nœuds de l'anneau, comme aussi autant qu'il est possible vers les limites de l'orbite de Saturne. Car le plan de l'anneau de Saturne, qui ne paroît pas différer bien sensiblement du plan de l'orbite du Satellite, est incliné de $23°\frac{1}{2}$ au plan de l'Ecliptique, son nœud ascendant & descendant étant en 1655, selon M. Huygens, au $20°\frac{1}{2}$ de la Vierge & des Poissons. Or de même que l'ascension droite observée du Soleil differe quelquefois beaucoup de sa longitude, & qu'on se tromperoit si l'on vouloit substituer l'un pour l'autre, ou sans faire aucune réduction, de même le lieu apparent du Satellite observé doit différer sensiblement de sa longitude réduite au plan de l'anneau. Ainsi il a fallu y avoir égard toutes les fois que l'on a comparé deux conjonctions Apogées ou Périgées qui ne répondoient pas précisément aux mêmes distances de ces nœuds ; & c'est ce qui a été pratiqué d'abord par M. Hallei, & ensuite par M. Pound, dont nous donnons ici les Tables réduites & corrigées.

Le lieu du nœud de l'Anneau, est le même que celui de l'orbite du quatrieme Satellite de Saturne.

TABLES
DES MOYENS MOUVEMENS
DU IV. SATELLITE
DE
SATURNE,
Découvert par M. HUYGENS *en* 1655.

Années Gregor.	Epoques. S. D. M.
1641	1 16 53
1661	3 27 28
1681	5 12 03
1701	6 04 03
1721	7 18 38
1741	9 03 13
1746	3 08 43
1747	1 29 18
1748 B	0 19 53
1749	0 03 03
1750	10 23 38
1751	9 14 13
1752 B	8 04 48
MOIS.	S. D. M.
Janvier.	0 00 00
Fevrier.	11 09 54
Mars.	8 12 02
Avril.	7 21 55
Mai.	6 09 14
Juin.	5 19 07
Juillet.	4 06 26
Août.	3 16 18
Septemb.	2 26 12
Octobre.	1 13 30
Novemb.	0 23 24
Decemb.	11 10 42

Années.	Moyens mouvem. S. D. M.
1	10 20 35
2	9 11 10
3	8 01 45
4	7 14 55
5	6 05 30
6	4 26 05
7	3 16 40
8	2 29 50
9	1 20 25
10	0 11 00
11	11 01 35
12	10 14 45
13	9 05 20
14	7 25 55
15	6 16 30
16	5 29 40
17	4 20 15
18	3 10 50
19	2 01 25
20	1 14 35
40	2 29 10
60	4 13 45
80	5 28 20
100	7 12 55
120	8 27 30
140	10 12 5
160	11 26 40

Jours.	Moyens mouvem. S. D. M.
1	0 22 35
2	1 15 09
3	2 07 44
4	3 00 18
5	3 22 53
6	4 15 28
7	5 08 02
8	6 00 37
9	6 23 12
10	7 15 46
11	8 08 21
12	9 00 55
13	9 23 30
14	10 16 05
15	11 08 39
16	0 01 14
17	0 23 48
18	1 16 23
19	2 08 58
20	3 01 32
21	3 24 07
22	4 16 42
23	5 09 16
24	6 01 51
25	6 24 25
26	7 17 00
27	8 09 35
28	9 02 09
29	9 24 44
30	10 17 18

Moyens mouv. H.	M.	Minutes	Moyens mouvem. M. S.
1	0	56	31 29 10
2	1	53	32 30 06
3	2	49	33 31 03
4	3	46	34 31 59
5	4	42	35 32 55
6	5	39	36 33 52
7	6	35	37 34 48
8	7	31	38 35 45
9	8	28	39 36 41
10	9	24	40 37 38
11	10	21	41 38 34
12	11	17	42 39 31
13	12	14	43 40 27
14	13	10	44 41 24
15	14	07	45 42 20
16	15	03	46 43 17
17	16	00	47 44 13
18	16	56	48 45 10
19	17	52	49 46 06
20	18	49	50 47 03
21	19	45	51 47 59
22	20	42	52 48 56
23	21	38	53 49 52
24	22	35	54 50 49
25	23	31	55 51 45
26	24	27	56 52 42
27	25	24	57 53 38
28	26	20	58 54 35
29	27	17	59 55 31
30	28	13	60 56 27

Dans l'année Biſſextile, après le mois de Fevrier, il faudra ajouter un jour.

Le mouvement de ce quatrieme Satellite ſe faiſant dans le plan de l'Anneau, lequel eſt à très-peu près parallele au plan de l'Equateur terreſtre, c'eſt-à-dire, incliné de 23°½ au plan de l'Ecliptique, on pourra calculer par le moyen de ces Tables, les conjonctions & autres configurations du Satellite, ſi l'on ſuppoſe que les nœuds tant de l'anneau que de l'orbite du Satellite, ſe trouvoient en 1700 au 20° de la Vierge & des Poiſſons.

EPOQUES

EPOQUES
DES CONJONCTIONS MOYENNES
DU PREMIER SATELLITE
DE
JUPITER
AU MERIDIEN DE PARIS.

Années	Conjonctions. J. H. M. S.	Nomb. A.	Nomb. B.
1719	1 15 29 17	870	369
1720	1 05 40 44	954	283
1721	1 14 20 48	038	202
1722	1 04 32 15	122	116
1723	0 18 43 41	206	030
1724	0 08 55 10	290	939
1725	0 17 35 14	375	862
1726	0 07 46 41	459	776
1727	1 16 26 45	544	695
1728	1 06 38 12	628	609
1729	1 15 18 16	713	527
1730	1 05 29 43	897	441
1731	0 19 41 10	881	355
1732	0 09 52 38	965	269
1733	0 18 32 42	050	188
1734	0 08 44 10	134	102
1735	1 17 24 13	218	020
1736	1 07 35 41	303	934
1737	1 16 15 44	387	853
1738	1 06 27 12	471	767
1739	0 20 38 40	555	681
1740	0 10 50 08	640	595
1741	0 19 30 11	724	514
1742	0 09 41 39	808	427
1743	1 18 21 41	893	346
1744	1 08 33 09	970	260
1745	1 17 13 12	061	178
1746	1 07 24 40	145	092
1747	1 21 36 07	229	006
1748	0 11 47 35	314	920
1749	0 20 27 38	398	839

Années	Conjonctions. J. H. M. S.	Nomb. A.	Nomb. B.
1749	0 20 27 38	398	839
1750	0 10 39 05	483	752
1751	0 00 50 33	567	666
1752	1 09 30 37	651	585
1753	1 18 10 41	736	504
1754	1 08 22 09	820	418
1755	0 22 33 36	904	331
1756	0 12 45 03	989	245
1757	0 21 25 08	073	164
1758	0 11 38 33	157	078
1759	0 01 48 01	241	992
1760	1 10 28 05	326	911
1761	0 00 39 33	409	824
1762	1 09 19 36	494	743
1763	0 23 31 04	578	657
1764	0 13 42 32	662	571
1765	0 22 22 35	747	490
1766	0 12 34 03	830	404
1767	0 02 45 30	915	318
1768	1 11 25 33	000	236
1769	0 01 37 01	083	150
1770	1 10 17 04	168	069
1771	1 00 28 32	252	983
1772	0 14 40 00	337	857
1773	0 23 20 04	421	815
1774	0 13 31 31	505	729
1775	0 03 42 59	591	643
1776	1 12 23 02	674	562
1777	0 02 34 29	758	475
1778	1 11 14 32	842	394
1779	1 01 26 00	927	308

L'Epoque véritable pour 1700, qu'on trouve en ajoutant l'Equation $0^h\ 39'\ 08''$ à $1^j\ 0^h\ 31' \frac{1}{4}$ seroit, selon les Elémens établis par M. Pound, de $0^h\ 06'$ moins avancée que selon les Tables de M. Cassini publiées en 1693. En 1719 on trouve $0^h\ 09'$ ou $0^h\ 48'' \frac{1}{2}$ de différence entre les Epoques des anciennes & des nouvelles Tables.

EPOQUES
DES CONJONCTIONS MOYENNES
DU PREMIER SATELLITE
DE
JUPITER
AU MERIDIEN DE LONDRES.

Années Jul.	Conjonctions. J. H. M. S.	Nomb. A.	Nomb. B.
1719	1 6 21 13	872	396
1720	0 20 22 40	956	310
1721	1 5 2 44	40	229
1722	0 19 14 11	125	143
1723	0 9 25 38	209	57
1724	1 18 5 42	293	971
1725	0 8 17 10	377	889
1726	1 16 57 13	462	808
1727	1 7 8 41	546	722
1728	0 21 20 8	630	636
1729	1 6 0 12	715	554
1730	0 20 12 39	799	468
1731	0 10 23 7	883	382
1732	0 0 34 34	967	296
1733	0 9 14 38	52	215
1734	1 17 54 41	136	133
1735	1 8 6 9	220	47
1736	0 22 17 36	305	961
1737	1 6 57 40	389	880
1738	0 21 9 7	473	794
1739	0 11 20 35	557	708
1740	0 1 32 2	642	622
1741	0 10 12 6	726	540
1742	0 0 23 33	810	454
1743	1 9 3 37	895	373
1744	0 23 15 4	979	287
1745	1 7 55 8	63	205
1746	0 22 6 35	148	119
1747	0 12 18 3	232	33
1748	0 2 29 30	316	947
1749	0 11 9 34	400	866

Années Jul.	Conjonctions. J. H. M. S.	Nomb. A.	Nomb. B.
1749	0 11 9 34	400	866
1750	0 1 21 1	485	780
1751	1 10 1 5	569	698
1752	1 0 12 33	653	612
1753	1 8 52 37	738	531
1754	0 23 4 4	822	445
1755	0 13 15 32	906	359
1756	0 3 27 0	990	273
1757	0 12 7 3	75	191
1758	0 2 18 30	159	110
1759	1 10 58 34	243	24
1760	1 1 10 01	328	938
1761	1 9 50 05	412	856
1762	1 0 1 32	496	770
1763	0 14 13 00	580	684
1764	0 4 24 27	665	598
1765	0 13 4 31	749	517
1766	0 3 15 58	833	431
1767	1 11 56 2	918	349
1768	1 2 7 29	2	263
1769	1 10 47 33	86	182
1770	1 0 59 0	171	96
1771	0 15 10 28	255	10
1772	0 5 21 56	339	924
1773	0 14 2 0	423	842
1774	0 4 13 27	508	761
1775	1 12 53 31	592	675
1776	1 3 4 58	676	589
1777	1 11 45 1	761	507
1778	1 1 56 28	845	421
1779	0 16 7 56	929	335

Dans les Transf. Phil. de l'année 1714. M. Hallei avoit déja averti que le moyen mouvement du 1er Satellite devoit être un peu plus grand que selon les anciennes Tables, & que cela pouvoit aller à 2′ sur une révolution périodique de Jupiter. On a donc ici un peu plus de 8″ dont les révolutions du Satellite seroient plus courtes chaque année qu'on ne les supposoit autrefois.

TABLES
DES
REVOLUTIONS
DU PREMIER SATELLITE DE JUPITER
Pour les Jours de l'Année.

JANVIER.

J.	H.	M.	S.	N.A.	N.B.
1	18	28	36	0	5
3	12	57	12	1	9
5	07	25	48	1	14
7	01	54	24	2	18
8	20	23	00	2	23
10	14	51	36	2	27
12	09	20	12	3	32
14	03	48	48	3	37
15	22	17	24	4	41
17	16	46	00	4	46
19	11	14	36	4	51
21	05	43	12	5	55
23	00	11	47	5	60
24	18	40	23	6	64
26	13	08	59	6	69
28	07	37	35	7	73
30	02	06	11	7	78
31	20	34	47	7	82

FEVRIER.

0	20	34	47	7	82
2	15	03	23	8	87
4	09	31	59	8	92
6	04	00	35	9	96
7	22	29	11	9	101
9	16	57	47	9	105
11	11	26	23	10	110
13	05	54	59	10	114
15	00	23	35	11	118
16	18	52	11	11	123
18	13	20	47	11	128
20	07	49	23	12	132
22	02	17	59	12	137
23	20	46	35	13	141
25	15	15	11	13	146
27	09	43	47	13	150

MARS.

J.	H.	M.	S.	N.A.	N.B.
1	04	12	23	14	155
2	22	40	59	14	159
4	17	09	35	15	164
6	11	38	10	15	168
8	06	06	46	16	173
10	00	35	22	16	177
11	19	03	58	16	182
13	13	32	34	17	186
15	08	01	10	17	190
17	02	29	46	18	195
18	20	58	22	18	199
20	15	26	58	18	204
22	09	55	34	19	208
24	04	24	10	19	213
25	22	52	46	20	217
27	17	21	22	20	221
29	11	49	58	20	225
31	06	18	34	21	230

AVRIL.

0	06	08	34	21	230
2	00	47	10	21	235
3	19	15	46	22	239
5	13	44	22	22	244
7	08	12	58	22	248
9	02	41	34	23	252
10	21	10	10	23	257
12	15	38	46	24	261
14	10	07	22	24	265
16	04	35	58	25	270
17	23	04	33	25	274
19	17	33	09	25	279
21	12	01	45	26	283
23	06	30	21	26	287
25	00	58	57	27	292
26	19	27	33	27	296
28	13	56	09	27	300
30	08	24	45	28	304

TABLES
DES
REVOLUTIONS
DU PREMIER SATELLITE DE JUPITER
Pour les Jours de l'Année.

Mai.

J.	*H.*	*M.*	*S.*	*N.A.*	*N.B.*
0	08	24	45	28	304
2	02	53	21	28	309
3	21	21	57	29	313
5	15	50	33	29	317
7	10	19	09	19	322
9	04	47	45	30	326
10	23	16	21	30	330
12	17	44	57	31	335
14	12	13	33	31	339
16	06	42	09	31	343
18	01	10	45	32	348
19	19	39	21	32	352
21	14	07	57	33	356
23	08	36	33	33	361
15	03	05	09	33	365
26	21	33	45	34	369
28	16	02	21	34	373
30	10	30	57	35	378

Juin.

0	10	30	57	35	378
1	04	59	32	35	382
2	23	28	08	36	386
4	17	56	44	36	391
6	12	25	20	36	395
8	06	53	50	37	399
10	01	22	32	37	403
11	19	51	08	38	408
13	14	19	44	38	412
15	08	48	20	38	416
17	03	16	56	39	420
18	21	45	32	39	425
20	16	14	08	40	429
22	10	42	44	40	433
24	05	11	20	40	438
25	23	39	56	41	442
27	18	08	32	41	446
29	12	37	08	42	450

Juillet.

J.	*H.*	*M.*	*S.*	*N.A.*	*N.B.*
1	07	05	44	42	455
3	01	34	20	42	459
4	20	02	56	43	463
6	14	31	32	43	468
8	09	00	08	44	472
10	03	28	44	44	476
11	21	57	20	45	480
13	16	25	55	45	485
15	10	54	31	45	489
17	05	23	07	46	493
18	23	51	43	46	498
20	18	20	19	47	502
22	11	48	55	47	506
24	07	17	31	47	510
26	01	46	07	48	515
27	20	14	43	48	519
29	14	43	19	49	523
31	09	11	55	49	528

Aoust.

0	09	11	55	49	528
2	03	40	31	49	532
3	22	09	07	50	536
5	16	37	43	50	541
7	11	06	19	51	545
9	05	34	55	51	549
11	00	03	31	51	554
12	18	32	07	52	558
14	13	00	43	52	562
16	07	29	19	53	567
18	01	57	55	53	571
19	20	26	31	54	575
21	14	55	07	54	580
23	09	23	43	54	584
25	03	52	18	55	588
26	22	20	54	55	593
28	16	49	30	56	597
30	11	18	06	56	602

TABLES
DES
REVOLUTIONS
DU PREMIER SATELLITE DE JUPITER
Pour les Jours de l'Année.

SEPTEMBRE.					
J.	H.	M.	S.	N.A.	N.B.
1	05	46	42	56	606
3	00	15	18	57	610
4	18	43	54	57	615
6	13	12	30	58	619
8	07	41	06	58	624
10	02	09	42	58	628
11	20	38	18	59	632
13	15	06	54	59	637
15	09	35	30	60	641
17	04	04	06	60	646
18	22	32	42	60	650
20	17	01	18	61	655
22	11	29	54	61	659
24	05	58	30	62	663
26	00	27	06	62	668
27	18	55	42	62	672
29	13	24	18	63	677

OCTOBRE.					
1	07	52	54	63	681
3	02	21	30	64	686
4	20	50	06	64	690
6	15	18	41	65	695
8	09	47	17	65	699
10	04	15	53	65	704
11	22	44	29	66	708
13	17	13	05	66	713
15	11	41	41	67	717
17	06	10	17	67	721
19	00	38	53	67	726
20	19	07	29	68	730
22	13	36	05	68	735
24	08	04	41	69	739
26	02	33	17	69	744
27	21	01	53	69	749
29	15	30	29	70	753
31	09	59	05	70	758

NOVEMBRE.					
J.	H.	M.	S.	N.A.	N.B.
0	09	59	05	70	758
2	04	27	41	71	762
3	22	56	17	71	767
5	17	24	53	71	772
7	11	53	29	72	776
9	06	22	05	72	781
11	00	50	41	73	785
12	19	19	17	73	790
14	13	47	53	74	794
16	08	16	29	74	799
18	02	45	05	74	804
19	21	13	40	75	808
21	15	42	16	75	813
23	10	10	52	76	817
25	04	39	28	76	822
26	23	08	04	76	827
28	17	36	40	77	831
30	12	05	16	77	836

DECEMBRE.					
0	12	05	16	77	836
2	06	33	52	78	840
4	01	02	28	78	845
5	19	31	04	78	849
7	13	59	40	79	854
9	08	28	16	79	859
11	02	56	52	80	863
13	21	25	28	80	868
14	15	54	04	80	873
16	10	22	40	81	877
18	04	51	16	81	882
19	23	19	52	82	886
21	17	48	28	82	891
23	12	17	04	82	895
25	06	45	40	83	900
27	01	14	16	83	905
28	19	42	52	84	909
30	14	11	28	84	914

TABLE
DE LA PREMIERE EQUATION
DES CONJONCTIONS
DU PREMIER SATELLITE
DE
JUPITER.

No. A.	Equations M.	S.	Eq. du No. B.
0	39	08	15
4	38	12	16
8	37	16	16
12	36	21	16
16	35	26	17
20	34	30	17
24	33	35	17
28	32	40	18
32	31	45	18
36	30	50	19
40	29	56	19
44	29	03	19
48	28	10	20
52	27	16	20
56	26	23	20
60	25	30	21
64	24	38	21
68	23	47	21
72	22	56	22
76	22	05	22
80	21	15	22
84	20	26	23
88	19	37	23
92	18	48	23
96	18	00	24
100	17	14	24
104	16	28	24
108	15	42	24
112	14	57	25
116	14	13	25
120	13	30	25
124	12	48	26
128	12	07	26

No. A.	Equations M.	S.	Eq. du No. B.
128	12	07	26
132	11	27	26
136	10	47	26
140	10	09	27
144	9	31	27
148	8	45	27
152	8	19	27
156	7	44	28
160	7	10	28
164	6	38	28
168	6	07	28
172	5	37	28
176	5	08	29
180	4	41	29
184	4	15	29
188	3	49	29
192	3	24	29
196	3	01	29
200	2	40	30
204	2	20	30
208	2	01	30
212	1	42	30
216	1	25	30
220	1	10	30
224	0	58	30
228	0	47	30
232	0	36	30
236	0	26	30
240	0	18	30
244	0	12	31
248	0	07	31
252	0	04	31
256	0	01	31

No. A.	Equations M.	S.	Eq. du No. B.
256	0	01	31
260	0	00	31
264	0	01	31
268	0	03	31
272	0	07	31
276	0	12	31
280	0	19	31
284	0	28	30
288	0	38	30
292	0	50	30
296	1	03	30
300	1	17	30
304	1	33	30
308	1	50	30
312	2	08	30
316	2	28	30
320	2	51	30
324	3	15	29
328	3	40	29
332	4	06	29
336	4	34	29
340	5	01	29
344	5	34	29
348	6	05	28
352	6	38	28
356	7	13	28
360	7	50	28
364	8	27	27
368	9	06	27
372	9	46	27
376	10	27	27
380	11	09	26
384	11	52	26

No. A.	Equations M	S.	Eq. du No. B.
384	11	52	26
388	12	37	26
392	13	23	25
396	14	11	25
400	14	59	25
404	15	48	24
408	16	38	24
412	17	30	24
416	18	22	23
420	19	15	23
424	20	09	23
428	21	04	22
432	22	59	22
436	22	55	22
440	23	53	21
444	24	51	21
448	25	49	21
452	26	48	20
456	27	48	20
460	28	48	19
464	29	49	19
468	30	50	19
472	31	51	18
476	32	53	18
480	33	55	17
484	34	57	17
488	35	59	17
492	37	01	16
496	38	05	16
500	39	08	15
504	40	11	15
508	41	15	14
512	42	17	14

TABLE

DE LA PREMIERE EQUATION

DES CONJONCTIONS

DU PREMIER SATELLITE DE *JUPITER.*

No. A.	Equations M.	S.	Eq. du No. B.
512	42	17	14
516	43	19	14
520	44	21	13
524	45	23	13
528	46	25	13
532	47	26	12
536	48	27	12
540	49	28	11
544	50	28	11
548	51	28	11
552	52	27	10
556	53	25	10
560	54	23	9
564	55	21	9
568	56	17	9
572	57	12	8
576	58	07	8
580	59	01	8
584	59	54	7
588	60	46	7
592	61	38	6
596	62	28	6
600	63	17	6
604	64	05	5
608	64	53	5
612	65	39	5
616	66	24	5
620	67	07	4
624	67	49	4
628	68	30	4
632	69	10	4
636	69	49	3
640	70	26	3

No. A.	Equations M.	S.	Eq. du No. B.
640	70	26	3
644	71	03	3
648	71	38	3
652	72	11	2
656	72	42	2
660	73	13	2
664	73	42	2
668	74	10	2
672	74	36	1
676	75	01	1
680	75	25	1
684	75	48	1
688	76	08	1
692	76	26	1
696	76	43	0
700	76	59	0
704	77	13	0
708	77	26	0
712	77	38	0
716	77	48	0
720	77	57	0
724	78	04	0
728	78	09	0
732	78	13	0
736	78	15	0
740	78	16	0
744	78	15	0
748	78	12	0
752	78	09	0
756	78	04	0
760	77	58	0
764	77	50	0
768	77	40	0

No. A.	Equations M.	S.	Eq. du No. B.
768	77	40	0
772	77	29	0
776	77	18	0
780	77	06	0
784	76	52	1
788	76	34	1
792	76	15	1
796	75	56	1
800	75	36	1
804	75	15	1
808	74	52	1
812	74	27	1
816	74	01	2
820	73	35	2
824	73	08	2
828	72	39	2
832	72	09	2
836	71	38	3
840	71	06	3
844	70	32	3
848	69	57	3
852	69	21	3
856	68	45	4
860	68	07	4
864	67	29	4
868	66	49	4
872	66	09	5
876	65	28	5
880	64	46	5
884	64	03	5
888	63	19	6
892	62	34	6
896	61	48	6

No. A.	Equations M.	S.	Eq. du No. B.
896	61	48	6
900	61	02	7
904	60	15	7
908	59	28	7
912	58	39	8
916	57	50	8
920	57	01	8
924	56	11	9
928	55	20	9
932	54	29	9
936	53	38	10
940	52	46	10
944	51	53	10
948	51	00	11
952	50	06	11
956	49	13	11
960	48	20	12
964	47	26	12
968	46	31	12
972	45	36	13
976	44	41	13
980	43	46	13
984	42	50	14
988	41	55	14
992	41	00	14
996	40	04	15
1000	39	08	15
1004	38	12	16
1008	37	16	16
1012	36	21	16
1016	35	26	17
1020	34	30	17
1024	33	35	17

TABLE
DE LA SECONDE EQUATION DES *CONJONCTIONS* DU PREMIER SATELLITE *DE JUPITER.*

Equations de la Lumiere additives.

Nombre B. corrigé.	0		100		200		300		400		500		600		700		800		900	
	Equations.		Equations.		Equations.		Equations.		Equations.		Equations.		Equations.		Equations.		Equations.		Equations.	
	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
0	16	15	14	56	11	18	6	21	1	58	0	00	1	52	6	21	11	18	14	56
4	16	15	14	49	11	07	6	09	1	44	0	00	2	01	6	34	11	28	15	02
8	16	15	14	43	10	56	5	58	1	36	0	01	2	11	6	46	11	39	15	08
12	16	14	14	36	10	46	5	46	1	28	0	02	2	21	6	58	11	49	15	13
16	16	13	14	29	10	34	5	34	1	20	0	03	2	31	7	10	12	00	15	19
20	16	12	14	22	10	22	5	22	1	13	0	05	2	41	7	22	12	10	15	24
24	16	10	14	15	10	10	5	11	1	06	0	07	2	51	7	34	12	20	15	29
28	16	09	14	07	9	59	4	59	1	00	0	10	3	01	7	47	12	30	15	34
32	16	07	13	59	9	47	4	48	0	54	0	12	3	11	7	59	12	40	15	38
36	16	05	13	51	9	36	4	37	0	48	0	15	3	21	8	11	12	49	15	43
40	16	02	13	43	9	24	4	26	0	42	0	19	3	32	8	23	12	59	15	46
44	15	59	13	35	9	12	4	15	0	37	0	23	3	42	8	36	13	08	15	50
48	15	55	13	26	9	00	4	04	0	32	0	27	3	53	8	48	13	17	15	53
52	15	53	13	17	8	48	3	53	0	27	0	32	4	04	9	00	13	26	15	55
56	15	50	13	08	8	36	3	42	0	23	0	37	4	15	9	12	13	35	15	59
60	15	46	12	59	8	23	3	32	0	19	0	42	4	26	9	24	13	43	16	02
64	15	43	12	49	8	11	3	21	0	15	0	48	4	37	9	36	13	51	16	05
68	15	38	12	40	7	59	3	11	0	12	0	54	4	48	9	47	13	59	16	07
72	15	34	12	30	7	47	3	01	0	10	1	00	4	59	9	59	14	07	16	09
76	15	29	12	20	7	34	2	51	0	07	1	06	5	11	10	10	14	15	16	10
80	15	24	12	10	7	22	2	41	0	05	1	13	5	22	10	22	14	22	16	12
84	15	19	12	00	7	10	2	32	0	03	1	20	5	34	10	34	14	29	16	13
88	15	13	11	49	6	58	2	21	0	02	1	28	5	46	10	46	14	36	16	14
92	15	08	11	39	6	46	2	11	0	01	1	36	5	58	10	56	14	43	16	15
96	15	02	11	28	6	34	2	01	0	00	1	44	6	09	11	07	14	49	16	15
100	14	56	11	18	6	21	1	52	0	00	1	52	6	21	11	18	14	56	16	15

TABLE
de la troisiéme EQUATION DES CONJONCTIONS du I. Satellite DE *JUPITER.*

Nombre A.	Equations. M. S.	Nombre A.
0	4 05	1000
20	4 04	980
40	4 01	960
60	3 57	940
80	3 51	920
100	3 44	900
120	3 35	880
140	3 24	860
160	3 12	840
180	2 59	820
200	2 46	800
220	2 32	780
240	2 18	760
260	2 01	740
280	1 45	720
300	1 30	700
320	1 15	680
340	1 01	660
360	0 48	640
380	0 36	620
400	0 25	600
420	0 17	580
440	0 10	560
460	0 04	540
480	0 01	520
500	0 00	500

TABLE
DE LA DEMI-DURE'E
DES ECLIPSES
DU PREMIER SATELLITE
DE JUPITER.

Nombre A.	Demi-durée des Eclipses. H. M. S.	Nombre A.	Demi-durée des Eclipses. H. M. S.	Nombre A.	Demi-durée des Eclipses. H. M. S.	Nombre A.	Demi-durée des Eclipses. H. M. S.
0	1 5 09	250	1 7 00	500	1 5 09	750	1 7 46
10	1 4 56	260	1 7 15	510	1 4 53	760	1 7 57
20	1 4 44	270	1 7 31	520	1 4 39	770	1 8 07
30	1 4 33	280	1 7 45	530	1 4 26	780	1 8 15
40	1 4 23	290	1 7 57	540	1 4 15	790	1 8 22
50	1 4 13	300	1 8 07	550	1 4 07	800	1 8 26
60	1 4 07	310	1 8 15	560	1 4 03	810	1 8 28
70	1 4 04	320	1 8 22	570	1 4 01	820	1 8 30
80	1 4 02	330	1 8 27	580	1 4 00	830	1 8 28
90	1 4 00	340	1 8 28	590	1 4 03	840	1 8 26
100	1 4 02	350	1 8 29	600	1 4 07	850	1 8 22
110	1 4 03	360	1 8 27	610	1 4 13	860	1 8 16
120	1 4 06	370	1 8 24	620	1 4 23	870	1 8 08
130	1 4 12	380	1 8 17	630	1 4 35	880	1 8 00
140	1 4 21	390	1 8 09	640	1 4 49	890	1 7 50
150	1 4 31	400	1 7 58	650	1 5 04	900	1 7 37
160	1 4 42	410	1 7 46	660	1 5 19	910	1 7 22
170	1 4 55	420	1 7 31	670	1 5 36	920	1 7 08
180	1 5 09	430	1 7 14	680	1 5 54	930	1 6 55
190	1 5 23	440	1 6 58	690	1 6 10	940	1 6 40
200	1 5 39	450	1 6 40	700	1 6 28	950	1 6 23
210	1 5 55	460	1 6 20	710	1 6 46	960	1 6 08
220	1 6 11	470	1 6 02	720	1 7 02	970	1 5 54
230	1 6 26	480	1 5 45	730	1 7 17	980	1 5 37
240	1 6 43	490	1 5 26	740	1 7 33	990	1 5 22
250	1 7 00	500	1 5 09	750	1 7 46	1000	1 5 09

La Table de la 3e Equation que l'on donne ici, eſt une correction du mouvement ſucceſſif de la lumiere, qui dépend de la diſtance de Jupiter au Soleil, depuis le Périhélie juſqu'à ſon Aphélie. Quant à la demi-durée des Eclipſes, il eſt évident qu'elle doit augmenter à meſure que le Satellite traverſera un plus grand eſpace dans l'ombre de Jupiter; ce qui ſuppoſe qu'on ait eu égard dans le calcul, aux variations du cône d'ombre, ſelon que Jupiter s'approche ou s'éloigne du Soleil, comme auſſi au Lieu du nœud & à l'inclinaiſon de l'orbite du Satellite à l'égard de l'orbite de Jupiter. Cette inclinaiſon a été limitée à 3°, étant à peu près double de celle de l'orbite de Jupiter ſur le plan de l'Ecliptique. Quand Jupiter ſe trouve vers le milieu du ſigne du Verſeau ou du Lion, c'eſt-à-dire, au nœud aſcendant ou deſcendant de l'orbite du Satellite, la demi-durée de l'Eclipſe eſt la plus longue, parce que le Satellite traverſe pour lors le demi-diametre du cône d'ombre: trois ſignes avant ou après, la demi-durée eſt la plus courte.

Le nombre *A* exprime en milliemes du cercle l'anom. moy. de ☿: le nombre *B* la diſtance moy. de ☿, au vrai lieu du Soleil, & *B* corrigé le vrai angle de *Commutation*.

Les configurations du quatrieme Satellite de Saturne se peuvent facilement observer avec des Lunettes de 15 à 25 pieds, comme aussi avec les Lunettes catadioptriques d'environ 15 pouces, qui sont assez communes aujourd'hui. Ce Satellite est rarement éclipsé par Saturne, & par conséquent on n'en a gueres fait encore d'observation qui puisse servir à déterminer les longitudes sur Terre. Celle du 25. Mars 1715. faite à Paris & à l'Observatoire Royal, lorsque le Satellite s'est caché à la partie occidentale du disque de Saturne vers les 11 heures du soir, a servi principalement à restituer les Tables que l'on vient de rapporter (pag. 304.) A l'égard des quatre autres Satellites qui ne sont vus que très-difficilement, parce qu'il faut y employer de trop grandes Lunettes, comme leurs mouvemens ne sont pas encore assez connus, on a cru devoir se dispenser d'en donner ici les Tables, de même que celles des trois Satellites les plus éloignés de Jupiter. Car à la réserve du premier qui se dégage le plus vîte de l'ombre, l'effet de la gravitation de ces Satellites qui agissent les uns sur les autres, produit un trop grand nombre d'inégalités * dans les mouvemens observés pour qu'on puisse en donner aujourd'hui des Tables exactes, outre qu'on n'est point d'accord si chaque orbite des Satellites de Jupiter a son nœud fixe** au même point, sçavoir au milieu du Verseau & du Lion; & qu'il est même assez probable que l'inclinaison de leur orbite est variable, de même que leur excentricité qu'on n'a pu encore constater, n'ayant pas été possible d'en soumettre toutes les inégalités au calcul de la Théorie, parce qu'il reste en effet de trop grandes difficultés à surmonter.

** *Celui du quatrieme Satellite doit rétrograder de* 8° 24′ *en* 100 *ans.* Newton. Phil. nat. Lib. 3. Prop. 23.

* M. Bradlei a remarqué en 1726 que ces inégalités étoient remarquables, principalement dans le second Satellite, dont le mouvement est quelquefois accéléré ou retardé à tel point, qu'on s'apperçoit d'une différence qui monte à 30 ou 40 minutes dans l'espace d'environ sept mois: cet espace de tems d'environ 7 mois, répond à une demi-période ou intervalle, dans lequel les trois Satellites les plus proches de Jupiter, retournent à peu près à une même situation, soit entr'eux, soit à l'égard de l'ombre de Jupiter.

Au reste on pourra tenter de construire de nouvelles Tables de ces Satellites pour en déduire leurs configurations à l'égard de leur Planete principale, lorsque les époques & les autres élémens qui servent à établir leurs mouvemens, auront été vérifiés un très-grand nombre de fois. Il est certain que si l'on peut parvenir à constater un jour les nœuds & l'inclinaison des orbites de ces Satellites, on pourra corriger les Tables qu'en a données en 1693. feu M. Cassini, de même que celles de Saturne en se servant de la méthode, & ayant égard aux circonstances indiquées pag. 302, 303. Enfin les époques & les moyens mouvemens des Satellites de Saturne qu'on a corrigés, en comparant les premieres observations (que feu M. Cassini, qui les avoit découvertes, communiqua en 1687. à la Société Royale de Londres) à celles qui ont été continuées en France à l'Observatoire, & en Angleterre par MM. Hallei & Pound, se trouvent réduites au Méridien de Paris : comme il suit.

	I. Satellite.	II.	III.	IV.	V.
1700....	3s 02° 53′	7s 04° 15′	3s 07° 07′	7s 13° 28′	4s 15° 24′
En 20 ans	6 27 46	0 18 20	0 19 01	1 14 35	1 03 13

On trouve aussi que les époques & les moyens mouvemens des Satellites de Jupiter ont été un peu corrigés en France * & en Angleterre, comme il suit.

* *Mem. de l'Academ. Tom. VIII.*

	I. Satell.	II.	III.	IV.
Sçavoir pour 1700..	2s 12° 12′ 10″	2s 12° 28′ 11″	5s 12° 47′ 16″	7s 17° 05′ 44″
1719.	5. 12. 11. 59.	2. 11. 49. 08	3. 16. 48. 06	4. 29. 02. 08
	5. 12. 36. 30.	2. 12. 27. 12½	3. 27. 02. 26	4. 29. 12. 45

Un 3e avantage que l'on a retiré des Eclipses des Satellites, c'est qu'en les observant de différens lieux de la Terre, on peut déterminer les longitudes sur le globe : mais pour mieux développer ici la Méthode générale de déterminer les longitudes sur Terre, il est nécessaire d'établir ici quelques principes.

Les Eclipses des Satellites servent à découvrir les longitudes sur Terre.

Si par les poles de la Terre & par un lieu quelconque de sa surface, on fait passer un grand cercle de la Sphere, ce cercle, à cause de la rotation diurne de la Terre, tournera uniformément en 24 heures autour de l'axe ter-

reſtre. Et lorſque ſon plan paſſera par le Soleil, tous les habitans qui ſe trouveront dans la circonférence de ce grand cercle, compteront exactement Midi ou Minuit: ainſi ce cercle ſera leur Méridien. Mais ſi l'on ſuppoſe un autre Méridien vers l'Occident qui faſſe avec le premier un angle de 15°, le plan de ce ſecond cercle ne paſſera par le Soleil qu'une heure après le premier; de maniere qu'à l'inſtant auquel les habitans ſitués dans la circonférence de celui-ci compteront midi, les habitans de l'autre méridien, c'eſt-à-dire, du premier, compteront déja une heure après midi. De même ſi l'angle des méridiens étoit double, ou de 30 degrès; comme l'arc de l'Equateur compris entre les deux cercles ſeroit auſſi de 30 degrés, il eſt viſible que quand il ſera midi ſous le méridien le plus occidental, on comptera deux heures ſous le premier méridien qui eſt à l'Orient. Ainſi comptant toujours autant d'heures qu'il y a de fois 15 degrés dans l'arc de l'Equateur compris entre deux Méridiens, on pourra connoître de combien les Peuples Orientaux ſont plus avancés que les Occidentaux; en un mot de combien leurs horloges doivent anticiper. On comptera de même pour chaque degré de l'Equateur 4 minutes de tems *, & pour 15 minutes de l'Equateur une minute de tems, & ainſi de ſuite. Si l'arc de l'Equateur compris, par exemple, entre deux méridiens eſt de 85 degrés, diviſant 85 par 15 le quotient $5\frac{2}{3}$, fera connoître que ſous le méridien le plus oriental, on compte 5 heures 40 minutes de plus que ſous le méridien le plus occidental; enſorte que lorſqu'il ſera midi à l'égard des habitans ſitués ſous le Méridien qui eſt vers l'Orient, les habitans ſitués ſous l'autre méridien d'Occident compteront ſeulement $6^h\,20'$ du matin: en un mot à quelques heures du jour que ce ſoit, il y aura toujours une différence de $5^h\frac{2}{3}$, dans l'heure comptée à ces deux différens lieux, ſi véritablement l'arc

* *Puiſque 4'×15 valent une heure, &c.*

de l'Equateur compris entre les deux méridiens eſt de 85 degrés.

Par une opération contraire étant donnée la différence des heures que l'on compte au même inſtant dans deux lieux différens, on aura l'arc de l'Equateur compris entre leurs méridiens : cet arc ſe nomme la différence en longitude de ces deux lieux, & l'on eſt convenu * de compter auſſi les longitudes de chaque lieu depuis un méridien fixe, & qu'on a nommé le Premier méridien. On connoîtra cette différence ou cet arc, en multipliant la différence donnée par 15, & le produit ſera le nombre de degrés que l'on cherche : s'il y a des minutes de tems, on les multipliera par 15, & ſi le produit ſurpaſſe 60, on le diviſera par 60, le quotient & le reſte ſera le nombre de degrés & minutes, qui, ajoutés à ceux que l'on vient de trouver, donneront la différence en longitude des deux lieux propoſés. Soit, par exemple, la différence des heures de deux lieux $7^h\,22'$: on multipliera 7 par 15, & le produit ſera 105°; multipliant auſſi 22 par 15, on a pour le produit $330'$ ou $5°\,30'$: ainſi la différence totale en longitude ſera de $110°\,30'$. Ceci étant ſuppoſé,

* *Depuis la Déclaration de Louis XIII. on compte le premier Méridien à la Partie occidentale de l'Iſle de Fer, qu'on ſçait aujourd'hui être à 20° ou à 20° 2′½ à l'Occident du Méridien de Paris.*

Si dans divers lieux on obſerve le commencement d'une Eclipſe de Lune, ou bien l'immerſion d'un Satellite de Jupiter, & que l'on ait marqué dans chaque endroit les heures & minutes auſquelles l'obſervation a été faite, la différence de tems réduite en degrés & minutes, comme on vient de l'expliquer ci-deſſus, donnera la différence en longitude des lieux qu'occupe chaque Obſervateur.

Bien plus ſi par le moyen des Ephémérides on ſçait le moment de l'Eclipſe d'un Satellite, le calcul en ayant été fait ſur les meilleures Tables pour un Méridien donné, on n'aura plus beſoin d'un ſecond Obſervateur, ſçavoir, dans celui des deux lieux pour lequel ont été calculées les Ephémérides : car dès que l'on n'ignore plus à

quelle heure doit y arriver l'émerſion ou l'immerſion de la Lune ou du Satellite dans l'ombre, on pourra comparer ce tems avec celui du lieu où l'on en aura fait l'obſervation, & la différence ſera le nombre d'heures ou minutes qui répondent à la longitude que l'on cherche.

* *Voyez ce qui en eſt rapporté dans l'Almageſte du P. Riccioli, pag. 492 & 493.*

Avant qu'on eût propoſé* de faire uſage dans la recherche des longitudes, des immerſions & émerſions des Satellites dans l'ombre de Jupiter, & que feu M. Caſſini en eût publié pour la Ire fois les Ephémerides en 1668. on n'employoit gueres pour déterminer les longitudes, que les Eclipſes de Lune, ce qui ſe pratiquoit aſſez rarement: car on ſe contentoit ſeulement de comparer quelquefois les milieux obſervés d'une même Eclipſe vue en différens lieux de la Terre, comme l'avoient pratiqué en pareil cas Ptolomée* & les Aſtronomes Arabes, & lorſqu'après la découverte du Téleſcope on penſa à multiplier les obſervations, en déterminant le paſſage de l'ombre par les taches de la Lune, on ne fit cependant pas de progrès bien ſenſibles dans la Géographie, puiſque vers le milieu du dernier ſiecle on diſputoit encore s'il falloit adopter une correction importante que Gaſſendi & Peireſc avoient faite par le moyen des Eclipſes de Lune ſur preſque toute l'étendue de la Mer Méditerranée.

On s'eſt d'abord ſervi des Eclipſes de Lune pour découvrir les longitudes.

* *Geog. lib. I. cap. IV.*

Or immédiatement après la fondation de l'Obſervatoire de Paris, & le voyage fait à Uranibourg en 1671, on commença à ſe ſervir des immerſions ou émerſions des Satellites de Jupiter pour déterminer les différences en longitudes; & dans le même tems Flamſteed commença à faire uſage de l'occultation des Etoiles fixes par la Lune, ce qui donnoit un moyen encore plus certain de connoître les différences en longitudes ſur Terre.

Les Occultations des Etoiles par la Lune, & les Eclipſes des Satellites de Jupiter, ont été employés depuis à cet uſage. *Voyez Hevelii Selenographia, pag. 479 & 302.*

Mais comme il n'y a preſque aucune difficulté dans cette recherche, lorſque deux Obſervateurs ſitués dans des lieux fort éloignés, peuvent ſe communiquer des

obſervations correſpondantes, parce qu'il eſt facile de prévoir par les Tables l'heure à laquelle on doit ſe préparer aux obſervations; il ne reſtoit donc plus pour parvenir à réſoudre *par Approximation* le fameux Probleme des longitudes, que de ſuppléer à un ſecond Obſervateur, ce qui réduiſoit toute la queſtion à pouvoir prédire à deux minutes près, le tems de l'immerſion ou de l'émerſion des Satellites, ou bien à une minute de degrés près, le vrai lieu de la Lune pour un Méridien donné.

A la vérité feu M. Caſſini, & long-tems après M. Pound, ont fait quelques efforts pour perfectionner la théorie du 1er & du 2^d^ Satellite, & il eſt certain (ſans s'arrêter ici aux Elémens qui ſervent à la conſtruction des Tables, qu'ils ont enfin achevées, non ſans un très-grand travail) qu'on leur a de grandes obligations d'avoir réduit les mouvemens du premier Satellite à une forme de calcul ſi facile & ſi commode, qu'elle ſe trouve à la portée de ceux même qui ſçavent à peine les premiers Elémens d'Aſtronomie. Mais il auroit été très-avantageux qu'ils euſſent publié en même tems les obſervations du 1er & du 2^d^, & qu'ils nous euſſent fait connoître dans quels tems ou dans quelles circonſtances les Tables ſont défectueuſes; autrement on ne ſçauroit ſe flater dans les voyages de long cours (& peut être même dans les calmes ſur la mer) de parvenir à connoître la longitude en obſervant ces mêmes Satellites. Enfin un Navigateur qui voudroit relâcher à quelque côte ou iſle inconnue, ne pourroit encore ſçavoir aujourd'hui qu'à un degré & demi près la longitude du lieu, ou de ſon vaiſſeau, l'erreur des Tables du Ier Satellite étant quelquefois de 5 à 6 minutes.

Les Tables du premier Satellite réduites à une forme très-commode par MM. Caſſini & Pound.

De quelle maniere on pourroit remédier aux défauts de ces mêmes Tables.

On ne peut gueres eſpérer une plus grande exactitude en ſe ſervant des Tables de la Lune fondées ſur la Théorie de M. Newton: mais on a l'avantage de pouvoir obſerver preſque tous les jours le lieu de la Lune en mer,

& cela à quelque heure que ce ſoit quand la Lune eſt ſur l'horiſon, au lieu qu'on n'a pas encore réuſſi à y faire l'obſervation du premier ni des autres Satellites. Or puiſqu'on vient d'expoſer tout-à-l'heure par quel moyen on pourroit remédier au défaut des Tables des Satellites de Jupiter, il eſt à propos de dire ici comment on doit parvenir à connoître l'erreur des Tables Lunaires, & par conſéquent à prédire, peut-être mieux qu'à une minute de degrés près, le vrai lieu de la Lune pour un méridien donné.

M. Hallei après avoir reſtitué un paſſage de Pline où il eſt parlé du Saros Caldaique, ou retour périodique des Eclipſes après 223 lunaiſons, avoit fait uſage de cette période dès l'année 1684. pour en déduire les inégalités du mouvement de la Lune. En effet on reconnut bientôt que dans les conjonctions ou Eclipſes de Soleil, & enſuite dans toutes les autres phaſes, les erreurs des Tables ſe répétoient à chaque période, lorſque la Lune étoit à même diſtance du Soleil, & dans une poſition ſemblable du Lieu de ſon Apogée à l'égard du Soleil. Il n'y a donc pas de voie qui paroiſſe aujourd'hui plus certaine pour déterminer les longitudes par Approximation, le mouvement de la Lune étant ſi rapide * que 2′, & quelquefois $2'\frac{1}{2}$ dans ſon Lieu apparent, répondent à un degré de longitude.

* Quand on obſerve en Mer la diſtance de la Lune au Soleil, ou aux Etoiles fixes, ſi l'on ſe ſert du nouveau Quarrier de réflexion inventé par M. Newton, on ne s'apperçoit plus du mouvement du vaiſſeau, & par conſéquent on peut déterminer mieux qu'à une minute près, par diverſes opérations réitérées, le vrai lieu de la Lune de la maniere qui ſera enſeignée ci-après page 396. Or ſoit qu'on meſure ces diſtances, ſoit que la Lune éclipſe quelque Etoile, il eſt certain qu'on aura tout ce qu'on peut déſirer pour déterminer les longitudes tant ſur Mer que ſur Terre, ſi les Aſtronomes nous donnent une ſuite complete d'obſervations du mouvement de la Lune pendant une période entiere de 18 ans, & ſuppoſé qu'ils en publient tout le détail, ou qu'ils nous apprennent ſeulement, après avoir comparé les Tables aux obſervations pendant une ou pluſieurs périodes, quelles ſont les erreurs de ces mêmes Tables dans chaque point de l'orbite lunaire, pendant deux révolutions de l'Apogée, ou une révolution des nœuds. On pourroit auſſi obſerver en mer avec une Lunette de 4 à 5 pieds l'inſtant auquel une Etoile ſe trouve dans la ligne des cornes, ce qui donnera la conjonction apparente: mais il n'y a rien de plus précis que les occultations des Etoiles fixes par la Lune, lorſqu'il en arrive, ce qui eſt aſſez fréquent lorſque cet aſtre ſe trouve dans les hyades.

CHAPITRE

CHAPITRE DIX-SEPTIEME.

Des Cometes.

Les Cometes doivent être regardées comme de vraies Planetes.

OUTRE les Planetes de notre syſteme Solaire & dont on peut obſerver preſque tous les jours le mouvement apparent dans l'étendue du Zodiaque, il y a encore une autre eſpece de corps céleſtes, qu'on nomme Cometes, mais que l'on voit rarement & dont l'apparition eſt de peu de durée; car à peine les a-t-on obſervées quelques Mois, qu'elles diſparoiſſent entierement, parce que leur grande diſtance eſt cauſe qu'elles échappent à notre foible vue. Les anciens Philoſophes avoient placé les Cometes dans ces vaſtes régions du Ciel qui ſe trouvent au-deſſus de l'orbite de la Lune. Selon le témoignage d'Ariſtote de Seneque, de Plutarque & des divers Auteurs tant Grecs que Latins, les Pythagoriciens & les autres Philoſophes de la Secte Italique enſeignoient depuis longtems que les Cometes n'étoient autre choſe que des Etoiles errantes, ſemblables aux Planetes; qu'elles parcouroient des orbites d'une grandeur preſqu'immenſe, & qu'elles ne pouvoient être apperçues qu'après de très-longs intervalles de tems, c'eſt-à-dire, lorſqu'elles retournoient à chaque Révolution aux mêmes points de leurs orbites. Ce ſentiment, ſi l'on en croit Ariſtote, étoit auſſi celui d'Hippocrate de Chio: enfin c'étoit celui de Démocrite. En effet Seneque nous rapporte au Chap. III. du VII. Liv. de ſes Queſtions Naturelles, ce qui en a été dit par Démocrite l'un des plus ingénieux & peut-être le plus profond Philoſophe de la haute Antiquité. Il dit qu'*entre tous les Aſtres qu'on avoit obſervés, on pourroit ſoupçonner qu'il y a encore un grand nombre d'autres Planetes*

différentes de celles que nous connoissons. Ce qui doit s'entendre, comme l'on voit, des Cometes qu'on regardoit alors comme des Etoiles errantes, c'est-à-dire, qu'on mettoit au nombre des Planetes. On ignore cependant si le nombre en a été fixé, ni si plusieurs de ces Cometes ont été distinguées par des noms particuliers, étant d'ailleurs incertain si l'on avoit alors quelque théorie du mouvement des cinq Planetes qui nous environnent. Cependant Seneque ajoute encore, qu'Apollonius le Myndien, l'un de ceux qui avoit le plus de connoissance dans la Physique, étoit persuadé que les Chaldéens plaçoient depuis long-tems les Cometes au rang des Etoiles errantes, qu'elles avoient un cours réglé & dans des orbites particulieres qui leur étoient connues. Le même Apollonius * soutenoit aussi que les Cometes étoient de véritables Astres semblables au Soleil & à la Lune. Leur cours ne se fait pas, ajoute-t-il, dans l'Univers sans être assujetti à quelque loi constante : elles descendent & remontent alternativement au plus haut des Cieux, mais lorsqu'elles achevent de descendre il nous est permis de les appercevoir, parce qu'elles décrivent la partie la plus basse de leur orbite. Ce sentiment semble avoir été adopté par Seneque : voici ce qu'il pensoit à ce sujet. Je ne suis pas, dit-il *, de ceux qui prétendent que les Cometes ne sont autre chose qu'un feu qui s'allume subitement : je les regarde comme des corps célestes d'une durée éternelle, de même que tant d'autres qui composent cet Univers. Chaque Comete a un certain espace assigné à parcourir. Les Cometes ne sont point détruites, mais elles se trouvent bientôt hors la portée de notre vue. Si on les met au nombre des

* *Suspicari ait se plures esse Stellas quæ currant.*

* *Apollonius ipse aiebat quod proprium sidus est Cometes sicut Solis & Lunæ, &c. Altiora mundi secat & tum demum appareret cum in imum cursûs sui venit.*

* » Non existimo Cometem subitaneum esse ignem, sed inter æterna opera » naturæ. Cometes habet suam sedem, & ideo non citò expellitur, sed emeritur » spatium suum, nec extinguitur, sed excedit. Si erratica Stella esset, in Signifero » esset, sed quis unum Stellis limitem ponit? Quis in angustum divina compellit? » Nempe hæc ipsa quæ sola moveri credis, alios & alios circulos habent; quare » ergo non aliqua sunt, quæ in proprium iter & ab istis remotum secesserint.

Planetes, il ſemble qu'elles ne devroient jamais ſortir du Zodiaque. Mais pourquoi le Zodiaque renfermeroit-il le cours des Aſtres, pourquoi les reſtraindre à un ſi petit eſpace? Le petit nombre des corps céleſtes qui ſont les ſeuls qui paroiſſent ſe mouvoir, décrivent des orbites différentes les unes des autres? Pourquoi donc n'y auroit-il pas d'autres corps céleſtes qui auroient chacun leurs routes particulieres à parcourir, quoique fort éloignées de celles des Planetes? Ce Philoſophe ajoute encore qu'il faudroit pour les reconnoître, avoir recueilli une ſuite non interrompue d'Obſervations des anciennes Cometes qu'on auroit vues; mais que faute d'un tel ſecours, ces Obſervations ne lui étant pas parvenues, & l'apparition des Cometes étant d'ailleurs aſſez rare, il ne croyoit pas qu'il fût poſſible dans le ſiecle où il vivoit, de parvenir à régler leurs mouvemens, ni le tems de leurs révolutions périodiques; qu'ainſi il ignore entierement le tems de leurs réapparitions & la loi ſuivant laquelle elles doivent revenir à même diſtance de la Terre ou du Soleil. Enfin il prédit ce qui eſt arrivé vers la fin du dernier ſiecle. « Le tems viendra * que les ſecrets » les plus cachés de la nature ſeront dévoilés & mis au » plus grand jour par la vigilance & par l'attention que » les hommes y apporteront pendant une longue ſuite » d'années; un ſiecle ou deux ne ſuffiſent pas pour une » auſſi grande recherche. Un jour viendra que la poſtérité » ſera étonnée de ce que nous aïons ignoré l'explication » d'un phénomene auſſi ſimple; ſur-tout lorſqu'après avoir » trouvé la vraie Méthode d'étudier la nature, quelque » grand Philoſophe ſera parvenu à démontrer dans quels » endroits des Cieux les Cometes ſe répandent, combien

Opinion de Seneque touchant les Cometes.

* » Veniet tempus quo ipſa quæ nunc latent, dies extrahet & longioris ævi » diligentia. Ad inquiſitionem tantorum ætas non una ſufficit. Veniet tempus quo » poſteri noſtri tam aperta nos neſciſſe mirabuntur. Erit qui demonſtret aliquando » in quibus Cometæ partibus errant, cur ſeducti à cæteris eunt, quanti qualeſque » ſunt.

» il y en a, & parmi quelles especes de corps célestes on » doit les ranger. »

Les Sectateurs d'Aristote ont prétendu que les Cometes étoient des feux ou des météores répandus dans notre Athmosphere.

Malgré ces réflexions les Sectateurs d'Aristote ont placé les Cometes parmi les corps sublunaires, & cela parce qu'ils craignoient qu'on ne renversât tant de vieilles opinions qu'ils ont soutenues avec opiniâtreté pendant plusieurs siecles, ne voulant pas admettre de générations ni de corruptions dans les cieux. Ils prétendoient donc que c'étoient des Météores; mais cette supposition tombe d'elle-même si l'on fait voir qu'elle répugne aux Observations; car une preuve évidente que les Cometes ne se forment pas dans notre air, c'est qu'étant apperçues au même instant des régions de la Terre les plus éloignées, elles sont par conséquent fort élevées au-dessus de l'Athmosphere terrestre, au contraire de ce qui arrive à l'égard de quelque Météore que ce soit, formé dans notre air, à cause de sa trop petite élévation au-dessus de la surface du globe terrestre.

Il est aisé de reconnoitre qu'elles ne sont point dans notre air.

Preuve incontestable que Cometes sont plus élevées au-dessus de la Terre, que n'est la Lune.

Il y a plus: il est constant que non seulement les Cometes sont fort élevées au-dessus de notre air, mais même qu'elles sont à une plus grande hauteur que la Lune. La preuve en est fondée sur ce qu'étant observées de différens lieux situés sur le globe terrestre, leur distance aux Etoiles les plus proches paroît assez sensiblement la même. On peut prendre pour exemple la Comete de 1577, la même qui a servi à faire cette découverte. Tycho-Brahé l'observoit à Uranibourg & Hagécius à Prague en Boheme, c'est-à-dire, à très-peu-près sous le même Méridien, mais environ six degrés plus au Midi vers l'Equateur. Or Tycho & son Correspondant s'attacherent à déterminer de combien la Comete étoit distante de la Luisante * du Vautour; c'est-à-dire, combien elle paroissoit plus basse; ce qui étoit d'autant plus facile que ces deux Astres paroissoient dans un même vertical.

* *C'est α de l'Aigle dans les Cartes de Bayer.*

Ils trouverent donc qu'au même instant la distance de la Comete à l'Etoile paroissoit sensiblement la même, & partant que si la Comete vue de deux lieux éloignés de plus de 150 lieues sur la Terre, paroissoit répondre au même point des cieux, cela ne pouvoit se faire à moins qu'elle ne fût fort au-dessus de la Lune.

La Démonstration. PLANCHE VI. *Fig.* 7.

Soit *ABG* un cercle qui représente un Méridien tracé sur la surface de la Terre où l'on suppose Uranibourg en *A* & la ville de Prague en *B*, *FCE* un grand cercle tracé dans la sphere des Etoiles fixes, & le point *F* le lieu de l'Etoile de la Constellation du Vautour: si l'on vouloit qu'en *D* fut le lieu de la Comete, il est évident que son lieu, vu d'Uranibourg, auroit été rapporté au point *E* du Ciel, sa distance apparente à l'Etoile du Vautour ayant pour mesure l'arc *FE*. Mais la Comete vue de Prague paroissant en *C*, sa distance apparente à l'Etoile du Vautour auroit donc été mesurée par l'arc *FC* plus petit que l'arc *FE*. Cependant on a trouvé par observation que de deux lieux si différemment situés sur le globe, la distance de la Comete à l'Etoile du Vautour paroissoit la même, & partant que les arcs *FE*, *FC* étoient égaux. Il est donc vrai de dire que la distance de la Comete à la Terre s'est trouvée si grande que l'arc *CE* n'a pu être de quelque grandeur sensible. Or puisque cela n'arrive pas à l'égard de la Lune (où l'on remarque une différence qui va à quelques minutes) il doit s'ensuivre que la Comete étoit élevée bien au-dessus de l'orbite de la Lune.

Le lieu vrai & le lieu apparent d'une Comete. Sa Parallaxe.

Au reste s'il arrivoit que la distance d'une Comete ne surpassât pas de beaucoup celle de la Lune à la Terre, son lieu vrai seroit sensiblement éloigné de son lieu *apparent*, & la Comete auroit une grande *parallaxe*. Je suppose que son véritable lieu, vu du centre de la Terre, réponde au point *G* du Ciel étoilé & que son lieu, vu du point *A* de la surface de la Terre, réponde au point *E*: la

distance *G E* dont on l'obſerveroit plus baſſe du point *A* eſt ce qu'on nomme ſa Parallaxe ; de ſorte que ſon effet ſera toujours d'abbaiſſer la Comete vers l'horiſon. Cette Parallaxe, comme on l'a prouvé ci-deſſus à l'égard de la Lune, eſt toujours égale à l'angle ſous lequel on verroit de l'Aſtre le demi-diametre de la Terre tiré du centre au Lieu propoſé ſur la ſurface du globe.

On voit par-là que ſi la Parallaxe ne ſçauroit être obſervée dans une Comete, c'eſt une preuve que l'angle ſous lequel on verroit de la Comete le demi-diametre de la Terre, ne ſçauroit être ſenſible ; & partant que la Comete doit être à une prodigieuſe diſtance, puiſque la Terre, vue de cet Aſtre, ne paroîtroit que comme un point imperceptible.

Maniere de découvrir la Parallaxe du mouvement diurne dans les Cometes.

Un ſeul fil tendu, ſuffit ou pourra faire connoître dans une recherche auſſi ſubtile, la parallaxe des Cometes, pour peu qu'elle ſoit ſenſible. Car lorſque la Comete vers la fin de ſon apparition ſemble avoir tellement rallenti ſon mouvement, qu'à peine change-t-elle de place d'un jour à l'autre, on fera par le moyen de ce fil deux différentes Obſervations en la maniere ſuivante. Premierement lorſque la Comete ſera fort haute ſur l'horiſon, on remarquera, s'il y a deux Etoiles fort proches, enſorte que la Comete ſe trouve avec ces deux Etoiles dans une même ligne droite parallele à l'horiſon ; c'eſt ce dont on s'aſſurera par le moyen du fil tendu, ſi l'œil s'apperçoit qu'il paſſe en même-tems par la Comete & par les deux Etoiles. Enſuite vers le coucher de la Comete on vérifiera encore par le ſecours du fil tendu ſi la Comete paroît en ligne droite avec les mêmes Etoiles. Car il eſt évident que ſi la Comete a une Parallaxe ſenſible, & qui l'abbaiſſe vers l'horiſon, elle doit certainement ne plus paroître dans la ligne qui joint les deux Etoiles obſervées : enfin s'il arrive qu'elle paroiſſe conſtamment dans la même ligne droite

comme auparavant, ce sera une preuve que sa parallaxe ne sçauroit être sensible, & partant que la Comete est à une très-grande distance de la Terre. Au reste la réfraction ne sçauroit causer aucune erreur ici, quoiqu'elle éleve manifestement tous les Astres proche l'horison au-dessus du Lieu vrai, parce que son effet, quoiqu'il nous trompe, affecte néantmoins de la même maniere les Etoiles que la Comete, & partant ne cause plus d'erreur dans leur distance ou dans leur position rélative.

Autre Méthode pour trouver la Parallaxe.

On peut aussi découvrir si une Comete a une parallaxe en l'observant proche l'horison Oriental dans un même cercle perpendiculaire ou vertical & qui passe par deux Etoiles. Car quand la Comete sera fort élevée, quoiqu'elle ne paroisse plus alors dans le même vertical que les deux Etoiles, si néantmoins elle continue à paroître dans la même ligne droite qui passe par ces deux Etoiles, c'est une marque que sa parallaxe est insensible, & que par conséquent elle se trouve dans les régions les plus éloignées du Ciel. Si au contraire elle paroît un peu plus basse que la ligne qui joint les deux Etoiles fixes, alors sa parallaxe sera sensible & par conséquent sera désignée par cette même quantité. Au reste ces deux méthodes sont encore également praticables si la Comete a un mouvement propre dans l'intervalle des Observations ; car il est facile d'en tenir compte en observant ce mouvement d'un jour à l'autre & le distribuant selon le tems écoulé entre les Observations.

» * Comme c'est par le défaut de parallaxe du mouvement diurne qu'on est parvenu à prouver que les Comètes étoient dans des régions fort au-dessus de la Lune, » c'est au contraire par la quantité observée d'une autre » parallaxe (qui est celle de l'orbe annuel) qu'on peut » prouver que ces Astres descendent dans la région des » Planetes. Car les Cometes qui s'avancent selon la suite

* *Ce qui suit est tiré du 3e Liv. des Princip. Mathem. de la Philosoph. de M. Newton.*

Les Cometes sont sujettes à la Parallaxe de l'orbe annuel.

» des Signes, nous semblent vers la fin de leurs appari-
» tions ou rallentir trop sensiblement leur mouvement,
» ou même rétrograder, & cela lorsque la Terre est entre
» elles & le Soleil. Au contraire elles paroissent se mou-
» voir trop rapidement si la Terre est en opposition, c'est-
» à-dire, si elles se trouvent en conjonction avec le Soleil.
» Or c'est précisément ce que nous observons à l'égard
» des Planetes. D'un autre côté celles qu'on nomme rétro-
» grades, parce qu'elles se meuvent effectivement contre
» la suite des Signes, ces Cometes, dis-je, semblent plus
» rapides vers la fin de leur apparition, si la Terre est en-
» tre elles & le Soleil; enfin elles paroissent ou rallentir
» trop sensiblement leur cours, ou même rétrograder si la
» Terre est dans une situation opposée, c'est-à-dire, si la
» Comete paroît en conjonction avec le Soleil. Il est
» donc aisé de voir que la cause de ces apparences est le
» mouvement de la Terre dans son orbite, de la même
» maniere qu'il arrive à l'égard des Planetes. Car selon que
» le mouvement de la Terre se fait dans le même sens, ou
» est contraire à celui de la Planete, elle paroît tantôt
» rétrograde, tantôt se mouvoir trop lentement & tantôt
» avec trop de rapidité.

» On peut connoître la distance d'une Comete au So-
» leil ou à la Terre si l'on connoît la quantité dont elle se
» détourne de sa premiere route, c'est-à-dire, aussi-tôt
» qu'elle paroît accélérer ou retarder son mouvement vers
PLANCHE VI. Fig. A. » la fin de son cours apparent. Car soient γQA, γQB,
» γQC trois longitudes observées d'une Comete au com-
» mencement de sa deviation & soit γQF une autre
» longitude observée qui convient à l'instant où la Co-
» mete est si petite & à une si grande distance qu'on cesse
» de l'appercevoir. On tirera la droite ABC dont les par-
» ties AB, BC compriſes entre les lignes droites QA,
» QB & QC soient entre elles dans le même rapport

» que

» que les tems écoulés entre les trois premieres Ob-
» servations. Enſuite on prolongera AC en G, de manie-
» re que AG ſoit à AB comme le tems qui s'eſt écoulé
» entre la premiere & la derniere, eſt au tems écoulé
» entre la premiere & la ſeconde obſervation : on tirera
» auſſi ΥG, enſorte que s'il étoit vrai que la Come-
» te eût eu un mouvement égal & uniforme & que la
» Terre pendant le même tems fût demeurée immobile ou
» qu'elle eût parcouru uniformément une ligne droite, on
» pourroit aſſurer que l'angle $\Upsilon \Upsilon G$ ſeroit la longitude
» de la Comete au tems de la derniere obſervation : mais
» puiſqu'il ſe trouve une différence en longitude repré-
» ſentée par l'angle $F\Upsilon G$, elle ſera donc cauſée par les
» inégalités du mouvement tant de la Comete que de la
» Terre. Or cet angle $F\Upsilon G$ doit être ajouté à l'an-
» gle $\Upsilon \Upsilon G$, s'il arrive que la Terre & la Comete ſe meu-
» vent en ſens contraire, de maniere que le mouvement
» de la Comete en doit paroître plus rapide ; mais ce ſera
» le contraire ſi la Terre & la Comete ſont emportées du
» même ſens : l'angle $F\Upsilon G$ ſera ſouſtractif & il pourroit
» même arriver un tel rallentiſſement dans le mouvement
» obſervé de la Comete, qu'il en paroîtroit rétrograde.
» Cependant il eſt vrai de dire que la plus grande partie
» de cette différence, ou même l'angle entier $F\Upsilon G$, a pour
» origine le mouvement réel de la Terre, & partant qu'on
» peut le conſidérer comme un effet de la Parallaxe du
» grand orbe, la petite quantité dont la Comete auroit ac-
» céléré ou rallenti ſon mouvement réel pouvant être
» négligée en cette rencontre. Voici donc la maniere
» de calculer la diſtance de la Comete à la Terre lorſ-
» qu'on connoît cette parallaxe. Soit S le Soleil, acT
» l'orbe annuel, a le lieu de la Terre au tems de la pre-
» miere obſervation, c le lieu de la Terre au tems de la
» troiſieme obſervation, & encore T le lieu qu'elle oc-

Maniere de découvrir la diſtance d'une Comete, lorſqu'on l'obſerve vers le commencement ou vers la fin de ſon apparition. PLANCHE VI, *Fig.* B.

» cupe au tems de la derniere observation. Soit aussi $T\Upsilon$ » la ligne droite tirée au commencement du Bélier : on » prendra l'angle ΥTV égal à l'angle $\Upsilon \mathcal{Q} F$ (*fig.* A) c'est-» à-dire égal à la longitude de la Comete observée lorsque » la Terre étoit en *T*. Ayant aussi tiré *ac*, on la prolongera » jusqu'en *g*, ensorte que *ag* soit à *ac* comme *AG* est à » *AC* (*fig.* A), & le point *g* sera le lieu que la Terre au-» roit occupé au tems de la derniere observation, si elle » s'étoit mue uniformément en ligne droite selon la ligne » *ac*. C'est pourquoi si l'on mene $g\Upsilon$ parallele à $T\Upsilon$, & si » l'on prend l'angle ΥgV égal à l'angle $\Upsilon \mathcal{Q} G$ (*fig.* A), cet » angle ΥgV sera égal à la longitude de la Comete qu'on » observeroit du point *g*, ensorte que l'angle TVg sera » l'espece de parallaxe que l'on cherche, puisqu'elle seroit » causée par le changement de position ou transport de la » Terre de *g* en *T*. Enfin le point *V* étant ainsi déterminé, ce » sera le lieu de la Comete réduit au plan de l'Ecliptique. Or la distance au Soleil de ce lieu *V* de la Co-» mete (réduit au plan de l'Ecliptique) lorsqu'on cesse de » l'appercevoir, se trouve ordinairement plus petite que » celle de Jupiter.

Du tems auquel une Comete paroit rétrograde, directe, ou se mouvoir trop lentement.

On conçoit donc facilement que si la Terre se meut du même sens qu'une Comete, & si son mouvement angulaire autour du Soleil est assez rapide pour que la ligne droite tirée continuellement à la Comete tende chaque jour de plus en plus en arriere, alors cette Comete, vue de la Terre, & dont le mouvement commençoit à se rallentir, doit paroître rétrograder à notre égard. Cependant si la Terre se meut plus lentement que la Comete, alors la Comete paroîtra directe, mais s'avançant moins vîte, puisqu'il faut faire déduction du mouvement de la Terre. Au contraire si la Terre se meut dans un sens opposé, la Comete paroîtra accélérer son mouvement, qui par cette même raison deviendra bien plus sensible à notre égard.

Quand elle paroit trop rapide.

La même chose est confirmée par la courbure apparente de la route des Cometes. Car tant qu'elles se meuvent assez vîte, elles parcourent à très-peu-près des arcs d'un grand cercle : mais sur la fin de leur apparition, lorsque cette partie de leur mouvement apparent qui doit être attribuée à la parallaxe de l'orbe annuel, devient trop considérable relativement au mouvement propre des Cometes (ou qu'elles auroient si la Terre demeuroit au même point de son orbe), alors ces Astres paroissent se détourner de leur route ordinaire ou s'écarter de la circonférence d'un grand cercle; ensorte que si la Terre se meut d'un côté, elles semblent au contraire emportées selon une direction opposée. Les différences de parallaxes qui sont causées chaque jour par le mouvement de la Terre sur son orbe, étant donc alors très-sensibles, l'observation qui en a été faite plusieurs fois, a fait enfin conclure que vers le commencement ou la fin de l'apparition des Cometes, leur distance n'étoit pas si excessive que quelques Philosophes l'avoient supposé; mais qu'elles se trouvoient alors bien au-dessous de l'orbite de Jupiter. De-là on est bientôt parvenu à conclurre qu'au tems de leur Périgée ou de leur Périhélie (les Cometes paroissant alors sous un bien plus grand angle, parce qu'elles sont beaucoup plus proche de la Terre) elles devoient descendre au-dessous des orbites de Mars, & de la Terre : quelques-unes ont aussi descendu au-dessous de l'orbite des Planetes inférieures.

Il est démontré que les Cometes peuvent descendre dans la région des Planetes.

En effet à mesure qu'elles s'éloignent de la Terre en s'approchant du Soleil, elles paroissent bien plus éclatantes, & leur lumiere devient plus vive de jour en jour. C'est pourquoi le diametre apparent d'une Comete s'observe en ce cas d'autant plus petit qu'elle s'approche du Soleil : comme en effet elle ne sçauroit s'en approcher, sans s'éloigner de la Terre, le Périgée d'une Comete arrivant quelquefois vingt ou vingt-cinq jours avant son passage par le Périhélie.

Grandes variétés dans les configurations apparentes des Cometes, & leurs différentes grandeurs.

Il n'y a rien d'ailleurs de si varié que la figure des Cometes, les unes ayant une chevelure qui les enveloppe, & qui s'étend de tous côtés, les autres une barbe ou une queue qu'on voit toujours dans une direction opposée au Soleil. Leur grandeur se trouve aussi fort souvent très-différente. Quelques-unes, indépendamment de leur queue, paroissent surpasser, dans certaines circonstances favorables de leur apparition, les Etoiles de la premiere & seconde grandeur. Enfin si l'on consulte les Historiens qui en ont parlé, il semble qu'aucune Comete n'ait jamais paru aussi grande que celle qui fut observée du tems de Neron : cette Comete, selon Seneque, égaloit le Soleil en grosseur. Hévélius en a cependant observé une autre en 1652 presqu'aussi grande que la Lune : mais elle étoit bien inférieure en lumiere à cette Planete, étant extraordinairement pâle, & comme enveloppée de fumées, qui loin de lui laisser quelqu'éclat, rendoient son aspect assez triste & peu agréable aux yeux. On doit remarquer que les Cometes sont toujours environnées d'une Athmosphere très-dense & chargées de vapeurs grossieres, qui absorbent presque toute la lumiere que ces Astres peuvent recevoir du Soleil ; & néantmoins lorsqu'une partie de ces vapeurs s'éleve ou se dissipe, on apperçoit quelquefois au travers de ce qui en reste, un noyau fort vif, très-éclatant & qui est le vrai corps solide ou l'hémisphere éclairé de la Comete.

Les Cometes de même que tous les autres Astres paroissent emportées chaque jour par le mouvement diurne d'Orient en Occident.

Les Cometes étant donc si fort élevées au-dessus de notre athmosphere, il doit s'ensuivre qu'elles paroîtront assujetties de même que les autres corps célestes au mouvement diurne apparent d'Orient en Occident, lequel est produit chaque jour, comme l'on sçait, par le mouvement de rotation de la Terre autour de son axe. Mais outre ce mouvement qui est commun à tous les Astres, elles en ont un autre qui leur est propre, ensorte qu'elles ne

reſtent jamais fixes au même lieu du Ciel où l'on a commencé à les appercevoir. Elles s'en éloignent peu à peu, & ſemblent bientôt après ſe répandre indifféremment dans toutes les Conſtellations. Les Anciens n'avoient que trop ſouvent remarqué ce mouvement; en ſorte qu'ils n'auroient ſans doute jamais placé ces Aſtres au rang des Planetes, ſi de même qu'aux ſix Etoiles errantes, ils ne leur euſſent connu un cours particulier. Certainement Seneque ne l'ignoroit pas, puiſqu'il remarqua que les Cometes décrivoient une ligne droite dans le Ciel, ou ſelon quelques Aſtronomes, un grand cercle de la Sphere. Dans le Chapitre 8. du 7me Livre de ſes Queſtions Naturelles, il dit que le cours des Cometes n'eſt pas impétueux ni ſemblable à celui des tourbillons de vent qui cauſent les tempêtes formées dans notre Athmoſphere; mais toujours tranquille, ſe faiſant avec ordre, & ſuivant une route déterminée. Il parle au Chap. 29. des deux grandes Cometes qu'il obſerva, dont l'une, dans l'eſpace de ſix mois parcourut la moitié du Ciel, & l'autre du tems de l'Empereur Claude, parut d'abord au Septentrion, enſuite ſembloit s'élever continuellement, & cela en ligne droite juſqu'à s'éloigner hors la portée de ſa vue.

Du mouvement propre ou réel des Cometes.

Pour connoître méchaniquement ou à peu près la route d'une Comete dans les cieux, on pourra ſe ſervir d'un globe céleſte, ſur la ſuperficie duquel ſoient exactement placées les Etoiles, chacunes dans leurs Conſtellations. On comparera tous les jours la Comete aux quatre Etoiles les plus proches, & que l'on aura choiſies de maniere que la Comete ſe trouve dans l'interſection des deux lignes tirées de chaque Etoile à celle qui lui eſt oppoſée; ce qui ſe peut pratiquer par le moyen d'un fil tendu à la vue ſimple (ou plutôt dans la lunette) & que l'on fera paſſer par la Comete & par les Etoiles: il y en a un ſi grand nombre de très-petites qu'on pourra ſouvent répé-

Maniere d'obſerver le cours apparent des Cometes.

PLANCHE VI. *Fig.* 8.

ter cette opération sur différentes Etoiles, sur-tout si l'on y emploie des lunettes de douze à quinze pieds. Soit donc la Comete, par exemple, en *A* au milieu des quatre Etoiles *B*, *C*, *D*, *E*, que l'on aura choisies, en sorte que le fil qui coupe en deux la Comete, passe exactement par les Etoiles *B* & *D*, comme aussi par les deux autres *C* & *E*. Ayant reconnu ces Etoiles sur le globe, selon leurs longitudes & latitudes, on étendra sur la surface sphérique de ce globe deux fils qui passeront semblablement chacuns par deux de ces Etoiles, & alors l'intersection commune de ces deux fils désignera le lieu apparent de la Comete dans le Ciel. Si l'on répete chaque jour cette opération, & qu'on ait soin de déterminer ainsi de nouvelles positions de la Comete sur le globe, en choisissant parmi les Etoiles environnantes celles dont les lieux se trouvent dans les Catalogues, on s'appercevra aussi-tôt que la Route apparente de la Comete, laquelle passe par tous ces lieux déterminés, sera un grand cercle de la Sphere; car il est certain que tous les points où l'on a observé le lieu de la Comete ne s'écarteront pas sensiblement de la circonférence d'un grand cercle, les observations l'ayant d'ailleurs confirmé tant de fois; ce que l'on pourra vérifier en suivant la Méthode que nous venons d'exposer ici.

Il est évident par là qu'il suffira désormais d'avoir déterminé seulement deux ou trois positions du cours d'une Comete (lorsque son mouvement est très-sensible & qu'il paroît à la vue simple se faire en ligne droite) puisque deux de ces points suffisent pour déterminer la position du grand cercle: on aura donc ainsi l'inclinaison apparente * de son orbite sur le plan de l'Ecliptique, son intersection ou son nœud apparent, ce que l'on doit d'abord découvrir assez facilement par le prolongement du fil appliqué sur la surface du globe, pourvu que l'on ait attention de le faire passer exactement par les deux points

* *Cette inclinaison qui paroît d'abord constante, & qu'on a trouvé néanmoins assez différente, vers la fin*

qui répondent aux lieux de la Comete obſervés.

de l'apparition des Cometes, a fait connoître qu'elles étoient ſujetes à la Parallaxe de l'orbe annuel.

Une autre Méthode en uſage depuis très-long-tems parmi les Aſtronomes, c'eſt d'obſerver chaque jour la diſtance de la Comete à deux Etoiles fixes, dont les longitudes & latitudes ſoient connues, ce qui déterminera ſon lieu dans le Ciel. Or l'on conçoit aſſez que pluſieurs de ces lieux placés comme ci-devant ſur la ſurface du globe, déſigneront bientôt le mouvement de la Comete vu de la Terre (puiſqu'elle ne s'écarte pas d'un grand cercle), à moins que ce ne ſoit le mouvement propre & journalier de la Terre ſur ſon orbite, ou la parallaxe du grand orbe qui la détourne * un peu de ſon cours; ce qui n'arrive gueres, comme nous l'avons dit, qu'au commencement ou vers la fin de ſon apparition. Quant aux diſtances de la Comete aux plus proches ou aux plus belles Etoiles fixes, on peut les obſerver avec des Quarts-de-Cercle ou Sextans, en les plaçant de maniere que le plan de leur limbe paſſe par la Comete & par l'Etoile; car alors ſi on dirige la pinnule ou lunette fixe à l'Etoile, par exemple, & celle de l'Alidade à la Comete, les degrés & minutes &c de la circonférence, marqués par l'Alidade déſigneront la diſtance apparente de la Comete à l'Etoile, ce que l'on pourra réitérer autant de fois qu'on voudra, & cela ſur deux ou pluſieurs Etoiles fixes: les Aſtronomes ſe ſervent auſſi d'une lunette garnie d'un Micrometre, ce qui eſt d'autant plus avantageux qu'il n'eſt beſoin en ce cas que d'un ſeul Obſervateur pour meſurer la diſtance de la Comete aux Etoiles qui l'environnent.

Autre Méthode d'obſerver le cours apparent des Cometes.

Il ſuit de ce que nous venons de dire que les Cometes ſe meuvent toutes dans un plan qui paſſe, non pas par notre œil, mais par le Soleil, & dès-lors il eſt néceſſaire que quelque mouvement qu'ait un corps céleſte dans

Les Cometes ſe meuvent toujours dans un plan qui paſſe par le Soleil.

* Elle peut auſſi changer aſſez ſubitement de direction vers le tems de ſa conjonction au Soleil, ou plutôt, un peu avant ou après ſon paſſage par le Périhélie, comme il eſt arrivé à celles de 1680 & de 1744.

ce plan, ſon cours ne paroiſſe plus s'écarter de la circonférence d'un grand cercle. Ainſi le mouvement des Cometes ſera donc régulier & parfaitement réglé: car quoiqu'elle ſoit ſujette à certaines inégalités, on obſerve néantmoins dans ſon cours une aſſez grande régularité, nonobſtant les inégalités apparentes qui l'accélerent ou la retardent.

Variétés ſurprenantes dans leurs cours.

Cependant le mouvement propre de chaque Comete ne ſe fait pas à beaucoup près dans le même ſens, puiſqu'il eſt varié à l'infini, les unes s'avançant d'Occident en Orient, lorſqu'au contraire la plupart ſe trouvent emportées contre l'ordre des Signes, c'eſt-à-dire, dans un ſens oppoſé à celui des Planetes. Bien plus, depuis que l'on obſerve le cours des Cometes avec quelque attention, on s'eſt apperçu qu'il ſe dirigeoit tantôt vers le Nord & tantôt vers le Midi, & cela avec des inclinaiſons ſi différentes, qu'il n'a pas été poſſible de les renfermer dans un Zodiaque, de la même maniere que les Planetes; car ſi elles ſe trouvent une fois dans ce Zodiaque, elles en ſortent bientôt avec plus ou moins de viteſſe & par différens côtés. Regiomontanus en a obſervé une qui paroiſſoit avoir une viteſſe bien extraordinaire, puiſqu'elle parcourut 40 degrés en un jour. Enfin il y a des Cometes dont le mouvement eſt plus rapide au commencement qu'à la fin de leur cours: au contraire d'autres ſe meuvent très-rapidement au milieu, & très-lentement ſoit au commencement ſoit à la fin de leur apparition.

Les Cometes vers la fin de leur apparition ſemblent ſe détourner un peu de la circonférence du grand cercle qu'elles ont ſuivies.

On a obſervé encore que pluſieurs Cometes avant que de diſparoître entierement commençoient à s'écarter vers la fin de leur cours, de la circonférence du grand cercle qu'elles avoient ſuivies juſques là ſi conſtamment; ce que l'on a remarqué d'autant plus facilement qu'en recherchant, comme nous l'avons expliqué ci-deſſus, leur inclinaiſon apparente, ou l'angle que ſembloit former leur orbite avec le plan de l'Ecliptique, on a trouvé qu'il changeoit

geoit bien plus ſenſiblement vers la fin de leur apparition; mais cette déviation apparente eſt bien moins cauſée par le mouvement réel de la Comete que par celui de la Terre, ainſi qu'il arrive tant aux Planetes ſupérieures qu'aux inférieures, dont les diſtances au plan de l'Ecliptique ſont ordinairement, très-différentes (toutes choſes d'ailleurs égales) ſelon les diverſes poſitions de la Terre ſur ſon orbite. Car il eſt certain que ſi les Cometes étoient obſervées du Soleil, elles paroîtroient décrire véritablement un grand cercle.

Quels ſont les véritables orbites des Cometes.

Au reſte, il ne faut pas s'imaginer que parce que les Cometes paroiſſent décrire aſſez exactement un grand cercle de la Sphere, leur véritable cours ſe faſſe pour cela dans la circonférence d'un cercle; car les mêmes apparences s'obſerveront conſtamment, ſoit qu'une Comete ſe meuve dans une ligne droite, ſoit dans une ellipſe, une parabole ou une hyperbole, pourvu qu'elle ne ſorte pas effectivement du même plan. En effet, dès que l'on ſuppoſe un plan qui paſſe par l'œil, tout corps en mouvement, quel qu'il ſoit, & quelque route qu'on lui attribue, paroîtra conſtamment dans la circonférence d'un grand cercle. Auſſi le plus grand nombre des Philoſophes & des Aſtronomes du dernier ſiécle ont-ils ſuppoſé que les orbites des Cometes étoient rectilignes, juſqu'à ce qu'on ſe ſoit enfin apperçu qu'une orbite parabolique ou elliptique s'accordoit bien mieux avec les phénomenes obſervés. Il eſt vrai que pour ſuppoſer leurs orbites elliptiques, il les faut imaginer prodigieuſement allongées ou excentriques, c'eſt-à-dire, que leur premier axe doit être incomparablement plus grand que le ſecond, & c'eſt en cela que les orbites des Cometes pourroient être diſtinguées de celles des Planetes, puiſque ces dernieres décrivent des ellipſes ſi peu excentriques qu'elles ne different preſque pas d'un cercle, à moins qu'on n'en

Hévélius s'eſt apperçu le premier qu'elles ſe courbent en s'approchant du Soleil.

veuille excepter Mars & Mercure qui ont une excentricité un peu plus grande que les autres Planetes. Mais on doit bien remarquer que le Soleil se trouve toujours au foyer commun de toutes les orbites tant des Planetes que des Cometes, & que généralement tous les Astres se meuvent autour de ce point ou foyer, sans s'écarter de cette fameuse loi constante, qui consiste à décrire des aires proportionnelles aux tems. Or il suit de là que les Cometes sont assujetties de même que les Planetes à l'effet de la gravitation qu'on peut bien considérer comme une pésanteur universelle vers le Soleil.

Dans quels tems les Cometes se meuvent à nos yeux, & dans quels tems elles disparoissent.

On voit présentement la raison pourquoi les Cometes ne doivent être uniquement apperçues que lorsqu'elles descendent dans la partie la plus basse de leur orbite, c'est-à-dire, vers le Soleil; car comme elles remontent ensuite vers la partie la plus haute, qui est l'extrémité du premier axe de leur orbite, elles s'éloignent par conséquent du Soleil; & venant à parcourir des régions fort éloignées, elles se trouvent en ce cas hors la portée de notre vue. On comprendra ceci d'autant plus facilement qu'il est nécessaire de considérer deux causes principales de leur peu de lumiere; car outre qu'elle diminue & qu'elle est bien moins vive à mesure qu'une Comete s'éloigne du Soleil (dont elle nous réfléchit les rayons de la même maniere que les Planetes) il arrive aussi que le diametre apparent des Cometes diminue à mesure qu'elles s'éloignent, jusqu'à devenir insensible à notre égard. On doit aussi remarquer que vers le tems de leur passage par l'Aphélie lorsqu'elles parcourent les régions les plus éloignées du Soleil, leur mouvement doit être prodigieusement lent; c'est pourquoi dans des orbites aussi excentriques, il doit arriver qu'elles seront comme immobiles au tems du passage par l'Aphélie, & qu'au contraire leur mouvement doit se faire avec une rapidité prodigieuse au tems du passage par le

Périhélie, & c'eſt ce qui fait qu'on les apperçoit ſi peu de tems à chaque fois qu'elles deſcendent vers le Soleil.

Soit le Soleil en *S*, *ABPD* l'orbite elliptique d'une Comete, *TCE* l'orbite de la Terre. Si l'on ſuppoſe que le demi-axe de l'ellipſe ou de l'orbite de la Comete ſoit cent fois plus grand que la moyenne diſtance de la Terre au Soleil, il eſt évident que cette Comete n'achevera ſa révolution périodique autour du Soleil que dans mille ans ou environ ; car ſelon la regle de Kepler, les Quarrés des tems périodiques doivent conſtamment ſe trouver dans le même rapport que les cubes des diſtances moyennes *à l'égard du Soleil. Ainſi il eſt vrai de dire qu'une Comete, dans la ſuppoſition que l'on vient de faire, ne doit ſe retrouver à la portée de notre vue qu'après avoir parcouru un très-long eſpace, ſçavoir lorſqu'elle s'approchera de la Terre, à meſure qu'elle deſcend vers le Soleil comme en *F*, ou bien lorſqu'elle commencera à remonter auſſi-tôt après ſon paſſage par le Périhélie ; car dans ce dernier cas on doit l'appercevoir encore quelque tems juſqu'à ce qu'elle ceſſe de ſe montrer en *G*. D'un autre côté, ſi la diſtance Aphélie eſt à la diſtance Périhélie, c'eſt-à-dire, ſi la plus grande diſtance de la Comete au Soleil eſt à ſa plus petite diſtance comme 1000 eſt à 1, la viteſſe de la Comete au tems de ſon paſſage par le Périhélie ſera donc à la viteſſe qu'elle doit avoir au tems de ſon Aphélie dans le même rapport : cela eſt évident, puiſque l'aire *ASB* doit toujours être égale à l'aire *DSP*, les arcs *AB*, *DP* étant parcourus dans des tems égaux. Mais il n'eſt pas moins évident que la viteſſe angulaire de la Comete autour du Soleil doit être alors en raiſon doublée ou comme les quarrés de 1000 & de 1. C'eſt pourquoi ſi la Comete parcourt en un jour un angle d'un degré autour du Soleil au tems du paſſage par le Périhélie, elle ne parcourra plus au paſſage par l'Aphélie que la $\frac{1}{1000000}$ partie d'un

PLANCHE VI. Fig. 9.

* *La moitié du grand Axe eſt toujours égale à la diſtance moyenne de la Planete, au foyer de l'Ecliptique.*

degré: on voit par là quelle doit s'y mouvoir si lentement qu'il faudra plusieurs années pour qu'elle puisse parcourir un degré.

Dans l'Astronomie on peut supposer que les petites portions d'Ellipses que nous voyons parcourir aux Cometes pendant quatre à cinq Mois, ne different pas sensiblement d'une Parabole.

Les ellipses que décrivent les Cometes ayant donc une si grande excentricité, on a regardé jusqu'ici comme des vraies paraboles, les petites portions de ces orbites que nous voyons décrire aux Cometes; car une ellipse dont les foyers seroient à une distance presqu'immense, ne differe pas sensiblement d'une parabole, de la même maniere qu'elle dégénere en un cercle lorsque ses deux foyers s'approchent & se réuniſſent au même point. L'avantage que l'on a trouvé à supposer que les orbites des Cometes étoient de véritables paraboles, c'est qu'il en résulte une approximation ou forme de calcul beaucoup plus facile que si l'on venoit à considérer ces mêmes orbites comme de véritables ellipses. C'est aussi ce qui a principalement déterminé le célebre Mathématicien M. *Halleï* à construire une Table générale pour calculer les mouvemens des Cometes; car une seule Table suffit, toutes les paraboles étant semblables, au lieu que les ellipses ayant une excentricité variable ne sont plus de même espece & le calcul en devient plus pénible & plus compliqué. Supposant donc que le mouvement des Cometes se fait dans un orbe parabolique, M. Halleï a appliqué cette théorie à toutes les Cometes qui avoient été soigneusement observées, & le calcul étant achevé, on s'est apperçu que leurs mouvemens déduits jour par jour de la théorie, étoient si conformes & s'accordoient avec tant de précision dans l'espace de plus 180° & même de 9 Signes, qu'à peine y a-t-on trouvé quelquefois une différence de 3 minutes. Tant de Cometes observées, & qui ont toutes paru si conformes à la théorie, ont fait voir manifestement qu'on pouvoit espérer de prédire, selon ces principes, le mouvement apparent des Cometes

avec au moins autant de précision que celui des Planetes calculées sur les meilleures Tables Astronomiques, & quoiqu'il soit vrai de dire que les Cometes ont une bien plus grande inégalité réelle dans leur mouvement que nos Planetes (puisque l'excentricité de leur orbe est infiniment plus grande) cela n'empêche pas néantmoins que leur orbite calculée ne réponde aussi parfaitement aux observations que celles des Planetes, parce que la regle des aires proportionnelles au tems paroît générale & constante pour tous les corps célestes, & se trouve par là confirmée merveilleusement. Or la théorie de M. Newton sur les Cometes a paru d'autant plus véritable qu'elle ne suppose d'autres causes physiques que celles qui sont communes à toutes les Planetes, tous ces Astres étant assujettis constamment aux mêmes loix, & les Observations Astronomiques s'y étant accordées si parfaitement jusqu'à ce jour.

Cette grande découverte de M. Newton sur la vraie théorie des Cometes a paru si belle & si intéressante qu'elle a anéanti tout-à-coup les hypotheses des autres Astronomes.

Les Observations des Cometes dont Tycho s'étoit déja servi si utilement pour renverser l'opinion des Sectateurs d'Aristote, n'ont gueres été plus favorables en ces derniers tems aux Tourbillons imaginés par Descartes; puisqu'on s'est enfin apperçu qu'au moins la moitié des Cometes observées jusqu'ici, avoient un cours opposé ou directement contraire à celui des Planetes. Quand Descartes composa son système sur les débris de la Philosophie d'Aristote, il ne sçavoit gueres l'Astronomie de son tems, comme on le verra ci-après. Il n'ignoroit pas cependant au sujet des Cometes ce que Tycho avoit découvert, c'est-à-dire, qu'il étoit impossible que ces Corps fussent répandus dans notre air. Mais comme les Cieux solides n'avoient été imaginés par Aristote que pour retenir chaque Planete ou les empêcher de s'échapper par la tangente, & qu'il avoit, pour ainsi dire, précipité par cette raison, toutes les Cometes au-dessous de la Lune, cette

opinion ne pouvant plus subsister, Descartes imagina un grand fluide ou Tourbillon solaire dans lequel il a prétendu qu'elles devoient nager. Cette nouvelle hypothese paroissoit d'autant plus simple qu'on se persuadoit déja d'être bientôt en état d'expliquer par là tous les phénomenes, à quoi on s'est d'autant plus attaché que les découvertes de Galilée & de MM. Huyghens & Cassini sur les Satellites de Jupiter & de Saturne, n'exigeoient autre chose que de petits tourbillons qu'on faisoit mouvoir dans le même sens; ce qui n'auroit pas été aussi facile si les Planetes tant du premier que du second ordre eussent fait leurs révolutions dans des sens opposés les unes aux autres.

Un grand nombre de Cometes se meuvent d'Orient en Occident ou contre l'ordre des Signes.

Mais quoique toutes les Planetes se meuvent dans leurs orbites d'Occident en Orient, on observe cependant un grand nombre de Cometes qui sont emportées en sens contraire, en sorte que leur mouvement réel est véritablement rétrograde ou contre l'ordre des Signes. Descartes auroit dû considérer, par exemple, celle qui fut observée par Regiomontanus l'an 1472 & dont la viteſſe apparente sembloit prodigieuse, puisqu'elle parcourut environ 40 degrés en un jour. S'il se fût donné la peine de calculer les orbites de plusieurs autres Cometes, lui qui étoit si grand Géometre, il se seroit bientôt apperçu qu'il y en avoit un très-grand nombre qui étoient rétrogrades. Mais il s'est contenté d'expliquer le mouvement des Planetes d'une maniere vague, ne faisant pas même attention à l'inclinaison de leur orbe sur le plan de l'Ecliptique; en sorte que dans son systeme, on ne sçauroit concevoir pourquoi le mouvement du fluide ou grand Tourbillon solaire emporteroit les Planetes autrement que selon un seul & même plan, sçavoir celui de l'Ecliptique. Il paroît donc présentement que les Tourbillons de Descartes n'existent point comme quelques Phisophes l'ont

cru sans l'avoir examiné ; car si le grand Tourbillon solaire avoit lieu, ce Tourbillon, de même qu'un torrent, emporteroit d'Occident en Orient les Cometes lorsqu'elles y descendent. En effet lorsqu'une Comete est parvenue à la hauteur de la Terre, la viteſſe du Tourbillon devient alors si grande, que si ce Tourbillon existoit réellement, il faudroit de néceſſité qu'il l'entraînât, & qu'ainsi la Comete parcourût à chaque heure plus de 7000 lieues ; d'où l'on voit que cet espece de torrent ou entraîneroit les Cometes avec une très-grande rapidité, ou détruiroit bientôt leurs mouvemens s'ils se faisoient en sens contraire. Qui ne voit donc pas à présent, de la maniere du monde la plus évidente, qu'aucun corps ne pourroit se maintenir long-tems contre l'effort prodigieux d'un semblable torrent ? D'un autre côté l'on observe qu'un grand nombre de Cometes se meuvent contre la direction de ce prétendu torrent, & cela avec la plus grande facilité, ayant un mouvement très-libre ; en sorte qu'elles obſervent les loix générales auſquelles elles sont toutes assujetties, préciſément de même que s'il n'y avoit aucun fluide qui pût leur réſiſter. On voit ainsi que ces obſervations sont abſolument contraires & répugnent à la nature des Tourbillons ; car dès qu'on suppoſe un fluide qui entraîne les Planetes, il faut néceſſairement qu'il entraîne auſſi dans le même sens tous les autres corps solides à meſure qu'ils y tomberont. C'eſt pourquoi, puiſque cela n'arrive pas à l'égard des Cometes, on peut donc établir comme une vérité dont il n'eſt plus permis de douter, qu'il n'y a aucune matiere dans les Cieux capable de réſiſter au mouvement des Planetes ; qu'il n'y a, dis-je, aucun milieu qui ait une denſité aſſez ſenſible, ni qui soit comparable à notre air. Car il eſt certain que ce dernier détruit bien ſenſiblement le mouvement des corps lancés au-deſſus de la ſurface de la Terre, comme cela se voit par le jet des bombes & des autres projectiles.

Il n'y a point de Tourbillons dans les cieux, comme l'ont prétendu Deſcartes & ceux de ſa Secte.

Il y a donc lieu de croire que ceux qui ont étudié les Principes de la Philoſophie de Deſcartes ou de Leibnits, s'en détacheront d'autant plus facilement, quant à ce qui regarde les Tourbillons, qu'il eſt aiſé de voir, ſur-tout lorſqu'on a appris un peu d'Aſtronomie, que ces prétendus Tourbillons répugnent aux Obſervations des Cometes. Quant à ceux qui ſemblent s'efforcer d'expliquer par là le mouvement des corps céleſtes, ils ne doivent gueres être écoutés, puiſqu'ils n'ont qu'un tiſſu de fictions impoſſibles ou imaginaires à nous propoſer.

La matiere fluide répandue dans les cieux eſt ſi rare, qu'elle n'a pas la moindre denſité ſenſible.

On doit encore conſidérer que puiſque la réſiſtance d'un milieu dépend de ſa denſité, il doit s'enſuivre que là où le milieu ne réſiſte pas, ſa denſité ne ſçauroit gueres être bien ſenſible. Mais puiſqu'on eſt convaincu aujourd'hui que les Cometes n'éprouvent aucune réſiſtance ſenſible dans les Cieux, mais qu'elles parcourent avec la plus grande liberté leurs trajectoires, de la même maniere que ſi elles ſe mouvoient dans le vuide, la réſiſtance du milieu doit donc être bien peu conſidérable. En effet on prouve que ce milieu peut être ſi rare, que ſi l'on en excepte la maſſe des Planetes & des Cometes, auſſi-bien que leurs athmoſpheres, ce qui reſte de matiere dans tout l'eſpace Planétaire, c'eſt-à-dire, depuis le Soleil juſqu'au delà de l'orbite de Saturne, doit être ſi rare & en ſi petite quantité, qu'à peine occuperoit-elle, étant ramaſſée, plus d'eſpace que celui qui eſt contenu dans un pouce d'air pris dans l'état où nous le reſpirons: la démonſtration géométrique s'en trouve dans les Ouvrages de MM. Newton, Keill & Gregori; mais celle qu'en a donnée Roger Côtes dans ſes Leçons phyſiques paroît plus ſimple, étant d'ailleurs plus à la portée des Commençans.

Le mouvement des Cometes étant

Les Philoſophes Scholaſtiques qui ont fait juſqu'ici tant de mauvais raiſonnemens métaphyſiques contre le vuide

vuide, n'ont pas besoin d'être réfutés davantage. Semblables à ces fameux Sophistes de la Grece, il semble qu'ils tâchent d'envelopper leurs questions de tant de subtilités qu'il vaut mieux n'y faire aucune attention, au plutôt y répondre à la maniere de Diogene qui les voyant disputer contre le mouvement, imagina que de se promener c'étoit la meilleure façon de leur répondre : ainsi bien loin de s'embarrasser dans cette multitude de sophismes que les Scholastiques mettent à chaque instant dans la dispute, on ne leur doit proposer autre chose que de vouloir bien suivre les Mouvemens d'une Comete dans les cieux ; car malgré les raisonnemens ou subtilités de l'Ecole, ils connoîtront bientôt la nécessité d'admettre le vuide.

Il paroît d'abord qu'on doit voir bien moins souvent les Cometes lorsqu'elles descendent vers le Soleil, que lorsqu'elles en remontent immédiatement après leur passage par le Périhélie*; car lorsqu'elles descendent elles n'ont presque point de queues, n'étant pas encore assez échauffées par le Soleil. Aussi sont-elles alors bien moins remarquables, en sorte qu'elles échappent souvent à nos yeux ; au lieu qu'après leur passage par le Périhélie, elles paroissent souvent avec des queues presqu'immenses & du moins assez grandes pour être remarquées de tout le monde. Ces queues semblent composées d'une matiere lumineuse, très-rare ** & des plus subtile. Il semble que la chaleur du Soleil ait atténué les particules de cette matiere, qui pour lors s'éleve avec beaucoup de force de la

* La Comete de 1742 qui a été rétrograde n'a été apperçue qu'après son passage par le Périhélie, mais c'est uniquement parce qu'elle n'étoit pas visible en Europe (étant dans la Partie australe du Ciel) lorsqu'elle descendoit vers le Soleil : le contraire est arrivé à l'égard de celle de 1744. En général la proposition énoncée ci-dessus est vraie, mais il faut bien prendre garde qu'on y suppose toutes choses égales ; autrement une Comete en descendant vers le Soleil pourroit se trouver beaucoup plus près de la Terre qu'en remontant, & partant seroit sans doute visible uniquement dans le premier, & non pas dans le second cas.

** Remarquez qu'on apperçoit les plus petites Etoiles fixes à travers les queues les plus épaisses des Cometes, & cela de la même maniere qu'on les apperçoit dans les pays septentrionaux à travers les plus fortes Aurores boréales.

surface des Cometes. Il pourroit bien se faire qu'elle auroit la même origine qu'une matiere à peu près semblable qui s'exhale de notre Terre * & qu'on a vu dans ces derniers tems s'élever à une hauteur prodigieuse au-dessus de notre Athmosphere ; car ces vapeurs lumineuses, appellées *Aurores Boréales*, ont été apperçues généralement dans toute l'Europe, & il est à remarquer qu'elles ressemblent fort, tant par leur figure, que par leur splendeur à celles des Cometes, n'y ayant peut-être que le défaut de matiere qui puisse faire disparoître l'Aurore Boréale.

* *On remarquera que dans la Suede il n'y a aucune nuit d'hiver où l'on n'apperçoive parmi les constellations ces aurores, & cela dans toutes les régions du ciel.*

Les queues des Cometes sont toujours à l'opposite du Soleil.

Il y a encore ceci à remarquer dans les queues des Cometes, sçavoir qu'elles sont toujours dans la partie opposée au Soleil, c'est-à-dire, que si le Soleil est à l'Occident, la queue semble se répandre vers l'Orient, & au contraire ; en un mot à minuit la queue tend vers le Nord. Ces mêmes queues, comme on l'a déja dit, augmentent sensiblement à mesure que les Cometes descendent vers le Soleil : elles sont très-grandes vers le Périhélie, ensuite elles décroissent à mesure que les Cometes s'éloignent du Soleil, diminuant peu à peu jusqu'à rentrer tout-à-fait dans l'Athmosphere des Cometes.

Elles participent au mouvement du corps de la Comete.

Lorsque les queues des Cometes ne sont pas encore fort grandes, il ne faut pas s'imaginer qu'elles montent avec rapidité, ni qu'elles s'élevent continuellement de la tête de la Comete pour disparoître ensuite ; ce sont plutôt des colomnes permanentes de vapeurs ou d'exhalaisons qui s'éloignant assez lentement de la Comete participent à son mouvement ; car il leur a été communiqué par la tête dès le commencement, ainsi elles continuent de la suivre dans les cieux. On voit clairement par là que dans toute l'étendue des cieux il n'y a point de matiere capable de résister, en sorte que des corps aussi solides que les Planetes & les Cometes, doivent non-seulement s'y mouvoir sans trouver d'obstacles & y achever perpé-

tuellement leurs révolutions, mais auſſi que la même facilité de parcourir les cieux a lieu dans le mouvement de ces vapeurs ſi rares qui compoſent les queues des Cometes.

Longueur de la Queue de la Comete de 1681. auſſi-tôt après ſon paſſage par le Périhélie.

La fameuſe Comete de 1680. que l'on commença à obſerver à Londres & à Paris, auſſi-tôt après ſon paſſage par le Périhélie, avoit alors une queue ſi prodigieuſe qu'elle parut occuper 40 & même 60 degrés dans le Ciel: cela doit d'autant moins nous ſurprendre qu'elle a ſi fort approché du Soléil qu'à peine étoit-elle éloignée de ſa ſurface d'environ la ſixieme partie du diametre Solaire. Ainſi l'œil placé en ce moment dans la Comete auroit vu le Soleil ſous un angle d'environ 120 degrés, c'eſt-à-dire, que le Soleil auroit paru ſi exceſſivement grand, qu'il lui auroit ſemblé occuper plus de la moitié du ciel. On ne doit donc pas être étonné ſi la chaleur que cette Comete a du pour lors reſſentir a été ſi terrible, puiſqu'elle a dû ſurpaſſer trois mille fois celle d'un fer rouge. Mais on voit par là la néceſſité de regarder les Cometes comme de vraies Planetes: elles doivent être conſidérées comme des corps ſolides, très-compacts & permanens; car ſi la Comete de 1680. n'eût été autre choſe qu'un amas de vapeurs ou d'exhalaiſons de la Terre, du Soleil & des autres Planetes, il eſt évident qu'à ſon paſſage par le Périhélie, cette Comete eût été anéantie, & qu'une chaleur bien moins grande, eût été capable de diſſiper bientôt ces vapeurs.

M. Gottfroy Kirck a apperçu le premier cette Comete.

Cette Comete a été vue pendant plus de quatre Mois, ſçavoir depuis le 14. Novembre qu'elle fut obſervée à Cobourg en Saxe par M. Kirck, juſqu'au 19. Mars de l'année 1681. que M. Newton ceſſa de l'appercevoir: comme elle parut couper deux fois le plan de l'Ecliptique, on vit d'abord ce qu'Hévélius avoit déja remarqué ſur d'autres Cometes, que ſa trajectoire n'étoit pas tout-à-fait rec-

La Comete de 1680. & de 1681. a été observée avant & après sa conjonction au Soleil.

tiligne, mais qu'elle se courboit un peu en s'approchant du Soleil. Il y a plus, on s'apperçut pour la premiere fois qu'elle tournoit autour du Soleil: & c'est ce qui confirma entierement M. Newton dans la découverte qu'il fit pour lors de sa véritable théorie; car le mouvement de cette Comete calculé dans une orbe parabolique & ensuite dans une ellipse, s'accorde si parfaitement avec cette multitude d'Observations qu'on avoit faites du mouvement de la Comete dans l'espace de 9 Signes qu'elle a parcourus en longitude, qu'on peut bien dire que la théorie s'accorde aux observations avec autant de certitude qu'on calcule le Lieu des Planetes. Le mouvement apparent de cette Comete sembloit assujetti à des inégalités extraordinaires: mais, comme on l'a expliqué ci-dessus, ce n'étoit autre chose qu'un effet du mouvement réel de la Terre autour du Soleil. Lorsqu'elle parut pour la premiere fois au 29° 51′ du Lion, elle ne parcouroit pas deux degrés par jour: environ quinze jours après, vers le commencement de Décembre, son mouvement diurne étoit d'environ cinq degrés, ensuite il a paru retarder entre le 5 & le 20 du Mois de Décembre, la Comete n'ayant parcouru dans un intervalle de 15 jours & demi qu'environ 40 degrés. Après son passage par le Périhélie elle recommença à accélérer son mouvement, faisant alors environ 5 degrés par jour. Enfin elle a retardé sensiblement de jour en jour jusqu'au 19 Mars qu'on l'a observée pour la derniere fois au 0° 43′ des Gemeaux.

Irrégularités apparentes dans le mouvement de cette Comete.

La Comete de 1744.

L'orbite de la Comete qui a commencé à paroître au 13 Décembre 1743 ** & qu'on a cessé d'observer en Europe au commencement du Mois de Mars de l'année suivante, peu de tems après son passage par le Périhélie, a été calculée comme il suit dans une orbe parabolique. En voici les principaux résultats.

*** La premiere observation en a été faite à Lausanne par M. de Cheseaux.*

La distance Périhélie ou sa plus grande proximité du

Soleil a été de $\frac{2252}{10000}$ de la moyenne distance du Soleil à la terre: ainsi la Comete s'en est plus approchée que Mercure.

Soit le lieu de la Terre en *T*, le 21 Décembre 1743. à $6^h\ 57'\ 57''\frac{1}{2}$ de tems moyen, & le lieu du Soleil calculé pour le même instant ♑ 29° 36′ 02″½, le logarithme de sa distance à la Terre *ST* 9.992675: soit aussi le lieu apparent de la Comete α, mais réduit au plan de l'Ecliptique (par la Perpendiculaire abaissée en *A*) ♈ 22° 23′ 02″½, avec une latitude géocentrique boréale 16° 18′ 55′, mesurée par l'angle αTA: l'élongation de la Comete au Soleil ou l'angle *STA* auroit donc été de 112° 47′ 00″. PLANCHE VI. *Fig.* C.

De même si on suppose qu'au 17. Fevrier 1744. à $6^h\ 34'\frac{1}{2}$ de tems moyen, la Terre se soit trouvée au point τ de son orbite, la longitude du Soleil étant ♒ 28° 31 20″, & le logarithme de sa distance à la Terre 9.995183, puisque la longitude géocentrique de la Comete a été déterminée au même instant ♌ 20° 55′ 35″ ou 40″, & sa latitude géocentrique boréale de 19° 24′ 43″, on aura donc l'élongation $S\tau C$ de 22° 24′ 20″, & l'angle $\sigma\tau C$, qui est la latitude apparente de la Comete au moment de l'observation, de 19° 24′ 43″.

La Comete ayant paru sous un angle un peu plus grand au tems de la seconde, que de la premiere observation, il s'ensuit que sa Trajectoire ou sa projection a dû passer entre la Terre & le Soleil. Ainsi on a cru devoir essayer à diverses fois de connoître la valeur de l'angle τSC* qui est l'élongation, vue du Soleil, de la Comete à

* Dans le Triangle τSC étant connus les angles, comme aussi le côté τS distance de la Terre au Soleil, on a calculé la valeur des côtés τC, *SC*: mais dans cette supposition, puisque la Perpendiculaire σC élevée sur le plan de l'Ecliptique, passe par le lieu de la Comete σ, on fera donc au Triangle Rectangle $\tau C\sigma$, comme le Rayon, est à la Tangente de la latitude géocentrique observée, ainsi τC, sera à $C\sigma$: & la somme des quarrés de *SC*, $C\sigma$, donnera au Triangle Rectangle $SC\sigma$, la valeur du quarré de l'hypotenuse, & par conséquent la distance de la Comete au Soleil $S\sigma$.

l'égard de la Terre, & on l'a supposé d'abord de la moitié, ensuite des deux tiers de l'angle droit. Enfin après plusieurs tentatives on en approché jusqu'à pouvoir le conclurre assez juste de 56°.

De quelle maniere on peut déterminer par approximation les Trajectoires des Cometes.

Quoique la méthode que l'on explique ici soit un des meilleurs moyens de trouver par le calcul & par approximation la vraie trajectoire des Cometes, il faut avouer cependant qu'on est obligé de revenir souvent à de nouvelles suppositions, & de recommencer un long calcul pour approcher davantage dans la recherche des angles au Soleil, ou de la vraie position de la trajectoire que la Comete a parcourue. C'est ainsi qu'après plusieurs tentatives on a trouvé la valeur approchée de l'angle τSC: mais pour y parvenir il a fallu en même tems tenter à diverses fois celle de l'angle TSA, lequel angle devient toujours déterminé relativement à l'angle τSC, comme on le verra par ce qui suit.

Soit supposé en second lieu l'angle TSA de 34° 12′ 20″, sçachant la distance TS de la Terre au Soleil, on connoîtra donc comme ci-dessus les côtés TA, SA, du Triangle TSA, comme aussi l'hypotenuse ou distance $S\alpha$ de la Comete au Soleil, au moment de la premiere observation.

PLANCHE VI. *Fig.* C. & D.

Il ne s'agit donc plus que de trouver le côté $\sigma\alpha$ ou l'angle $\sigma S\alpha$ * compris entre les deux distances données de la Comete au Soleil au tems de la premiere & de la seconde observation; car si l'on fait passer ensuite par les points σ & α une Parabole, cette courbe représentera (dans la supposition qu'on a faite ci-dessus des angles au Soleil de

* Pour trouver l'angle $\sigma S\alpha$, on doit considérer que la Projection CSA de cet angle sur le plan de l'Ecliptique est déja connue, & partant la base CA peut être facilement calculée par la Trigonométrie, ou plutôt en se servant de la méthode de Street expliquée page 552: mais parce qu'on connoît aussi les Perpendiculaires $C\sigma$, $A\alpha$, & par conséquent leur différence de hauteur $a\alpha$, il sera facile de connoître enfin le côté $\sigma\alpha$, en menant par le point σ, c'est-à-dire, par l'extrémité de la Perpendiculaire la moins élevée, une ligne droite σa parallele ou égale à la base CA, & calculant ensuite la valeur de l'hypotenuse $\sigma\alpha$.

56° & de 34° 12′⅓) la trajectoire de la Comete que l'on cherche.

La valeur de l'hypotenuse de $\sigma\alpha$ (laquelle seroit égale à CA si les perpendiculaires $C\sigma$, $A\alpha$, étoient égales) étant une fois déterminée, & connoissant aussi les trois côtés du Triangle $S\sigma\sigma$, il sera facile de faire passer une Parabole * par les points σ & α, & qui aura son foyer au point S.

Pour s'assurer présentement si l'angle TSA que l'on a supposé de 34° 12′⅓ dans le calcul du Triangle TSA, n'est point trop grand ou trop petit relativement au premier angle τSC, il n'est question que de vérifier si dans l'espece de Parabole qu'on vient de déterminer, l'aire ** PLANCHE VI. *Fig.* C.

Voyez la Théorie des Cometes

Fig. D.

* Soit le Triangle $\sigma S\alpha$ formé par les lignes droites tirées de la Comete au Soleil: des points σ & α, comme centre, & des intervalles σS, αS, on décrira les cercles SNI, SML. Ayant ensuite mené la ligne droite MNO qui touche l'une & l'autre circonférence: on abaissera les perpendiculaires SO, σN, αM, & par le point σ on menera la ligne droite $R\sigma r$ parallele à MNO: la ligne OSr, sera l'axe de la Parabole, & la distance SO la moitié du Parametre. Divisant donc SO en deux également au point P, le point P sera l'extrémité de l'axe de la Parabole, & par conséquent le Lieu du Périhélie de la Comete dans son orbite.

Il est facile de déterminer les angles $PS\sigma$, $PS\alpha$, compris entre l'un & l'autre lieu de la Comete déduit des observations & le Périhélie, comme aussi la plus petite distance SP de la Comete à l'égard du Soleil. Car dans le Triangle Rectangle $\sigma R\alpha$, on connoit l'hypotenuse $\sigma\alpha$, & le côté $R\alpha$ (qui est égal à la différence des lignes $M\alpha$, $N\sigma$ ou de $S\alpha$, $S\sigma$,) on pourra donc calculer la valeur de l'angle $R\sigma\alpha$ ou de son supplément à 180° $\alpha\sigma r$: mais puisque les trois côtés de Triangle $\alpha\sigma S$ sont connus, l'angle $\alpha\sigma S$ est donc aussi déterminé, & partant la différence des angles connus $\alpha\sigma r$, $\alpha\sigma S$, sçavoir, $r\sigma S$ étant donnée, on pourra calculer dans le Triangle Rectangle σrS la valeur du côté Sr: on connoitra aussi la valeur de l'angle σSr ou de son complément à 90° σSP, d'où il sera facile de conclurre αSP. Enfin la distance SP du Périhélie de la Comete au Soleil sera donnée, puisqu'on a $2PS + Sr = rO = \sigma S$, qui est la distance de la Comete au Soleil déja calculée pour le tems de la seconde observation.

** Le complément arithmétique du logarithme Sesquialtere de la distance de la Comete au Soleil, sçavoir, dans notre exemple 0.970846 étant ajouté au logarithme d'un jour 9.560128, la somme est le logarithme de 0.530974, qui étant retranché du logarithme de l'angle $PS\sigma$, qui est de 94° 02′ 53″ (& qu'on trouvera par la Table générale de la Cométographie de M. Hallei de 2.046916) le reste sera le logarithme de l'aire $PS\sigma$ parcourue en 13, 05966 jours. De la même maniere l'aire $PS\alpha$ qui répond à la somme des angles $PS\sigma + \sigma S\alpha = 94°\ 2'\ 53'' + 43°\ 07'\ 33'' = 137°\ 10'\ 26''$, a dû être parcourue en 71, 015 jours. Ainsi dans la Parabole qu'on vient de déterminer, la Comete auroit employé 57 jours, 965 à descendre depuis α jusqu'en σ, ce qui differe à peine du tems écoulé entre les observations, puisqu'on auroit dû trouver tout au plus 57 jours, 985; d'où l'on peut conclurre que l'angle TSA (*Fig.* C.) qu'on a supposé ci-dessus de 34° 12′ 20″, seroit d'environ 10″ trop petit, ce qui est presque insensible.

La loi générale de la gravitation étant connue, il est facile de découvrir l'espece de Parabole parcourue par la Comete, & qui doit répondre au tems écoulé entre la premiere & la seconde observation.

parcourue par la Comete répond exactement au tems écoulé entre la 1re & la 2de observation. Cela suppose, comme l'on voit, la loi générale de la Gravitation, selon laquelle la Comete à mesure qu'elle s'approche ou s'éloigne du Soleil augmente ou diminue sa pesanteur en raison renversée du quarré de sa distance à l'égard de cet astre.

Lorsqu'on s'est une fois assuré que l'angle TSA qu'il a fallu supposer d'abord connu à très-peu près, a été approché autant qu'il a été possible du véritable angle vu du Soleil, & qu'il répond au mouvement de la Comete depuis α jusqu'en σ, il ne reste plus qu'à vérifier la supposition que l'on a premierement faite à l'égard de l'autre angle au Soleil τSC: mais pour cet effet il faut achever de déterminer par rapport au plan de l'Ecliptique * la position de la trajectoire de la Comete. Ensuite on pourra comparer avec une 3e observation le lieu apparent de la Comete, calculé selon cette orbite, & en conclurre l'angle τSC.

PLANCHE VI. *Fig.* C. & E.

* Dans le Triangle Rectangle $\sigma a \mu$, on fera comme μa, est à σa ou CA; ainsi le rayon, est à la tangente de l'angle $\sigma \mu a =$ ☋ σC: mais au Triangle Rectangle ☋$C\sigma$, comme le rayon, est à la tangente de ☋σC, ainsi σC, est à C☋: Ces deux Triangles sont dans un plan perpendiculaire à l'Ecliptique; mais si l'on considere le Triangle ☋SC, lequel est dans le plan même de l'Ecliptique, puisqu'on connoit les côtés ☋C, SC, & l'angle compris ☋CS supplément de SCA, il sera facile de calculer par la Méthode de Street l'angle ☋SC, qui donnera la position de la ligne des nœuds, & le lieu du ☋ en ♏ 15° 36′ 06″½. Car la longitude du point C est déterminée à cause de l'angle τSC qu'on a supposé de 56°.

Ayant abaissé du point C sur la ligne des nœuds la perpendiculaire CG, on connoit dans le Triangle Rectangle CGS l'hypotenuse CS, comme aussi l'angle CSG compl. à 180° de ☋SC; on calculera donc la valeur de CG: mais au Triangle Rectangle $GC\sigma$ (lequel est dans un plan perpendiculaire à celui de l'Ecliptique) on aura GC: $C\sigma$:: Rayon: Tang. $CG\sigma$ de 46° 22′ 45″, qui sera l'inclinaison de la Trajectoire sur le plan de l'Ecliptique.

Enfin le Cosinus de l'inclinaison * de la Trajectoire, est au sinus total, comme le sinus de l'angle ☋SC, au sinus de ☋$S\sigma$: ainsi le lieu de la Comete dans son orbite (vu du Soleil) sera connu au tems de la seconde observation, & partant l'angle ☋SP sera donné, ce qui détermine le lieu du Périhélie en ♎ 16° 49′ 22″½; or en se servant de la Table générale de la Cométographie, on découvrira aussi le tems du passage par le Périhélie, le 1 Mars 1744. à 8h 00′ 35″ de tems moyen.

* *Voyez le Lemme démontré pag. 114.*

La même Table générale doit servir à faire découvrir si l'angle τSC qu'on a supposé de 56°, doit être augmenté ou diminué; car il suffit de comparer pour cet effet aux observations du commencement de Décembre ou du mois de Mars, les Lieux de la Comete déduits des Elémens qu'on vient d'établir ci-dessus, & les différences feront connoitre si l'on a assez approché de la vraie Trajectoire. De cette maniere on pourra, si l'on veut, recommencer tout le calcul en faisant varier de quelques minutes l'angle τSC, sans qu'il soit nécessaire pour cela de changer bien sensiblement l'angle TSA.

CHAPITRE


Revolutions Periodiques Autour du Soleil.
Saturne. Employe 29. 167. 22. 4.
Jupiter. à parcourir 11. 314. 22.
Mars. son 1. 321. 23.
la Terre. Orbite. 1. 000. 06.
Venus. 0. 224. 16.
Mercure. 0. 87. 23.
La Lune tourne autour de la Terre, en 27 jours 7 heures. 43' Et ces mouvemens sont si rapides que l'on peut déduire exactement la longitude de chaque lieu dans sur Mer que sur Terre, sur tout lorsqu'on connoit ☽ Etoilles fixes.
Revolutions periodiq. des Satellites de Jupiter en
le premier tourne autour de Jupiter en 1. 18. 28.
le second 3. 13. 14.
le troisieme 7. 03. 59.
le quatrieme 16. 18. 05.
Leurs Immersions ou Emersions de l'Ombre de Jupiter peuvent servir à determiner les Longitudes sur Terre.
Revolutions Autour de l'Axe.
jours h
le Soleil fait en 25 00. 00.
Jupiter. revolution 00. 09. 56.
Mars. en autour 01. 00. 40.
la Terre. de son 00. 23. 56.
Venus. Axe en 00. 23. 00.
la Lune. 27. 07. 43.
Densités
la Lune. 123 ⅓.
la Terre. 100.
le Soleil. 025 ⅓.
Jupiter. 019.
Saturne. 015.
Saturne a cinq Lunes ou Satellites et un Anneau
d h m
le premier tourne 1. 21. 19.
le second autour de 2. 17. 41.
le troisieme Saturne en 4. 12. 25.
le quatrieme 15. 22. 41.
le cinquieme 79 22. 04.
Orbite de Saturne
Jupiter
Mars
la Terre
Comete qui a paru en 1698.
Comete qui a paru en 1682.
Comete qui a paru en 1684.
Perihelie de ♂
Perihelie de ♀
Perihelie de la Terre
Aphelie de ♂
Aphelie de ♀
Aphelie de ♄
Aphelie de ♃
☊ de Saturne
☊ de Mercure
☊ de Mars
☊ de Venus
☊ de Jupiter
Dessiné et gravé par Dheulland

CHAPITRE DIX-HUITIEME.

De la Sphere & de ſes différens Cercles.

COMME il eſt certain que chaque Obſervateur, en quelque endroit de l'Univers qu'on le ſuppoſe, eſt exactement au centre de cette vaſte étendue qui l'environne, puiſqu'elle n'a point de bornes à ſon égard, ou du moins qu'il ne lui eſt pas poſſible d'en reconnoître les limites; il s'enſuit que toutes les fois qu'il conſiderera ſoit de jour, ſoit de nuit, la profondeur ou l'étendue du Ciel, elle doit néceſſairement lui paroître comme une voute ou ſurface ſphérique concave, qui aura pour centre le lieu que ſon œil occupe. Car quoiqu'il ſoit néceſſaire d'admettre à des diſtances fort inégales, cette multitude prodigieuſe d'Etoiles que nous voyons ſous tant de ſortes de grandeurs différentes: néantmoins, comme celles qui ſont les plus proches de nous, ſe trouvent certainement à des diſtances preſque infinies, il ſemble que rien n'eſt plus ſimple que d'imaginer, au lieu de pluſieurs ſurfaces concentriques, une ſeule & unique Sphere ou ſurface ſphérique concave, qui ſera regardée comme le terme le plus éloigné où l'on puiſſe rapporter tous les mouvemens, tant des Planetes que des autres Aſtres, que nous obſervons dans les cieux. C'eſt pour cette raiſon que dans l'application des cercles de la Sphere nous ne devons tenir aucun compte de la diſtance de la Terre au Soleil, puiſqu'elle eſt preſque nulle en comparaiſon du demi-diametre de la Sphere ou du Ciel étoilé.

L'œil de l'Obſervateur peut toujours être ſuppoſé au centre du Ciel.

Cela ſuppoſé, l'on doit concevoir maintenant, pourquoi l'apparence du Ciel étoilé doit être exactement la même à notre égard, en quelque endroit que la Terre ſe

Il importe peu, & ce ſont les mêmes apparences, ſoit que l'œil du

Spectateur soit placé sur la Terre ou dans le Soleil.

trouve sur son orbite, & pourquoi nous devons appercevoir les Etoiles ou les Constellations préciſément de la même maniere que ſi nous étions placés, ſoit dans le Soleil, ſoit à la circonférence, ſoit au centre de notre ſyſteme Planétaire. Ainſi l'on peut établir comme un principe certain, que c'eſt la même apparence quant au Ciel étoilé, ſoit que l'on faſſe paſſer les plans des différens cercles de la Sphere par le centre de la Terre, ou que l'on en ſuppoſe d'autres ſemblables & paralleles, qui paſſent par le centre du Soleil; car ces cercles paralleles doivent ſe confondre dans le même endroit du Ciel à notre égard, leur diſtance n'étant pas ſenſible en comparaiſon de celles des Etoiles fixes, ou de la Sphere où ils ſe terminent. De cette maniere on doit voir ces cercles paralleles dans le même point des cieux, ſoit qu'on les obſerve de la Terre ou du Soleil.

Les grands cercles de la Sphere. Ce que c'eſt.

Pour mieux déterminer les véritables lieux des Etoiles, & reconnoître par conſéquent la vraie route ou l'ordre ſuivant lequel ſe font leurs mouvemens apparens dans les cieux, il eſt à propos d'y diſtinguer de grands & de petits cercles. Les grands cercles ſont ceux qui diviſent la Sphere en deux parties égales, & qui par conſéquent ont même centre que le centre de la Sphere. Ainſi tous les grands cercles de la Sphere ayant un même centre, ſe coupent toujours en deux également, ſoit qu'ils ſe rencontrent à angles droits, ou à angles obliques.

Des petits cercles de la Sphere.

Les petits cercles au contraire ſont ceux qui diviſent la Sphere en deux parties inégales, & qui par conſéquent ont des centres différens de celui de la Sphere. Ces cercles prennent leur nom de quelque grand cercle, auquel ils ſont paralleles.

Les Poles de ces cercles.

Chaque cercle a deux Poles, c'eſt-à-dire, deux points ſur la ſuperficie de la Sphere, leſquels pris de part & d'autre & conſiderés ſéparément ſont de tous côtés également éloi-

gnés de la circonférence : ces Points ou Poles ſont aiſés à déterminer, car ce ſont les endroits où une ligne droite qu'on ſuppoſe paſſer par le centre du cercle & qui eſt perpendiculaire ſur ſon plan, vient aboutir dans les points oppoſés de la ſuperficie de la Sphere.

Parmi les cercles de la Sphere, il y en a d'immobiles & d'autres qui ſont mobiles.

Il y a des cercles qui ſe déterminent par rapport au lieu où eſt l'Obſervateur, tels ſont l'Horiſon & le Méridien. Il y en a d'autres qui dépendent du mouvement des Corps céleſtes. Ces derniers ſont appellés *Mobiles* parce qu'ils changent de place en même tems que l'Obſervateur, les premiers étant appellés *Immobiles*, parce qu'ils occupent conſtamment les mêmes points du Ciel.

L'Ecliptique.

Les principaux cercles mobiles ſont l'Ecliptique, l'Equateur, & leurs Paralleles. Comme la Terre tourne autour du Soleil par ſon mouvement annuel, ſi un Obſervateur étoit dans le Soleil, il s'appercevroit peu à peu que la Terre décrit un cercle parmi les Etoiles fixes. C'eſt-là le cercle qu'on appelle l'*Ecliptique*, & c'eſt préciſément le même cercle, que nous qui ſommes placés ſur la Terre, voyons parcourir au Soleil par un mouvement apparent, dans l'eſpace d'une année, comme on l'a fait voir ci-deſſus.

L'Ecliptique ſe diviſe en douze parties égales, qu'on appelle les douze Signes ou les douze maiſons du Soleil. Elles tirent leur nom de la Conſtellation voiſine & commencent à l'Equinoxe du Printems, continuant à ſe ſuccéder les unes aux autres d'Occident en Orient. Les trois premiers Signes, ſçavoir ♈, ♉, ♊, s'étendent depuis l'Equinoxe du Printems juſqu'au Solſtice d'Eté, en tirant un peu vers le Nord. Les trois ſuivans, qui ſont ♋, ♌, ♍, commencent au Solſtice d'Eté, & ſe terminent à l'Equinoxe d'Automne. Les trois qui viennent enſuite, ſçavoir ♎, ♏, ♐, commencent à l'Equinoxe d'Automne, deſcendent un peu vers le Sud, & ſe terminent au Solſtice

d'Hiver. Enfin les trois derniers qui sont ♑, ♒, ♓, commencent au Solstice d'Hiver, & finissent à l'Equinoxe du Printems.

Chacun de ces douze Signes est divisé en trente degrés, & par conséquent tout l'Ecliptique en 360: on voit perpétuellement le Soleil dans ce cercle & il n'en sort jamais. Il n'en est pas de même des Planetes; elles s'en écartent de part & d'autre, dans l'espace d'environ huit degrés; de sorte que si l'on imagine un cercle, une zone ou ceinture qui ait seize degrés de large, & au milieu de laquelle soit placé l'Ecliptique, cette zone désignera l'étendue du Ciel où les Planetes font leurs révolutions. Cette zone ou anneau applati a été nommée *Zodiaque* par les *Grecs* *, à cause des Signes ou Animaux qui en forment les Constellations.

Le Zodiaque.

* Latinè, *Signifer*.

Si l'on fait passer par les Poles de l'Ecliptique une infinité de cercles qui coupent perpendiculairement l'Ecliptique, on aura ce qu'on appelle les cercles *Secondaires* de l'Ecliptique. C'est par le moyen de ces cercles qu'on détermine la situation de chaque Etoile ou de chaque point du Ciel par rapport à l'Ecliptique; car le lieu de chaque Etoile, relativement à l'Ecliptique, est celui où le cercle Secondaire qui passe par l'Etoile, va rencontrer l'Ecliptique. L'arc qui se trouve compris entre ce lieu & le premier point d'♈, ou le commencement du Belier, se nomme la *Longitude* de l'Etoile, elle se mesure par degrés, minutes, &c. Mais l'arc du cercle Secondaire compris entre l'Etoile & l'Ecliptique, est ce qu'on appelle la *Latitude* de cette Etoile. De là vient que ces cercles Secondaires de l'Ecliptique sont nommés cercles de Latitude. La latitude d'une Etoile peut être septentrionale ou méridionale; car l'Ecliptique divise le Ciel étoilé en deux hémispheres, dont l'un est septentrional & l'autre méridional.

Les cercles de Latitude, ou cercles Secondaires de l'Ecliptique.

Ce qu'il faut entendre par la longitude d'une Etoile.

La latitude d'une Etoile.

Comme la Terre tourne sur son axe, il arrive de là

que tous les Aſtres, c'eſt-à-dire, tout le Ciel étoilé ſemble tourner autour de la Terre dans l'eſpace de vingt-quatre heures. Ce mouvement apparent s'appelle *Diurne*: on peut imaginer au contraire qu'il ſe fait par le moyen d'un premier mobile qui entraîne la maſſe du Ciel, comme ſi la Terre étoit véritablement en repos, & que le Ciel tournât autour d'elle. Or le cercle qui eſt préciſément ſitué à diſtances égales entre les deux Poles de la Terre, & qu'on nomme l'Equateur, étant continué juſqu'au Ciel étoilé forme l'Equateur céleſte; de maniere que toutes les Etoiles, & généralement tous les points du Ciel, excepté les deux Poles, ſemblent décrire ou l'Equateur ou quelques-uns de ſes paralleles; en ſorte qu'un de ces mêmes cercles paralleles ſe trouve plus grand ou plus petit, ſelon que les Etoiles ou les différens points du Ciel par où il paſſe, ſont plus ou moins éloignés des Poles.

L'Equinoctial ou l'Equateur céleſte.

L'Equateur & l'Ecliptique étant de grands cercles, ſe coupent néceſſairement, comme nous l'avons dit, en deux parties égales; & la ſection de leurs plans demeurant toujours parallele à elle-même, regarde conſtamment les mêmes points du Ciel, ſçavoir le commencement d'♈ & de ♎ (car nous faiſons ici abſtraction de ce mouvement très-lent par lequel l'axe de la Terre, ou l'interſection de l'Ecliptique & de l'Equateur rétrograde de 50″ par année.) Ainſi lorſque le Soleil ſe voit dans le point de l'Ecliptique où ſe fait cette interſection, ſçavoir en ♈; c'eſt-à-dire, lorſque la Terre ſe trouve réellement dans la ſection oppoſée en ♎, c'eſt alors que le Soleil ſemble décrire dans le Ciel par ſon mouvement diurne le cercle équinoctial, qu'on appelle autrement l'Equateur. C'eſt pourquoi le Soleil ne ſçauroit décrire chaque année par ſon mouvement diurne que deux fois ſeulement l'Equateur, ſçavoir lorſqu'il vient paſſer à l'un ou à l'autre des deux interſections de l'Ecliptique & de l'Equateur, dont

l'une est le commencement du Printems & l'autre de l'Automne; car c'est alors que tous les habitans de la Terre ont les jours égaux aux nuits, & c'est de cette égalité que l'Equateur a pris son nom. L'angle que l'Ecliptique fait avec l'Equateur dans ces points d'intersections est de $23^{\circ}\frac{1}{2}$. Ensuite le Soleil quittant l'Equateur paroît s'avancer peu à peu vers le Nord ou vers le Sud, & décrire chaque jour de petits cercles paralleles à l'Equateur, jusqu'à ce que s'étant avancé dans l'Ecliptique à 90° de l'intersection comptée depuis ♈ ou ♎, il paroisse enfin éloigné de $23^{\circ}\frac{1}{2}$ de l'Equateur, ce qui sert à désigner sa plus grande déclinaison. En effet on le doit voir ensuite retourner vers l'Equateur, & de là vient que les deux petits cercles qu'il semble décrire par son mouvement diurne, dans les deux points qui répondent à sa plus grande distance de l'Equateur, sont nommés *Tropiques*, du mot grec Τρέπω, qui signifie *Retourner*. Or celui de ces deux petits cercles qui est du côté du Nord s'appelle *Tropique de l'Ecreviſſe*, & celui qui est du côté du Sud, *Tropique du Capricorne*. Nous avons assez expliqué ci-dessus au Chapitre VII. comment le Soleil, quoique réellement en repos, semble néantmoins avoir ce mouvement apparent, & changer sa déclinaison ou s'éloigner de l'Equateur, & cela à cause du mouvement réel de la Terre sur son orbite.

Des petits cercles qu'on nomme les deux Tropiques.

Il y a encore dans la Sphere deux autres petits cercles remarquables, que les Poles de l'Ecliptique semblent décrire chaque jour à cause du mouvement diurne ou de Rotation de la Terre autour de son axe: ils sont éloignés de $23^{\circ}\frac{1}{2}$ des Poles de l'Equateur ou des Poles du Monde: on les a nommés cercles polaires. Le premier ou plutôt celui qui est dans l'hémisphere septentrional, est appellé *Arctique*, à cause du voisinage de l'une ou l'autre Constellation de l'Ourse, qui se nomme en grec Ἄρκτος,

Les deux autres petits cercles, qu'on nomme Polaires.

Le second qui à notre égard se trouve dans l'hémisphere méridional, est appellé *Antarctique*, parce qu'il est à l'opposite du premier.

Si l'on fait passer par les Poles du Monde, c'est-à-dire, par ceux de l'Equateur, une infinité de grands cercles, ces cercles seront les Secondaires de l'Equateur. Ils servent à déterminer tous les points du Ciel relativement à l'Equateur, de même que les cercles Secondaires de l'Ecliptique servent, comme nous l'avons dit, à déterminer ces mêmes points relativement à l'Ecliptique. Ainsi l'*Ascension droite* d'une Etoile ou d'un point du Ciel, quel qu'il soit, n'est autre chose que l'arc de l'Equateur, compris entre le commencement du Belier, & le point où coupe l'Equateur le cercle Secondaire qui passe par l'Etoile. De même la *Déclinaison* d'une Etoile n'est autre chose que l'arc du même cercle Secondaire, compris entre cette Etoile & l'Equateur ou cercle équinoctial : la déclinaison est septentrionale ou méridionale, suivant que l'Etoile se trouve écartée de l'Equateur vers l'un ou l'autre Pole. De là vient que les cercles Secondaires de l'Equateur sont aussi appellés cercles de Déclinaisons.

L'Ascension droite. Ce que c'est.

La Déclinaison.

Les principaux, d'entre ces cercles de Déclinaison, sont les deux *Colures*, dont l'un qui passe par les points des Equinoxes se nomme pour cet effet Colure des Equinoxes, & l'autre qui le coupe à angles droits, & qui passe constamment par les Poles de l'Ecliptique & de l'Equateur, se nomme Colure des Solstices, parce qu'en effet il rencontre l'Ecliptique dans les deux points les plus éloignés de l'Equateur. Or comme le Soleil, lorsqu'il est dans l'un ou l'autre de ces deux points opposés, semble y demeurer quelque tems, sa distance à l'égard de l'Equateur ne paroissant presque pas changer, on a cru devoir nommer ces mêmes points les Solstices.

Les deux grands cercles qu'on nomme Colures.

L'Equateur terreſtre eſt ſitué préciſément au milieu entre les deux Poles de la Terre, c'eſt-à-dire, à diſtances égales de chaque côté. Nous avons dit ci-deſſus que le plan de ce cercle prolongé juſqu'aux Etoiles fixes formoit l'Equateur céleſte. Mais il faut obſerver que ſi la longitude & la latitude des Etoiles fixes ſe déterminent dans le Ciel relativement à l'Ecliptique & à ſes cercles Secondaires; il n'en eſt pas de même de la longitude & la latitude des villes & des autres lieux de la Terre qui ſe déterminent relativement à l'Equateur, & à ſes cercles Secondaires, ceux-ci paſſant toujours par les deux Poles de la Terre. On doit remarquer que le cercle Secondaire de l'Equateur, par quelque lieu que ce ſoit qu'il paſſe, s'appelle le *Méridien du lieu*, parce qu'en effet, lorſque le Soleil traverſe le plan de ce cercle, à chaque révolution de la Terre autour de ſon axe, il eſt midi pour ceux qui habitent ſous ce Méridien. On appelle auſſi la *Longitude* d'un lieu l'arc de l'Equateur, compris entre un Méridien, qu'on nomme *Premier* (lequel paſſe par un lieu déterminé) & le Méridien du lieu dont il s'agit.

Le Méridien d'un lieu.

La longitude d'un lieu.

Les anciens Géographes faiſoient paſſer leur premier Méridien par un endroit de la Terre qui leur étoit connu, & qu'ils croyoient pour lors être le plus occidental: depuis ce cercle ils comptoient la longitude de tous les autres endroits de la Terre, en tirant vers l'Orient. Mais parce que la navigation a fait enfin connoître dans le XVe ſiecle qu'il n'y a point de lieu qu'on puiſſe appeller le plus occidental de tous, il ſemble qu'on ait peu à peu négligé cette maniere de compter la longitude depuis un premier Méridien; en ſorte que chacun s'eſt donné la liberté de déterminer la longitude des différens endroits de la Terre relativement au Méridien du lieu ou du Port de mer où il habite. Quant à qu'on appelle la *Latitude* d'un lieu, c'eſt l'arc du Méridien, compris entre ce lieu propoſé & l'Equateur,

La latitude d'un lieu.

l'Equateur. La latitude eſt ſeptentrionale ou méridionale, ſuivant que le lieu eſt éloigné de l'Equateur vers l'un ou vers l'autre Pole.

Au reſte les habitans de la Terre portent divers noms ſuivant les différens Méridiens & les différens paralleles où ils ſont placés. On appelle *Periœciens* ceux qui habitent en effet ſous le même parallele ; mais ſous le demi-cercle oppoſé du même Méridien. Ils ont les mêmes ſaiſons dans les même tems, parce que le Soleil s'approche d'eux ou bien s'en éloigne dans les mêmes tems de l'année, mais quand il eſt midi chez les uns, il eſt minuit pour les autres. On appelle auſſi *Antœciens* ceux qui habitent ſous le même demi-cercle d'un Méridien, mais ſous des paralleles oppoſés : ainſi il eſt midi & minuit chez les uns & les autres en même tems ; mais ils n'éprouvent pas les mêmes ſaiſons aux mêmes jours de l'année : elles arrivent dans des tems alternativement oppoſés à leur égard.

Periœciens.

Antœciens.

Enfin on appelle *Antipodes* ceux qui participent aux deux conditions dont nous venons de parler, ou qui étant ſous des Méridiens & ſous des paralleles directement contraires, ont les pieds diamétralement oppoſés les uns aux autres. De là vient qu'alternativement ils ont l'Eté & l'Hiver, midi & minuit, enfin le lever & le coucher des Aſtres dans des tems entierement oppoſés.

Antipodes.

Les quatre petits cercles de la Terre, qui répondent perpendiculairement au-deſſous des quatre petits cercles du Ciel, ſçavoir les deux Tropiques & les deux Polaires, diviſent la Terre en cinq portions, qu'on appelle *Zones*. L'une de ces zones qui eſt nommée *Torride*, eſt compriſe entre les deux Tropiques. C'eſt celle que les Anciens croyoient inhabitée à cauſe du trop grand chaud : mais on a découvert il y a deux ou trois cens ans, qu'au contraire les pays qu'elle renferme, ſont la plupart très-fertiles, peu

Des cinq zones.

incommodes aux habitans & même très-riches & bien peuplés. Les deux autres zones appellées *Froides* ou *Glaciales*, s'étendent jusque sous les deux Poles, à compter depuis le cercle Arctique & le cercle Antarctique: il y regne un froid continuel qui les rend presque inhabitables. Il reste enfin deux zones *Tempérées*, & qui sont situées entre la zone torride & les zones glaciales. Nous habitons une de ces zones, & l'autre est peuplée par nos Antipodes & nos Antœciens. Virgile a décrit ces cinq zones au 1er Livre des Georgiques. *

Amphiſciens. Ceux qui habitent la zone torride, sont nommés *Amphiſciens*, parce que selon les diverses saisons leur ombre à midi se porte alternativement deux fois chaque année vers

Aſciens. l'un ou l'autre Pole. On les a encore nommés *Aſciens*, parce que le Soleil passe aussi deux fois sur leurs têtes, & qu'à midi ils ne font aucune ombre. Ceux qui habi-

Hétéroſciens. tent les zones tempérées, sont appellés *Hétéroſciens*, d'autant qu'à midi leur ombre ne se porte jamais que vers l'un des Poles. Enfin ceux qui habitent les zones glaciales,

Périſciens. sont nommés *Périſciens*, parce qu'en Eté le Soleil ne se couchant point, ils voient leur ombre tourner continuellement autour d'eux.

L'Horiſon ſenſible. Les cercles que l'on regarde comme immobiles, parce qu'en effet ils se déterminent par rapport à l'endroit où est l'Observateur, sont l'Horison & le Méridien. L'*Horiſon* est un cercle qui se présente naturellement à nos yeux, lorsqu'étant dans une plaine ou au milieu de la mer, on porte la vue de tous côtés, ce cercle ainsi déterminé, divisant la partie visible du Ciel d'avec celle qui est invisible:

* *Quinque tenent cœlum zonæ, quarum una coruſco*
Semper Sole rubens, & torrida ſemper ab igni:
Quam circum extremæ dextrâ, lævâque trahuntur,
Cæruleâ glacie concretæ atque imbribus atris;
Has inter, mediamque duæ mortalibus ægris
Munere conceſſæ Divûm. Virgil. Georgic. I. v. 233.

on le nomme horiſon *Senſible* pour le diſtinguer de l'horiſon *Rationel* qui lui eſt parallele, & qui paſſe par le centre de la Terre. Car nous devons rapporter tous les phénomenes céleſtes à une ſurface ſphérique, qui a pour centre, celui de la Terre, & non pas le lieu qu'occupe l'œil. L'Horiſon rationel.

Il eſt vrai que ces deux horiſons étant continués juſqu'aux Etoiles fixes, ſe confondent enſemble, & qu'ainſi la Terre comparée à la ſphere des Etoiles fixes, n'étant qu'un point, il doit s'enſuivre que des cercles qui ne ſeront diſtans relativement aux Etoiles, que d'un intervalle qui differe à peine d'un point imperceptible, doivent être regardés comme ne faiſant qu'un ſeul & même cercle: mais il n'en eſt pas de même à l'égard de la Lune & des Planetes les plus proches de la Terre.

Les Poles de l'Horiſon ſont deux points, dont l'un eſt directement ſur la tête de l'Obſervateur, & ſe nomme *Zénit*; l'autre qui lui eſt diamétralement oppoſé s'appelle *Nadir*. De ces deux points partent une infinité de cercles qui vont à l'Horiſon & qui ſont ſes cercles ſecondaires. On les nomme *Verticaux* ou *Azimuts*. Les petits cercles paralleles à l'Horiſon ſont appellés *Almicantarats*. Tous ces mots viennent des Arabes, qui les ont introduits dans l'Aſtronomie. Ils diſent *Semt* pour *Zénit*, *Al Sumut*, *&c.* Les Poles de l'Horiſon. Le Zénit & le Nadir. Des cercles Verticaux ou Azimuts. Almicantarats.

Entre les cercles verticaux, les principaux ſont le *Méridien* & le *premier Vertical*. Le Méridien paſſe par les Poles du Monde & par le Zénit & le Nadir: il coupe l'Horiſon dans deux points diamétralement oppoſés, qui ſont le Septentrion & le Midi, & par conſéquent il ſert à les déterminer. De même le premier Vertical qui coupe le Méridien à angles droits, ſert à déſigner dans l'Horiſon les points de l'Orient & de l'Occident. Ainſi ces deux cercles diviſent l'Horiſon en quatre parties égales, chacune deſquelles ſe ſoudiviſant auſſi en huit parties égales, produit une diviſion entiere de l'Horiſon en trente deux Le premier Vertical.

parties ou rumbs de Vents, que l'on nomme auſſi Quarts de Vent.

La hauteur ou l'élévation d'une Etoile, & ſon Abbaiſſement au-deſſous de l'Horiſon.

L'*Elévation* ou l'*Abbaiſſement* d'une Etoile ſous l'Horiſon eſt l'arc du cercle Vertical, qui ſe trouve compris entre cette Etoile & l'Horizon. L'*Azimut* d'une Etoile eſt l'arc de l'Horiſon, qui ſe trouve compris entre le point du Septentrion ou du Midi, & le cercle Vertical qui paſſe par l'Etoile. Ainſi l'Azimut peut être oriental ou occidental. L'*Amplitude* orientale ou occidentale d'un Aſtre eſt l'arc de l'Horiſon, compris entre le point du lever ou du coucher de cet Aſtre, & le point de l'Orient ou de l'Occident. Cette Amplitude peut donc être auſſi ſeptentrionale ou méridionale.

L'Azimut d'une Etoile.

L'Amplitude orientale ou occidentale.

C'eſt dans le Méridien que s'obſerve la plus grande élévation des Etoiles.

Comme c'eſt à l'Horiſon que toutes les Etoiles ſe levent & ſe couchent, de même c'eſt au Méridien qu'elles ſont dans leur plus grande hauteur, & c'eſt auſſi dans le même Méridien au-deſſous de l'Horiſon qu'elles ſont dans leur plus grand abbaiſſement. Car puiſque le Méridien eſt ſitué perpendiculairement, tant à l'égard de l'Equateur, qu'à l'égard de l'Horiſon, il eſt évident de là qu'il doit diviſer en parties égales, ſoit au-deſſus, ſoit au-deſſous de l'Horiſon, les Segmens de tous les cercles paralleles ou Almucantarats, & qu'ainſi le tems qui doit s'écouler entre le lever d'une Etoile & ſon paſſage au Méridien eſt toujours égal à celui qui eſt compris entre le paſſage au Méridien & le coucher. Au reſte le Soleil ſemble décrire chaque jour par ſon mouvement apparent ou l'Equateur ou un de ſes paralleles, de maniere que quand il eſt arrivé au Méridien au-deſſus de l'Horiſon, il eſt midi; mais quand il eſt arrivé au Méridien au-deſſous de l'Horiſon, il eſt minuit, & c'eſt ſans doute ce qui a fait donner à ce cercle le nom de Méridien.

Le *Nonantieme* ou *Nonagéſime degré* eſt le point de l'Ecliptique, qui eſt éloigné de quatre-vingt-dix degrés du

lieu où l'Ecliptique coupe l'Horiſon. La hauteur de ce point, qui varie à chaque inſtant, nous fait connoître la meſure de l'angle que l'Ecliptique forme avec l'Horiſon. On donne auſſi le nom de *Milieu du Ciel* au point de l'Ecliptique qui ſe rencontre dans le Méridien. Dans les Signes aſcendans, c'eſt-à-dire depuis ♑ juſqu'au ♋ le nonantieme degré eſt à l'Orient du Méridien : mais dans les Signes deſcendans, depuis le ♋ juſqu'au ♑, il eſt au contraire à l'Occident du Méridien.

L'Horiſon & le Méridien ſont véritablement des cercles mobiles.

Quoique nous ayons conſidéré tout à l'heure l'Horiſon & le Méridien comme des cercles immobiles, en regardant le mouvement diurne ou apparent du Ciel comme réel, il eſt cependant vrai de dire que ces deux cercles ſont les ſeuls qui ſoient mobiles. En effet une Etoile, ou ſi l'on veut, le Soleil ſe leve, lorſque le plan de l'Horiſon, qui eſt emporté circulairement par le mouvement diurne de la Terre, deſcend aſſez bas pour le laiſſer paroître ; de même cet Aſtre ſe couche lorſque le plan de l'Horiſon s'éleve aſſez haut pour le dérober à notre vue, de maniere que c'eſt le Soleil qui de ſon côté demeure en repos. Enfin les Etoiles, le Soleil ou les Planetes arrivent au Méridien d'un lieu, lorſque le plan de cet Horiſon, par ſon mouvement angulaire autour de l'axe de la Terre, vient à traverſer le lieu où ſont ces Etoiles ou Planetes comme immobiles. Ainſi il faut ſe donner bien de garde de leur attribuer un mouvement que ces Aſtres n'ont aucunement.

Méridien univerſel.

Mais ſi l'on conçoit un cercle immobile, qui paſſe par le Soleil & par les Poles, ce cercle ne ſera pas ſeulement le Méridien d'un lieu déterminé, ce ſera un Méridien univerſel, en ſorte qu'on comptera midi dans un endroit, lorſque le Méridien particulier à ce lieu, en tournant autour de l'axe de la Terre, ſe confondra avec le plan de ce Méridien univerſel.

Comme chaque Méridien acheve en vingt-quatre heures par un mouvement angulaire autour de l'axe une circonférence entiere ou 360 degrés, il faut de néceſſité qu'il parcourre dans chaque heure quinze degrés, c'eſt-à-dire, la vingt-quatrieme partie de 360. D'où il ſuit que ſi l'on conçoit un autre Méridien, qui paſſant par les Poles, forme un angle de quinze degrés avec le premier que nous avons ſuppoſé paſſer par le Soleil, on comptera une heure après midi, quand le Méridien du lieu, après avoir quitté le plan du Méridien univerſel, viendra ſe confondre avec cet autre Méridien, c'eſt-à-dire, quand il ſe réunira à celui qui forme un angle de quinze degrés avec le Méridien univerſel. Ce cercle ſera donc ce qu'on appelle le cercle d'une heure. Semblablement ſi l'on conçoit un autre cercle, qui paſſe par les Poles, & qui coupe l'Equateur à trente degrés du Méridien univerſel, ce ſera le cercle de deux heures, en ſorte que quand le Méridien d'un lieu y ſera parvenu, on comptera dans ce lieu deux heures après midi. De même ſi l'on conçoit des cercles qui paſſent par les Poles & par chaque diviſion de quinze en quinze degrés de l'Equateur, ces cercles repréſenteront ceux qu'on appelle cercles *Horaires* : ils diviſent l'Equateur en vingt-quatre parties égales, & chacun de ces cercles horaires doit déterminer à ſon tour l'heure que l'on compte en quelque endroit, c'eſt-à-dire, lorſque le Méridien de cet endroit vient à ſe rencontrer dans le plan de ces cercles. Par exemple, lorſque le Méridien d'un lieu vient ſe réunir au cercle qui fait un angle de 75 degrés avec le Méridien univerſel, on comptera dans ce lieu cinq heures après midi : ſi ce Méridien eſt éloigné de 90 degrés du Méridien univerſel, on comptera ſix heures après midi. Mais ſi l'on regarde le Méridien d'un lieu comme immobile, & que l'on conçoive un cercle qui paſſant par les Poles & par le Soleil, tourne avec le Soleil autour de

Les cercles Horaires.

l'axe de la Terre par un mouvement angulaire, comme il semble en effet que cela se fait ; alors quand ce cercle se rencontrera dans le plan de celui qui forme un angle de quinze degrés avec le Méridien du lieu proposé, on comptera dans ce moment une heure après midi, & de cette maniere le cercle qui forme l'angle de quinze degrés, sera le cercle d'une heure. Ensuite celui qui fera un angle de trente degrés avec le Méridien du lieu, sera le cercle de deux heures, & celui qui formera un angle de 45 degrés, sera le cercle de trois heures, & ainsi des cercles suivans.

On démontre ici que la hauteur du Pole est toujours égale à la latitude du Lieu. PLANCHE VI. *Fig.* 10.

Dans quelque endroit de la Terre que ce soit, la hauteur ou l'élévation du Pole au-dessus de l'Horison, est toujours égale à la latitude de ce lieu. Car soit, par exemple, le cercle HZQ le Méridien, HCO l'Horison, $\text{Æ}CQ$ l'Equateur, Z le Zénit, & P le Pole ; la hauteur du Pole, ou sa distance à l'Horison sera mesurée par PO, & la latitude du lieu par l'arc $Z\,\text{Æ}$. Or comme l'arc $P\text{Æ}$ entre le Pole & l'Equateur, est le Quart-de-cercle, & que l'arc ZO compris entre le Zénit & l'Horison, vaut aussi un Quart-de-cercle, il s'ensuit que les arcs $P\text{Æ}$, & ZO seront égaux entre eux : ôtant donc l'arc commun ZP, les arcs $Z\,\text{Æ}$ & PO qui resteront seront par conséquent égaux entre eux ; c'est-à-dire que la latitude d'un lieu sera toujours égale à l'élévation du Pole au-dessus de l'Horison de ce lieu.

Maniere de connoître la grandeur de la circonférence de la Terre.

Cette proposition une fois démontrée nous fournit d'abord une Méthode pour mesurer la circonférence de la Terre. Car si l'on s'avance en droite ligne vers le Nord, jusqu'à ce que l'élévation du Pole* augmente d'un degré, par exemple, & qu'on mesure ensuite en toises le che-

* C'est ainsi que dans les Plaines de *Sinjar*, *Chalid ibn Abd'imlic*, *& Ali ibn Isa* mesurerent séparément l'un vers le Nord & l'autre vers le Sud, un degré de la circonférence de la Terre, ce qui fut exécuté vers l'an 820. de l'Ere Chrétienne par ordre du Caliphe Almamoun, le septieme de la race des Abbassides.

min que l'on aura fait, le nombre de toises que l'on trouvera, sera justement le nombre que doit contenir un degré d'un grand cercle de la Terre. Ce nombre multiplié par 360 donnera le nombre de toises contenues dans toute la circonférence de la Terre. Or par des mesures très-exactes il se trouve que la longueur d'un degré comprend 25 lieues moyennes de France qui font environ 69 milles d'Angleterre.

CHAPITRE DIX-NEUVIEME.

De quelques autres Elemens de la Sphere.

PLANCHE VI. *Fig.* 10. L'ANGLE que forme le plan de l'Equateur avec celui de l'Horison étant mesuré par l'arc *Æ H* doit toujours être égal à *Z P* complément à 90° de la latitude du Lieu. Or il suit de là que si cet angle est droit, la latitude du Lieu sera nulle, & que par conséquent le cercle de l'Equinoctial passera par le Zénit : mais il suit encore que dans cette position perpendiculaire de l'Equateur, tous ses paralleles formeront aussi des angles droits avec le plan de l'Horison, & c'est-là ce qu'on nomme *la Sphere droite*, ces mêmes cercles paralleles étant coupés en deux parties égales par le plan de l'Horizon : ainsi le tems qu'une Etoile paroîtra sur l'Horison doit constamment être égal à celui qu'elle emploiera à passer sous l'Horison. De plus il paroît encore évident par la figure 11, que dans cette situation de la Sphere les deux Poles seront nécessairement dans l'Horison ; car dans la Sphere droite le Zénit est traversé par l'Equateur, en sorte que les points *Z* & *Æ* se réunissent, comme aussi les Poles *P* & *P* avec les deux points *H, O* diamétralement opposés dans l'Horison.

Fig. 11.

De la Sphere droite.

Ensuite

Enſuite pour peu qu'on s'éloigne de l'Equateur vers l'un ou l'autre Pole, l'Equateur s'écarte auſſi du Zénit en s'approchant de l'Horiſon, de ſorte qu'il fait pour lors un angle oblique avec le plan de ce dernier, ce qui a fait nommer *la Sphere oblique* cette autre poſition de la Sphere, où le Pole vers lequel on s'eſt avancé paroît autant élevé au-deſſus de l'Horiſon, & l'autre Pole autant abbaiſſé au-deſſous, qu'on compte de degrés dans la latitude du Lieu. La figure 12 repréſente cette ſeconde poſition de la Sphere, qui eſt préciſément celle qui nous convient, puiſque nous habitons les Zones tempérées; car quoique l'Equateur $\text{Æ} \underset{\sim}{Q}$ ſoit encore coupé en deux également par le plan de l'Horiſon, comme cela arrive dans la Sphere droite; quoiqu'il ſoit vrai de dire que le Soleil venant à parcourir l'Equateur, le jour ſoit égal à la nuit dans quelque poſition que ce ſoit de la Sphere oblique, cependant les paralleles à l'Equateur ne s'y trouvent plus coupés en deux parties égales. En effet on voit au premier coup d'œil que du côté du Pole élevé il y a une plus grande partie *IL* de ces cercles au-deſſus de l'Horiſon, comme auſſi une moindre partie *LM* au-deſſous; en ſorte que plus ces paralleles ſe trouvent proches du Pole, plus la portion élevée ſera grande, juſqu'à ce qu'étant moins éloignés du Pole qu'il n'y a de degrés dans la latitude du Lieu, alors chaque parallele, comme cela ſe voit dans la figure, ſera en ce cas tout entier au-deſſus de l'Horiſon *HO*. Le contraire doit auſſi arriver à l'égard des autres paralleles ſitués au-delà de l'Equateur du côté du Pole abbaiſſé: la partie *RS* de ces mêmes paralleles qui demeurera cachée ſous l'Horiſon ſera d'autant plus grande, qu'ils ſe trouveront plus éloignés de l'Equateur; & la partie élevée *NR*, ou qui nous eſt viſible, en ſera d'autant plus petite. Enfin ceux d'entre ces paralleles, qui ſe trouveront plus proches du Pole abbaiſſé qu'il n'y a de degrés com-

De la Sphere oblique.

pris dans la latitude du Lieu, ſeront perpétuellement cachés à notre égard, auſſi-bien que toutes les Etoiles & Conſtellations qui s'y rencontrent. De là il ſuit néceſſairement que, comme le Soleil parcourt chaque jour un des paralleles à l'Equateur, les jours doivent augmenter peu à peu depuis l'Equinoxe du Printems juſqu'au Solſtice d'Eté, & au contraire diminuer juſqu'à l'Equinoxe d'Automne; les jours pendant tout cet intervalle de tems étant plus longs que les nuits, après quoi les nuits ſeront plus longues juſqu'à l'autre Equinoxe: en effet il eſt évident que les jours doivent diminuer peu à peu depuis l'Equinoxe d'Automne juſqu'au Solſtice d'Hiver, & augmenter enſuite depuis ce dernier Solſtice juſqu'à l'Equinoxe du Printems, où ils reparoîtront préciſément égaux aux nuits.

Dans la Sphere oblique tous les Aſtres paroiſſent ſe lever & ſe coucher ſelon des routes obliques. Or de même que l'Aſcenſion droite d'une Etoile eſt l'arc compris entre le commencement du Bélier & le point de l'Equateur qui paſſe au Méridien en même tems que l'Etoile, ou le point de l'Equateur, qui dans la Sphere droite, monte ou ſe leve en même tems que l'Etoile, de même l'Aſcenſion oblique eſt l'arc de l'Equateur compris entre le premier point du Belier & le point de l'Equateur qui dans la Sphere oblique ſe leve en même tems que l'Etoile: elle doit donc toujours être comptée du même ſens, mais elle ſera différente ſelon les diverſes obliquités de la Sphere. On a nommé *Différences Aſcenſionnelles* les différences des Aſcenſions droites & obliques.

L'Aſcenſion oblique d'un Aſtre.

La différence Aſcenſionnelle.

On doit encore remarquer que dans la Sphere oblique, il doit y avoir un cercle parallele autant éloigné du Pole élevé qu'il y a de degrés compris dans la latitude du Lieu: or ce parallele, ſelon ce qui vient d'être expliqué ci-deſſus, peut être nommé à juſte titre *le Cercle de*

perpétuelle Apparition, & c'eſt le plus grand de tous les Cercles paralleles qui paroiſſent continuellement entiers ſur l'Horiſon. Toutes les Etoiles compriſes entre ce Cercle & le Pole ne ſe couchent plus, ni ne ſe levent, mais elles montent & deſcendent alternativement en s'approchant tantôt du Zénit & tantôt de l'Horiſon. On peut auſſi appeller *Cercle d'Occultation perpétuelle* le cercle qui lui eſt oppoſé vers l'autre Pole; car les Etoiles compriſes dans ce dernier eſpace ne doivent plus paroître ſe lever ni ſe coucher, en ſorte qu'elles ſont tout-à-fait inviſibles à l'égard de ceux qui ſe trouvent dans la Sphere oblique qu'on vient de ſuppoſer. Le cercle de perpétuelle Apparition.

Si le plan de l'Equateur ne formoit plus d'angle avec celui de l'Horiſon, mais ſi ces deux cercles venoient à ſe réunir ou ſe confondre, alors le Pole paroîtroit au Zénit, & tous les paralleles à l'Equateur ſeroient des paralleles à l'Horiſon. Cette troiſieme poſition de la Sphere a été nommée *la Sphere Parallele :* il eſt évident que les Etoiles ne doivent plus y paroître ſe lever ni ſe coucher, mais tourner uniquement chaque jour ſelon des cercles paralleles à l'Horiſon. Quant au Soleil, lorſqu'il ſera parvenu dans l'Equateur, il raſera pour lors l'Horiſon, tournant ainſi tout autour, juſqu'à ce que par ſon mouvement propre s'élevant peu à peu vers le Pole, il ne ſe couchera plus, mais doit produire un grand jour de ſix mois entiers. Au contraire lorſque le Soleil s'éloignera de l'Equateur vers le Pole oppoſé, on ne l'appercevra plus, il ne ſe levera point, ce qui doit produire, dans cette poſition de la Sphere, une longue nuit de ſix mois. Telle eſt la condition de ceux qui paſſeroient leur vie ſous les deux Poles : mais on ignore s'il y a des habitans dans ces deux régions de la Terre. De la Sphere parallele. PLANCHE VI. *Fig.* 13.

Les anciens n'étant pas encore aſſez avancés dans la Géographie pour diſtinguer les latitudes par degrés & Ancienne diviſion des Régions de la

Terre en climats & en cercles paralleles.

minutes, s'étoient contentés de diviſer les régions de la Terre en *Climats*, par des cercles paralleles. La regle qui leur ſervoit pour la diſtribution de ces climats étoit la plus grande durée des jours. Car dans la Sphere droite, c'eſt-à-dire ſous l'Equateur les jours ſont perpétuellement égaux aux nuits: mais ſi l'on s'en écarte vers l'un ou l'autre Pole, alors les jours d'Eté deviennent plus longs que les nuits, & même d'autant plus longs qu'on s'approche des Poles, juſqu'à ce qu'enfin au Solſtice d'Eté il n'y a plus de nuit ſous le cercle Polaire. Ainſi un lieu plus avancé vers le Pole & dont le plus grand jour excédoit d'un quart d'heure la durée du jour d'un autre lieu, donnoit une diviſion géographique, c'eſt-à-dire que pour faire la diviſion du Globe terreſtre on avoit imaginé de faire paſſer préciſément autant de paralleles à l'Equateur qu'il en falloit pour qu'au Solſtice d'Eté la durée du jour pût augmenter de quart en quart d'heure d'un parallele à l'autre. Suppoſant donc l'Equateur pour le premier de ces paralleles, le ſecond devoit paſſer par tous les lieux de la Terre où le plus long jour d'Eté devoit être de $12^h\frac{1}{4}$, le troiſieme par tous les lieux où le plus long jour devoit être de $12^h\frac{2}{4}$, le quatrieme devoit répondre à $12^h\frac{3}{4}$; & ainſi de ſuite juſqu'au cercle Polaire. On appelloit climats deux fois l'intervalle compris entre ces mêmes paralleles. Ainſi les climats étoient diſtingués par des augmentations d'une demi-heure dans la durée du plus grand jour. Au reſte l'excès du plus grand jour d'Eté ſur 12 heures peut continuellement augmenter à meſure qu'on s'approchera de plus en plus du Pole élevé, juſqu'à ce qu'on arrive au cercle Polaire*; car en ce lieu le Tropique doit toucher l'Horiſon en un ſeul point,

* C'eſt ce qui s'obſervoit dans l'Iſlande ou l'Iſle Thulé ſelon Strabon & Ptolomée, qui ſe ſont fondés ſur l'obſervation de Pithéas, les Marſeillois ayant navigué juſqu'en cet Iſle du tems d'Aléxandre le Grand. Vers la fin du dernier ſiecle le Roi de Suede Charles XI. & les Académiciens envoyés par le Roi de France en dernier lieu au Cercle Polaire ont obſervé ces longs jours d'Eté ſur les Montagnes ſituées au Nord du Golfe de Botnie.

ſans le couper, & partant le cercle parallele que parcourt le Soleil au jour du Solſtice, doit être tout entier ſur l'Horiſon : ainſi le Soleil ne paroîtra point ſe coucher ſous ce climat. Or le jour étant alors de 24 heures, excede par conſéquent de 12 heures ou de 24 demi-heures la durée de celui qu'on obſerveroit ſous l'Equateur; c'eſt pourquoi la diviſion géographique de la Terre ne s'étendoit qu'à vingt-quatre climats, ou tout au plus à quarante-huit paralleles.

Comme dans la haute Antiquité la plupart des peuples n'avoient pas tout-à-fait réglé la grandeur de l'année, parce qu'ils ne connoiſſoient pas encore aſſez le mouvement apparent du Soleil, il eſt évident que ſi l'on eût fixé à certains jours du mois quelque évenement remarquable, on auroit eu trop de peine à découvrir dans la ſuite, préciſément le tems de l'année auquel cela devoit répondre : on ſe ſervoit donc de la méthode uſitée parmi les gens qui vivoient à la campagne, car ceux-ci ne pouvoient ſe régler ſur le Calendrier civil, puiſque les mêmes jours du mois civil ne répondoient jamais aux mêmes ſaiſons de l'année, & qu'ainſi il falloit avoir recours à d'autres Signes pour diſtinguer les tems & les Saiſons. Or les Laboureurs, les Hiſtoriens & les Poëtes y ont employé le lever & le coucher des Aſtres : pour cet effet ils diſtinguoient trois ſortes de lever & coucher des Aſtres qu'ils ont nommé *Coſmique*, *Achronique* & *Héliaque*. Lorſqu'on dit qu'un Aſtre ſe leve ou ſe couche coſmiquement, c'eſt qu'il ſe leve ou ſe couche à l'inſtant que le Soleil ſe leve : ainſi une Etoile qui ſe leve ou ſe couche le matin, ſe leve ou ſe couche coſmiquement. Mais le lever d'une Etoile s'appelle achronique lorſqu'elle ſe leve au coucher du Soleil, c'eſt-à-dire lorſqu'elle ſe leve le ſoir étant en oppoſition au Soleil & ſe faiſant voir toute la nuit.

Des différens noms qu'on a donnés au lever & au coucher des Etoiles.

Le lever d'une Etoile eſt héliaque, lorſque s'étant peu

à peu éloignée des rayons du Soleil, elle s'en trouve suffisamment distante pour qu'on puisse l'appercevoir le matin avant le lever du Soleil. Cet effet dépend comme l'on voit du mouvement apparent du Soleil qui s'éloigne chaque jour de l'Etoile en s'avançant vers l'Orient. De même le coucher d'une Etoile est héliaque quand le Soleil commence à s'approcher tellement de l'Etoile qu'on commence à la perdre le soir dans ses rayons : on auroit donc pu donner le nom d'occultation ou de réapparition à ces sortes de lever ou coucher héliaques.

Toutes les Etoiles fixes du Zodiaque comme aussi les Planetes supérieures Mars, Jupiter & Saturne se trouvent le matin dans leur lever héliaque un peu avant celui du Soleil, & cela peu de tems après s'être levées cosmiquement : la raison est que le Soleil ayant un grand mouvement apparent vers l'Orient, laisse derriere lui ces Astres au bout de quelques jours. On peut concevoir la même chose à l'égard de leur coucher héliaque qui doit arriver avant leur coucher achronique. A l'égard de la Lune, comme elle s'avance tous les jours vers l'Orient bien plus vîte que le Soleil, elle se leve le soir héliaquement lorsqu'elle est nouvelle & qu'elle sort des rayons du Soleil : mais au contraire son coucher héliaque arrive le matin lorsqu'étant en décours elle approche de sa conjonction au Soleil. Quant aux Planetes inférieures Venus & Mercure, qui tantôt précedent le Soleil à l'Orient, & tantôt le laissent en arriere vers l'Occident, il doit arriver que tantôt le lever de ces Planetes sera héliaque le matin, sçavoir lorsqu'elles seront rétrogrades, & tantôt le soir lorsqu'elles seront directes.

PLANCHE VII. *Fig.* 1. Pour observer la hauteur du Soleil ou d'une Etoile on se sert d'un Quart-de-Cercle mobile *E A D* garni de pinnules ou lunettes fixes *A B* qu'on place sur l'un des deux rayons qui le terminent, ou du moins parallelement à


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. A.
Fig 7.
Fig. 8
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 9
Fig. B.
Fig. 12.
Fig D.
Fig. C.
Fig. 13.
Fig. E.
Fig. A.
Orbite
Terre

l'un de ces rayons. On dispose ensuite l'instrument dans une situation verticale par le moyen d'un cheveu qui pend du centre, & qui est chargé d'un plomb ou balle par le bas. Le Quart étant dans cet état on peut le faire mouvoir enhaut ou en bas par le secours d'un genou, jusqu'à ce que la lumiere du Soleil passant par la pinnule antérieure vienne se placer sur le trou de la pinnule qui est du côté de l'œil, ou bien (si c'est une lunette dont on se sert) jusqu'à ce que l'Astre soit coupé en deux également par le fil horisontal placé au foyer commun des deux verres convexes; car l'instrument étant arrêté dans cette position, le fil à plomb ou cheveu doit marquer sur le limbe l'arc *EC* qui est semblable à la hauteur du Soleil ou de l'Astre. Pour le démontrer, soit prolongé *AZ* jusqu'au Zénit, & soit *AH* une ligne horisontale, il est évident que les angles *EAB*, *ZAH* sont toujours égaux, puisque ce sont des angles droits : mais les angles *BAC*, *ZAS* qui sont opposés au sommet sont encore égaux ; ôtant donc ces deux derniers angles, de grandeurs égales, c'est-à-dire, de chacun des angles droits, il restera l'angle *EAC* égal à l'angle *SAH*. Or l'arc *EC* du Quart-de-Cercle mesure l'angle *EAC* d'une part, & de l'autre part l'angle *SAH* est mesuré par l'arc du cercle vertical compris entre le Soleil & l'Horison; il est donc vrai de dire que ce dernier arc ou angle de la hauteur du Soleil est d'un même nombre de degrés & minutes, &c que l'arc *EC* marqué sur le Quart-de-Cercle. Lorsqu'il est question d'une Etoile on regarde directement par les deux pinnules au lieu de recevoir, comme on vient de l'expliquer, l'image sur la seconde pinnule. De plus, si l'on se sert de lunettes d'approche, il faut placer le bord du Soleil sur le fil horisontal, en sorte que le fil paroisse comme une tangente au disque; car il est évident que si l'on a observé la hauteur du bord supérieur, il sera aisé de con-

Maniere d'observer la hauteur du Soleil ou des Etoiles.

noître celle du centre, en retranchant de la quantité observée le demi-diametre apparent du Soleil, & l'ajoutant au contraire si c'est le bord inférieur dont on a pris la hauteur. On trouve communément dans les voyages, la hauteur méridienne du Soleil ou d'une Etoile, en observant à chaque instant les hauteurs de l'Astre aux environs du Méridien, & faisant attention à celle qui est la plus grande de toutes. La raison de cette pratique est fondée sur ce qui a été expliqué ci-devant, sçavoir que c'est dans le Méridien que les Astres parviennent à leur plus grande hauteur. Cependant si l'Astre est bien proche du Zénit cette méthode peut souvent ne pas réussir ; c'est pourquoi il est à propos, 1°. de tracer une ligne méridienne ; 2°. de bien placer tant le plan du limbe que le centre du Quart-de-Cercle à plomb sur cette ligne ; 3°. de s'assurer si la lunette ou pinnule est exactement parallele au plan du Quart-de-Cercle ; 4°. d'élever l'instrument à très-peu de chose près à la hauteur où l'Astre doit passer ; 5°. de faire attention à l'heure du passage, pour servir ensuite de vérification, & s'assurer si c'est la hauteur méridienne qu'on a observée ; car pour peu qu'on se néglige sur ces cinq articles, on risque de connoître imparfaitement la plus grande hauteur de l'Astre, ce qui influe nécessairement sur les déclinaisons observées, comme aussi sur les latitudes géographiques, comme on le va voir tout à l'heure.

Méthode de déterminer la latitude du Lieu.

La connoissance de la latitude du Lieu étant le fondement de toutes les observations & de la plupart des calculs astronomiques, il est donc nécessaire de s'attacher principalement à la bien déterminer. Or comme on a prouvé qu'elle étoit égale à la hauteur du Pole, il s'ensuit que pour la connoître, il suffit d'observer l'élévation du Pole sur l'Horison. D'un autre côté le Pole étant un point mathématique dans l'espace, & que par conséquent on ne sçauroit appercevoir, il n'est gueres possible d'obser-

ver

ver sa hauteur, de la même maniere qu'on vient de l'enseigner à l'égard des hauteurs Méridiennes, tant du Soleil que des Etoiles: ainsi il faut avoir recours à d'autres méthodes. Parmi le grand nombre de celles qu'on peut employer, on a jugé à propos d'expliquer d'abord ici celle qui suppose la connoissance de la ligne Méridienne, c'est-à dire, de la section du plan du Méridien avec celui de l'Horison. Pour tracer cette ligne on peut se servir de Gnomons dont on recherchera soignement le pied par le moyen d'un fil à plomb suspendu librement; & ayant trouvé ce point, on en décrira comme d'un centre, avec de très-grands compas, plusieurs circonférences de cercles sur le plancher (qu'on suppose ici parfaitement horisontal, ce qu'on peut reconnoître avec de grandes regles & des niveaux), de maniere que l'image du Soleil venant à rencontrer successivement toutes ces circonférences, on ait soin de marquer les lieux où chacun des deux bords de cette image les a touchées, & par conséquent le point qui a dû répondre au centre de l'image *: cette opération doit être tentée au moins deux heures avant midi, & l'on choisira pour y réussir un appartement fort obscur pour mieux distinguer l'image. Le soir on trouvera de la même maniere qu'on l'a pratiqué avant midi, les points du centre de l'image correspondans à ceux qu'on aura marqués le matin sur chaque circonférence; & divisant celui de ces arcs qu'on voudra en deux également, la ligne qui passera par le milieu de l'arc & par le pied du Gnomon sera la ligne méridienne. Il est aisé de voir que cette ligne doit diviser aussi en deux également chacun des arcs marqués sur les autres circonférences, c'est-à-dire, qui auront été déterminés par les points correspondans du soir & du matin, ce qui servira de preuve; en sorte que ces sortes d'opérations réitérées sur plusieurs cercles concentriques peuvent servir à se corriger mutuellement.

Comment on peut tracer la ligne Méridienne. PLANCHE VII. *Fig.* 2.

* *Les distances de chaque extrémité du diametre au centre de l'image, sont en même raison que leurs distances à l'ouverture du Gnomon. Voyés Eucl. Liv.* VI. *Prop.* 3.

Au reſte cette méthode n'eſt exacte qu'au tems des Solſtices ; car dans toutes autres ſaiſons la méridienne tracée déclinera de quelques ſecondes ſoit à l'Orient ſoit à l'Occident, à cauſe du changement du Soleil en déclinaiſon, qui devient aſſez ſenſible pour que cet Aſtre, quoique à même hauteur, ſe trouve plus ou moins éloigné du Méridien le ſoir que le matin : on corrigera donc cette erreur par le moyen des Tables qui en ont été conſtruites, ou bien en calculant les deux triangles ſphériques *AZP*, *SZP*, dont deux côtés ſont conſtans ; car le côté variable *AP* eſt la diſtance du Soleil au Pole, ou le complément de ſa déclinaiſon lorſqu'on l'a obſervé le matin du côté de l'Orient ; & dans l'autre triangle, qui eſt occidental, le côté *SP* eſt la diſtance du Soleil au Pole au moment de l'obſervation du ſoir. Conſidérant qu'on peut ſuppoſer conſtans les côtés *AZ* & *SZ*, comme auſſi les angles *AZP*, *SZP*, il ſera facile de déterminer par les analogies qu'a données M. Cotes dans ſon Livre intitulé, *Harmonia menſurarum*, la petite variation de l'angle au Pole, c'eſt-à-dire, la différence des deux angles *APZ*, *SPZ*, laquelle réduite en tems à raiſon de 24 heures pour 360° ſera la correction de la méridienne que l'on cherche.

La correction de la Méridienne trouvée par les hauteurs correſpondantes. PLANCHE VII. *Fig.* 3.

Les côtés que nous ſuppoſons ici conſtans, ſçavoir *AZ* & *SZ* ſont les compléméns de la hauteur du Soleil ſur l'Horiſon : on en connoîtra la valeur ſi l'on meſure la hauteur du Gnomon, comme auſſi la diſtance du centre de l'image obſervée au pied de ce Gnomon ; car ſoit *GP* la hauteur du Gnomon qui eſt à plomb ou perpendiculaire, *SP* la ligne horiſontale terminée au centre de l'image obſervée le matin par exemple, il eſt évident que puiſqu'on peut meſurer les deux côtés du triangle rectangle *GPS* il ſera facile de découvrir la valeur de l'angle *SGP* ou de ſon alterne *ASZ* complément de la hauteur du Soleil ſur l'Horiſon.

Fig. 2.

A l'égard des angles AZP ou SZP qu'on peut supposer égaux, il est évident qu'ils ont pour mesure la moitié de l'arc tracé sur le plancher & qui est compris entre l'observation du matin & sa correspondante du soir. Car si l'on imagine deux plans verticaux qui passent par l'ouverture du Gnomon & par les extrémités de cet arc, l'angle qu'ils formeront entre eux aura pour mesure l'arc qui aura été déterminé par l'observation du soir & du matin sur l'une des circonférences de cercle. PLANCHE VII *Fig.* 3.

Enfin si le plan n'étoit pas assez horisontal, on en pourroit mesurer l'inclinaison par le moyen d'une grande regle & d'un niveau, d'où il seroit facile de corriger les angles PSG du soir ou du matin, qui donneront chacun la hauteur du Soleil, par le calcul de deux triangles; ou bien on recevra l'image du soir sur un carreau rétabli dans un même niveau que le point correspondant du matin, après quoi on pourra tracer la ligne méridienne. On pourroit aussi prendre les hauteurs du Soleil avec un Quart-de-Cercle, & tracer en même-tems les Azimuts du soir & du matin.

Comment on observe la hauteur du Pole.

Pour déterminer la hauteur du Pole il faut placer le plan du Quart-de-Cercle le plus exactement qu'il sera possible, à plomb sur la ligne méridienne, & on observera la plus grande hauteur SO de quelques-unes des Etoiles qui ne se couchent point: on déterminera aussi sa plus petite hauteur sO, & prenant la moitié Ps de la différence Ss de ces hauteurs, on l'ajoutera à la plus petite hauteur, ou bien on la retranchera de la plus grande, & l'on aura par ce moyen la hauteur apparente du Pole sur l'Horison. PLANCHE VII. *Fig.* 4.

Si l'on veut se servir du Gnomon au défaut d'un Quart-de-cercle en y employant les observations du Soleil, il faudra calculer sa déclinaison, laquelle comme on l'enseignera ci-après, suppose son vrai lieu déduit des Tables

ou des Ephémerides, & marquant sur la ligne méridienne le centre de l'image, on aura par conséquent sa distance au Zénit *MGP* (fig. 2.) ou le complément de sa hauteur apparente sur l'Horison. Cette distance au Zénit étant donc connue, soit avec un Quart-de-Cercle, soit par le moyen d'un Gnomon, on y ajoutera, ou l'on en retranchera la déclinaison du Soleil, selon que cet Astre est au Sud ou au Nord de l'Equateur, & l'on aura ainsi la distance de l'Equateur au Zénit, laquelle est toujours égale à la hauteur du Pole, puisque c'est précisément la latitude du Lieu. Au reste si la déclinaison du Soleil excede la latitude du Lieu, ce qui peut arriver dans la Zone torride, lorsque le Soleil est moins éloigné du Pole que le Zénit du Lieu, alors la différence entre la déclinaison du Soleil & sa distance au Zénit sera la latitude du Lieu.

De l'obliquité de l'Ecliptique.

Lorsqu'on connoît une fois la latitude, il est facile de découvrir l'obliquité de l'Ecliptique, c'est-à-dire, son inclinaison au plan de l'Equateur; car si l'on observe au tems du Solstice d'Eté la plus petite distance méridienne du Soleil au Zénit, & qu'on retranche cette distance de la latitude (on suppose ici que le lieu de l'observation soit moins éloigné du Pole que le Soleil) le reste sera la vraie obliquité de l'Ecliptique. Dans le siecle précédent* la plupart des Astronomes ont fait l'obliquité de l'Ecliptique de 23° 31′ ou 30′; ensuite ayant égard aux Tables de réfractions & de parallaxes pour corriger les distances apparentes du Soleil au Zénit & les réduire aux véritables, ils ont établi cette obliquité de 23° 29′ ou

* *En 1437 on a trouvé à Sarmakand avec un instrument (dont le rayon surpassoit 100 pieds) construit par ordre d'Ulugbeigh Prince Tartare 23° 30′ 17″.*

Les Arabes ayant déterminé vers l'an 820 l'obliquité de 23° 33′ Almamoun fit encore construire un plus grand instrument pour cette recherche, avec lequel Ali fils d'Isa habile Méchanicien & quelques-uns de ceux qui avoient travaillé à la mesure de la Terre, observerent à Damas l'obliquité de 23° 33′ 52″ la même année que le Caliphe mourut en conduisant son armée contre les Grecs. En 1269 Nassir Oddin l'observa fort exactement proche Tauris de 23° 30′ 00″.

$23^{\circ}\ 28'\ 50''$; mais on l'a obſervée dans ces derniers tems de $23^{\circ}\ 28'\ 30''$ ou $20''$, ce qui a fait imaginer à quelques Aſtronomes qu'elle diminuoit, ſans examiner quelle pouvoit être la préciſion à laquelle on tâchoit de parvenir il y a ſoixante ans dans une recherche auſſi délicate. D'ailleurs ils ont adopté les obſervations faites avec des Gnomons, ne conſidérant pas que ces ſortes d'inſtrumens ne doivent gueres être employés que pour obſerver les latitudes géographiques, puiſqu'il eſt conſtant qu'avec les plus grands Gnomons comme de 60 à 80 pieds de hauteur perpendiculaire, on ne ſçauroit répondre d'un tiers de minute vers le Solſtice d'Eté, au lieu qu'avec les Quarts-de-Cercle garnis de lunettes on peut connoître les hauteurs abſolues à $2''\frac{1}{2}$ ou $5''$ tout au plus, parce que le diſque du Soleil eſt terminé dans la lunette, ce qui n'arrive jamais aux Gnomons : en effet la pénombre y rend toujours l'image confuſe vers les bords, & par cette raiſon l'obſervation de la hauteur trop incertaine.

Il eſt incertain ſi elle diminue ou ſi elle eſt conſtante.

Les Obſervations faites avec des Gnomons, jugées inſuffiſantes pour décider cette queſtion.

Ce que nous venons de dire à l'égard de la plus grande déclinaiſon ou obliquité de l'Ecliptique, peut s'appliquer auſſi à toute autre déclinaiſon du Soleil, on pourra toujours y employer la même méthode, & même les Gnomons donneront dans les Zones tempérées les latitudes ou déclinaiſons d'autant mieux qu'on approchera du Solſtice d'Hiver, parce que les rayons du Soleil étant projettés à une grande diſtance, l'image de cet Aſtre, de même que les eſpaces qui répondent aux minutes & ſecondes du Méridien, augmentent très-ſenſiblement & ſemblent compenſer en quelque maniere les erreurs que pourroient cauſer l'eſtime ou l'incertitude des Termes de la pénombre. Maintenant ſi l'on obſerve la hauteur du Soleil ou d'un Aſtre en ſe ſervant de la méthode propoſée ci deſſus, on doit faire attention dans le calcul de la déclinaiſon, qu'il peut arriver que le Soleil ou l'Aſtre

Maniere de calculer les déclinaiſons du Soleil dans la zone tortide.

sera moins éloigné de l'Equateur que le lieu de la Terre où se fait l'observation, & en ce cas on prendra la différence entre la latitude du Lieu & la distance de l'Astre au Zénit, ce qui donnera la déclinaison que l'on cherche. Mais si au contraire le Zénit du lieu est situé entre l'Astre & l'Equateur, il est évident que c'est la somme de ces deux distances qu'il faudra prendre pour avoir la déclinaison de l'Astre.

On explique ici d'où dépendent, & comment on peut découvrir l'ascension droite du Soleil, sa longitude, sa déclinaison & l'angle que forme l'Ecliptique avec le Méridien.

PLANCHE VII. *Fig.* 5.

Lorsque l'on connoît la déclinaison du Soleil, il suffit de résoudre un triangle sphérique rectangle pour en déduire son ascension droite. Soit, par exemple, $\text{Æ}Q$ le cercle équinoctial, $\text{Æ}C$ l'Ecliptique, S le lieu du Soleil, d'où abbaissant un cercle SD perpendiculairement sur l'équinoctial, l'arc SD représente la déclinaison. Dans le triangle rectangle $SD\text{Æ}$ étant donné SD, & l'angle Æ qui est l'obliquité de l'Ecliptique, on aura par la Trigonométrie sphérique l'arc $\text{Æ}D$ qui est l'ascension droite du Soleil, comme aussi l'arc $\text{Æ}S$ qui est le vrai lieu du Soleil dans l'Ecliptique: on connoîtra encore l'angle $\text{Æ}SD$ qui sera l'inclinaison du Méridien ou cercle de déclinaison à l'égard de l'Ecliptique. De plus puisque dans le même triangle rectangle $\text{Æ}SD$ l'angle Æ est toujours le même, & par conséquent doit être regardé comme constant, il s'ensuit que si l'on ne connoissoit uniquement que l'ascension droite, il seroit facile de connoître la déclinaison DS & la longitude du point S qui passe au Méridien en même-tems que le point D qu'on appelle en ce cas le *Milieu du Ciel*; qu'enfin on pourroit encore trouver par le calcul la valeur de l'angle $DS\text{Æ}$ qui est l'inclinaison de l'Ecliptique & du Méridien en cet endroit. Mais si au lieu de l'ascension droite l'on connoissoit seulement la longitude du point S, on pourroit toujours résoudre ce triangle pour en déduire, suivant les analogies indiquées dans la Trigonométrie, l'ascension droite $\text{Æ}D$, la dé-

clinaiſon DS du point S, & l'angle DSC de l'Ecliptique & du Méridien.

Les Aſtronomes qui ont travaillé le plus aſſiduement à perfectionner les Tables des mouvemens du Soleil, en ont enfin découvert la théorie, en ſe ſervant des méthodes dont nous venons de parler. Car ils ont d'abord obſervé chaque jour la déclinaiſon du Soleil, ce qui leur a fait bientôt connoître les longitudes correſpondantes, & par conſéquent le mouvement diurne ou apparent de cet Aſtre dans l'Ecliptique, c'eſt-à-dire, le mouvement réel de la Terre ſur ſon orbite qui ſe fait dans le même tems. Or ces obſervations ont fait encore découvrir que le mouvement apparent du Soleil n'étoit point égal, ni uniforme dans le plan de l'Ecliptique, & qu'ainſi la Terre devoit ſe mouvoir avec différentes viteſſes autour du Soleil, en ſorte qu'un peu après le Solſtice d'Eté, elle ſe meut beaucoup plus lentement que vers le Solſtice d'Hiver, & qu'enfin elle eſt aſſujettie à cette fameuſe loi conſtante de Kepler, qui conſiſte à décrire autour du Soleil, qui eſt le foyer de l'Ellipſe qu'elle parcourt chaque année, des aires proportionnelles aux tems : ces aires, comme on l'a déja dit, ſont compriſes entre les rayons tirés chaque jour du Soleil, ou ce qui eſt la même choſe, du foyer, au point de la circonférence de l'Ellipſe qu'occupe la Terre.

Ancienne Méthode de déterminer les aſcenſions droites & les déclinaiſons des Etoiles fixes.

Si l'on ſe propoſe de découvrir l'aſcenſion droite des Etoiles fixes, on peut d'abord y employer la méthode ordinaire, laquelle eſt propoſée dans tous les Livres d'Aſtronomie, & qui ſuppoſe de même que celle qui a été imaginée depuis par Flamſteed, qu'on ait recherché le lieu du Soleil dans l'Ecliptique & que l'on ait d'ailleurs une Pendule à ſecondes bien reglée. Car en allongeant ou en accourciſſant le Pendule on peut tellement regler le mouvement de cette Horloge qu'elle achevera ſa révolution de 24 heures dans le même tems que les Etoiles fixes

emploient à revenir au Méridien : on doit remarquer que les révolutions d'Etoiles ſont un peu plus courtes que la durée du jour naturel à cauſe du mouvement du Soleil qui eſt très-ſenſible & qui ſe fait chaque jour d'un degré ou environ vers l'Orient. Suppoſant donc l'Horloge réglée comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, & qu'elle marque préciſément le midi à l'inſtant du paſſage du Soleil par le Méridien, il faudra prendre garde aux heures, minutes & ſecondes marquées par les aiguilles à l'inſtant qu'une Etoile fixe paroîtra dans le Méridien ; car le tems écoulé depuis midi étant converti en degrés, minutes & ſecondes de l'Equateur, à raiſon de 360° pour 24 heures, ſera la différence en aſcenſion droite apparente entre le Soleil & l'Etoile fixe : ajoutant donc cette différence à l'aſcenſion droite * du Soleil, la ſomme ſera l'aſcenſion droite de l'Etoile que l'on cherche. Or étant une fois connue l'aſcenſion droite d'une Etoile fixe, il ſera facile de connoître celles de toutes les autres Etoiles, puiſqu'il ſuffit de convertir en degrés, minutes, &c. le tems écoulé entre les paſſages au Méridien de ces Etoiles & celui de la premiere Etoile dont on a découvert l'aſcenſion droite. Il ne s'agit donc uniquement que de bien déterminer les paſſages de ces Etoiles par le plan du Méridien & d'appercevoir à chaque fois l'inſtant marqué par les aiguilles d'une Horloge bien réglée : mais comme il pourroit y avoir trop de difficultés à déterminer les paſſages de tous les Aſtres par le Méridien, voici un moyen encore plus ſimple.

* *Cette Méthode ſuppoſe qu'on connoiſſe la parallaxe du Soleil & la réfraction, & par conſéquent elle eſt d'autant moins exacte, qu'on ignore la juſte quantité de ces deux Elémens.*

La conſtruction & l'uſage du Réticule.

Quand on connoît déja l'aſcenſion droite d'une Etoile, au lieu d'attendre les paſſages au Méridien pour lui comparer toutes les autres, on pourra ſe ſervir de la méthode ſuivante pour connoître leurs aſcenſions droites. On placera au foyer commun des deux verres convexes d'une lunette deux fils AB, CD qui ſe coupent à angles droits, &

PLANCHE VII *Fig.* 6.

& deux autres EF, GH auſſi à angles droits, mais qui forment des angles de 45° avec les deux premiers, ces quatre fils ayant une même interſection commune en o. On dirigera enſuite la lunette à l'Etoile dont l'aſcenſion droite & la déclinaiſon ſont connues, & l'on diſpoſera tellement l'inſtrument que l'Etoile ſe trouve non-ſeulement ſous le fil AB à ſon entrée dans la lunette, mais auſſi qu'elle parcourre exactement ce même fil AB. Il eſt évident que dans cette ſituation le fil AB repréſentera une petite partie d'un cercle parallele à l'Equateur, qui eſt celui que l'Etoile ſemble parcourir par ſon mouvement apparent: mais puiſque dans cette ſituation CD ſe trouve perpendiculaire à ce cercle parallele, il s'enſuit que CD repréſentera pour lors un Méridien ou cercle horaire; c'eſt pourquoi la lunette demeurant immobile, on obſervera l'inſtant marqué à la Pendule, auquel l'Etoile connue parviendra au fil horaire CD: enſuite on attendra qu'une autre Etoile paſſe dans la même ouverture de lunette ſelon une ligne quelconque LK parallele à AB, & l'on obſervera auſſi l'inſtant auquel cette Etoile parviendra en Q. Or la différence de tems écoulé entre les paſſages de la premiere & de la ſeconde Etoile à un même cercle horaire, étant convertie en degrés & minutes, &c. de l'Equateur, c'eſt-à-dire, à raiſon de 360° pour 24 heures, donnera leur différence en aſcenſion droite apparente: mais puiſqu'on connoît déja l'aſcenſion droite de la premiere, on aura donc par ce moyen l'aſcenſion droite de la ſeconde Etoile.

Les angles QHo & QoH qui ſont des demi-droits ou de 45° étant égaux, il s'enſuit que QH ſera égale à Qo; c'eſt pourquoi ſi l'on obſerve encore l'inſtant auquel l'Etoile paſſe au fil oG, & qu'on le compare à l'inſtant qu'elle a dû paſſer au fil oC, on aura ainſi le tems que l'Etoile a employé à parcourir l'arc QH de ſon parallele: or ce

tems étant converti en degrés, minutes, &c. on connoîtra donc l'arc du parallele $\underset{\frown}{Q}H$, lequel eſt toujours égal à l'arc $\underset{\frown}{Q}o$ du cercle horaire. Mais parce que dans les cercles inégaux les nombres de parties ſemblables d'arcs de même grandeur ſont entr'eux réciproquement comme les rayons, il ſuit qu'en convertiſſant le tems écoulé en degrés, &c. il en réſulte un trop grand arc, puiſque c'eſt l'arc du parallele qui contient le même nombre de degrés que ſon correſpondant forme dans l'Equateur. C'eſt pourquoi comme il s'agit de déterminer la véritable valeur de l'arc $\underset{\frown}{Q}H$ du parallele lorſque cet Aſtre eſt tranſporté ſur l'Equateur ou ſur un grand cercle. On fera comme le Rayon d'un grand cercle eſt au Rayon du parallele LK, lequel ne ſçauroit différer bien ſenſiblement du parallele oB de l'Etoile connue; c'eſt-à-dire, comme le rayon eſt au ſinus de la diſtance au Pole de l'Etoile connue, ainſi le nombre de degrés, &c. compris dans l'arc $\underset{\frown}{Q}H$ réduit en ſecondes, à un 4me terme; ce qui fera connoître le nombre des degrés, minutes, &c. compris dans l'arc $\underset{\frown}{Q}o$. Cet arc $\underset{\frown}{Q}o$ eſt la différence en déclinaiſon, entre l'Etoile qui décrit le parallele $\underset{\frown}{Q}K$ & l'Etoile connue ou qui a décrit le parallele oB: étant donc donnée la déclinaiſon de cette derniere, on aura par conſéquent celle de l'autre Etoile qu'on ſe propoſoit de découvrir. Par cette méthode on peut non ſeulement découvrir l'aſcenſion droite & la déclinaiſon des Etoiles fixes; mais auſſi les mouvemens apparens des Planetes & des Cometes; puiſqu'il eſt toujours facile de les comparer à quelques Etoiles connues, ou dont l'aſcenſion droite & la déclinaiſon ſe trouvent dans les Catalogues. Au reſte il eſt certain que la Réticule dont on vient de parler & qui eſt compoſée de fils inclinés à 45° pourroit être d'un aſſez grand uſage dans l'Aſtronomie, ſi depuis environ vingt-cinq ans on n'en avoit imaginé une autre, dont la perpendiculaire doit toujours être égale à la baſe compriſe

Dans les cercles inégaux, les degrés, que contiennent des arcs égaux ſont entr'eux réciproquement comme les rayons des cercles.

Autre Réticule encore plus ſimple. PLANCHE VII *Fig.* A.

entre les deux lames inclinées; car outre qu'on peut même s'y paſſer des fils (qu'il eſt fort difficile d'appercevoir ou de bien éclairer pendant la nuit) il y a d'ailleurs cela d'avantageux qu'on profite de tout le champ de la lunette, au lieu que dans le premier il n'eſt pas facile de diſpoſer trois fils exactement paralleles, ni d'obſerver des Etoiles plus éloignées, du fil A o B que la moitié du champ de la lunette.

Démonſtration de la propoſition énoncée ci-deſſus.

On démontre de la maniere ſuivante que dans des cercles inégaux les nombres qui expriment les parties ſemblables d'arcs de même grandeur ſont entr'eux réciproquement comme les rayons de ces cercles; car ſoient deux cercles inégaux qui aient un même centre C, & ſur la circonférence de l'un deſquels on ait pris l'arc AF égal à l'arc BE: ayant mené la droite CE, il eſt évident que les arcs AD, EB ſeront ſemblables, c'eſt-à-dire, que ces deux derniers arcs contiendront un même nombre de parties ſemblables, puiſqu'on doit regarder comme telles des parties qui ont même rapport aux circonférences entieres de ces cercles. Mais puiſqu'on a ſuppoſé d'ailleurs AF de même grandeur que BE, on aura donc AD eſt à AF comme AD eſt à BE; & parce que ce dernier rapport de AD à BE eſt le même que celui du rayon CA au rayon CB,* on aura donc AD eſt à AF comme CA eſt à CB. Or AD eſt à AF comme le nombre de parties contenues dans BE eſt au nombre de parties ſemblables contenues dans AF; il s'enſuit donc que le nombre de parties contenues dans BE ſera au nombre de parties ſemblables contenues dans AF comme CA eſt à CB.

PLANCHE VII Fig. 7.

* *Les rayons ſont toujours entre eux comme les circonférences des cercles.*

La Méthode propoſée par Flamſteed pour trouver les aſcenſions droites.

Une autre méthode de trouver les aſcenſions droites des Aſtres & qui ne ſuppoſe preſqu'aucune connoiſſance de la déclinaiſon, ni par conſéquent de la hauteur du Pole, de celle du Soleil & des Etoiles fixes, c'eſt de diriger à peu près dans le Méridien vers le tems de l'Equinoxe du Printems, une lunette garnie d'un micrometre,

c'eſt-à-dire, de fils paralleles & à angles droits, dont l'un doit ſe mouvoir de haut en bas, en conſervant toujours ſon parallélisme. On fera enſorte que cette lunette ſoit à l'abri des injures de l'air, & qu'elle puiſſe demeurer immobile pendant quelques jours : enſuite on fera mouvoir à l'inſtant du midi le filet horiſontal du micrometre, en ſorte que les bords du Soleil le puiſſent parcourir exactement dans l'eſpace de 3 à 4 minutes que cet Aſtre emploie à traverſer la lunette. On obſervera auſſi l'inſtant (marqué par l'Horloge à pendule) qui répond au paſſage de chacun de ſes deux bords au filet vertical qui eſt fixe, ce qui donnera le paſſage de ſon centre : on attendra que quelqu'une des Etoiles voiſines de l'Equateur arrive au filet vertical de la même lunette ; & ayant obſervé le moment de ſon paſſage, on connoîtra, en faiſant mouvoir le fil horiſontal du micrometre, de combien cette Etoile eſt plus élevée ou plus baſſe que le centre du Soleil, ce qui eſt facile (puiſqu'on peut connoître par l'obſervation de l'autre bord du Soleil) l'intervalle que le curſeur ou filet mobile doit parcourir pour répondre exactement au diametre du Soleil & que ce diametre peut être connu d'ailleurs par les paſſages obſervés du bord oriental & occidental, comme on le verra ci-après. Ayant donc converti en degrés, &c. le tems écoulé entre les paſſages du Soleil & de l'Etoile au fil vertical de la lunette, on aura leur différence en aſcenſion droite apparente, laquelle étant ajoutée à celle qu'on trouvera à l'Equinoxe ſuivant entre l'Etoile & le Soleil, c'eſt-à-dire, lorſque cet Aſtre doit reparoître à midi à la même hauteur, donnera par conſéquent l'arc de l'Equateur qui répond au chemin parcouru par le Soleil pendant tout le tems écoulé d'environ ſix mois. Maintenant il faut conſidérer que ſi le Soleil paroiſſoit à midi vers le tems de l'autre Equinoxe exactement au même endroit de la lunette

qu'au tems de la premiere observation, il est évident qu'étant dans chacun de ces deux cas précisément à une même distance du Zénit ou de l'Equateur, sa distance au colure des Solstices, ou si l'on veut aux points équinoctiaux, seroit par conséquent la même, & partant que ce qui s'en manque ou ce qui excede 180° dans l'arc qu'aura paru parcourir le Soleil, seroit le double de son ascension droite au moment de la premiere observation.

Connoissant ainsi l'ascension droite du Soleil, on a par conséquent celle de l'Etoile, & c'est à celle-ci qu'on peut ensuite comparer toutes les autres. Mais comme il est rare que dans cet intervalle d'environ six mois le Soleil retourne à midi précisément à la même hauteur où il avoit paru pour la premiere fois à son passage par la lunette, il est donc nécessaire de calculer trigonométriquement par des parties proportionnelles le mouvement en ascension droite qui répond à la petite différence qu'on a trouvée à l'égard du Soleil, relativement à l'Etoile, au tems de la premiere & de la seconde observation; car si l'on sçait à peu près la déclinaison du Soleil, & si l'on a observé exactement avec le micrometre les différences en déclinaisons du bord du Soleil & de l'Etoile, on pourra calculer par la Trigonométrie ou par les formules de M. Cotes, l'arc de l'Equateur ou de la différence en ascension droite qui répond au changement en déclinaison.

Soit, par exemple, S le lieu du Soleil observé un peu après l'Equinoxe du Printems dans l'Ecliptique $\Upsilon \Leftrightarrow \simeq$; soit aussi F le lieu d'une Etoile située presque à même distance de l'Equateur $\Upsilon C \simeq$. Si l'on tire par le Pole P les droites PSR, PTF qui passent par le Soleil & par l'Etoile, il est évident que l'arc RT de l'Equateur représentera la différence en ascension droite apparente entre le Soleil & l'Etoile, & qu'ainsi la grandeur de cet arc sera connue par observation. Soit encore s le lieu du Soleil ob- PLANCHE VII. Fig. B.

ſervé à midi, & qui répond à peu près à la même hauteur vers l'Equinoxe d'Automne : ayant mené par le Pole P & par le point s la ligne droite ou cercle de déclinaiſon Psr, l'arc Tr ſera par conſéquent la différence en aſcenſion droite obſervée entre l'Etoile F & le Soleil. Mais le Soleil ayant paru dans la lunette plus haut à midi au tems de l'Equinoxe d'Automne, qu'au tems de la premiere obſervation faite à midi à l'Equinoxe du Printems, pour trouver le lieu σ du Soleil dans l'Ecliptique où le point ρ de l'Equateur qui répond exactement à la même diſtance du point $\simeq$, que le point R étoit éloigné d'Υ, on réſoudra les deux triangles $rs\simeq$, $\rho\sigma\simeq$; car ſi l'on connoît à peu près la diſtance rs du Soleil à l'Equateur au tems de l'obſervation faite en Automne, comme la différence de rs à $\rho\sigma$ eſt donnée par obſervation, & que l'angle en $\simeq$ eſt conſtant, il s'enſuit que la petite variation $r\rho$ du côté $r\simeq$ ſera déterminée, & qu'ainſi l'arc entier $T\rho$ ſera déterminé. Enfin ſi l'on ajoute les deux arcs RT, $T\rho$, & qu'on retranche la ſomme $RT\rho$ du demi-cercle de l'Equateur $\Upsilon T\simeq$ qui vaut 180, la moitié du reſte ſera la valeur des arcs $R\Upsilon$, $\rho\simeq$, c'eſt-à-dire, que l'arc $R\Upsilon$ ſera connu & doit répondre à l'aſcenſion droite du Soleil au tems de la premiere obſervation du Printems.

Comment on peut calculer le diametre apparent du Soleil.

Le tems du paſſage du Soleil au Méridien ayant été obſervé au filet vertical de la lunette immobile, donneroit (étant converti en minutes & ſecondes de degrés à raiſon de 24 heures pour 360°) le véritable diametre* du Soleil, ſi cet Aſtre ſe trouvoit préciſément aux environs de l'Equateur, & ſi par ſon mouvement, qui paroît cha-

* Dans les Pleines Lunes on peut obſerver de la même maniere ſon diametre à l'heure du paſſage de cet Aſtre par le Méridien : mais il faut bien prendre garde que le diametre déduit de cette obſervation, n'eſt pas le diametre vu de la ſurface ; mais celui qui ſeroit vu du centre de la Terre ; car la différence qui eſt tout-à-fait inſenſible pour le Soleil, devient trop conſidérable à l'égard de

que jour se faire en sens contraire au mouvement diurne ou vers l'Orient, ce passage n'étoit pas d'une durée un peu plus longue que le véritable. Pour remédier à ces deux sources d'erreurs, il sera facile quant au premier point de se servir de la regle expliquée ci-dessus * pour réduire le tems ou l'arc en minutes & secondes de grand cercle. Quant au second on peut y remédier en observant le retour du Soleil & de l'Etoile à la lunette immobile; car l'on aura par ce moyen le mouvement diurne du Soleil en ascension droite qui se fait à l'égard de l'Etoile fixe; d'où l'on tirera la partie proportionnelle qui répond au tems du passage du Soleil, & qu'il faudra rabattre de la durée observée de ce passage, pour en déduire le véritable diametre.

La durée de son passage au Méridien doit toujours paroître un peu trop longue.

* *Page 386.*

Etant données l'ascension droite & la déclinaison d'un Astre, on trouve par la Trigonométrie sphérique sa longitude & sa latitude. Comme il est beaucoup plus facile de découvrir d'abord les deux premiers de ces élémens que les deux autres, à cause du mouvement diurne ou de rotation de la Terre autour de son axe, les Astronomes s'en servent aujourd'hui pour en déduire les deux derniers, puisque ceux-ci ne dépendent plus dès-lors que d'un calcul assez simple. Dans toutes les Tables astronomiques & dans les Catalogues d'Etoiles on ne recherche jamais que les longitudes & latitudes, parce que c'est à l'égard de l'Ecliptique & de ses paralleles que se fait le mouvement réel des corps célestes, dont on compte la longitude depuis le commencement d'Υ. Ainsi pour trouver la longitude & la latitude d'une Etoile, soit le colure des Solstices $PB\text{Æ}Q$ qui passe par les Poles B & P de l'Ecliptique &

Maniere de déterminer les longitudes & latitudes des Astres.

PLANCHE VII *Fig.* 8.

la Lune, à cause de sa proximité, pour n'être pas négligée. La raison de ce que nous venons de dire est fondée sur ce que l'on réduit le tems en degrés, &c. à raison de 24 heures pour 360°: or le centre de la révolution du ciel étoilé n'étant pas à la surface, mais au centre du globe terrestre, il est évident de là que le diametre de la Lune conclu de son passage au Méridien, sera le diametre vu du centre de la Terre, lequel est un peu trop petit à notre égard.

de l'Equateur, soit $\text{Æ}\,\Omega$ l'Equateur ou le cercle équinoctial, EC l'Ecliptique dont la commune section se fait en Υ, soit enfin une Etoile en S: on tirera par le Pole P & par cette Etoile le cercle de déclinaison PSF qu'on prolongera, s'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'il rencontre l'Equateur au point F, & l'arc ΥF sera l'ascension droite de l'Etoile, comme aussi l'arc SF sa déclinaison. On menera encore par le Pole B de l'Ecliptique & par l'Etoile, le cercle de latitude BSO qui rencontrera l'Ecliptique en O: or il est évident que l'arc ΥO sera la longitude de l'Etoile, & l'arc SO sa latitude. C'est pourquoi dans le Triangle sphérique BPS, puisqu'on connoît le côté PS qui est l'arc de complément de la déclinaison observée, comme aussi l'arc BP qui est égal à l'obliquité ou inclinaison de l'Ecliptique à l'Equateur; de plus puisqu'on connoît l'angle $FP\,\Omega$ mésuré par l'arc $F\Omega$ complément de l'ascension droite, on aura donc son supplément ou l'angle BPS. Ainsi dans le Triangle BPS puisque trois parties sont données, il sera facile de trouver l'angle PBS, qui a pour mesure l'arc OC, & donc le complément à $90°$ sera l'arc ΥO longitude de l'Etoile, on trouvera aussi l'arc BS complément à $90°$ de la latitude de l'Etoile.

Cette Méthode est générale & peut servir aussi pour découvrir l'ascension droite & la déclinaison d'une Etoile dont la longitude & latitude seroient données: mais rarement a-t-on besoin de résoudre ce dernier cas. Quoiqu'il en soit, on a proposé dans ces derniers tems d'épargner aux Calculateurs l'embarras de tracer une figure sur le globe pour résoudre selon les diverses circonstances le Triangle sphérique obliquangle énoncé ci-dessus; car comme il se trouve toujours qu'on ne connoît que deux côtés & l'angle compris, il n'est pas facile d'appercevoir où doit tomber la perpendiculaire qu'il faut abbaisser pour résoudre ce Triangle: il vaut donc mieux résoudre les deux

Autre Méthode.

deux triangles rectangles ΥLF, SLO. Dans le premier de ces deux Triangles connoissant l'ascension droite ΥF, & l'angle $L\Upsilon F$, il sera facile de calculer l'angle ΥLF, ce qui donnera la valeur de son opposé au sommet SLO, comme aussi les côtés ΥL, & LF. D'ailleurs si l'on soustrait l'arc connu FL, de la déclinaison FSL, le reste LS sera par conséquent connu : c'est pourquoi dans le second triangle rectangle SLO, puisqu'on connoît outre l'angle droit, le côté LS & l'angle OLS, il sera facile de calculer la valeur de SO latitude de l'Etoile que l'on cherche : mais on trouvera aussi l'arc LO, qui étant ajouté à l'autre arc ΥL de l'Ecliptique lequel est déja connu, donnera l'arc total ΥO qui sera la longitude de l'Etoile.

Au reste il y a différens cas où il faudra prendre au lieu de la somme des deux arcs, leurs différences & au contraire : cela varie selon les quatre situations possibles d'un Astre entre les deux colures de la Sphere. La figure 9 suffit pour faire connoître ces différens cas. Voici les cinq analogies qui servent à les résoudre.

I. *Comme le cosinus de l'obliquité de l'Ecliptique* F Υ L
est au Sinus total
ainsi la Tangente de l'ascension droite Υ F
a la Tangente Υ L *de l'arc de l'Ecliptique correspondant*

II. *Comme le Sinus total*
est au Sinus de l'obliquité de l'Ecliptique L Υ F.
ainsi le cosinus de l'ascension droite Υ F
au cosinus de l'angle Υ LF *de l'Ecliptique & du Méridien*

III. *Comme le Sinus total*
est à la Tangente de l'obliquité de l'Ecliptique
ainsi le Sinus de l'ascension droite Υ F
a la Tangente de l'arc de déclinaison F L. *Cet arc* F L *étant retranché (ou ajouté selon les différens cas) de la déclinaison de l'Astre observée* F S, *le reste* L S *sera l'hypotenuse du Triangle rectangle* L O S ; *c'est pourquoi l'on fera*

IV. *Comme le Sinus total*
est au Sinus de l'angle de l'Ecliptique & du Méridien Υ L F *ou* S L O
ainsi le sinus du côté L S
est au sinus du côté S O *qui sera la Latitude que l'on cherche.*

V. *Enfin comme le Sinus total*
est au cosinus de l'angle de l'Ecliptique & du Méridien
ainsi la Tangente du côté L S
est à la Tangente de l'arc L O, *qui étant ajouté (ou retranché selon les différens cas) à l'arc* Υ L, *la somme (ou la différence) sera connoître la Longitude* Υ O *que l'on cherche.*

Un seul Observateur ne sçauroit guères déterminer les lieux des Planetes autrement qu'en recherchant leurs ascensions droites & leurs déclinaisons.

On a cru devoir entrer dans tout ce détail, parce que ces sortes de calculs de la longitude & latitude des Astres sont devenus d'autant plus nécessaires qu'il est assez rare qu'on observe autrement le lieu des Etoiles, des Planetes ou des Cometes, autrement que par leurs ascensions droites & déclinaisons : ainsi on est toujours obligé de les réduire à leurs vraies longitudes & latitudes suivant la forme de calcul énoncée ci-dessus. On peut dire cependant qu'on pourroit y employer encore une autre Méthode qui ne suppose que quatre analogies dans chacune desquelles se trouve le sinus total : mais à moins que de bien tracer la figure selon les regles de la projection, ou d'avoir un globe céleste sous les yeux, il est quelquefois difficile de ne pas se méprendre dans le calcul. Soit donc tiré de l'Astre à Υ l'arc d'un grand cercle ΥS : dans le triangle rectangle ΥFS on connoît les deux côtés ΥF, FS qui représentent l'ascension droite & la déclinaison de l'Astre observé, c'est pourquoi on découvrira par la Trigonométrie l'arc ΥS & l'angle $S\Upsilon F$, d'où retranchant (ou bien y ajoutant selon les différens cas) l'angle $F\Upsilon L$ qui est l'obliquité de l'Ecliptique, le reste (ou la somme) $S\Upsilon L$ sera l'angle du triangle rectangle ΥOS qu'il est facile de résoudre, puisqu'on en connoît l'hypotenuse ΥS. On pourra donc calculer par la Trigonométrie les arcs ΥO, SO, de ce triangle qui donneront comme l'on voit, la longitude & la latitude de l'Astre observé.

PLANCHE VII *Fig. 9.*

L'avantage de déterminer les ascensions droites & les déclinaisons des Astres à l'instant de leur passage par le Méridien, est fondé sur ce qu'on évite dans l'ascension droite, non seulement l'effet de la réfraction, mais encore celui de la parallaxe ; que d'ailleurs la parallaxe de hauteur & la réfraction étant beaucoup plus aisées à déterminer dans un cercle vertical que dans toute autre

situation oblique, la déclinaison de l'Astre observée devient par là d'autant plus facile à corriger, puisque le Méridien où se fait l'observation n'est autre chose qu'un cercle vertical ou cercle de hauteur.

Lorsqu'on compare les lieux des Etoiles fixes observés par les Anciens avec ceux qu'elles nous paroissent occuper relativement à l'Ecliptique, on ne trouve pas que les latitudes aient changé; mais quant aux longitudes qui se comptent depuis la section de l'Ecliptique & de l'Equateur en ♈ ou à l'Equinoxe du Printems, on s'aperçoit qu'elles ont augmenté très-sensiblement. Il ne faut pas croire pour cela que ces Etoiles ont eu un mouvement réel; mais ce sont au contraire les points équinoctiaux qui s'en sont éloignés par un mouvement rétrograde, & c'est de ces derniers, comme l'on sçait, que se comptent les longitudes. Or les plus anciennes longitudes des Etoiles observées ayant été comparées à celles qu'on a rétablies en ces derniers tems, nous ont fait enfin connoître que la précession des Equinoxes étoit de 0′ 50″ par an, ce qui répond à un degré dans l'espace de 72 ans.

Les longitudes des Etoiles augmentent de près d'une minute chaque année, mais leurs latitudes, qu'on avoit crues invariables, changent bien peu & en différens sens.

Ce que l'on vient d'exposer ci-dessus suffit, à ce qu'il semble, pour faire concevoir les moyens de construire un Catalogue général de toutes les Etoiles fixes. L'usage des Catalogues qui ont été publiés jusqu'à ce jour, a été de faciliter aux Astronomes les observations du vrai lieu, tant des Planetes, que des Cometes, puisque chaque fois qu'on les comparera une fois à des Etoiles connues, c'est-à-dire, dont la position se trouve dans les Catalogues, leurs véritables lieux dans le Ciel seront déterminés. Il arrive cependant qu'un Astre n'étant pas visible dans le Méridien, ou ne pouvant être comparé à quelque petite Etoile par le moyen du Réticule (parce que la lumiere du Crépuscule est trop forte) on est obligé de

mesurer par de grands arcs, sa distance à deux Etoiles de la premiere ou de la seconde grandeur. Voici donc la méthode * de calculer la longitude ou la latitude d'un Astre lorsqu'on sçait sa distance à deux Etoiles fixes dont la position se trouve dans les Catalogues.

PLANCHE VII *Fig.* 10. Soit EF un arc de l'Ecliptique dont le Pole est en B, & soient A, C deux Etoiles fixes dont on connoît la longitude & la latitude : soit enfin P l'Astre dont on a observé la distance aux deux Etoiles A & C. Dans le triangle ABC étant donnés les côtés AB, CB complémens des latitudes de chaque Etoile, comme aussi l'angle ABC qui est mésuré par l'arc EF différence en longitude de ces deux Etoiles, on pourra déterminer par la Trigonométrie l'arc AC qui est la distance des deux Etoiles, comme aussi l'angle BCA : ensuite puisqu'on connoît les trois côtés du triangle APC, il sera aisé de calculer l'angle PCA, qui étant retranché de l'angle BCA, le reste sera l'angle BCP. Enfin dans le triangle BCP étant donnés les côtés BC, CP & l'angle BCP on aura par conséquent l'angle CBP qui a pour mésure l'arc OF, différence en longitude entre l'Etoile C & la Planete P : on pourra calculer aussi l'arc BP qui est le complément de la latitude de l'Etoile.

* Cette Méthode peut être d'un grand usage sur Mer, si au défaut de l'occultation des Etoiles zodiacales, on veut tenter d'y rechercher la longitude par les distances de deux des plus belles Etoiles à la Lune : mais il faut remarquer que le mouvement de la Lune est trop rapide pour qu'on puisse supposer, que la distance de cet Astre à deux Etoiles, ait été mesurée dans un même instant : il faudra donc marquer soigneusement le tems des distances observées, & meme réitérer de les observer plusieurs fois, afin de réduire par là à une même heure, minute, & seconde, chacune de ces distances. Au reste, elles doivent être déterminées avec les nouveaux Quartiers de Réflexion garnis de lunettes ; & afin que dans le calcul de la longitude, on ne tombe pas dans les erreurs grossieres qu'on a remarquées dans les Catalogues, on donne ici la position des Etoiles de la premiere grandeur qui ont été restituées par de nouvelles Observations, & dont la plus grande partie se trouve rapportée dans le Discours préliminaire de l'Histoire Céleste.

Les déclinaisons de ces mêmes Etoiles pourront encore servir pour déterminer exactement la hauteur du Pole, si l'on peut observer leur hauteur méridienne en mer pendant le crépuscule.

Tables de l'Aſcenſion & Déclinaiſon des principales Etoiles.

NOMS des ETOILES.	Aſcenſion droite en 1742.	Aſcenſion droite en 1750.	Mouvement annuel en Aſcenſion droite.	Déclinaiſon en 1742.	Déclinaiſon en 1750.	Mouvement annuel en déclinaiſon.
	D. M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	D. M. S.	M. S.
La Polaire.	10. 19. 52½	10. 39. 11	2. 25, 00	87. 55. 20 b.	87. 58. 00	0. 19, 60
Acharnar.	21. 55. 30	22. 00. 00	0. 34, 00	58. 33. 22½ a.	58. 30. 45	0. 19, 70
e du Belier.	28. 10. 30	28. 17. 10	0. 50, 00	22. 13. 47½ b.	22. 16. 07½	0. 17, 56
Aldebaran.	65. 16. 15	65. 23. 41½	0. 50, 64	15. 57. 50 b.	15. 58. 57½	0. 08, 19
e de la Chevre.	74. 25. 00	74. 33. 47½	0. 65, 83	45. 42. 05 b.	45. 42. 50	0. 05, 55
Rigel.	75. 32. 05	75. 37. 52½	0. 43, 20	08. 31. 12½ a.	08. 30. 32	0. 05, 04
e d'Orion.	85. 18. 10	85. 24. 45	0. 49, 46	07. 20. 07 b.	07. 20. 24½	0. 02, 14
Canopus.	94. 32. 20	94. 35. 00	0. 20, 00	52. 33. 55 a.	52. 34. 15	0. 02, 56
Sirius.	98. 26. 40	98. 31. 57½	0. 39, 82	16. 22. 55 a.	16. 23. 26½	0. 04, 09
Procyon.	111. 26. 35	111. 32. 55	0. 47, 55	05. 51. 50 b.	05. 50. 38	0. 08, 69
a de l'Hydre.	138. 43. 40	138. 49. 36½	0. 44, 55	07. 33. 09 a.	07. 33. 11	0. 15, 22
Regulus	148. 38. 35	148. 44. 56	0. 47, 64	13. 13. 15 b.	13. 11. 00	0. 17, 00
Epi de la Vierge.	197. 54. 35	198. 00. 54	0. 47, 37	09. 48. 05 a.	09. 49. 37½	0. 19, 00
Arcturus.	210. 58. 32½	211. 04. 00	0. 40, 96	20. 32. 32½ b.	20. 29. 59½	0. 19, 05
Wega.	243. 24. 20	243. 31. 40	0. 54, 92	25. 49. 55 a.	25. 51. 10	0. 09, 50
e de la Lyre.	277. 03. 10	277. 07. 10	0. 29, 94	38. 33. 58 b.	38. 34. 24	0. 03, 24
a de l'Aigle.	294. 32. 50	294. 38. 42½	0. 44, 20	08. 12. 37½ b.	08. 13. 47½	0. 08, 73
a du Cygne.	308. 09. 40	308. 13. 52½	0. 31, 55	44. 22. 12½ b.	44. 23. 47½	0. 11, 90
e de Pegaſe.	342. 58. 35	343. 04. 30	0. 44, 00	13. 49. 22½ b.	13. 51. 57½	0. 19, 21
Fomalhaut.	340. 49. 40	340. 56. 00	0. 47, 73	30. 59. 00 a.	30. 56. 36½	0. 18, 37

Les plus récentes obſervations ayant été comparées à celles qui ont été faites en France il y a près de 60 ans (leſquelles ont été nouvellement calculées & corrigées par l'Aberration &c.) ont enfin fait connoître le mouvement apparent des Etoiles, & par conſéquent leurs variations annuelles ou de dix en dix ans, telles qu'on les voit dans la Table ci-deſſus. Cependant comme il n'a pas été poſſible de connoître en ces derniers tems ni de rétablir l'aſcenſion droite des deux Etoiles *Acharnar* & *Canopus*, on ne s'eſt uniquement attaché qu'à déduire leurs vraies déclinaiſons de toutes les obſervations faites en Cayenne & au Perou. On peut donc établir avec certitude *Acharnar* au commencement de $\left\{\begin{matrix}1673\ldots 58^{\circ}\ 56'\ 00''\\ 1739\ldots 58\ \ 34\ \ 22\frac{1}{2}\end{matrix}\right\}$ & *Canopus* $\left\{\begin{matrix}52^{\circ}\ 31'\ 00''\\ 52\ \ 33\ \ 47\frac{1}{2}\end{matrix}\right\}$

Tables de la Longitude & Latitude des principales Etoiles.

NOMS des ETOILES.	Longitude en 1742.	Longitude en 1750.	Mouvement des Etoiles en 50 ans.	Latitudes.	Variations en Latitude dep. 50 ans.
	D. M. S.	D. M. S.	M. S.	D. M. S.	M. S.
α *du Belier.*	♈ 04. 03. 36	♈ 04. 10. 10	41. 51	09. 57. 25 b.	00. 00
Aldebaran.	♉ 06. 10. 45	♉ 06. 17. 20	41. 24½	05. 29. 15 a.	inconnue.
Rigel.	♊ 13. 13. 20	♊ 13. 20. 00	41. 59	31. 09. 10 a.	—00. 25
α *de la Chevre.*	♊ 18. 15. 06½	♊ 18. 21. 50	41. 52½	22. 51. 50 b.	+00. 30
La Polaire.	♊ 24. 57. 10	♊ 25. 03. 50	41. 40*	66. 04. 10 b.	inconnue.
α *d'Orion.*	♊ 25. 09. 05	♊ 25. 15. 55	42. 30	16. 03. 38 a.	—00. 47½
Sirius.	♋ 10. 31. 38	♋ 10. 38. 15	41. 25	39. 32. 40 a.	+00. 37½
Canopus.	♋ 11. 21. 30	♋ 11. 28. 10	41. 40*	75. 51. 50 a.	
Procyon.	♋ 22. 13. 32½	♋ 22. 20. 10	41. 35	15. 58. 00 a.	+00. 55
α *de l'Hydre.*	♌ 23. 41. 36	♌ 23. 48. 20	41. 59	22. 23. 54 a.	00. 00
Regulus	♌ 26. 14. 10	♌ 26. 20. 45	41. 10	00. 27. 35 b.	+00. 05
l'Epi de la Vierge.	♎ 20. 14. 28	♎ 20. 21. 10	41. 52½	02. 01. 54 a.	00. 00
Arcturus.	♎ 20. 37. 57½	♎ 20. 44. 40	41. 46	30. 55. 12 b.	—02. 05
Antares.	♐ 06. 10. 30	♐ 06. 17. 20	41. 40*	04. 32. 11½ a.	+00. 45½
α *de la Lyre.*	♑ 11. 42. 10	♑ 11. 48. 45	41. 22½	61. 45. 15 b.	+00. 27½
α *de l'Aigle.*	♑ 28. 08. 05	♑ 28. 14. 55	42. 35	29. 18. 47½ b.	—00. 07½
Fomalhaut.	♓ 00. 13. 27½	♓ 00. 20. 15	41. 40*	21. 06. 13½ a.	+01. 00
α *du Cygne.*	♓ 01. 47. 04	♓ 01. 53. 35	40. 59	59. 55. 04 b.	—00. 27½
Acharnar.	♓ 11. 34. 55	♓ 11. 41. 35	41. 40*	59. 19. 45 a.	inconnue.
Markab.	♓ 19. 53. 16	♓ 19. 59. 55	41. 40*	19. 24. 52½ b.	+00. 12½

La distance de l'Etoile Canopus au Cœur de l'Hydre observée en 1677, à l'Isle de Ste Helene de 57° 31′, & celle d'Acharnar à Fomalhaut de 39° 05′ 20″ ayant été un peu augmentée à cause de la réfraction, on a calculé les deux triangles dont ces distances sont les bases & dont les deux autres côtés sont les distances véritables de chaque Etoile au Pole ; & c'est ainsi qu'on a déduit pour le commencement de l'année 1678 l'ascension droite d'Acharnar 21° 19′½ & celle de Canopus 94° 11′. Mais il faut bien remarquer que pour mieux établir l'ascension droite de ces deux Etoiles, il auroit fallu que M. Hallei eût publié la quantité dont la réfraction a dû accourcir les distances, ou du moins qu'il eût averti de la saison de l'année & de l'heure ou de la hauteur qui répondoit à chaque obser-

vation ; car on n'a supposé qu'à peu près les vraies distances dans le calcul précédent. C'est pourquoi les ascensions droites & longitudes de ces deux Etoiles calculées pour 1750, sont assez douteuses & n'ont pas à beaucoup près le même degré de précision que celles des autres Etoiles qu'on trouve dans les Tables ci-dessus.

CHAPITRE VINGTIEME.

Des Crépuscules & de la Réfraction des Astres.

L'air contribue beaucoup à nous faire paroître le ciel éclairé.

Entre les principaux avantages que nous retirons de notre atmosphere, l'un des plus considérables est que par son moyen le Soleil éclaire & répand sa lumiere dans toutes les parties du ciel qui l'environnent. Car si la Terre n'avoit autour d'elle aucune athmosphere, il n'y auroit de clarté que dans la seule partie du ciel qu'occupe le Soleil ; & l'Observateur, tournant les yeux au-delà & de tous côtés, n'appercevroit uniquement dans le Ciel qu'un fond obscur & comme plongé dans les ténebres. En plein jour les moindres Etoiles brilleroient, & cela assez près du Soleil ; puisqu'il n'y auroit rien qui pût les effacer, cette vive lumiere du Soleil n'étant réfléchie vers nos yeux par aucun corps que ce fût. Aussi tous les rayons qui après s'être brisés ou réfléchis ne se répandroient plus sur la Terre passeroient au-delà & pourroient éclairer ou les Planetes ou les Cometes, &c. presque tous se perdant dans un espace infini sans se détourner jamais vers la Terre.

Si l'atmosphere terrestre étoit anéanti tout-à-coup, la lumiere du Ciel disparoî-

Mais puisque l'atmosphere qui nous environne reçoit une multitude prodigieuse de rayons du Soleil & puisquelle nous les refléchit, il arrive qu'en ce cas on attribue au Ciel une lumiere qu'il n'a pas, & c'est cette même splendeur de l'atmosphere qui seule est capable d'effacer ou d'absorber presqu'entierement la lumiere des Etoiles fixes.

troit au coucher du Soleil, & nous serions subitement plongés dans les ténebres.

De plus s'il n'y avoit point d'atmosphere, il est certain qu'immédiatement avant le coucher du Soleil, sa lumiere seroit aussi vive qu'à midi, & d'un très-grand éclat; & qu'au moment de son coucher de profondes ténebres s'éleveroient tout-à-coup; en sorte que l'arrivée subite de la nuit ou le passage si soudain de la lumiere aux ténebres seroit fort incommode pour tous les habitans de la Terre. Mais par le moyen de l'atmosphere (quoiqu'après le coucher du Soleil aucun de ses rayons ne puisse venir directement à nous) il arrive cependant que nous jouissons d'une lumiere douce qui nous est réfléchie, & que les ténebres de la nuit ne se répandent que par des degrés presqu'insensibles. La raison est que la Terre par son mouvement diurne de rotation nous fait perdre à la vérité le Soleil de vue; mais l'air supérieur continue d'en être éclairé, & remplit encore à notre égard tout le Ciel de sa lumiere: ensuite le Soleil continuant de descendre, l'air perd successivement de sa clarté; en sorte que lorsque le Soleil est parvenu au 18eme degré au-dessous de l'Horison, il cesse entierement d'éclairer l'atmosphere, & l'air est totalement obscurci.

La cause des crépuscules.

De même lorsqu'au matin le Soleil est parvenu au 18eme degré sous l'Horison, il commence à éclairer l'atmosphere & à répandre de plus en plus dans le Ciel cette lumiere qui paroît d'abord douteuse, mais dont la vivacité augmente jusqu'au lever du Soleil. Or c'est cette foible lumiere du matin, ou celle du soir après le coucher du Soleil, & qui est produite par les rayons brisés dans l'atmosphere, qu'on appelle le *Crépuscule*.

PLANCHE VII *Fig.* 11.

Pour mieux entendre ce que nous venons de dire, soit *A D L* un cercle de la surface de la Terre concentrique au vertical, dans lequel se trouve le Soleil sous l'Horison; soit encore un autre cercle *C B M* dans le même plan, renfermant la portion d'air qui nous peut réfléchir

les

les rayons du Soleil. Soit enfin l'œil au point *A* de l'Horiſon ſenſible *A N* ou de la ſurface de la Terre. Puiſqu'il eſt démontré (*Euclid. Liv. 3 Prop. 16*) qu'on ne peut mener au point *A* aucune ligne droite entre le cercle & la tangente *A N*, il eſt clair que le Soleil étant au-deſſous de l'Horiſon, aucun de ſes rayons ne pourra parvenir directement juſqu'à l'œil placé en *A*; mais qu'étant, par exemple, dans la ligne *C G*, il peut y avoir un rayon qui tombant ſur la particule *C*, ſe réfléchiſſe ſelon la ligne *C A*, & par conſéquent rencontre l'œil au point *A*. De cette maniere les rayons du Soleil éclairant une infinité de particules de l'atmoſphere, ſeront pareillement détournés vers l'œil. Or ſi du point *B* (où la tangente *A B* rencontre la ſurface extérieure de l'air qui nous réfléchit la lumiere) on mene *B D* qui touche la Terre en *D*, lorſque le Soleil ſe trouvera dans cette ligne, alors le rayon *S B* doit ſe réfléchir en *B A* & rencontrer l'œil en *A*, parce qu'il ſe peut faire en ce cas que l'angle d'incidence *D B E* ſoit égal à l'angle de réfléxion *A B E*; ainſi ce rayon ſera le premier qui pourra parvenir à nos yeux le matin, & c'eſt par conſéquent le commencement de l'aurore ou du crépuſcule du matin, de même que le dernier qui y parvient le ſoir, doit déterminer la fin du crépuſcule. En effet le Soleil deſcendant plus bas les particules d'air qui ſont en *B* ou en-deçà ne doivent plus être éclairées du Soleil.

L'atmoſphere ſolaire doit auſſi contribuer à augmenter les crépuſcules.

La cauſe des crépuſcules ne doit pas être attribuée entierement à notre air, puiſqu'il y a une certaine matiere éthérée qui environne le Soleil, comme s'il avoit lui-même une eſpece d'atmoſphere; ce que l'on peut remarquer, par exemple, après le coucher du Soleil: car elle eſt toujours plus de tems que le Soleil à ſe lever, ou à ſe coucher. Avant le lever elle paroît de figure circulaire parce que c'eſt un ſegment de l'atmoſphere du Soleil coupé par l'Horiſon. En un mot ſa lumiere eſt tout-à-

fait différente de celle qui naît de l'atmosphere terrestre. Quant au crépuscule qui en provient il paroît d'une bien moindre durée que celui qui est causé par notre atmosphere lequel ne sçauroit finir que lorsque le Soleil est descendu 18 degrés sous l'Horison, & quant à ce dernier, on ne peut gueres décider quelles sont au juste les limites qui déterminent le commencement & la fin des crépuscules; car leur durée dépend & de la quantité de matiere propre à réfléchir la lumiere, qui se trouve dans l'air & de la hauteur de l'air. En Hiver l'air étant plus condensé, doit avoir moins de hauteur, & par conséquent les crépuscules finissent beaucoup plutôt. Au contraire en Eté l'air étant plus rarefié & plus élevé, ce même air est plus long-tems éclairé du Soleil, & par conséquent les crépuscules sont plus longs. De plus le crépuscule du matin est plus court que celui du soir; parce que l'air est plus dense & plus bas le matin que le soir. Le commencement du crépuscule arrive lorsque les Etoiles de la sixieme grandeur disparoissent le matin, mais il finit quand elles commencent à paroître sur le soir, la lumiere du Soleil réfléchie par l'air étant le seul obstacle qui les empêchoit de paroître.

Les crépuscules d'Hiver moins longs que ceux d'Eté.

Le P. Riccioli a trouvé par des Observations faites à Bologne en Italie la durée du crépuscule du matin, aux environs de l'Equinoxe, d'une heure 47′ : mais celui du soir, a paru de deux heures, n'ayant fini que quand le Soleil étoit à 21° sous l'Horison. En Eté vers les Solstices le crépuscule s'est trouvé quelquefois durer 3 heures 40 minutes, & celui du soir presque la moitié de la nuit.

Les observations de la durée des crépuscules peuvent servir à déterminer la hauteur de l'air.

Il suit de tout ce que nous venons de dire que le commencement du crépuscule du matin ou la fin de celui du soir étant donné, on pourra trouver facilement l'élévation de l'air qui réfléchit la lumiere; car la fin du crépuscule arrive lorsque les rayons qui partent du Soleil sont des tangentes à la Terre & se réfléchissent vers l'œil de l'Observa-

teur, par les parties les plus élevées de notre air : & ce moment étant donné, on trouve l'abbaissement du Soleil sous l'Horison, d'où il est facile de calculer la hauteur de l'air.

Car soit SB la tangente ou le rayon de lumiere qui est réfléchi, selon la ligne AB parallele à l'Horison, par la particule B, la plus élévée de l'air, l'angle SBN est donc la mesure de l'abbaissement du Soleil sous l'Horison : or parce que AB est aussi une tangente de la Terre, l'angle au centre AED sera égal à l'angle SBN*, c'est-à-dire, à l'abbaissement du Soleil sous l'Horison, & la moitié AEB du premier angle égale à la moitié du second. Soit donc vers la fin du crépuscule l'abbaissement du Soleil sous l'Horison de 18°, l'angle AEB seroit par conséquent de 9° dans la supposition que le rayon SB traverseroit l'atmosphere sans souffrir aucune réfraction. Mais comme par la réfraction ce rayon se courbe dans l'air vers H, il faut diminuer l'angle AEB d'une quantité égale à la réfraction horisontale du Soleil, c'est-à-dire, d'environ un demi-degré, ainsi l'angle AEB, sera réellement de 8° 30′ ; mais AE est à BH comme le Sinus total est à l'excès de la sécante de l'angle AEB sur le rayon, c'est-à-dire, comme 100000 est à 1110. Supposant donc le Raïon de la Terre en nombres ronds de 1400 lieues, la hauteur de l'atmosphere qui réfléchit les rayons du Soleil, sera d'environ $15\frac{1}{2}$ lieues; car 100000 : 1110 :: 1400 : $15\frac{1}{2}$.

PLANCHE VII *Fig.* 11.

* *Voyez le Lemme ci-dessus page* 201.

Dans la Sphere droite les crépuscules sont très courts, parce que le Soleil descend perpendiculairement au-dessous de l'Horison, en sorte que si dans la Sphere oblique ils sont plus longs, c'est parce que le Soleil y descend obliquement. D'ailleurs plus la Sphere est oblique, c'est-à-dire, plus la latitude d'un lieu devient grande, plus le crépuscule y sera long ; d'où l'on voit que les habitans de la Terre qui sont éloignés de l'Equateur de plus de 48°, ont au Solstice d'Eté * des crépuscules qui durent toute la

Les crépuscules sont plus courts dans la Sphere droite.

* *Car* $66\frac{1}{2}$ *qui est l'abbais-*

sement du Soleil au-dessous du Pole, au Solstice d'Eté, est la somme de 48° ½ & 18°.

nuit, & qui leur procurent une lumiere suffisante pour que les nuits n'y soient pas entierement obscures.

Dans la Sphere parallele les crépuscules durent plusieurs mois; en sorte que les Habitans jouissent pendant presque toute l'année d'une lumiere qui vient immédiatement du Soleil, ou qui est refléchie.

Le cercle qui termine les crépuscules.

Si l'on conçoit au-dessous de l'Horison un cercle parallele à l'Horison, & qui en soit à la même distance que le Soleil, lorsque le crépuscule finit, on aura le cercle qui termine les crépuscules; car toutes les fois que le Soleil par son mouvement diurne apparent sera arrivé le matin, par exemple, à ce parallele, ce sera le commencement du crépuscule du matin, dans quelque parallele à l'Equateur que se trouve alors le Soleil: de même le crépuscule du soir finira lorsque le Soleil après son coucher sera arrivé à un semblable parallele à l'Horison.

PLANCHE VII *Fig.* 12.

Supposons que l'Horison soit $H Q O$, & que le cercle $V a X$ parallele à l'Horison soit celui qui termine les crépuscules, que HZO soit le Méridien, $Æ Q R$ l'Equateur: il est évident que plus l'Equateur sera oblique à l'Horison, plus aussi les arcs de l'Equateur & de ses paralleles, qui se trouvent compris entre l'Horison & son parallele $R a X$ doivent augmenter. Les arcs $Q R$, $d a$, $c e$, $g h$, $k l$ qui sont des portions de l'Equateur ou de ses paralleles, compriſes entre l'Horison & le cercle qui termine les crépuscules, s'appellent les arcs des crépuscules; car ils en déterminent la durée: & comme chaque arc est plus ou moins grand à l'égard du parallele dont il dépend, le crépuscule durera plus ou moins selon que le Soleil passera successivement dans ces paralleles.

Je suppose qu'on prenne le point a dans le cercle qui termine les crépuscules, & par où passe le parallele à l'Equateur $d a$; qu'ensuite on fasse passer par a le grand cercle $M a N$, en sorte qu'il touche le cercle de l'apparition

perpétuelle. Comme l'Horiſon touche auſſi le même cercle, ces deux cercles feront avec l'Equateur & ſes paralleles des angles égaux, ou bien la meſure de chacun des deux angles, ſera la diſtance qu'il y a entre le parallele & ſon grand cercle: & parce que tous les arcs des paralleles de l'Equateur, qui ſe trouvent compris entre l'Horiſon & le cercle *MaN* ſeront ſemblables ſuivant la Prop. 13 du Liv. 2 *des Sphériques de Théodoſe;* il doit s'enſuivre que le Soleil les décrira en des tems égaux.

Quant au cercle *MaN* qui coupe le cercle *VaX* qui termine les crépuſcules, ou bien il le coupera en deux points différens, ou il le touchera en un ſeul point. Suppoſons premierement qu'il le coupe dans les deux points *a*, *h*, les arcs des paralleles *da*, *gh*, ſeront ſemblables; & par conſéquent lorſque le Soleil décrira par ſon mouvement diurne ces deux paralleles, les crépuſcules ſeront égaux; mais quand il décrira un parallele entre ces deux-là, comme ſeroit *ce*, alors le crépuſcule ſera moins long: car en ce cas l'arc *cm*, qui eſt l'arc du crépuſcule, ſera moindre que *ce*, qui eſt ſemblable à l'arc *da*, ou à *gh*, le Soleil décrivant *ce* & *da* en tems égaux.

De plus lorſque le Soleil eſt dans des paralleles plus éloignés de l'Equateur que n'eſt *gh*, les crépuſcules ſeront plus longs; car l'arc du crépuſcule *lk* eſt plus grand que l'arc *qk*, que le Soleil, quand il eſt dans le parallele *gh*, décrit dans un tems égal à la durée du crépuſcule.

Différentes durées des crépuſcules.

Dans les pays où le Pole eſt élevé, les crépuſcules ſeront toujours plus longs, à meſure que le Soleil décrira des paralleles plus voiſins du Pole. En effet l'arc du crépuſcule *op* eſt plus grand que *QR*, & il faut plus de tems pour décrire *YV*, que pour décrire *op*. Mais ſi le Soleil décrit le parallele *ST*, qui ne touche en aucun endroit le cercle qui termine le crépuſcule, la durée du crépuſcule égalera celle de toute la nuit.

De là vient que les crépuſcules augmentent & diminuent d'une maniere tout-à-fait différente de celle des jours & des nuits ; car lorſque le Soleil s'avance depuis le commencement de l'Ecreviſſe, où l'on doit avoir les plus longs jours, juſqu'au commencement du Capricorne, où ils ſont les plus courts ; alors les jours diminuent peu à peu à notre égard, & au contraire les nuits augmentent continuellement. Mais par rapport aux crépuſcules, les choſes ſont bien différentes ; car quoique le Soleil étant au commencement de l'Ecreviſſe, c'eſt-à-dire, quoique dans le Solſtice d'Eté, nous ayons le plus long crépuſcule, & qu'il diminue enſuite à meſure que les jours décroiſſent ; néantmoins cette diminution ne ſe fait pas continuellement juſqu'à ce que le Soleil arrive au Capricorne : car le plus court de tous nos crépuſcules ſe rencontre à certain point de l'Ecliptique ſitué entre la Balance & le Capricorne, après quoi les crépuſcules commencent à augmenter, de maniere qu'on doit bientôt obſerver un crépuſcule préciſément de même durée que lorſque le Soleil s'eſt trouvé dans l'Equateur, & cela avant que le Soleil ſoit arrivé au Capricorne. Il y a plus, ſi le Soleil continuoit à s'éloigner au-delà du Tropique du Capricorne, les crépuſcules augmenteroient de plus en plus malgré la diminution continuelle qui ſe feroit dans la longueur des jours. Enfin quoique les jours viennent à augmenter bien ſenſiblement depuis le paſſage du Soleil au Capricorne juſqu'au Bélier, cependant les crépuſcules au contraire diminuent, juſqu'à un certain point entre ces deux Signes, où doit arriver pour la ſeconde fois le plus court crépuſcule. Ceci paroîtra encore plus évident par les propoſitions qu'on va démontrer tout à l'heure, où nous déterminerons le lieu & le tems du plus court crépuſcule.

PLANCHE VII *Fig.* 13. Suppoſons en ſecond lieu que le cercle *M a N* touche dans un point *a* le cercle qui termine les crépuſcules, &

qu'on tire par le point *a* un parallele à l'Equateur *da*: voici comme on prouve que quand le Soleil ſera dans ce parallele, on doit obſerver le plus court de tous les crépuſcules. Comme les arcs des paralleles *Qn*, *da*, *gi*, qui ſe trouvent compris entre l'Horiſon & le cercle *MaN* ſont tous égaux, il eſt évident que le Soleil deſcendant au-deſſous de l'Horiſon, doit les décrire dans des tems égaux. Mais parce que les arcs des crépuſcules *ce*, *gh*, ſont plus grands que *cm* ou *gi*, le Soleil demeurera donc plus de tems dans l'arc *ce*, que dans l'arc *cm*; ou bien plus de tems dans l'arc *gh*, que dans *gi*, c'eſt-à-dire, que dans l'arc *da*; d'où l'on voit que les crépuſcules ſeront plus longs dans les paralleles *ce*, *gh*, que dans le parallele *da*, où doit néceſſairement paroître le plus court de tous les crépuſcules.

Comment on détermine le plus court crépuſcule.

On peut déterminer de la maniere ſuivante la diſtance qu'il y a entre l'Equateur & le parallele du plus court crépuſcule; car puiſque le cercle *MaN*, & l'Horiſon *HO*, touchent un même parallele, ſçavoir le cercle qu'on a nommé ci-deſſus de perpétuelle apparition, il s'enſuit que ces cercles ſont également inclinés à l'Equateur, & que par conſéquent l'angle *anT* compris entre l'Equateur & le cercle *MaN*, eſt égal à l'angle *FQd*, que forme l'Equateur avec l'Horiſon. Mais ſi l'on tire par le zénit *Z* & le point *a* un cercle vertical *ZYa*, qui coupe l'Horiſon en *Y* & l'Equateur en *T*, il doit arriver que dans les Triangles ſphériques *anT*, *TQY*, les angles en *a* & *Y* ſeront droits, & partant égaux entr'eux. De plus on a fait voir que les angles ſont égaux en *Q* & *n*; d'ailleurs ils ſont égaux en *T*, étant oppoſés au ſommet. Ainſi les deux triangles *anT* & *TQY*, qui ont des angles égaux, ou qui ſont équiangles, ont auſſi leurs côtés égaux; & par conſéquent *Ta* ſera égal à *TY*, c'eſt-à-dire, à la moitié de l'arc *aY*, qui eſt la diſtance

compriſe entre l'Horiſon & le cercle qui termine les crépuſcules. De plus $a\,n$ ſera égal à $\underset{\frown}{Q}\,Y$; enfin $a\,n$ ſera égal à $\underset{\frown}{Q}\,d$ (ſuivant la Prop. 13 du 2^{d} Livre *des Sphériques de Théodoſe*) puiſque $Q\,R$ & $d\,a$ ſont paralleles: ainſi $d\,\underset{\frown}{Q}$ doit par conſéquent être égal à $\underset{\frown}{Q}\,Y$.

Maintenant dans le Triangle ſphérique $T\,\underset{\frown}{Q}\,Y$, rectangle en Y, le côté TY eſt la moitié de la diſtance entre l'Horiſon & le cercle qui termine les crépuſcules. De plus l'angle $Y\,\underset{\frown}{Q}\,T$ eſt égal à l'angle $F\,\underset{\frown}{Q}\,d$, qui eſt la même choſe que le complément de la latitude du lieu. On pourra donc connoître le côté $\underset{\frown}{Q}\,Y$, ou $\underset{\frown}{Q}\,d$ qui lui eſt égal: enſuite menant du point d ſur l'Equateur un cercle de déclinaiſon $d\,F$, on aura dans le Triangle rectangle ſphérique $d\,\underset{\frown}{Q}\,F$ le côté $\underset{\frown}{Q}\,d$ connu, comme auſſi l'angle en $\underset{\frown}{Q}$; on connoîtra donc par ce moyen l'arc $d\,F$, qui eſt la diſtance entre le parallele du plus petit crépuſcule & l'Equateur, c'eſt-à-dire, ſa déclinaiſon à l'égard de l'Equateur, qui eſt préciſément ce qu'on ſe propoſoit de découvrir.

Une ſeule analogie ſuffit, comme on le va voir, pour réſoudre le Probleme; car dans le Triangle $T\,\underset{\frown}{Q}\,Y$, ſi l'on fait * comme le rayon : eſt à la tang. de TY :: cotang. de $\underset{\frown}{Q}$: au ſin. $\underset{\frown}{Q}\,Y$, ou ce qui eſt la même choſe, au ſin. de $d\,\underset{\frown}{Q}$. Mais le ſinus de $\underset{\frown}{Q}$: au coſin. $\underset{\frown}{Q}$ :: comme le rayon : à la cotang. $\underset{\frown}{Q}$; donc en raiſon égale le rayon multiplié par le ſinus de $\underset{\frown}{Q}$: tang. $TY \times$ coſin. $\underset{\frown}{Q}$ :: comme le rayon : au ſin. $\underset{\frown}{Q}\,d$ (c'eſt-à-dire, dans le triangle rectangle $\underset{\frown}{Q}\,d\,F$) :: ſin. $\underset{\frown}{Q}$: ſin. $d\,F$ :: comme le rayon $\times$ ſin. $\underset{\frown}{Q}$: au rayon $\times$ ſin. $d\,F$. Or dans le premier & dernier rapport les antécedens étant égaux, il en doit être de même à l'égard des conſéquens. C'eſt pourquoi

* R : *tangente* T Y :: *cotangente de* Q : *ſinus* Q Y = Q *d*
ſinus Q : *coſinus* Q :: R : *cotangente de* Q
ex Æquo R × *ſinus* Q : *tangente* T Y × *coſinus* Q :: R : Q *d* (*ſinus* Q : *ſinus d* F)
(:: R × *ſinus* Q : R × *ſinus d* F)
Donc *la tangente* T Y × *coſinus* Q = R × *ſinus d* F
D'où l'on tire R : *tangente* T Y :: *coſinus* Q : *ſinus d* F.

ſi

si l'on réduit l'équation en analogie, on aura comme le rayon est à la tangente de TY, ainsi le cosinus de Q (qui est le sinus de la latitude du lieu) est au sinus de dF, qui sera la distance du parallele que l'on cherche, à l'égard de l'Equateur.

Maniere de déterminer l'heure du commencement ou de la fin des crépuscules.

Lorsqu'on connoît une fois la déclinaison du Soleil, voici de quelle maniere on peut calculer l'instant auquel commence ou finit le crépuscule. Soit op le parallele à l'Equateur que paroît alors décrire le Soleil & qui rencontre en p le cercle qui termine les crépuscules : ayant mené par le pole P le cercle horaire ou de déclinaison Pp, dans le Triangle sphérique PZp, on connoît les trois côtés, sçavoir PZ qui est le complément de la latitude du lieu, Pp complément de la déclinaison du Soleil, & Zp, qui vaut un Quart-de-Cercle plus la distance de l'Horison au cercle qui termine les crépuscules $= Zl + lp$: on pourra donc connoître par la Trigonométrie l'angle ZPp & partant son complément à deux droits pPV, qui étant réduit en heures & minutes de l'Equateur fera connoître le tems du commencement ou de la fin du crépuscule.

La puissance réfractive de l'atmosphere.

L'Atmosphere de la Terre ne produit pas seulement le crépuscule du matin & du soir, soit en réfléchissant, soit en détournant un peu les rayons du Soleil : il arrive encore que ces rayons se brisent sensiblement, en sorte que le lieu apparent du Soleil ou des Etoiles devient par là presque toujours différent du véritable : ainsi il a été nécessaire de reconnoître les Réfractions, causées par notre atmosphere aux rayons de tous les Astres, lorsqu'ils viennent à y entrer plus ou moins obliquement ; c'est-à-dire, en changeant leurs directions, & les déterminant à suivre différentes lignes droites ou courbes diversement inclinées.

En effet, une infinité d'expériences nous apprennent que les rayons d'un corps lumineux, ou même de tout objet visible, venant à tomber sur un milieu diaphane,

plus ou moins denſe que celui qu'ils viennent de traverſer ; ces mêmes rayons, dis-je, ne continuent plus à ſe mouvoir en ligne droite, mais ſe détournent ou ſe briſent en effet pour ſuivre enſuite toute autre direction. Si donc les rayons tombent ſur un milieu plus denſe que celui qu'ils viennent de traverſer, alors la réfraction qu'ils ſouffrent doit les approcher de la ligne perpendiculaire abbaiſſée au-deſſous du lieu de la ſuperficie du milieu où ſe fait le point d'incidence. Mais au contraire ſi ces rayons viennent à tomber ſur un milieu diaphane plus rare, en ce cas ils doivent ſe rompre & s'écarter de la ligne droite perpendiculaire à la ſuperficie de ce nouveau milieu.

Divers effets de la réfraction.

On apperçoit facilement dans la nature pluſieurs effets de la réfraction. Un bâton, par exemple, dont une partie eſt dans l'air & l'autre dans l'eau, y paroît briſé, ou plus élevé qu'il n'eſt en effet. Les vapeurs qui s'élevent de la mer ou même de la ſurface de la Terre ſuffiſent pour nous faire appercevoir quelquefois des objets fort éloignés : il en eſt de même des objets ſitués dans certains fonds au-delà d'une riviere, qui tantôt paroiſſent & tantôt ſe dérobent à nos yeux. On peut dire la même choſe de tous les Aſtres en général, que nous voyons plus élevés, c'eſt-à-dire, plus près du Méridien qu'ils ne paroîtroient, ſi leurs rayons ne ſouffroient point de réfractions.

La réfraction des Aſtres. PLANCHE VII *Fig.* 14.

Suppoſons que ZV ſoit de 90° ou le quart d'un cercle vertical, lequel a pour centre celui de la Terre T, & que le ſecond cercle correſpondant, immédiatement au-deſſous, ſoit auſſi le quart d'un grand cercle de la Terre AB. Enfin ſoit GH le quart d'un cercle vertical ayant même centre & dans le même plan, mais qu'il faut imaginer à la hauteur de l'atmoſphere. Si en S eſt un Aſtre, d'où émanent les rayons de lumiere, tel que SE, lequel ſoit continué juſqu'à la ſuperficie extérieure de l'atmoſphere en E,

comme ce rayon après avoir traverſé un air très-ſubtil, ou pour ainſi dire, un grand vuide, vient à pénétrer ou à tomber dans notre atmoſphere, qui eſt un milieu bien plus denſe; ce rayon ſouffrira donc une réfraction dès le point *E*, & s'approchera par conſéquent de la perpendiculaire *TE* *: mais comme l'air ſupérieur eſt plus rare que l'inférieur, & que par conſéquent la denſité du milieu par où doit paſſer le rayon de lumiere va toujours en augmentant; il s'enſuit qu'à meſure que ce rayon s'avancera dans l'air, il doit ſe courber de plus en plus, de maniere que s'il parvient à notre œil, ce ne ſera plus en ligne droite, mais ſelon une ligne courbe *EA*.

* *Puiſque ce même rayon* TE *eſt néceſſairement perpendiculaire à la petite tangente ou ſurface de l'athmoſphere en* E.

Imaginons préſentement une ligne droite *AF* qui touche la courbe en *A*, alors le rayon *EA* doit paroître entrer dans l'œil ſelon la direction de cette ligne droite; car comme l'objet ſe voit toujours directement, il eſt évident qu'on jugera que c'eſt ſuivant la ligne droite ou la tangente *AF* que ſe fait la direction des rayons qui frappent l'organe de notre vue; c'eſt-à-dire, que l'objet nous ſemblera au point *Q*, qui eſt un point du Ciel plus proche du zénit que celui que l'Aſtre occupe réellement. De cette maniere il doit donc arriver qu'un Aſtre paroîtra ſur l'Horiſon, quoiqu'il ſoit véritablement encore au-deſſous.

Par le moyen des réfractions on apperçoit une Eclipſe de Lune, lorſque la Lune eſt encore ſous l'horiſon.

De là vient que lorſque le Soleil & la Lune ſont oppoſés diamétralement, & que l'un & l'autre ſont un peu au-deſſous de l'Horiſon, la réfraction les fait néantmoins paroître au-deſſus. C'eſt auſſi par la réfraction qu'on voit une Eclipſe de Lune, quoique la Lune ſoit ſous l'Horiſon, & le Soleil au-deſſus, comme cela a été quelquefois obſervé.

Il n'y a plus de réfractions au zénit.

Quant un Aſtre eſt au zénit il n'a aucune réfraction; car le rayon tombe en ce cas perpendiculairement, & partant continue ſa route ſans ſe courber. Mais plus le

La plus grande réfraction se fait à l'Horiſon.

La réfraction eſt encore d'environ une minute à 45° de hauteur.

Les Aſtres qui ſont à hauteurs égales, ont des réfractions égales.

rayon tombe obliquement dans l'air, plus ſa réfraction devient grande, en ſorte que la plus grande de toutes les réfractions ſe fait à l'Horiſon. Lorſqu'une Etoile eſt élevée de 45 à 50° au-deſſus de l'Horiſon, ſa réfraction n'eſt plus ſi ſenſible. Dans les diſtances du Méridien qui ſont égales, les réfractions ſont les mêmes; & par conſéquent les réfractions du Soleil, de la Lune & de toutes les Etoiles fixes ſont égales; ce que l'on prouve facilement contre l'opinion du célebre Tycho-Brahé, le Reſtaurateur de l'Aſtronomie, & qui a publié les premieres Tables des réfractions. C'eſt pourquoi ſi on découvre les réfractions des Etoiles fixes, on aura auſſi celles du Soleil, de la Lune, & de toutes les Planetes. Or il eſt plus aiſé d'obſerver la réfraction d'une Etoile fixe, que celle du Soleil & de la Lune. Car comme on ne connoît pas aſſez exactement la parallaxe de ces deux Planetes, cela eſt cauſe qu'on ne ſçauroit bien déterminer leurs réfractions, d'autant qu'on n'eſt jamais certain de la différence qui doit être attribuée à la parallaxe, & de celle qui dépend de la réfraction. Mais les Etoiles fixes n'ayant aucune parallaxe, toute la différence entre le lieu vu & le lieu vrai doit dépendre entierement de la réfraction.

On peut connoître aſſez exactement les déclinaiſons, les aſcenſions droites, les longitudes & les latitudes des Etoiles fixes, qui ſont élevées de plus de cinquante degrés au-deſſus de l'Horiſon; car dans une ſi grande hauteur leurs réfractions ne ſont preſque rien. Quand on connoît bien ces élemens, voici comme on trouve les réfractions auprès de l'Horiſon.

Maniere de trouver la réfraction d'une Etoile.

PLANCHE VII *Fig.* 15.

Soit $OPZH$ le Méridien, HO l'Horiſon, $\mathcal{E}Q$ l'Equateur, P le Pole, Z le Zénit, A l'Etoile dont on veut trouver la réfraction, ZD le vertical qui paſſe par l'Etoile, C le lieu où l'on voit l'Etoile; & l'arc AC la réfraction. Si l'on obſerve donc la diſtance où l'Etoile eſt du

zénit, sçavoir l'arc ZC, & qu'on sçache aussi, soit par la hauteur connue d'une autre Etoile qui ne souffre point de réfraction, soit par une Pendule bien réglée, le moment précis de l'observation; si l'on connoît d'ailleurs l'ascension droite du Soleil, on aura le point de l'Equateur, qui dans le même moment est au Méridien, sçavoir le point $Æ$. Mais comme on sait aussi l'ascension droite de l'Etoile, & par conséquent le point de l'Equateur B (où le cercle de déclinaison PAB, qui passe par l'Etoile, rencontre l'Equateur) on aura nécessairement l'arc de l'Equateur $ÆB$, qui est la mesure de l'angle ZPA. Ainsi dans le Triangle sphérique ZPA, connoissant ZP, qui est la distance du Pole au Zénit, & PA qui est le complément de la déclinaison de l'Etoile, comme aussi l'angle ZPA, on trouvera par la Trigonométrie sphérique le côté ZA, c'est-à-dire, la véritable distance de l'Etoile au Zénit. Or si de cette distance l'on ôte ZC, qui est la distance au Zénit déterminée par observation, on aura l'arc AC, qui est la réfraction de l'Etoile, & c'est ce qu'il falloit trouver.

On peut encore trouver la réfraction d'une Etoile, si on observe son azimut, c'est-à-dire, l'arc de l'Horison compris entre le Méridien & le vertical qui passe par l'Etoile, sçavoir DO; car cet arc est la mesure de l'angle PZA, lequel étant donné, comme aussi les côtés PZ, PA, on trouvera ZA, c'est-à-dire, la véritable distance de l'Etoile au Zénit. Enfin si de cette distance on ôte celle qui a été observée, sçavoir ZC, il restera CA, qui est la réfraction que l'on cherche.

Maniere de trouver l'azimut d'un Astre. PLANCHE VII *Fig.* 16.

Voici la maniere de connoître exactement par observation l'azimut de quelque Etoile que ce soit. On tirera sur le plan de l'Horison une ligne méridienne AE, au-dessus de laquelle on suspendra un fil perpendiculaire CA, ce qui se pratique en y attachant un poids. On sus-

pendra ensuite un autre fil *B D*, en y attachant de même un poids. Ces deux fils doivent être placés de maniere que l'Etoile puisse s'y rencontrer au moment de la hauteur ou de la distance au zenit qu'on aura observée avec le quart-de-cercle. Après cela on marquera le point *B*, où le fil *B D* rencontre le plan de l'Horison, & dans la ligne méridienne le point *A*, sur lequel vient tomber le fil *C A*. Ensuite ayant pris sur la méridienne tel point que l'on voudra, comme *E*, on tirera les lignes *A B*, *B E*: & ayant divisé une regle en parties égales assez petites, il faudra mesurer les trois côtés du triangle *B A E*. Ayant ces trois côtés, on cherchera par la Trigonométrie l'angle *B A E*, & de cette maniere on connoîtra l'azimut de l'Astre, qui est ce qu'il falloit trouver. Quand on voit l'horison, il faut se servir d'un instrument plus précis destiné à cet usage, & dont on a publié depuis peu la description. *Fig.* 17.

Par le moyen de la réfraction, on peut expliquer pourquoi le Soleil & la Lune étant vus près de l'Horison, ont une figure ovale. Cela vient de ce que la réfraction éleve beaucoup plus leur bord inférieur, qu'elle n'éleve le supérieur, en sorte que le limbe supérieur & inférieur semblent se rapprocher l'un de l'autre & font paroître le corps de ces Planetes plus étroit perpendiculairement qu'il n'est en effet. Mais comme la réfraction éleve également ceux qui touchent les verticaux, leur distance ne varie point, & le diametre horisontal ne doit point se rétrécir.

Les rayons du Soleil étant près de l'Horison, font bien plus de chemin dans notre atmosphere que vers le Zénit. PLANCHE VII *Fig.* 17.

Lorsque le Soleil est à l'Horison, les rayons de cet Astre font beaucoup plus de chemin dans l'air, que lorsqu'il est près du Méridien. Soit, par exemple, *ABD* la Terre, & *E C F* l'atmosphere terrestre, dont la hauteur est ordinairement estimée de 18 lieues. Soit *C A* le rayon horisontal, *E A* le rayon vertical, il est certain que *C A* est plus long que *E A*: or voici comment on peut en rendre raison. Supposons, en nombres ronds, que le demi-diametre

de la Terre AT soit de 1400 lieues, & EA d'environ 20 lieues : ET & CT seront chacun de 1420 lieues, dont le quarré sera égal aux quarrés TA & CA, & par conséquent si du quarré de CT on ôte le quarré de AT, il restera le quarré CA, c'est-à-dire, si de 2016400 on ôte 1960000, il restera 56400 pour le quarré de la ligne CA, dont la racine est $237\frac{1}{2}$. Ainsi CA est à EA, comme $237\frac{1}{2}$ est à 20, c'est-à-dire, à très-peu de chose près, comme 12 à 1.

On explique ici pourquoi la lumiere du Soleil est moins vive à son lever ou à son coucher, qu'à l'heure de son passage au Méridien.

Cela fait voir pourquoi on peut regarder le Soleil levant ou le Soleil couchant, sans que les yeux en soient blessés, au lieu qu'on ne sçauroit le regarder ainsi quand il est au Méridien ; car lorsque le Soleil est à l'Horison, ses rayons traversant un fluide aussi grossier que l'atmosphere, rencontrent une infinité de particules qui voltigent dans l'air, qui les détournent ou les réfléchissent, ce qui affoiblit d'autant le Soleil à l'horison. Mais puisque le Soleil s'affoiblit si fort, en traversant un espace aussi petit qu'est celui de l'atmosphere, il s'ensuit évidemment de là, que si notre atmosphere s'étendoit jusqu'à la Lune, en conservant toujours la même densité, on ne pourroit aucunement voir le Soleil, & encore moins la Lune ou les Etoiles.

Quoique la réfraction n'ait point été employée par les Anciens dans le calcul des Observations astronomiques, il paroît cependant qu'on n'en ignoroit point la cause dès le XI. siécle *. Mais le premier qui en a publié quelques Observations a été Bernard Walterus de Nuremberg, &

* Voyez ce qui a été écrit à ce sujet dans l'Optique de Al Hayfen Auteur Arabe, qui a composé aussi un Traité sur les crépuscules. Vitellion écrivit ensuite sur le même sujet, & cependant ni lui ni Copernic ou plutôt Walterus qui a observé la réfraction, n'ont pas jugé à propos d'en tenir compte dans les Observations astronomiques, soit parce qu'ils n'ont pu parvenir à en découvrir la juste quantité, soit parce qu'elle n'étoit pas même encore assez connue vers l'Horison. Tycho-Brahé y réussit enfin, mais quoiqu'il eût bien déterminé les réfractions horisontales, il a été néantmoins obligé de supposer qu'elles cessoient entierement au quarante-cinquieme degré de hauteur.

néantmoins ni lui ni ſes Succeſſeurs n'en ont fait aucun uſage pour corriger les Hauteurs méridiennes. En 1583 Tycho-Brahé reconnut enfin non ſeulement qu'elle ſurpaſſoit 30′ vers l'Horiſon, mais encore l'erreur qu'une plus petite réfraction vers 10 à 12 degrés de hauteur, devoit produire dans l'obliquité de l'Ecliptique, lorſqu'on obſervoit le Soleil à Midi au ſolſtice d'hiver. Enſuite les Expériences qui ont donné lieu à la fameuſe regle de Snellius, beaucoup mieux expliquée par Deſcartes, ayant fait connoître que les angles d'incidence étoient aux angles de réfractions dans un rapport conſtant *, feu M. Caſſini entreprit de s'aſſurer s'il y avoit encore quelque réfraction au 45e degré de hauteur, ce qu'il nous aſſure avoir découvert prémierement avec un Gnomon de 80 pieds de hauteur, enſuite par d'autres Obſervations faites avec des Quarts de cercles & Sextans garnis de lunettes. Car il faut ſçavoir qu'après l'appareil extraordinaire & les ſommes preſqu'immenſes que Tycho avoit employées à conſtruire les inſtrumens les plus parfaits, il n'auroit gueres été poſſible ſans la regle dont nous venons de parler, ou ſans la découverte qui ſe fit bientôt après des lunettes qu'on appliqua aux Quarts-de-Cercles, de parvenir à s'aſſurer s'il y avoit effectivement environ 1′ de réfraction à la hauteur du Pole d'Uranibourg. Auſſi ne doit-on pas être ſurpris ſi la Table de M. Caſſini ne fut pas d'abord adoptée. Mais au retour d'un voyage fait en Cayenne par Richer en 1672 la réfraction d'une minute à la hauteur du Pole fut généralement reconnue, & après quelques légeres corrections, M. Caſſini a publié la Table dont on ſe ſert encore aujourd'hui : cette Table eſt aſſez conforme aux moindres réfractions d'Hiver. Dans ce tems-là M. Picard s'apperçut auſſi en obſervant d'abord le Soleil

* Cette regle n'a gueres lieu à l'égard de notre atmoſphere qu'à plus de 20 degrés au-deſſus de l'Horiſon. *Voyez les Tables de MM. Newton, Caſſini, &c.*

leil à Paris, enſuite au cap de Sette que les réfractions horiſontales étoient variables ou inconſtantes : on remarqua de plus que les Obſervations faites en l'Iſle de Cayenne preſque au milieu de la Zone torride, donnoient de plus petites réfractions qu'en France proche l'Horiſon ; car on les y a ſoupçonnées les deux tiers, & un peu plus de celles de notre climat. Ces deux dernieres découvertes n'ont point été reçues juſqu'en ces derniers tems, ſoit qu'on les ait négligées ou autrement ; juſqu'à ce que la même matiere ayant été traitée avec plus de ſoin pendant les deux voyages faits au Nord & au Perou, les réfractions ont été conſtatées par des Obſervations déciſives, plus petites pendant l'Eté, comme on peut s'en convaincre par ce qui eſt rapporté dans le Volume de l'Acad. de l'année 1739. & dans l'Hiſtoire céleſte, &c. La Table de M. Bouguer que l'on donne ici, a été conſtruite pour le niveau de la mer dans la zone torride, l'Auteur ayant d'ailleurs le premier découvert qu'à Quito qui eſt élevé de 1400 toiſes, les réfractions étoient ſenſiblement plus petites.

TABLE DES REFRACTIONS,

Conſtruite ſur les Obſervations faites au niveau de la Mer dans la Zone Torride.

Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.
D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.
0	27. 00	12	3. 31	24	1. 41	36	1. 02	48	0. 40	60	0. 26	72	0. 15		
1	20. 31	13	3. 14	25	1. 36	37	1. 00	49	0. 39	61	0. 25	73	0. 14		
2	15. 53	14	2. 58	26	1. 31	38	0. 58	50	0. 38	62	0. 24	74	0. 13		
3	12. 25	15	2. 48	27	1. 27	39	0. 55	51	0. 36	63	0. 23	75	0. 12		
4	10. 05	16	2. 36	28	1. 24	40	0. 53	52	0. 35	64	0. 22	76	0. 12		
5	08. 18	17	2. 26	29	1. 20	41	0. 51	53	0. 33	65	0. 21	77	0. 11		
6	07. 04	18	2. 17	30	1. 17	42	0. 49	54	0. 32	66	0. 20	78	0. 10		
7	06. 05	19	2. 10	31	1. 14	43	0. 48	55	0. 31	67	0. 19	79	0. 09		
8	05. 21	20	2. 03	32	1. 10	44	0. 46	56	0. 30	68	0. 18	80	0. 08		
9	04. 50	22	1. 57	33	1. 08	45	0. 44	57	0. 29	69	0. 18	90	0. 00		
10	04. 20	22	1. 51	34	1. 06	46	0. 42	58	0. 28	70	0. 17				
11	03. 54	23	1. 45	35	1. 04	47	0. 41	59	0. 27	71	0. 16				
12	03. 31	24	1. 41	36	1. 02	48	0. 40	60	0. 26	72	0. 15				

En France la Réfraction a été observée à la hauteur de $3° 46 \frac{1}{2}$ de .... 12′. 00″.

Par des Observations réitérées plusieurs années pendant l'Eté { $4\ 42\ \frac{2}{5}$ ..... 09. 47 $\frac{1}{2}$. / $7\ 52\ \frac{1}{2}$ 06. 25

10. 00..... 05. 05.

Mais dans les plus grandes chaleurs la Réfraction a paru à la hauteur de 4° 42′ de 9′ 20″. Au lieu que dans les plus grands froids une même Etoile observée au Méridien sous le pole, à la hauteur de 4° 44′ $\frac{1}{4}$, a donné pour la quantité de la Réfraction 11′ 15″.

Or puisque la Table de M. Newton paroît assez conforme aux Réfractions observées pendant les plus grandes chaleurs de l'Eté, il est d'autant plus convenable de la rapporter ici, qu'en la comparant à celle que M. Bouguer a construite pour la Zone Torride, on peut appercevoir tout d'un coup les différences des réfractions qui conviennent aux deux climats, & cela à chaque degré de hauteur.

TABLE

DES REFRACTIONS DE M. NEWTON,

Qui paroît conforme à nos plus grandes chaleurs d'Eté.

Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfraction.	Haut. App.	Réfractions.	Haut. App.	Réfractions.
D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.	D.	M. S.
0. 00	33. 45	6.00	7. 45	14	3. 31	26	1. 49	38	1. 08	50	0. 45	62	0. 28
0. 30	27. 35	6.30	7. 14	15	3. 17	27	1. 44	39	1. 06	51	0. 44	63	0. 27
1 00	23. 07	7.00	6. 47	16	3. 04	28	1. 40	40	1. 04	52	0. 42	64	0. 26
1. 30	19. 46	7.30	6. 22	17	2. 53	29	1. 36	41	1. 02	53	0. 40	65	0. 25
2. 00	17. 08	8.00	6. 00	18	2. 43	30	1. 32	42	1. 00	54	0. 39	66	0. 24
2. 30	15. 02	8.30	5. 40	19	2. 34	31	1. 28	43	0. 58	55	0. 38	67	0. 23
3. 00	13. 20	9.00	5. 22	20	2. 26	32	1. 25	44	0. 56	56	0. 36	68	0. 22
3. 30	11. 57	9.30	5. 06	21	2. 18	33	1. 22	45	0. 54	57	0. 35	69	0. 21
4. 00	10. 48	10.00	4. 52	22	2. 11	34	1. 19	46	0. 52	58	0. 34	70	0. 20
4. 30	09. 50	11.00	4. 27	23	2. 05	35	1. 16	47	0. 50	59	0. 32	75	0. 15
5. 00	09. 02	12.00	4. 05	24	1. 59	36	1. 13	48	0. 48	60	0. 31	80	0. 09
5. 30	08. 21	13.00	3. 47	25	1. 54	37	1. 11	49	0. 47	61	0. 30	90	0. 00

CHAPITRE VINGT-DEUXIEME.

Où l'on traite des Parallaxes.

COMME les mouvemens diurnes apparens tant des Planetes que des autres Aſtres ſe font autour de l'axe de la Terre, & non pas autour de l'œil de l'Obſervateur qui eſt à la ſurface, il eſt donc néceſſaire de reconnoître une inégalité dans la viteſſe apparente des corps céleſtes, puiſque nous ne ſommes plus au centre de leur mouvement. Car il eſt évident que ſi un mobile quelconque parcourt uniformément la circonférence d'un cercle, il ne ſçauroit y avoir d'autres points que le centre ou dans l'axe de ce même cercle, d'où l'on puiſſe obſerver ſon mouvement égal & uniforme: il en eſt de même de tous les Aſtres que nous obſervons dans les cieux; leurs lieux apparens, tels que nous les appercevons de la ſurface, doivent différer de leurs lieux véritables, c'eſt-à-dire, de ceux que l'on obſerveroit du centre de la Terre. Or c'eſt cette différence entre le lieu vrai & le lieu vu qu'on nomme la Parallaxe.

Le mouvement vu d'un corps qui décrit uniformement un cercle, ne ſauroit paroître égal ni conſtant, ſi l'œil n'eſt pas au centre ou dans l'axe du cercle.

Soit AB le quart de la circonférence d'un grand cercle tracé ſur la ſurface de la Terre, dont T eſt le centre: ſoit auſſi en A le lieu de l'Obſervateur à la ſurface, & dont le zénit doit répondre au point V du Ciel étoilé: ayant mené le grand cercle de la Sphere VNH, on tirera la ligne AD qui repréſentera l'Horiſon ſenſible. Suppoſons préſentement un Aſtre en C, c'eſt-à-dire, dont la diſtance au centre de la Terre ſoit TC, il eſt évident que ſi l'on obſervoit cet Aſtre du centre de la Terre, ſon vrai lieu paroîtroit au point E du Ciel étoilé; en ſorte que l'arc

La Parallaxe, ce que c'eſt. PLANCHE VII *Fig.* 19.

DE mesureroit sa hauteur au-dessus de l'Horison : ce point *E* est donc le lieu vrai de l'Astre. Mais si du point *A* de la surface l'on observe aussi le même Astre, comme il paroîtra au point *D* de l'Horison, le point *D* étant son lieu apparent, la différence *DE* entre le lieu vrai & le lieu vu ou apparent de l'Astre, sera ce qu'on nomme *la Parallaxe.*

Si l'Astre se trouve plus élevé sur l'Horison comme en *M*, le point *P* sera son vrai lieu, c'est-à-dire, son lieu tel qu'il paroîtroit vu du centre de la Terre : mais le point *N* sera son lieu apparent ou vu par l'Observateur placé en *A* sur la surface, & l'arc *PN* sera sa parallaxe, laquelle est d'ailleurs bien moindre que l'arc *DE* ; d'où l'on voit que la parallaxe d'un Astre à l'Horison est la plus grande de toutes, & que plus cet Astre s'élevera sur l'Horison plus elle doit diminuer, jusqu'à s'anéantir totalement lorsque cet Astre parviendra au Zénit. En effet l'Astre étant supposé en *Q*, on doit l'appercevoir, tant du point *T*, que du point *A*, dans une même ligne droite *TV*, en sorte qu'il ne sçauroit y avoir en ce cas aucune différence entre le lieu véritable & le lieu vu ou apparent. Au reste plus un Astre sera éloigné de la Terre, moins sa parallaxe deviendra sensible : ainsi la parallaxe *GD* d'un Astre *F* qui sera plus éloigné de la Terre, est plus petite que la parallaxe de l'Astre *C* qui en est plus proche. On voit par là que la parallaxe est encore la différence entre la vraie distance d'un Astre au Zénit vu du centre de la Terre & sa distance apparente au Zénit vu de la surface ; car la vraie distance au Zénit d'un Astre *M* est mesurée par l'arc *VP*, mais sa distance apparente vue du point *A* est mesurée par l'arc *VN*.

Plus un astre est éloigné de la terre, moins sa parallaxe devient sensible.

Or ces distances sont mesurées par les angles *VTM*, *VAM* compris entre la droite *TV* tirée au Zénit, & les lignes *TM*, *AM* tirées tant du centre que de la surface

de la terre à l'aſtre M, & la différence de ces deux angles eſt l'angle TMA. Car l'angle extérieur VAM étant égal aux deux intérieurs pris enſemble ATM, TMA, il s'enſuit que TMA eſt préciſément la différence des angles VAM & VTM, & que par conſéquent il meſurera l'angle de la parallaxe, puiſqu'il eſt la parallaxe même de l'aſtre ſitué en M. En général on peut dire que cet angle eſt toujours celui ſous lequel on doit appercevoir de l'aſtre, le rayon de la terre qui eſt tiré au point de la ſurface qu'occupe l'Obſervateur; enſorte que quand ce demi-diametre ſera vu directement, c'eſt alors que la parallaxe ſera la plus grande. Ainſi la plus grande parallaxe d'un aſtre doit s'obſerver lorſqu'il paroît à l'horiſon, les autres parallaxes du même aſtre diminuant à meſure qu'il monte ſur l'horiſon, & cela dans un rapport conſtant, comme on le prouve par le Théoreme ſuivant.

La parallaxe eſt toujours l'angle ſous lequel on doit appercevoir de l'aſtre, le demi-diametre de la terre tiré au lieu qu'occupe l'Obſervateur à la ſurface.

THEOREME.

Le Sinus de la parallaxe d'un aſtre eſt toujours au Sinus de ſa diſtance apparente au Zenit en raiſon conſtante, c'eſt-à-dire, dans la raiſon du demi-diametre terreſtre, à la diſtance de l'aſtre au centre de la terre.

La démonſtration eſt fondée ſur ce Théoreme ſi connu dans la Trigonométrie, où l'on prouve que dans le triangle ATM, le Sinus de l'angle AMT, eſt au Sinus de l'angle TAM ou VAM, comme AT eſt à TM, c'eſt-à-dire, dans la raiſon conſtante du demi-diametre de la terre, à la diſtance de l'aſtre.

Or il ſuit de-là que le Sinus de la parallaxe d'un aſtre en C eſt au Sinus de la parallaxe en M, comme le Sinus de l'angle VAC eſt au Sinus de l'angle VAM; c'eſt pourquoi ſi l'on connoît une fois la parallaxe à une diſtance donnée quelconque du Zenit, ſa parallaxe ſera par

Les parallaxes diminuent dans le rapport des Sinus de la diſtance apparente de l'aſtre au Zénit.

conſéquent déterminée pour telle autre diſtance que ce ſoit de l'aſtre à l'égard du Zénit.

On peut remarquer ici que ſi la diſtance d'un corps céleſte à la terre ſurpaſſe 15000 demi-diametres terreſtres, en ce cas ſa parallaxe deviendra tout-à-fait inſenſible. Car comme dans cette ſuppoſition TF ſeroit à TA comme 15000 eſt à 1, c'eſt-à-dire, comme le rayon ou le ſinus total eſt au ſinus de l'angle TFA, l'angle de la parallaxe ſeroit par conſéquent d'environ $12''\frac{1}{2}$, ce qui eſt un ſi petit angle, qu'il n'eſt pas étonnant de le voir échapper aux recherches des plus habiles Obſervateurs.

Si la diſtance d'un aſtre au centre de la terre eſt connue, il eſt évident qu'on ne doit plus ignorer ſa parallaxe, puiſque dans le triangle TAC rectangle en A, étant donné le $\frac{1}{2}$ diametre TA de la terre, comme auſſi la diſtance TC, on pourra trouver par la Trigonométrie l'angle ACT, qui ſera la parallaxe horiſontale de l'aſtre. Et réciproquement ſi la parallaxe d'un aſtre eſt une fois connue, on déterminera facilement par le calcul Trigonométrique, ſa diſtance au centre de la terre, puiſque dans le même triangle que ci-deſſus, étant donnés le coté AT, & l'angle ACT, on en pourra déduire la diſtance TC.

Quand un aſtre n'a point de mouvement propre ni de parallaxe, ſa vraie diſtance à une Etoile, laquelle eſt toujours meſurée par l'arc d'un grand cercle de la ſphere, doit toujours paroître la même, c'eſt-à-dire; conſtante & immuable, à quelque degré d'élevation que ce ſoit de l'aſtre ſur notre horiſon. Mais ſi la parallaxe eſt ſenſible, il eſt évident qu'à différens points du ciel ſa diſtance apparente à l'Etoile nous paroîtra changer continuellement; enſorte que ſi l'on voit d'abord à l'Orient l'Etoile dans un même cercle vertical que l'aſtre & un peu plus haute, leur diſtance doit enſuite diminuer à meſure que l'un & l'autre viendra à s'élever: mais au contraire elle doit augmenter ſi l'Etoile

La Parallaxe fait varier à chaque inſtant la diſtance d'un aſtre aux Etoiles fixes qui l'environnent.

eſt plus baſſe, quoique dans l'un & l'autre cas on doive appercevoir du centre de la terre la même diſtance apparente de l'aſtre à l'Etoile, & cela en quelque lieu du ciel que ce puiſſe être. Ainſi les différentes diſtances de l'aſtre à l'Etoile que l'on obſerve de la ſurface de la terre, ne ſont point réelles, mais apparentes.

Suppoſons qu'au moment que l'aſtre *C* eſt à l'horiſon, on l'apperçoive du centre *T* de la terre, en conjonction avec l'Etoile *E*, le même aſtre obſervé du point *A* de la ſurface, paroîtra dans la même ligne droite, ou en conjonction avec une autre Etoile *D*, de maniere que ſa diſtance apparente à l'Etoile *E*, ſera meſurée par l'arc *D E*. Enſuite l'aſtre venant à s'élever ſur l'horiſon comme en *M*, on l'obſerveroit encore du centre de la terre en conjonction avec l'Etoile *E*, laquelle occupe pour lors le point *P*; & cependant du point *A* de la ſurface on verra l'aſtre au point *N*, c'eſt-à-dire, bien moins éloigné de la premiere Etoile que lorſqu'on l'obſervoit à l'horiſon. C'eſt pourquoi le même aſtre ne paroîtra plus en conjonction avec la ſeconde Etoile *D*, mais il en ſera écarté de tout l'arc *N d*, puiſqu'on a toujours *P d* égal à *E D*. On doit donc inférer de tout ce que nous venons de dire, que ſi un aſtre quelconque paroît occuper conſtamment à quelque degré de hauteur que ce ſoit ſur l'horiſon, la même diſtance parmi les Etoiles fixes, enſorte que les arcs de diſtance à chaque Etoile ſoient toujours les mêmes, on peut être aſſuré par-là que cet aſtre n'a aucune parallaxe ſenſible. Il y a plus, ſi ſa diſtance aux Etoiles varie en effet, mais ſi l'on n'y apperçoit d'autre variation que celle qui convient à ſon mouvement propre, on peut dire de même que cet aſtre ne ſçauroit avoir de parallaxe ſenſible. Enfin ſi l'aſtre paroît s'approcher ou s'éloigner plus ou moins de quelque Etoile, qu'on ne le doit ſuppoſer ayant égard à ſon mouvement propre, la différence qui en réſulte ſera l'effet de ſa parallaxe.

Différentes especes de Parallaxes.

Quoique nous n'ayons gueres considéré jusqu'ici que la parallaxe d'un astre dans un cercle vertical, cependant comme il en résulte un changement sensible relativement aux autres cercles de la sphere, il en faut conclurre que ses longitudes, latitudes, ascensions droites, & déclinaisons apparentes, paroîtront un peu différentes de la véritable, c'est-à-dire, de celle qu'on observeroit du centre de la terre; ainsi nous allons exposer les quatre especes de parallaxes qui sont principalement en usage parmi les astronomes.

PLANCHE VII *Fig.* 20.

Soit l'horison HO dont le pole est en V, soit aussi EQ l'écliptique & son pole en P, il faut imaginer un cercle vertical VA qui passe par l'astre dont le vrai lieu est en C. Si le lieu apparent du même astre est au point D, c'est-à-dire, toujours dans le même vertical, mais un peu plus éloigné du Zénit, il est évident que l'arc DC sera la parallaxe de hauteur. Tirant donc par le pole P de l'Ecliptique, & par le vrai lieu de l'Etoile, un cercle secondaire ou de latitude PCG, le point G sera le lieu de l'astre réduit à l'écliptique, ensorte que le point G ainsi déterminé, désignera sa vraie longitude; mais si l'on fait encore passer par le lieu vu D de l'astre, un cercle de latitude PDH qui rencontre l'écliptique au point H, ce dernier point sera le lieu vu de l'astre réduit à l'écliptique; de maniere que l'arc de l'écliptique GH, compris entre les deux cercles de latitude qui passent & par le lieu vrai de l'astre, & par son lieu vu ou apparent, sera ce qu'on nomme la *Parallaxe en longitude*. Enfin la vraie latitude de l'astre, qui est en C, étant mesurée par CG, & la latitude apparente du même astre, vu en D, étant mesurée par DH, la différence CN de ces deux arcs, sera sa *Parallaxe en latitude*.

La parallaxe de longitude, ce que c'est.

La parallaxe de latitude.

Il peut aussi arriver que l'astre se rencontrera dans un cercle vertical qui coupe l'écliptique au 90e degré depuis l'Orient, c'est-à-dire, que le cercle vertical sera perpendiculaire

perpendiculaire à l'écliptique, comme cela se voit au point e du cercle *VE*: or en ce cas l'astre n'aura aucune parallaxe en longitude, puisque le cercle *VE* coupant l'écliptique à angles droits, doit nécessairement passer par ses poles, & qu'ainsi il n'y a qu'un seul & unique cercle de latitude à imaginer pour réduire & le lieu vu, & le vrai lieu de l'astre, au même point de l'écliptique. Car ces deux points doivent se confondre, de même que la parallaxe de latitude ne doit plus différer de la parallaxe de hauteur.

On distingue aussi les Arcs ou parties de l'écliptique en orientales & occidentales. La partie ou le Quart oriental est celui qui est compris entre le nonantieme degré, & le point de l'écliptique qui se leve. Le Quart occidental est celui qui est compris entre le nonantieme degré, & le point de l'écliptique qui se couche: cette distinction a fourni la regle suivante; sçavoir, que lorsqu'un astre répond au Quart oriental de l'écliptique, sa longitude apparente surpasse la vraie; cela est évident, puisque l'effet de la parallaxe est d'abbaisser vers l'horison, & par conséquent vers l'Orient un astre qui se leve. Dans la Figure le point *H* désigne le lieu vu ou apparent de l'astre réduit à l'écliptique, lequel est plus oriental que le point *G*, qui répond au vrai lieu. Mais si au contraire l'astre est dans le Quart occidental de l'écliptique, sa longitude apparente sera plus petite que la vraie, parce que dans cette situation, l'effet de la parallaxe est d'abbaisser l'astre vers l'Occident.

Pour expliquer les parallaxes d'ascension droite & de déclinaison, supposons présentement que le cercle *EQ* soit l'équateur, *P* le pole, *PVH* le Méridien, *VCA* un cercle vertical qui passe par l'astre, dans lequel *C* soit son vrai lieu, *D* son lieu vu ou apparent; & soient encore *PCG*, *PDH* des cercles secondaires de l'équateur ou cercles de déclinaisons qu'on aura fait passer par le lieu vrai & le lieu vu de l'astre, & qui rencontreront l'équa-

teur en *G* & *H*. Il eſt évident que le point *G* ſera connoître la vraie aſcenſion droite de l'aſtre, & le point *H* l'aſcenſion droite apparente, & qu'ainſi la diſtance *G H* ſera la *Parallaxe d'Aſcenſion droite*. De même la vraie déclinaiſon de l'aſtre étant *CG*, & *D H* la déclinaiſon apparente, la différence *NC* ſera la *Parallaxe en déclinaiſon*. Que ſi l'aſtre eſt à l'Orient du Méridien, ſon aſcenſion droite apparente ſera plus grande que la vraie; & au contraire elle ſera plus petite ſi l'aſtre eſt à l'Occident. En un mot il n'y a plus de parallaxe d'aſcenſion droite au Méridien, parce qu'en ce cas on n'a qu'un ſeul & même cercle de déclinaiſon qui paſſe par le lieu vrai & par le lieu apparent de l'aſtre; & d'autant que le Méridien eſt un cercle vertical, la parallaxe de déclinaiſon eſt alors la même que celle de hauteur.

La parallaxe d'Aſcenſion droite.

La parallaxe de déclinaiſon.

Les Aſtronomes ont imaginé différentes méthodes pour découvrir les Parallaxes des aſtres, & par conſéquent leurs diſtances à la terre; ce qui eſt abſolument néceſſaire ſi l'on veut avoir une juſte idée de l'étendue & de la grandeur du monde. Voici donc la plupart des méthodes qui ont été publiées à cette fin.

Premiere Méthode de découvrir les parallaxes.

PLANCHE VIII. *Fig.* 1.

On obſervera premierement l'inſtant auquel un aſtre paroît dans un même cercle vertical avec deux Etoiles fixes. Soit donc *VB* le cercle vertical où paroiſſent, tant l'aſtre *S* dont le lieu vu eſt *E*, que les deux Etoiles *C* & *D*: il eſt certain que ſi cet aſtre n'a point de mouvement propre, ſa ſituation à l'égard des Etoiles fixes doit être conſtamment la même, enſorte qu'en quelqu'endroit du Ciel que ce ſoit, ſon vrai lieu doit toujours demeurer dans une même ligne droite avec les deux Etoiles fixes *C* & *D*. On obſervera donc quelques heures après la poſition de l'aſtre à l'égard des deux Etoiles, c'eſt-à-dire, on attendra qu'au lieu d'appercevoir les trois objets dans un même vertical, ils paroiſſent autant qu'il ſera poſſible dans une


Fig. 1.
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. A
Fig. 8. et 9.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. B.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 20
Dheulland Del et Sculp

ligne horiſontale. Ainſi ſoient pour la ſeconde fois les deux Etoiles fixes en *c* & *d*, & le lieu vu de l'aſtre en *e*: ſon lieu vrai doit être néceſſairement dans la ligne qui paſſe par les deux Etoiles fixes *c* & *d*; c'eſt pourquoi ſi l'on obſerve les diſtances au Zénit, tant de l'aſtre que des Etoiles fixes, ſçavoir, *dV* & *eV*, & ſi l'on meſure de plus la diſtance *de* du lieu vu *e*, à l'Etoile fixe *d*, comme auſſi la diſtance *dc* des deux Etoiles, on pourra connoître facilement la parallaxe. Car le vrai lieu de l'aſtre doit être dans le cercle vertical *Ve*, qui paſſe par le lieu vu ou apparent de l'aſtre; mais puiſqu'il doit être auſſi dans l'arc *dc* qui joint les deux Etoiles fixes, l'interſection commune *s* de ces deux arcs, ſera par conſéquent le vrai lieu que l'on cherche, & partant l'arc *es* ſera la parallaxe de hauteur. Or dans le triangle *dVc* on connoît tous les côtés; on connoîtra donc l'angle *Vdc*. De même dans le triangle *dVe* on connoît les trois côtés; ainſi l'on découvrira la valeur de l'angle. *dVe* ou *dVs*: enfin dans le triangle *dVs* connoiſſant le côté *dV*, qui eſt la diſtance obſervée de l'Etoile au Zénit, comme auſſi les angles *dVs*, *Vds* dont on vient de chercher la valeur, on aura par conſéquent le côté *Vs*, qui étant retranché de *Ve*, le reſte *se* ſera la parallaxe de hauteur.

Seconde Méthode. PLANCHE VIII. *Fig.* 2.

La parallaxe ſe peut encore découvrir plus facilement de la maniere ſuivante. On obſervera l'inſtant auquel un aſtre eſt vu du côté de l'Orient dans un même vertical avec une Etoile fixe, & l'on meſurera dès-lors leur diſtance. Enſuite quand l'aſtre & l'Etoile reparoîtront vers l'Occident, à même hauteur ſur l'horiſon qu'au moment de la premiere obſervation, on meſurera encore la diſtance de l'aſtre à l'Etoile, & la différence des deux diſtances ſera à très-peu de choſe près la parallaxe que l'on cherche. Soit l'horiſon *HO*, *V* le Zénit, *VB* le cercle vertical où l'on a obſervé d'abord l'aſtre en *E*, & l'Etoile en

D : soit aussi S le vrai lieu de l'astre, & par conséquent SE sa parallaxe, il est clair que la différence des hauteurs observées de l'astre & de l'Etoile DE, sera leur distance apparente. Si l'on observe ensuite l'Etoile en d, & le lieu vu ou apparent de l'astre en e à une même distance du Zénit, on voit d'abord que la distance observée de de l'astre & de l'Etoile fixe, sera égale à très-peu de chose près, à leur vraie distance ; car soit le vrai lieu de l'astre en s, comme il arrive presque toujours que la parallaxe se est très-petite, relativement à l'arc Ve, il s'ensuit que sd, ed seront à très-peu près de même grandeur ; ce que l'on peut supposer avec d'autant plus de certitude, que quand même l'arc se seroit d'un degré, (ce qui est la plus grande parallaxe de hauteur qu'on puisse observer dans tous les astres qui ne sont point au-dessous de la Lune) les arcs de ds differeroient à peine d'une minute. Mesurant donc avec quelqu'instrument la distance de, on connoîtra par conséquent ds qui lui est presque égal. Mais ds est égal à DS, qui est la vraie distance de l'astre à l'Etoile au tems de la premiere observation. Si l'on retranche donc de DS l'arc observé DE, le reste SE sera la parallaxe de l'astre lorsqu'il paroissoit au point E.

Troisieme Méthode. PLANCHE VIII. *Fig.* 3.

On peut encore connoître la parallaxe d'un astre en observant son Azimut, sa distance au Zénit & le tems écoulé entre cette premiere observation & l'heure de son passage au Méridien. Car soit $HVPO$ le Méridien, V le Zénit, P le pole : soit aussi HO l'horison, VB le cercle vertical qui passe par le lieu vrai S & par le lieu apparent E de l'astre. On fera passer aussi par chacun de ces points S, E les cercles de déclinaison PS, PE, & l'on observera l'azimut BO de l'astre, ou l'angle BVO de la même maniere qu'on l'a enseigné ci-devant lorsqu'il s'agissoit pour trouver la réfraction, de connoître l'azimut des Etoiles : il faudra mesurer aussi en même tems la distance

apparente *VE* de l'aſtre au zénit, & ſur-tout ne pas négliger de remarquer les heures, minutes, ſecondes, &c. indiquées au même inſtant à la pendule. Enſuite on attendra que l'aſtre arrive au Méridien, & l'on aura ſoin de marquer encore fort exactement le moment de ſon paſſage, ſoit en l'obſervant à la pendule, ſoit en déterminant la hauteur ſur l'horiſon de quelque belle Etoile*, dont la poſition ſoit donnée, &c. Car l'intervalle de tems écoulé entre l'obſervation de l'aſtre dans le cercle vertical, & ſon paſſage au Méridien étant converti en degrés, minutes, &c. de l'équateur, donnera la valeur de l'arc *ÆC* de l'équateur qui ſera la meſure de l'angle *VPS*: c'eſt pourquoi dans le triangle *VPS*, connoiſſant le côté *VP* diſtance du zénit au pole, comme auſſi les angles *VPS*, *PVS*, on aura donc l'arc *VS* qui ſera la vraie diſtance de l'aſtre au zénit, laquelle étant retranchée de la diſtance obſervée *VE*, le reſte ou la différence *SÉ* ſera la parallaxe de hauteur.

Il faut bien remarquer que pour convertir le tems en degrés & minutes, &c. de l'équateur, où il faut ſe ſervir de la Table conſtruite pour les heures, minutes, &c. du premier mobile, leſquelles ſont d'une durée un peu moins longue que les heures ſolaires moyennes, puiſqu'une révolution du ciel étoilé s'acheve en bien moins de tems que celle du Soleil; & cela ſuppoſe comme l'on voit, qu'à chaque révolution des Etoiles fixes, la pendule parcourre 24 heures, & que dans cet état elle avance chaque

Comment il faut réduire le tems en degrés, &c.

* On peut remarquer ici que Tycho, Hevelius, &c. qui n'avoient pas d'horloges aſſez exactes, ſe ſont preſque toujours ſervis, avant l'invention des Pendules à ſecondes, des hauteurs d'Etoiles obſervées avec leurs meilleurs Quarts-de-cercles, & cela aux environs du Ier vertical; car comme elles y montent ou deſcendent fort vite, cette obſervation leur donnoit le tems vrai, en ſuppoſant l'aſcenſion droite du Soleil connue. Ce qui eſt aiſé à concevoir, puiſqu'il ne s'agit que de réſoudre un triangle dont on connoît les trois côtés, ſçavoir, la diſtance de l'Etoile au Zénit, ſa diſtance au pole, & la diſtance du Zénit au pole; car l'angle au pole étant connu par-là, l'aſcenſion droite du milieu du ciel leur étoit donnée, & par conſéquent l'heure ou la diſtance du Soleil au Méridien.

jour d'environ 4′ sur le tems vrai ou apparent ; cette maniere de compter le tems, quoiqu'assez incommode, a pourtant cet avantage, que les Etoiles fixes doivent passer chaque jour au Méridien à la même heure, si la pendule a été bien réglée. Il n'en est pas de même si la pendule est à l'ordinaire accommodée au moyen mouvement du Soleil, ensorte qu'elle parcourre 24 heures à chaque révolution moyenne du Soleil ; car dans cet état de la pendule, les Etoiles passant chaque jour 3′ 56″ trop tôt, ou accélérant leur passage d'environ deux heures par mois, &c. il est évident qu'au lieu de compter 15° 0′ 00″ pour chaque heure de tems écoulé à la pendule, comme dans le cas ci-dessus, il est nécessaire d'avoir recours à une autre Table construite, sur ce principe que $23^h\ 56'\ 04''$ répondent à 360° 00′ 00″. Or dans cette supposition on doit compter sur l'équateur pour chaque heure de tems écoulé à la pendule, 15° 02′ 27″ 51‴, & ainsi de suite proportionnellement.

Quatrieme Méthode. PLANCHE VIII. *Fig.* 4.

Soit HO un arc de l'horison, AM le Méridien, P le pole, V le zénit, E le lieu apparent de l'astre, dont on aura observé la distance au zénit VE, quelques heures avant son passage au Méridien. Soit aussi S le vrai lieu de l'astre, SE sa parallaxe. Supposons qu'ayant marqué le tems de la pendule auquel l'astre se trouvoit en E, on ait observé dans le même instant son azimut EVM, on pourra de même après le passage de l'astre au Méridien, réitérer une semblable opération lorsqu'il reparoîtra à la même distance Ve du zénit : sur quoi il est à remarquer que puisque les distances apparentes de l'astre au zénit sont égales dans l'un & l'autre cas, les vraies distances VS, Vs, seront par conséquent égales entr'elles. Or puisque le tems écoulé entre la premiere & la seconde observation est connu, si on le réduit en degrés, minutes, &c. de l'équateur, on aura par conséquent l'angle SPs, dont la

moitié est SPV: c'est pourquoi dans le triangle SPV étant donnés les angles SPV, SVP complément de l'azimut à 180°. ou au demi-cercle, comme aussi le côté VP distance du zénit au pole, on pourra connoître l'arc VS qui sera la vraie distance de l'astre au zénit, lequel étant retranché de l'arc VE qui est la distance observée, le reste SE sera la parallaxe de hauteur que l'on cherche.

On voit aisément que cette quatrieme méthode revient à la précédente, puisque dans l'un & l'autre cas, il n'est question que de découvrir l'angle au pole compris entre le Méridien & le cercle horaire qui passe par le point S du vertical situé à l'Orient, c'est-à-dire, où l'on a fait la premiere observation. Comme l'*instrument des Passages* dont on a déja parlé ci-devant, peut donner exactement les verticaux * à chaque instant, & qu'il pourroit se faire que le Méridien ne seroit pas encore connu, principalement si l'astre observé passe entre le zénit & le pole, & s'il n'est visible que du côté du Nord, la quatrieme méthode peut en ce cas suppléer à la troisieme. Car la parallaxe ou la distance d'une Comete observée dans une même nuit, & dans un tems où elle passeroit fort proche de la terre, seroit ainsi connue, au lieu qu'il faut supposer plusieurs tentatives & des opérations réitérées avant que de découvrir le point de l'horison du côté du Septentrion qui répond au Méridien; ce qui semble exiger un intervalle de plusieurs jours avant qu'on y puisse diriger bien exactement la lunette de l'instrument des passages.

PLANCHE VII *Fig.* 17.

La IIIe. & IVe. Méthode pourroient être d'un grand usage pour déterminer la parallaxe du Soleil, si l'on venoit à observer celle d'une Comete qui auroit un mouvement apparent très-rapide, comme il est arrivé en 1472.

Il se présente d'abord deux méthodes assez simples pour découvrir le point de l'horison, tant du côté du Nord que du Midi, où l'on doit fixer la lunette de l'instrument des

* Pour faire usage de cet instrument, il est avantageux de pouvoir découvrir des objets fort éloignés dans l'horison; car il est évident que si l'on y a reconnu deux ou plusieurs points, qui répondent exactement aux verticaux qu'on aura fait parcourir chaque fois au fil du milieu de la lunette, on pourra mesurer ensuite avec un Quart-de-cercle, de deux à trois piés de rayon, l'angle que forment entr'eux ces mêmes objets ou points fixes de l'horison.

passages ; pour qu'elle parcourre le plan du Méridien. La
PLANCHE VIII. *Fig.* 4. première consiste à observer les deux instans marqués à la pendule, auxquels une Etoile paroît à mêmes hauteurs correspondantes, ou à mêmes distances du zénit VS, Vs ; car le milieu du tems écoulé sera l'heure qu'a dû marquer la pendule au moment que l'Etoile passoit au Méridien. Donc si ayant dirigé la lunette de l'instrument à l'endroit où l'on soupçonne que doit passer le Méridien, il arrive que l'Etoile se trouve dans le filet vertical de cette lunette, précisément au même instant que celui qui résulte en prenant un milieu entre les deux tems des hauteurs correspondantes, il sera vrai de dire en ce cas, que la lunette étoit dirigée au Méridien, & que par conséquent en plongeant, l'objet qu'on remarquera dans l'horison, soit au Nord, soit au Midi, sera celui qui doit indiquer le vrai point par où passe la Méridienne du lieu. Mais s'il y a quelque différence entre le passage observé, & celui qui aura été conclu, il faudra avoir égard à cette différence, & tourner l'instrument peu à peu, soit à l'Orient, soit à l'Occident, en réitérant la même opération que ci-dessus, jusqu'à ce que cette différence tantôt plus ou moins grande s'anéantisse, & qu'ainsi le passage au fil de la lunette soit le même que celui qu'on aura déduit des hauteurs correspondantes. L'autre méthode se peut pratiquer lorsqu'on n'a point de Quart-de-cercle pour observer les hauteurs correspondantes, ou les distances au zénit VS, Vs: elle suppose seulement qu'on puisse découvrir les deux points de l'horison diamétralement opposés du Nord & du Midi, & que le mouvement de la pendule soit bien uniforme pendant vingt-quatre heures ; car si l'on dirige la lunette de l'instrument des passages à l'endroit qu'on soupçonne être à peu près le Méridien, & si l'on observe trois fois de suite en vingt-quatre heures le passage d'une Etoile qui ne se couche point, c'est-à-dire, une fois du côté du Midi

Midi, par exemple, & une fois du côté du Nord; il eſt évident que cette lunette ne ſera véritablement dirigée au Méridien, que quand les intervalles des paſſages, pris deux à deux & qui ſont de douze heures, paroîtront égaux de part & d'autre : car hors ce cas-là, une demi-révolution de l'Etoile ſurpaſſera l'autre, & partant la lunette de l'inſtrument des paſſages ſera tournée un peu trop à l'Orient ou à l'Occident à l'égard du Méridien. Soit dans la Sphere P le pole élevé, celui de Paris, par exemple, à $48^{\circ}\ 51'$, Z le zénit, Cc le parallele que parcourt une Etoile telle que ſeroit α de la chevre, qui ne ſe couchant point, paroît au Méridien dans ſon plus grand abbaiſſement ſous le pole à la hauteur de $4^{\circ}\frac{2}{3}$. Dans les triangles ſphériques ZPC, ZPc, les côtés ZP, CP ou cP, ſont conſtans : de plus ſi l'on ſuppoſe auſſi qu'en Z, l'angle formé par le vertical que parcourt la lunette (avant qu'elle ſoit dirigée au Méridien) ſoit auſſi le même dans les deux cas, comme d'un tiers de minute; alors l'angle en C ou c, ſera conſtant. Mais la variation de l'angle en P ſera très-différente dans ces deux triangles, puiſque dans le premier cas, l'angle en Z ſera plus grand que l'angle en P, Z étant l'angle extérieur du triangle ZCP : au contraire ce ſera l'angle en P qui deviendra extérieur dans l'autre triangle ZcP, & comme l'angle Z eſt celui qu'on ſuppoſe toujours le même, il doit donc être plus petit que l'angle cPm du cercle horaire & du Méridien. La différence des angles en P devient très-ſenſible dans les obſervations, quand même la lunette de l'inſtrument décriroit un vertical qui ne s'éloigneroit dans l'horiſon que d'un arc de $20''$ à l'égard du Méridien; car ſi l'on abbaiſſe les deux cercles perpendiculaires CM, cm ſur le Méridien, comme on ſuppoſe ici que l'angle en Z des triangles rectangles CMZ, cmZ eſt toujours le même, les tangentes des côtés MC, mc, doivent donc varier en même raiſon que

PLANCHE VIII. *Fig.* A.

* *Trigon. Sph. prop. 27. voyez auſſi la ſeptieme formule pour les Triangles rectangles.*

les ſinus * des côtés MZ, mz, c'eſt-à-dire, que ſi l'on ſuppoſe les diſtances au zénit de l'Etoile α de la chevre de $3° 3' \frac{1}{2}$ & de $85° 26' \frac{1}{2}$, la variation des côtés MC, mc, ſera à peu près comme 1 eſt à $18 \frac{1}{2}$; d'où l'on voit que ſi l'angle MPC a pour meſure un arc de l'équateur de $1'' \frac{2}{3}$ l'angle mPc ſera meſuré par un arc d'environ $30''$, ce qui répond à deux ſecondes de tems à la pendule, & donnera par conſéquent une demi-révolution de près de $4''$ plus longue que l'autre.

Cinquieme Méthode.

Comme les deux dernieres méthodes que nous venons d'expliquer ſuppoſent que l'on connoiſſe les azimuts, ce qu'il n'eſt peut-être pas toujours poſſible d'exécuter faute d'un lieu commode, nous allons expliquer ici comment on peut découvrir la parallaxe ſans obſerver l'azimut, l'azimut pouvant ſe déduire en même tems qu'on calcule les aſcenſions droites vraies & apparentes. Pour cet effet il faut déterminer ſoigneuſement les diſtances de l'aſtre à deux Etoiles fixes, dont les poſitions, & par conſéquent les aſcenſions droites ſoient connues, pour en conclurre l'aſcenſion droite vue ou apparente de l'aſtre : on y procedera de la même maniere qu'on peut calculer ſa longitude ſuivant la méthode expliquée ci-deſſus, *page 396*. Enſuite lorſque cet aſtre paſſera au Méridien, il faut meſurer encore ſa diſtance aux mêmes Etoiles fixes, & par-là on connoîtra pour lors, ſuivant la même méthode, ſon aſcenſion droite vraie, c'eſt-à-dire, le point où le cercle de déclinaiſon qui paſſe par le vrai lieu de l'aſtre, doit rencontrer l'équateur.

PLANCHE VIII. *Fig.* 5.

L'aſcenſion droite apparente de l'aſtre, obſervé dans le cercle vertical VB, étant donnée auſſi-bien que le point de l'équateur qui paſſe en même tems au Méridien, on aura par conſéquent l'angle VPE; c'eſt pourquoi dans le triangle VPE étant donnés les côtés VP, VE auſſi-bien que l'un des angles oppoſés VPE, on pourra connoître par

conſéquent l'angle PVE, qui ſera l'angle azimutal. D'un autre côté étant donnée l'aſcenſion droite vraie de l'aſtre, obſervée dans le Méridien, & partant le point de l'équateur qui a dû y paſſer au même inſtant, on aura par conſéquent l'angle VPS: ainſi dans le triangle VPS étant donnés les deux angles PVS, VPS, & le côté VP, on pourra découvrir enfin la valeur du côté VS, qui ſera la vraie diſtance de l'aſtre au zénit, laquelle étant retranchée de la diſtance apparente VE, le reſte SE ſera la parallaxe de hauteur.

Il eſt important lorſqu'on veut bien connoître les aſcenſions droites des aſtres, d'y employer quelque méthode plus préciſe que celle des tems écoulés à l'horloge à pendule: cela eſt évident * ſurtout ſi l'on veut tenter quelqu'opération délicate; car l'erreur d'une ſeconde de tems dont on pourroit s'être trompé, ſoit en comptant, ſoit dans les paſſages obſervés de l'aſtre & de l'Etoile aux fils de la lunette, en produit une de 15 ſecondes de degrés dans les aſcenſions droites, & cela à raiſon de 24^h. pour 360°.

Les parallaxes preſqu'inſenſibles du Soleil de Mars ou de Venus, ne doivent pas être recherchées, en y employant les aſcenſions droites, déduites des tems écoulés à la pendule.

Si l'on n'a pas la commodité d'obſerver les paſſages au Méridien, il faudra recourir à d'autres obſervations faites à pareilles diſtances vers l'Occident, ce qui ſuppoſe qu'on obſerve avec un Quart-de-cercle les mêmes hau-

* Ceux qui les premiers ont recherché les parallaxes de Mars & de Venus en y employant des différences en aſcenſion droite obſervées, ſe ſont bien donné de garde de publier tout le détail de leur obſervation, puiſqu'il doit s'enſuivre néceſſairement que les obſervations même pourroient donner des différences en ſens contraire à ce qui a été conclu au ſujet de la parallaxe. Or de toutes les méthodes publiées par Diggeſeus, & les Tichoniciens, la meilleure & celle qu'il auroit été le plus à propos de pratiquer juſqu'ici dans la recherche des parallaxes de Mars Achronique, c'eſt, à ce qu'il ſemble, la derniere qu'on vient de propoſer: & c'eſt auſſi celle que Kepler avoit tentée le premier ſur les obſervations de Tycho; mais comme il eſt trop difficile de meſurer exactement la diſtance de l'aſtre à celle des deux Etoiles qui eſt occidentale ou orientale, & cela à cauſe du mouvement diurne, il faudroit, pour y réuſſir, que la lunette garnie d'un bon micrometre, fût montée ſur l'inſtrument aſtronomique de M. Graham (décrit dans l'optique de Smith) & de plus qu'une groſſe horloge fit mouvoir uniformément cette machine d'Orient en Occident, pour lui faire ſuivre l'aſtre & l'Etoile fixe, lorſqu'on les auroit placés ſous les fils.

teurs apparentes de l'aſtre, tant à l'Orient qu'à l'Occident, comme on l'a propoſé dans la quatrieme méthode. Il eſt évident par-là que pour connoître la vraie aſcenſion droite de l'aſtre, on pourra ſe diſpenſer, s'il y a quelqu'obſtacle, de l'obſerver dans le Méridien. Ainſi prenant la diſtance de l'aſtre à deux Etoiles lorſqu'il eſt du côté de l'Orient, on en déduira par conſéquent ſon aſcenſion droite vue ou apparente, laquelle excedera l'aſcenſion droite véritable à cauſe de la parallaxe qui abbaiſſe néceſſairement cet aſtre vers l'Orient. On meſurera de même la diſtance de l'aſtre aux Etoiles fixes, lorſqu'étant du côté de l'Occident il reparoîtra à même hauteur ſur l'horiſon; ce qui donnera ſon aſcenſion droite apparente, qui dans ce ſecond cas doit être plus petite, ou differer d'autant de la véritable, qu'elle a paru la ſurpaſſer au moment de la premiere obſervation. Car du côté de l'Occident, comme la parallaxe abbaiſſe l'aſtre vers l'horiſon, elle doit l'écarter autant de ſon vrai lieu, quoiqu'en ſens contraire, qu'à pareille hauteur du côté de l'Orient. Si l'on prend donc la moitié de la différence de ces deux aſcenſions droites apparentes, & ſi on l'ajoute à la plus petite aſcenſion droite obſervée, ou bien ſi on la retranche de la plus grande, l'on aura l'aſcenſion droite vraie, & par conſéquent le point ou le cercle de déclinaiſon qui paſſe par l'aſtre, rencontre l'équateur. D'ailleurs comme au moment de la premiere obſervation on a pu calculer le point Æ de l'équateur qui paſſoit au Méridien, c'eſt-à-dire, l'aſcenſion droite du milieu du ciel, on connoîtra donc l'arc $ÆC$ qui eſt la meſure de l'angle $ÆPC$: c'eſt pourquoi dans le triangle VPS étant donné le côté VP, comme auſſi les angles PVS, VPS, on trouvera comme ci-devant la diſtance VS de l'aſtre au zénit, qui étant retranchée de l'apparente, le reſte SE ſera la parallaxe de hauteur que l'on cherche.

PLANCHE VIII. *Fig.* 3.

Sixieme Méthode.

L'une des plus faciles, & peut-être celle dont on a fait le plus d'uſage de toutes les Méthodes de découvrir les parallaxes, c'eſt de rechercher comme il ſuit la parallaxe d'aſcenſion droite : on ſe ſervira pour cet effet d'une lunette ayant au foyer commun de ſes deux verres convexes un réticule garni de fils inclinés à 45°, ou bien ſi c'eſt pendant la nuit, de petites lames, ainſi qu'il a été expoſé aſſez au long au Chap. XIX. Suppoſons, par exemple, qu'on ſe ſerve comme autrefois du Réticule garni de cheveux inclinés à 45°, on diſpoſera tellement la lunette, que l'aſtre puiſſe parcourir exactement le fil AB, c'eſt-à-dire, enſorte que ſon mouvement apparent ſoit conforme à la direction de ce fil. Or en ce cas AB repréſentera un parallele à l'équateur *, & le fil CD un Méridien ou Cercle horaire. Enſuite on déterminera l'inſtant auquel l'aſtre paſſe au fil horaire CD, & ayant attention que la lunette demeure immobile, on obſervera auſſi l'inſtant auquel une Etoile fixe qu'on ſçait à peu près avoir la même déclinaiſon, arrivera au même fil ou cercle horaire. Car ſi l'aſcenſion droite de cette Etoile eſt connue, il eſt évident qu'en convertiſſant en degrés, minutes, &c. l'intervalle de tems écoulé entre les paſſages de l'aſtre & de l'Etoile fixe, on aura par conſéquent l'aſcenſion droite apparente de l'aſtre, puiſqu'on ſçait la différence entre l'aſcenſion droite de l'Etoile, & l'aſcenſion droite apparente de l'aſtre. Cette opération doit être faite autant qu'il ſera poſſible, vers le cercle de ſix heures; & par conſéquent pour retirer tout l'avantage qu'on peut eſpérer de cette méthode, il faut dans la ſphere oblique, que l'aſtre ait au moins quelques degrés de déclinaiſon ſeptentrionale. Mais

PLANCHE VIII. *Fig. 6.*

* Ceci n'eſt exactement vrai que quand l'aſtre eſt dans l'équateur & aux environs du Méridien ; car ſi l'aſtre décline beaucoup vers l'un ou l'autre pole, ou s'il eſt bien éloigné du Méridien & ſujet aux grandes réfractions, à meſure qu'il s'approche de l'horiſon, alors ou il ſera impoſſible de faire parcourir le fil de la lunette à l'aſtre, ou il pourroit paroître le parcourir, ſans qu'on en pût conclurre pour cela, que ce fil repréſente un parallele à l'équateur.

lorſque l'aſtre & l'Etoile paſſeront au Méridien, ſi l'on réitere la même opération, il réſultera pour lors la vraie aſcenſion droite de l'aſtre obſervé, puiſqu'au Méridien il n'y a plus de parallaxe d'aſcenſion droite, & que par conſéquent l'aſcenſion droite vraie de l'aſtre, eſt pour lors la même que l'apparente. On aura donc ainſi le point de l'équateur qui eſt coupé par le cercle de déclinaiſon qui paſſe par le vrai lieu de l'Etoile; c'eſt pourquoi étant données l'aſcenſion droite vraie, & l'aſcenſion droite apparente de l'aſtre, on connoîtra par conſéquent leur différence, qui ſera la parallaxe d'aſcenſion droite, ou l'angle *SPE* que l'on cherche.

PLANCHE VIII. *Fig.* 5.

La *Parallaxe d'aſcenſion droite* étant connue, voici comme on peut déterminer la *Parallaxe de hauteur*, & par conſéquent la parallaxe horiſontale. Comme on connoît l'aſcenſion droite apparente de l'aſtre, comme auſſi le point de l'équateur qui a paſſé au Méridien au tems de la premiere obſervation, on aura par conſéquent l'arc de l'équateur compris entre le Méridien & le lieu apparent de l'aſtre. Cet arc ſera la meſure de l'angle *VPE*; c'eſt pourquoi dans le triangle *VPE* étant donnés les côtés *VP*, *VE* (par l'obſervation de la hauteur du pole & de celle de l'aſtre, ou autrement,) connoiſſant auſſi l'angle *VPE*, on aura par conſéquent la valeur de l'angle *PVE*: mais ſi de l'angle *VPE* on retranche l'angle *SPE*, qui eſt la parallaxe d'aſcenſion droite obſervée, on aura par conſéquent l'angle *VPS*; & partant dans le triangle *VPS* étant donnés les angles *PVS*, *VPS*, & le côté *VP*, on connoîtra par conſéquent le côté *VS* qui ſera la vraie diſtance de l'aſtre au zénit, laquelle étant retranchée de la diſtance apparente *VE*, la différence *SE* ſera la parallaxe de hauteur, qu'on réduira facilement à la parallaxe horiſontale par l'analogie du Théoreme qu'on a démontré au commencement de ce Chapitre. Le calcul ſera beaucoup plus ſimple ſi l'on veut

ſe ſervir des analogies de M. Cotes, c'eſt-à-dire, en conſidérant que dans le triangle *VPE* le côté *VP*, & l'angle *PVE* ſont conſtans, d'où il ſera facile de conclurre la petite variation *SE* du côté *VE*, puiſqu'on connoît *SPE*, ou celle de l'angle *VPE*, qui eſt la parallaxe d'aſcenſion droite.

Maniere de calculer la parallaxe lorſque l'aſtre a un mouvement propre.

Juſqu'ici on a ſuppoſé que l'aſtre n'avoit pas de mouvement propre dans l'intervalle de tems écoulé entre les obſervations : mais comme on ignore ſi ſon aſcenſion droite, par exemple, ne pourroit pas changer continuellement par cette ſeule raiſon, à moins que le mouvement propre de l'aſtre ne ſe fit ſelon un cercle horaire ou de déclinaiſon, (comme cela paroît poſſible à l'égard de certaines Cometes), ce qui eſt un cas fort rare ; il eſt à propos d'expliquer ici comment on doit avoir égard à ce mouvement : cela eſt fort ſimple, ſi l'on a ſoin d'obſerver deux jours de ſuite la vraie aſcenſion droite de l'aſtre à l'heure de ſon paſſage par le Méridien. Car comme au Méridien il ne ſçauroit y avoir de parallaxe d'aſcenſion droite, il eſt évident de-là que la différence entre les aſcenſions droites obſervées deux jours de ſuite au Méridien, donnera préciſément la variation qui convient au mouvement propre de l'aſtre ; d'où il ſera aiſé de conclurre le vrai mouvement horaire qui appartient à cet aſtre relativement à l'équateur, & partant le mouvement qui répond à tel intervalle de tems que ce ſoit. Par exemple, ſi en un jour ou 24^h l'aſtre parcourt ſelon l'équateur $30'$, c'eſt-à-dire, ſi cet aſtre paroît s'avancer en un jour de 30 min. relativement à l'équateur : ſi d'ailleurs le tems écoulé entre la premiere obſervation faite du côté de l'Orient, & la ſeconde faite au Méridien, eſt de ſix heures ; il eſt aiſé de voir que le mouvement propre de l'aſtre dû à cet intervalle, ſera de $7'\frac{1}{2}$; c'eſt pourquoi ſi la différence entre l'aſcenſion droite apparente obſervée dans le cercle vertical & l'aſcenſion droite vraie obſervée dans le Méridien, eſt de $20'$, comme

il en faut attribuer, selon ce qui a été exposé ci-dessus, $7\frac{1}{2}$ au mouvement propre de l'astre, il s'ensuit que les $12\frac{1}{2}$ qui restent, doivent être regardées comme un effet de la parallaxe d'ascension droite.

On peut aussi appliquer la même regle aux longitudes, tant vraies qu'apparentes d'un astre, qui auront été observées dans le dessein de découvrir la parallaxe; car sa longitude apparente se peut déduire des distances observées à deux Etoiles fixes dont on connoît le vrai lieu, & sa longitude vraie ne sçauroit se conclurre (en y employant de la même maniere les distances observées) que quand l'astre sera parvenu au nonagésime degré, puisqu'il n'y a que ce seul cas où la longitude apparente ne differe plus de la vraie. Ainsi cette méthode revient au même que la précédente, puisqu'au nonagésime degré on évite la parallaxe de longitude, de même qu'au Méridien on évite celle d'ascension droite. Par-là on peut suppléer à un second observateur placé au centre de la terre, ou du moins dans un lieu fort éloigné sur sa surface, & au zénit duquel se trouveroit l'astre; ce qui est l'une des plus générales & des plus anciennes de toutes les méthodes proposées pour déterminer la parallaxe. On trouvera aussi dans Diggeseus, ou dans la Science des Longitudes de Morin, les deux dernieres dont on vient de parler, qui par conséquent ont été connues il y a plus d'un siecle; ensorte qu'il y auroit lieu d'être surpris comment quelques Auteurs modernes les ont regardées comme nouvelles, si ce n'est qu'on pourroit croire qu'ils n'ont consulté ni les ouvrages de Ticho, ni ceux de Kepler *, ni d'Hevelius ou l'on en a fait un fréquent usage, & comme cela se trouve aussi dans les Histoires Célestes, telles que dans celle d'Angleterre, à l'occasion de Mars Achronique, observé dans son Perigée en 1672.

* *Voyez les Ephémérides de Kepler de l'année 1619.*

Toutes les Méthodes qu'on vient de rapporter, sont assez

assez praticables lorsque la parallaxe d'un astre est au moins d'une demi-minute : mais il n'en est pas de même lorsqu'elle devient plus petite, à moins qu'on ne se serve de celle qu'on a proposée, *page* 355. puisqu'il est presqu'impossible autrement de ne se pas tromper, soit dans les passages observés (c'est-à-dire, quant aux intervalles de tems écoulés lorsqu'on compte à la pendule) soit dans les distances estimées & qu'on ne sçauroit bien mesurer à cause du mouvement diurne, si l'on veut se réduire, au lieu d'y employer le tems, à ne mesurer uniquement que les distances aux Etoiles voisines. A l'égard de la Lune, comme sa parallaxe est très-grande, étant quelquefois d'un degré & plus à l'horison, on a imaginé quelques méthodes particulieres pour la déterminer.

La Méthode que Ptolomée a proposée dans son Almageste, pour déterminer la parallaxe de la Lune.

On suppose, par exemple, que la Lune lorsqu'elle se trouve dans sa plus grande latitude boréale, & au commencement de l'Ecrevisse, parvienne jusqu'au zénit de l'observateur, c'est-à-dire, qu'à l'heure de son passage au Méridien elle n'ait plus de parallaxe. Soit donc supposé V, un lieu de la terre situé dans les Zones tempérées, à distance de $28^{\circ}\frac{3}{4}$ de la ligne Equinoctiale : on peut choisir pour faire cette observation, quelques contrées d'Egypte, un peu plus méridionales que la ville d'Alexandrie où Ptolomée a pratiqué cette méthode; ou bien les Isles Canaries, & particulierement la ville de Laguna dans l'Isle Tenerif; car la Lune y seroit facilement observée lorsqu'étant dans sa plus grande latitude boréale, elle monte près de $5^{\circ}\frac{1}{3}$ plus haut que le tropique du ♋. Cela supposé, si l'on connoît la latitude du lieu $\text{Æ}Z$, & si l'on observe encore 15 jours avant ou après, la Lune au Méridien, lorsqu'étant au ♑, elle sera dans sa plus grande latitude australe ; il est évident qu'un Spectateur placé au centre de la terre C, l'appercevroit dans l'un & l'autre cas, à distances égales Z♋ ♑M des deux Tropiques de l'Ecrevisse & du Capricorne.

PLANCHE VIII. *Fig.* B.

Le meilleur moyen de découvrir la plus grande latitude de la Lune.

Mais il n'en ſera pas de même à l'égard de l'Obſervateur, placé en *V*; car dans le premier cas la Lune n'ayant plus de parallaxe, puiſqu'elle paroît à ſon zénit, la différence entre l'obliquité de l'écliptique & la latitude du lieu, fera connoître la quantité de ſa plus grande latitude: mais dans le ſecond cas la Lune au lieu de paroître en *M* autant éloignée du point ♈, que le point *Z* l'eſt du point ♋; cet aſtre dis-je, paroîtra un peu plus bas en *N*, & cela à cauſe de ſa parallaxe. Or il s'enſuit en ce cas que la différence entre *ZM*, qui eſt le double de l'arc connu *ZÆ*, & la diſtance au zénit obſervée de la Lune *ZN* à l'heure de ſon paſſage au Méridien, lorſqu'elle eſt dans ſa plus grande latitude auſtrale, ſera la parallaxe de hauteur que l'on cherche.

Au reſte pour employer utilement cette méthode, il faut avoir égard, 1°. à la réfraction qui accourcit la diſtance *ZN*, & qu'il faut par conſéquent corriger par les Tables ci-deſſus, &c. ce que l'on ſuppoſe déja connu. 2°. Il faut auſſi meſurer au moment de la ſeconde obſervation le diametre apparent de la Lune, parce que ſi cet aſtre eſt, par exemple, dans ſes moyennes diſtances, étant dans ſa plus grande latitude en *N*, il ſera facile de connoître la parallaxe dans tout autre point de ſon orbite, puiſque les diametres ou les parallaxes de la Lune varient toujours en raiſon réciproque de ſes diſtances à la terre. Enfin il faut encore s'aſſurer ſi lorſque la Lune a été obſervée en *Z* & *N*, ſon nœud s'eſt trouvé exactement dans la ligne des Siſigies, ou bien encore ſi cet aſtre a dû ſe rencontrer préciſément dans ſes plus grandes latitudes: autrement il faudroit faire quelques réductions, ce qui ne ſçauroit gueres monter qu'à quelques ſecondes, la Lune étant vers ſes limites.

Si cette méthode paroît fort ſimple dans le cas que l'on vient de ſuppoſer, d'un Obſervateur qui apperçoit la Lune à ſon zénit, lorſque cet aſtre ſe trouve dans ſes plus grandes

latitudes, on peut dire qu'il n'en eſt pas de même lorſqu'il s'agit d'y procéder quand la Lune ne parvient pas tout-à-fait au zénit de l'Obſervateur, ainſi que l'ont tenté en pareil cas Copernic, Tycho *, &c. car la Lune étant obſervée en P dans ſa plus grande hauteur méridienne poſſible HP, l'arc OP ſera ſa parallaxe de hauteur, c'eſt-à-dire, la différence entre ſon lieu vu du point V, & ſon vrai lieu, tel qu'il paroîtroit du centre de la terre C; d'où l'on voit que la plus grande latitude poſſible, ou la plus grande diſtance $P\text{Æ}$ de la Lune à l'équateur, doit toujours paroître dans la Zone glaciale, & dans preſque toute l'étendue de la Zone tempérée plus petite que la véritable $O\text{Æ}$: mais parce que ce ſera tout le contraire ſi la Lune eſt obſervée dans ſa plus grande latitude en p ; c'eſt-à-dire, puiſque ſa plus grande latitude ou déclinaiſon apparente $\text{Æ}p$, doit ſurpaſſer la véritable $\text{Æ}o$, toutes les fois que la Lune ſera dans ſa plus petite hauteur méridienne Hp, cette diverſité d'aſpect fournit un moyen de découvrir la parallaxe. En effet la queſtion ſe réduit uniquement à déterminer une quantité qui étant variable ſuivant une raiſon donnée, corrige tellement les arcs $P\text{Æ}$, $\text{Æ}p$, qu'il en réſulte les deux plus grandes latitudes poſſibles, Auſtrales & Boréales de la Lune, parfaitement égales.

* *Voyez auſſi ce qui a été publié par M. Halley à la fin de ſon Catalogue des Etoiles Auſtrales.*

PLANCHE VIII. *Fig.* C.

Si la Lune eſt dans le colure des Solſtices, & dans ſes plus grandes latitudes à l'heure de ſon paſſage au Méridien ; voici de quelle maniere l'obliquité de l'écliptique étant connue, on pourra découvrir ſa parallaxe : ſoit l'arc $OP = u$, $Pp = a$, $P\text{Æ} = b$, l'arc $O\text{Æ}$ ſera par conſéquent égal à $u + b$: mais parce que, ſelon le Théoreme démontré ci-deſſus, les arcs OP, op ſont entre eux comme les ſinus des angles ZVP, ZVp connus par obſervation, c'eſt-à-dire, dans un rapport qu'on peut exprimer par celui de $m : n$, on aura l'arc $op = \frac{nu}{m}$, & partant $\text{Æ}p - op$

ou $a-b-\frac{nu}{m}=Æ o$, ce qui donne cette équation ($OÆ$) $u+b=a-b-\frac{nu}{m}$ ($Æ o$); d'où l'on tire $ma-2mb=mu+nu$, & enfin $u=\frac{ma-2mb}{m+n}=OP$ qui sera la parallaxe.

Cette méthode peut être rendue encore plus générale: mais il faut toujours que ce probleme soit limité à certaines conditions sur lesquelles il semble qu'on ne doit point se négliger : car premierement il faut que la Lune se trouve à même distance de la terre au tems de chaque observation, autrement il faudra avoir égard aux variations de ses distances, ce qu'il est facile toutefois de connoître si l'on a observé exactement son diametre apparent. En second lieu, il faut que la ligne des nœuds, & le grand axe de l'orbite de la Lune, se trouvent dans une position semblable à l'égard de la ligne des Sisigies ou des Quadratures; car il est certain que l'inclinaison de l'orbite seroit différente, & que par conséquent la plus grande latitude boréale ne pourroit plus être supposée égale à la plus grande latitude australe, si ces conditions n'étoient point observées. En troisieme lieu, comme l'inclinaison de l'orbite de la Lune est plus grande d'environ 18′ lorsque la ligne des nœuds est dans la ligne qui passe par le Soleil, que lorsqu'elle s'en trouve à 90°, & que l'on sçait d'ailleurs que les nœuds sont presqu'immobiles ou stationnaires, lorsqu'ils se rencontrent dans la ligne des Sisigies, il semble que c'est ce dernier cas qu'on doit choisir préférablement pour observer les parallaxes de la Lune : ainsi cette méthode peut se pratiquer au moins deux fois l'année, sçavoir, lorsque le Soleil nous paroît avoir la même longitude que le ☊ ou ☋ de la Lune.

Si la Lune a été observée au Méridien dans ses deux plus grandes latitudes Septentrionales & Méridionales, & à même degré de longitude à l'égard du colure des

PLANCHE VIII. *Fig.* D.

solstices, il faudra calculer la distance au zénit MZ du point de l'écliptique qui a dû passer au Méridien en même tems que la Lune, ce qui est facile, l'obliquité de l'écliptique étant connue. Faisant donc la différence des hauteurs méridiennes apparentes de la Lune $Pp = a$, comme aussi l'arc $MP = b$, on aura toujours l'équation $\frac{ma-2mb}{m+n} = u = OP$. Ou bien $\frac{ma-2mb+mc}{m+n} = u$ si l'on nomme c la différence en déclinaison des points M de l'écliptique, lorsque la Lune n'a pas la même longitude.

La figure de la terre qui cause quelques inégalités (selon les différens lieux) sur la parallaxe de la Lune, étant aujourd'hui exactement connue, il est certain qu'un des meilleurs moyens de découvrir cette parallaxe seroit de comparer les observations, faites dans des lieux fort éloignés, tant du commencement & de la fin, que de la plus grande quantité des Eclipses du Soleil. Mais les observations publiées jusqu'ici, ne paroissent gueres propres à cette recherche; car il faudroit qu'on eût déterminé les immersions ou émersions dont nous venons de parler, avec un soin tout particulier, ce qui n'a pas encore été exécuté.

Quelques-uns ont recherché la parallaxe * par les observations de la durée des Eclipses totales de Lune, ou bien en observant le commencement & la fin comme aussi la plus grande quantité obscurcie dans les Eclipses partiales: mais à cause que l'ombre ne paroît jamais bien terminée, ces moyens ne paroissent pas assez avantageux: enfin on va expliquer encore ici une méthode dont il paroît qu'on a fait usage en l'année 1681.

* Outre la méthode de M. Auzout où l'on propose de mesurer deux fois la même nuit le diametre de la Lune; sçavoir vers l'horison, ensuite proche le zénit, on pourroit se servir aussi de celle qui a été publiée dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1735 & qui consiste à déterminer les diametres de la Pleine-Lune, tels qu'on les verroit du centre & de la surface de la terre lorsque cet astre passe au Méridien proche le Zénit: mais il faut avouer cependant que ces méthodes ne sçauroient être employées pour déterminer la parallaxe de la Lune avec une précision suffisante.

Autre Méthode particuliere pour déterminer la parallaxe de la Lune.

Pendant une Eclipſe de Lune, on obſervera à l'inſtant que les cornes paroîtront dans un même vertical, la hauteur de l'une & l'autre corne ſur l'horiſon; enſuite on ajoutera la moitié de la différence de ces hauteurs à la plus petite hauteur obſervée, ou bien on la retranchera de la plus grande, & l'on aura par conſéquent la hauteur d'un point ſitué au milieu entre les extrémités des cornes; ce qui répond à très-peu de choſe près à la hauteur du centre de la Lune. Mais il eſt certain d'ailleurs que la vraie hauteur du centre de la Lune eſt à très-peu de choſe près égale à la hauteur du centre de l'ombre ſur l'horiſon au même inſtant donné. Or l'on ſçait pour cet inſtant le vrai lieu du Soleil dans l'écliptique, & par conſéquent on connoît le point qui lui eſt diamétralement oppoſé, ou qui répond au centre de l'ombre, & dont il n'eſt pas difficile de calculer la hauteur: car cette hauteur de l'ombre eſt préciſément égale à l'abaiſſement ou profondeur du Soleil ſous l'horiſon. Ainſi la vraie hauteur du centre de la Lune ſera par conſéquent connue, & puiſque l'on a déterminé par obſervation ſa hauteur apparente, la différence ſera la parallaxe de hauteur que l'on cherche.

On remarquera que comme la diſtance de la Lune au centre de la terre, diminue à chaque inſtant, ſelon qu'elle s'éloigne de ſon Apogée, c'eſt pour cette raiſon qu'on a calculé des Tables, qui repréſentent les parallaxes horiſontales de la Lune à chaque degré d'Anomalie moyenne.

Quoique les méthodes rapportées ci-deſſus puiſſent être généralement employées pour déterminer la parallaxe de la Lune, laquelle eſt très-conſidérable, il eſt cependant vrai de dire qu'elles ſont inſuffiſantes pour découvrir celle du Soleil; car cette derniere eſt ſi petite, qu'elle échappe aux obſervations. D'ailleurs quand bien même on tenteroit de faire uſage de la méthode de Ptolomée, en obſervant, au lieu de la Lune, le Soleil ſous l'un des

tropiques, il resteroit toujours assez d'erreur, soit dans les réfractions qui conviennent aux plus petites hauteurs méridiennes du Soleil, soit dans les divisions des instrumens (qui vraisemblablement échapperoient à l'habileté de l'Observateur) pour qu'on pût jamais se flater de connoître une aussi petite quantité que doit être la parallaxe du Soleil.

Aussi les Anciens s'étant apperçus que le défaut d'observations assez parfaites, seroit toujours le plus grand obstacle qui pût se rencontrer dans la recherche des parallaxes, il n'y a pas lieu d'être étonné s'ils ont tenté plusieurs voies particulieres pour les découvrir. Mais il faut avouer aussi que quoique ces méthodes imaginées par les Anciens, marquent beaucoup de génie & de sagacité, elles ne sçauroient néantmoins être bien avantageuses, s'il s'agit de constater un élément devenu aussi subtil qu'est la parallaxe du Soleil : ainsi le principal objet de leur utilité, se réduit uniquement à nous démontrer que la distance du Soleil à la terre est presqu'immense, en comparaison de la distance de la Lune à notre égard ; & c'est-là l'un des principaux motifs qui nous autorisent à les rapporter.

La Méthode imaginée par Hipparque, pour découvrir la parallaxe du Soleil.

L'une de ces Méthodes est celle d'Hipparque, dont Ptolomée & ceux qui l'ont suivi ont fait le plus d'usage. Elle est fondée sur l'observation des Eclipses de Lune, & sur quelques autres principes qu'on va établir ; car il faut sçavoir premierement que dans les Eclipses de Lune, la parallaxe horisontale du Soleil est toujours égale à la différence qui se trouve entre le demi-diametre apparent du Soleil, & la moitié de l'angle du cone d'ombre. En voici la démonstration : soit AFG le Soleil, DHE la terre, DMH le cone d'ombre, & DMC la moitié de l'angle du cone : on menera du centre du Soleil S, la droite SD qui soit tangente à la terre, & l'angle DSC sera le demi-diametre apparent de la terre vu du Soleil, & par conséquent la parallaxe horisontale du Soleil. Or l'angle ADS

PLANCHE VIII. Fig 7.

étant le demi-diametre apparent de cet aſtre vu de la terre, & ce même angle *ADS* étant extérieur & égal (*Euclid. Liv. 1. prop. 32.*) aux deux intérieurs *DMS*, *DSM* pris enſemble, il doit s'enſuivre que l'angle *DSM* ſera égal à la différence des angles *ADS*, *DMS*. En ſecond lieu la moitié de l'angle du cone doit toujours être égale à la différence de la parallaxe horiſontale de la Lune, & du demi-diametre de l'ombre vu dans l'orbe de la Lune : car ſoit *CDE* la terre, *CME* le cone d'ombre qui ſoit coupé par un plan perpendiculaire à la diſtance de la Lune ; il eſt évident que la ſection ſera un cercle dont le demi-diametre ſera *FG*, lequel vu du centre de la terre paroîtra ſous l'angle *GTF* ; mais ſelon la même Prop. 32. d'Euclide, l'angle *CFT* doit être égal aux angles *FMT*, *GTF*, & partant l'angle *FMT* ſera égal à la différence des angles *CFT*, *GTF*. Or l'angle *CFT* eſt celui ſous lequel le demi-diametre de la terre paroîtroit vu de la Lune, & par conſéquent cet angle eſt égal à ſa parallaxe horiſontale, mais auſſi l'angle *FTG* eſt le demi-diametre apparent de l'ombre ; il eſt donc vrai de dire que la moitié de l'angle du cone eſt égal à la différence entre la parallaxe horiſontale de la Lune, & le demi-diametre apparent de l'ombre terreſtre. C'eſt pourquoi ſi au demi-diametre du Soleil l'on ajoute le demi-diametre apparent de l'ombre terreſtre, & ſi l'on ôte de cette ſomme la parallaxe horiſontale de la Lune, le reſte ſera la parallaxe horiſontale du Soleil, laquelle ſeroit exactement connue s'il étoit poſſible d'établir la juſte quantité des élémens quil s'agit de ſuppoſer dans cette méthode. Mais bien loin de les pouvoir conſtater avec quelque certitude, on eſt tellement éloigné de parvenir à les bien connoître, qu'il a fallu néceſſairement les abandonner pour une recherche auſſi délicate qu'eſt la parallaxe du Soleil. Car on doit faire attention que les plus petites erreurs, qu'il eſt preſqu'impoſſible aux Aſtronomes d'éviter

PLANCHE VIII. *Fig. 8.*

d'éviter lorſqu'il faut conclurre par obſervation ces angles ou élémens, peuvent influer tellement ſur la parallaxe du Soleil, qu'il en doit réſulter des différences monſtrueuſes dans la diſtance de cet aſtre à la terre, que l'on cherche.

La Méthode d'Hipparque paroit inſuffiſante pour déterminer la parallaxe du Soleil.

Suppoſons, par exemple, la parallaxe horiſontale de la Lune de 60 min. 15 ſecondes, le demi-diametre du Soleil de 16 min. & le demi-diametre de l'ombre de 44 min. 30 ſec. il eſt évident qu'on en doit conclurre la parallaxe du Soleil de 15 ſecondes, & par conſéquent ſa diſtance à la terre de 13000 demi-diametres terreſtres. Mais ſi l'on avoit commis cependant quelqu'erreur en déterminant le demi-diametre de l'ombre, & qu'on ſe fût trompé dans cet élément de 12″ en moins, comme cela eſt poſſible, puiſqu'on ne peut gueres eſperer de le conſtater mieux qu'à $\frac{1}{5}$ de minute près; en un mot ſi au lieu de 44′ 30″ on ne l'avoit conclu que de 44′ 18″, il s'enſuivroit (en conſervant les autres élémens qu'on ſuppoſe d'ailleurs bien établis) que la parallaxe du Soleil ne ſeroit que de trois ſecondes, & partant la diſtance de cet aſtre deviendroit égale à 70000 demi-diametres terreſtres, ce qui ſurpaſſe environ cinq fois la diſtance qu'on a déterminée ci-deſſus. Si au contraire on s'étoit trompé de 12″ en excès dans le demi-diametre de l'ombre, & qu'ainſi il eût été établi de 44′ 42″, il en faudroit conclurre (ſi l'on ne change point les autres élémens) la parallaxe du Soleil de 27 ſecondes, & partant la diſtance du Soleil de 7700 demi-diametres terreſtres, ce qui differe environ dix fois de la diſtance qu'une pareille erreur de 12″ en moins, auroit fait conclurre. Mais il y a plus, ſi au lieu de 12″ en moins on ſe fût trompé de 15, alors la parallaxe du Soleil ſeroit anéantie, ce qui donneroit la diſtance du Soleil infinie. D'où l'on voit que puiſque d'auſſi petites erreurs qu'on pourroit commettre ſeulement en déterminant le demi-diametre de l'ombre, produiſent d'auſſi grandes différences dans

les parallaxes, ou plutôt dans les distances du Soleil à la terre, il en doit résulter nécessairement que par cette méthode on ne sçauroit conclurre exactement la parallaxe, ni la distance du Soleil à la terre.

La parallaxe horisontale avoit été établie par Ptolomée, suivant cette méthode de 3′ dans ses moyennes distances : & c'est sur ce fondement que tous les Auteurs Arabes, & dans les derniers siecles Regiomontanus, Copernic, & Tycho, ont établi les autres élémens d'où dépendent certains calculs qui leur ont servi à vérifier la Théorie des Planetes. Cependant on n'admet plus gueres aujourd'hui qu'environ $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{5}$ de minute, & cela parce que la plus grande parallaxe de Mars, qui dans son périgée est environ deux fois plus près de la terre que le Soleil, ne paroît pas excéder une demi-minute. Au reste la méthode d'Hipparque a dû être encore beaucoup plus imparfaite, avant la découverte des Lunettes d'approche, qu'elle ne le paroît aujourd'hui, à cause de la difficulté d'estimer à la vue simple les termes de la Pénombre, ou de mesurer sans Micrometre les diametres apparens. De maniere qu'il seroit étonnant comment on s'en est tenu si long-tems au résultat de Ptolomée, si ce n'est qu'on a eu bien de la peine à se résoudre à augmenter la distance du Soleil aussi prodigieusement qu'on l'a supposée depuis un siecle ou environ, outre qu'il n'étoit pas facile d'y mieux réussir par la méthode d'Aristarque, comme on le va voir tout à l'heure.

La Méthode d'Aristarque.

L'angle sous lequel le demi-diametre de la terre seroit vu du Soleil ayant donc paru, même aux plus anciens Astronomes, si petit qu'ils ne pouvoient gueres se flater de le bien constater par observation, le fameux *Aristarque* de Samos imagina une méthode qui sembloit devoir être avantageuse, parce qu'il s'agissoit de déterminer un assez grand angle, sçavoir, celui que soutend, ou qui a pour

baſe le demi-diametre de l'orbite Lunaire : en effet cet angle eſt environ ſoixante fois plus grand que la parallaxe du Soleil. Voici donc les principes qui ſervent de fondement à cette méthode.

On a fait voir déja à l'occaſion des Phaſes de la Lune, que ſi l'on imagine un plan qui paſſe par le centre de cet aſtre, & ſur lequel la ligne droite qui joint les centres de la Lune & du Soleil, ſeroit perpendiculaire, ce plan ſépareroit néceſſairement l'hémiſphere éclairé de la Lune d'avec celui qui eſt plongé dans l'ombre ; mais que ce plan venant à paſſer par l'œil de l'Obſervateur placé ſur la ſurface de la terre, l'hémiſphere de la Lune paroîtroit en ce cas diviſé en deux parties égales, dont l'une ſeroit éclairée, & l'autre opaque, enſorte que la ligne droite tirée du centre de la terre au centre de la Lune, ſe trouveroit en ce moment dans le plan même de la baſe du cone illuminé, & ſeroit perpendiculaire à l'autre ligne qui joint les centres de la Lune & du Soleil. Soit en *S* le Soleil, *T* la terre, *A Lq* le quart de la circonférence de l'orbite Lunaire ; ſi la ligne droite *S L* tirée du Soleil à la Lune touche ſon orbite au point *L*, l'angle *T L S* ſera droit, & partant la Lune paroîtra dichotome lorſqu'elle ſera parvenue au point *L*. C'eſt pourquoi ſi l'on obſerve l'inſtant auquel la Lune paroîtra à moitié éclairée, & ſi l'on meſure au même inſtant l'angle *L T S* qui eſt l'élongation de la Lune au Soleil, on aura par conſéquent la valeur de l'angle du complément *T S L*. Ainſi puiſque le côté *T L* eſt donné, il s'enſuit que connoiſſant tous les angles du Triangle rectangle *S L T*, comme auſſi le côté *T L*, on déterminera facilement par la Trigonométrie rectiligne, la valeur du côté *S T*, qui ſera la diſtance du Soleil à la terre, que l'on cherche.

PLANCHE VIII. *Fig. 9.*

Mais il eſt à conſidérer que la plus grande difficulté qui ſe préſente dans la pratique de cette méthode, conſiſte

La méthode d'Ariſtarque ne ſçauroit nous faire découvrir la diſtance du Soleil.

à décider du véritable inſtant auquel la Lune doit paroître dichotome ; car il eſt certain que pendant un eſpace de tems aſſez conſidérable avant ou après ce même inſtant & au moment même de la quadrature, la phaſe obſervée paroît à chaque fois ſi peu différente, qu'il n'eſt pas poſſible de diſtinguer ſi elle excede celle qui convient à la Lune Dichotome : cela eſt établi parmi les Aſtronomes qui ſe ſont le plus exercés à ce genre d'obſervation, & l'on peut s'en convaincre auſſi par le raiſonnement, comme il ſuit. Car dans le Chapitre où l'on a traité des Phaſes de la Lune, on a prouvé que le diametre de la Lune étoit à ſa partie éclairée du Soleil & qui nous eſt viſible, à très-peu de choſe près comme le diametre ou deux fois le rayon du Cercle, eſt au ſinus verſe de l'élongation de la Lune au Soleil. Mais on a prouvé auſſi dans le Chapitre où l'on a traité des Phaſes de Venus, que pour une plus grande exactitude il falloit prendre le rapport du diametre du cercle, au ſinus verſe de l'angle extérieur à la Lune, ou qui eſt extérieur au triangle formé par les trois lignes qui joignent les centres de la Terre, du Soleil, & de la Lune. Ainſi ſuppoſons qu'au véritable inſtant auquel la Lune paroîtra dichotome, l'angle *LST* ſoit de 15 minutes, alors comme le demi-diametre de l'orbite Lunaire eſt de 60 demi-diametres terreſtres, il s'enſuivra que la diſtance du Soleil à la terre ſeroit de 13758 demi-diametres terreſtres, ce qui étant établi. Soit premierement la Lune en quadrature au point *q*, c'eſt-à-dire, ſoit ſuppoſé l'angle *qTS* droit, l'angle extérieur du triangle à la Lune doit être en ce cas de 90 degrés 15′, dont le ſinus verſe ſera égal au rayon plus le ſinus de 15 minutes. C'eſt pourquoi on aura : comme le diametre du cercle eſt au rayon plus le ſinus de 15 minutes, ainſi le diametre de la Lune, eſt à ſa partie éclairée du Soleil qui ſeroit obſervée de la terre. Prenant donc la moitié des antécédens, on aura auſſi en diviſant : comme le rayon eſt au ſinus de 15 mi-

nutes, ainſi le demi-diametre de la Lune, eſt à l'excès dont ſa partie éclairée vue de la terre, doit ſurpaſſer ſon demi-diametre. Or le ſinus de 15 minutes eſt de 436 parties dont le rayon contient 100000, & le demi-diametre de la Lune étant de 15 minutes ou environ, ſi l'on fait : comme le rayon ou 100000 eſt à 436, ainſi 15 minutes ſont à un quatrieme terme; on trouvera un peu moins de 4 ſecondes : ainſi il eſt évident de-là que cette quantité ſera ſi petite qu'elle doit échapper aux obſervations, étant preſqu'inſenſible à notre égard : il eſt donc vrai de dire que la Lune étant en quadrature elle paroîtra ſenſiblement dichotome, puiſqu'alors ſa phaſe en doit différer d'une quantité ſi peu ſenſible. Partant ſi la Lune n'étoit jugée dichotome qu'au moment qu'elle eſt en quadrature, il s'enſuivroit que la diſtance du Soleil ſeroit infinie, puiſqu'en ce cas les angles SqT, STq étant droits, les lignes ST, Sq ſeroient paralleles, ou ne concourroient qu'à une diſtance infinie.

Suppoſons en ſecond lieu que l'élongation de la Lune au Soleil ſoit de 89° 30′, en ce cas l'angle extérieur à la Lune ſeroit de 89° 45′ étant égal aux angles STL, LST pris enſemble : or le ſinus verſe de 89° 45′ eſt égal au rayon moins le ſinus de 15 minutes, & parce que comme le rayon eſt au ſinus verſe de l'angle extérieur à la Lune, (c'eſt-à-dire, eſt au rayon moins le ſinus de 15 minutes) ainſi le diametre de la Lune, eſt à la partie éclairée du Soleil qui nous eſt viſible; en diviſant on aura : comme le rayon eſt au ſinus de 15′, ainſi le demi-diametre de la Lune de 15 minutes, ſera à la quantité dont le demi-diametre doit ſurpaſſer la partie éclairée qui nous eſt viſible, & qui n'excedera pas 4″, quoique dans un ſens contraire à ce qui a été trouvé ci-deſſus. Ainſi la phaſe de la Lune différant encore ſi peu de la phaſe dichotome, ſera facilement jugée dichotome, puiſqu'elle n'en différera pas

ſenſiblement. Si l'on a donc eſtimé ou établi en ce moment que la Lune étoit dichotome, il doit s'enſuivre (ſa diſtance à la quadrature étant de 30′) que le Soleil ſera éloigné de la terre de 6876 demi-diametres terreſtres.

Au reſte les obſervations des plus habiles Aſtronomes nous apprennent non-ſeulement que la Lune lorſquelle eſt éloignée de 30′ de la quadrature, paroît dichotome; mais même qu'étant en quadrature on ne ſçauroit pour lors appercevoir de différence entre le dichotome & la phaſe obſervée: il y a plus, Riccioli rapporte qu'ayant obſervé la Lune après la quadrature avec un excellent Téleſcope, elle paroiſſoit encore dichotome; c'eſt pourquoi on doit juger que cette phaſe eſt la même au moins pendant une heure. Mais parce qu'on ne ſçauroit manquer d'aſſigner d'une maniere vague aux divers inſtans d'un auſſi long intervalle de tems, la ſituation ou l'heure à laquelle la Lune a dû paroître dichotome, & que de chacun de ces inſtans on peut conclurre une infinité de diſtances du Soleil à la terre très-différentes les unes des autres, il s'enſuit donc que cette méthode ne ſçauroit nous faire connoître la vraie diſtance du Soleil.

On remarquera que quoiqu'on ſoit aſſez incertain de l'heure à laquelle la Lune paroît dichotome, ſçachant d'ailleurs que ce tems doit arriver un peu avant la quadrature, Riccioli a cru devoir choiſir le milieu du tems écoulé entre le moment auquel la phaſe a commencé à lui ſembler douteuſe, & le moment de la quadrature. Mais il eût bien mieux fait de prendre le milieu des deux inſtans auxquels les phaſes de la Lune étoient douteuſes, c'eſt-à-dire, le milieu entre l'inſtant auquel la Lune a ceſſé d'être en Croiſſant ou concave, & l'inſtant auquel elle a commencé à paroître convexe, puiſque ce dernier tems doit arriver un peu après la quadrature. De cette maniere il auroit conclu la diſtance du Soleil à la terre, (de même

que Vendelin) beaucoup plus grande qu'il ne l'a déduite de son calcul.

Au reste il n'est pas nécessaire de restraindre cette méthode uniquement à la phase de la Lune qui est dichotome ; car dans toute autre phase, soit avant ou après celle-ci, on peut également bien déterminer la distance du Soleil, c'est-à-dire, autant qu'il est possible d'y réussir en observant la Lune dichotome. Il suffit pour cet effet de déterminer avec un Télescope garni d'un Micrometre la phase de la Lune, & de mesurer au même instant l'arc de son élongation au Soleil, puisqu'on aura ainsi par observation la partie du demi-diametre éclairé de la Lune qui nous est visible. Or si cette partie est moindre que le demi-diametre, ou si elle l'excede, il en faudra prendre la différence ou l'excès, & l'on fera : comme le demi-diametre de la Lune est à la différence ou l'excès qu'on vient de trouver, ainsi le sinus total, à un quatrieme terme ; on connoîtra donc le sinus d'un angle, lequel étant ajouté au rayon, ou retranché selon le cas, fera connoître la juste valeur de l'angle extérieur à la Lune : mais puisqu'on sçait par observation l'angle à la terre, c'est-à-dire, l'élongation de la Lune, la différence entre l'angle extérieur & l'intérieur, sera par conséquent l'angle au Soleil. C'est pourquoi dans le triangle SLT connoissant tous les angles & le côté TL, on découvrira facilement la valeur du côté ST qui sera la distance de la terre au Soleil. Cependant on s'appercevra toujours qu'il est si difficile d'observer exactement la phase de la Lune, qu'il semble presqu'impossible de ne pas s'y tromper de quelques secondes ; d'où l'on voit que par cette méthode on ne peut gueres se flater de parvenir jamais à connoître avec quelque précision la distance du Soleil. Il faut avouer * néantmoins que par de semblables observations on s'est enfin assuré que la distance du Soleil à la Terre surpassoit de beaucoup 7000 demi-diametres terrestres.

* *Goth. Vendelini idæa Tabul. Atlant. Voyez aussi les Observations de Vendelin rapportées par Riccioli au III. Livre de son Almageste.*

Il est plus avantageux de rechercher les parallaxes de Mars & de Venus, si l'on veut connoître avec précision la parallaxe du Soleil.

La distance du Soleil étant donc si grande qu'il n'a pas été possible jusqu'ici de la bien déterminer, soit par les Eclipses, soit par les phases de la Lune, les Astronomes ont enfin tourné leurs vues vers d'autres objets, ayant tenté plusieurs fois de déterminer les parallaxes de la Planete de Mars ou de Venus, lesquelles étant une fois exactement connues, on n'ignoreroit plus celles du Soleil, ni par conséquent sa distance à la terre. En effet selon la Théorie des mouvemens de la Terre & des Planetes, il est facile de découvrir pour tel instant donné que ce soit, le rapport des distances du Soleil & d'une Planete à la Terre, les parallaxes étant toujours entr'elles en raison réciproque, ou dans la raison inverse de ces distances. Ainsi la parallaxe d'une Planete étant une fois donnée, il n'est pas difficile de découvrir celle du Soleil.

Lorsque Mars est Achronique, c'est-à-dire, en opposition au Soleil, cette Planete se trouve alors deux à trois fois plus proche de la terre que n'est le Soleil, & partant sa parallaxe doit être deux ou trois fois plus grande. De même Venus dans sa conjonction inférieure avec le Soleil, s'approchant environ quatre fois davantage de la terre que le Soleil, doit par conséquent augmenter en même raison sa parallaxe. Ainsi quoique la parallaxe presqu'insensible du Soleil ne puisse être observée selon les méthodes proposées ci-dessus, on la peut conclurre néantmoins des parallaxes de Mars ou de Venus, qui étant trois ou quatre fois plus grandes, peuvent être apperçues avec bien plus d'évidence. Or depuis plus d'un siecle les Astronomes ont déja recherché plusieurs fois la parallaxe de Mars: en France elle fut d'abord trouvée presqu'insensible par la comparaison que M. Picard fit de ses Observations avec celles de M. Richer qui fut envoyé à l'Isle de Cayenne en 1672. mais dans la suite * feu M. Cassini a cru devoir l'établir, soit par ses propres observations, soit en les comparant à d'autres

* *Voyez le Recueil des Observations & Voyages de l'Acad. publiés en 1693.*

d'autres qui avoient été faites en Cayenne d'environ $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{3}$ de minute, ce qui donne la parallaxe de Mars réduite à l'horiſon de $0'\ 25''$. Car ſuivant la méthode expliquée ci-deſſus, (pag. 437) Mars obſervé à l'Orient & à l'Occident du Méridien, parut avoir dans l'eſpace de huit heures un mouvement trop rapide, ou qui différoit du mouvement véritable de $1''\frac{3}{4}$ ou $2''$ de tems; d'où M. Caſſini a conclu la parallaxe horiſontale du Soleil de $9''\frac{1}{2}$, M. De la Hire qui l'obſerva la même année 1672 l'ayant établie de $6''$.

Par l'obſervation du paſſage de Venus ſur le diſque du Soleil, qui doit arriver l'an 1761. on pourra déterminer la diſtance, & par conſéquent la parallaxe du Soleil à une cinq-centieme partie près, * pourvu que l'obſervation en ſoit faite ſelon les circonſtances indiquées par M. Hallei, & que d'ailleurs le ciel permette qu'on obſerve Venus dans la Baie d'Hudſon vers le 56e degré de latitude Septentrionale, & dans les Indes Orientales, à Pondicheri ou à Madras. C'eſt peut-être à cette occaſion que la plupart des Auteurs modernes ont aſſuré que la parallaxe du So-

La différence des parallaxes du Soleil & de Venus, doit faire paroître, ſelon les divers lieux de la terre que l'on occupe, la Durée ou la Corde du paſſage de Venus ſur le Soleil, plus ou moins longue.

* La Parallaxe horiſontale du Soleil étant ſuppoſée de $12''\frac{1}{2}$, & par conſéquent celle de Venus de $43''$, il reſtera environ une demi-minute pour la différence des parallaxes horiſontales, ce qui doit donner (en ſuppoſant le Soleil au Zénit du Royaume de Pegou, au moment de la plus petite diſtance de Venus au centre de cet aſtre & conſervant d'ailleurs les hypotheſes communes) $\frac{1}{4}$ de minute ou $46''$ pour la quantité dont le mouvement apparent de Venus ſemblera s'accélérer, l'Obſervateur étant proche le Tropique du Cancer dans les Indes Orientales. Or Venus parcourant alors $4'$ par heure ſur le diſque du Soleil, $\frac{1}{4}$ de minute doivent répondre à environ $0^h\ 11'$, ce qui ſera la quantité dont la parallaxe doit faire paroître un peu trop courte la durée du paſſage de Venus ſur le diſque. D'un autre côté l'Obſervateur correſpondant, & qu'on ſuppoſe au cinquante-ſixieme degré de latitude boréale au Nord de l'Amérique, à peu près ſous le demi-cercle oppoſé du même Méridien, doit appercevoir Venus entrer ſur le Soleil un peu avant ſon coucher, & en ſortir quelque tems après ſon lever; de maniere que la durée du paſſage obſervé de cette Planete ſur le Soleil, lui paroîtra (à raiſon de $28''\frac{1}{2}$ pour la différence des parallaxes) plus longue d'environ 6 minutes que la véritable; & partant elle ſurpaſſera d'environ $17'$ celle qu'on obſerveroit vers l'embouchure Orientale du Gange. Or il eſt certain que ſi l'on conſtate, comme cela eſt poſſible, à $2''$ près le tems que le diſque entier de Venus emploie à parcourir le diſque du Soleil, comme il s'enſuivroit (de ce que chaque ſeconde de différence de parallaxe répond à $80''$ de tems, à raiſon de $12''\frac{1}{2}$ pour $0^h\ 17'$) qu'on ne commettroit tout au plus qu'une quarantieme partie de ſeconde d'erreur pour deux ſecondes de tems, on ne ſe tromperoit donc que d'une cinq-centieme partie ſur la diſtance ou la parallaxe, puiſque 40 fois $12\frac{1}{2}$ valent 500.

leil ſeroit inconnue juſqu'à ce tems-là, ſans ſe donner la peine d'examiner ſi par d'autres voies on n'y pourroit pas parvenir avec autant de certitude, ou du moins avec plus de facilité, puiſque dans les conjonctions inférieures de Venus au Soleil lorſque cette Planete eſt périgée (la terre étant au Périhélie, & Venus aux environs de ſon Aphélie) deux Obſervateurs placés ſous un même Méridien, ou à peu près, & à de très-grandes diſtances ſur la ſurface de la terre, ſeroient toujours en état de découvrir la parallaxe. Il faudroit tenter, par exemple, de comparer Venus au Méridien avec quelqu'Etoile qui paſſeroit à même hauteur dans la lunette immobile, ſoit d'un Quart-de-cercle mural, ſoit autrement, puiſqu'avec une ſemblable lunette de cinq à dix piés, garnie d'un Micrometre, il ne ſeroit pas impoſſible de découvrir juſqu'au double de la parallaxe de Venus. Car pour revenir à la Méthode de M. Hallei, où il s'agit de déterminer la parallaxe de Venus en obſervant ſon entrée & ſa ſortie ſur le diſque du Soleil, il eſt à propos de conſidérer, que non-ſeulement on y ſuppoſe de même que ci-deſſus, deux obſervateurs placés ſur la ſurface de la terre & à de très-grandes diſtances; mais que d'ailleurs ſi le Ciel n'eſt pas aſſez favorable dans chaque lieu, le jour du paſſage de Venus, il faudra néceſſairement recourir aux obſervations des jours précédens ou ſuivans, faites à la lunette immobile, comme on vient de le propoſer. C'eſt pour cette raiſon qu'on n'auroit point dû négliger juſqu'ici de rechercher les parallaxes de Venus aux tems de ſes conjonctions inférieures avec le Soleil, en l'obſervant dans un même lieu, tant au Méridien qu'à l'Orient & à l'Occident, n'étant pas abſolument difficile de meſurer en plein jour avec quelqu'inſtrument qui auroit au moins une de ſes Lunettes garnie d'un Micrometre, les diſtances de cette Planete à une Etoile fixe de la premiere grandeur. Il eſt vrai qu'auſſi-tôt après l'application des Lunettes d'ap-

proche aux Quarts-de-cercles, on a essayé plusieurs fois de mesurer les distances des Planetes au Soleil, mais il auroit été à souhaiter qu'au lieu d'y employer les ascensions droites en tems, on eût mesuré par de grands arcs (comme cela se pratiquoit en plein jour vers les plus grandes élongations, & particulierement à l'égard de la Planete de Mercure) les distances de Venus aux Etoiles fixes. De cette maniere on eût comparé cette Planete aux tems de ses conjonctions inférieures aux Etoiles, & non pas au Soleil, ce qui eût donné au lieu d'une différence, la parallaxe totale : ainsi on ne doit pas être étonné si pendant l'Eté de l'année 1681 * les observations réitérées que MM. Picard & Cassini firent séparément, ne nous ont point fait connoître cette parallaxe, puisqu'ils se contenterent uniquement de comparer Venus au Soleil par le moyen des Horloges à Pendules *. Enfin on pourroit se flater d'y réussir incomparablement mieux aujourd'hui par le moyen du Micrometre appliqué aux Lunettes d'un sextans monté sur un axe parallele à l'axe du monde, à peu près comme celui de M. Flamsteed, mais il faudroit principalement éviter le mouvement du premier mobile, en y employant une grosse horloge, comme il a été déja proposé.

* *Venus passoit alors dans le Parallele du Soleil, & s'étoit approchée des $\frac{1}{3}$ de la distance du Soleil.*

Avant la découverte du Telescope on ne pouvoit gueres être assuré de mesurer les distances des astres qu'à deux ou trois minutes près, ce qui a été cause que Kepler n'a pas assez diminué la parallaxe du Soleil ; car ne sçachant s'il falloit attribuer entierement aux erreurs des observations de Tycho, les divers résultats des distances observées de Mars aux Etoiles fixes, ce célebre Astronome n'a pu conclurre autre chose, sinon que la parallaxe de cette Planete au tems de son opposition ne pouvoit sur-

* *Atque adeò mirandum minimè si tantorum artificum multos & ingeniosos conatus, hactenus eluserit rei ipsius maxima subtilitas.* Hallcius *in Disquisit. de Paralll. solis, &c.*

passer $2'\frac{1}{2}$, ce qui donnoit celle du Soleil d'une minute ou environ.

La Parallaxe du Soleil selon l'opinion d'Horoxius & de M. Huygens.

Mais aussi-tôt qu'on est parvenu à déterminer les véritables diametres apparens des Planetes, & sur-tout ceux de Venus & de Mercure qui furent apperçus pour la premiere fois en 1631. & 1639. sur le disque du Soleil comme des corps opaques, c'est-à-dire, dépouillés de cette vive lumiere qui les environne, & qui augmente pour l'ordinaire un peu trop leur diametre apparent; Horoxius & M. Huygens ayant calculé sous quel angle l'œil placé dans le Soleil observeroit chaque Planete, ont établi les premiers la vraie parallaxe du Soleil d'un quart de minute.

Car ayant reconnu que le demi-diametre de Venus vu du Soleil, ne pouvoit paroître tout au plus dans ses moyennes distances que sous un angle de 15″, ils ont en même tems calculé celui de Mercure, qui s'est trouvé de 10″. Quant aux Planetes supérieures dont la lumiere est bien moins vive, il étoit aisé de connoître assez exactement sous quel angle leurs demi-diametres observés vers le tems de leur opposition, paroîtroient, vus du Soleil. Or celui de Saturne dans ses moyennes distances ne doit paroître, de même que celui de Mercure, que sous un angle de 10″, & celui de Jupiter, la plus grosse de toutes les Planetes, sous un angle de 20″ tout au plus. Ainsi les Astronomes du dernier siecle ont jugé par-là que le demi-diametre de la terre devoit tenir à peu près un milieu entre le plus grand demi-diametre vu du Soleil, qui est celui de Jupiter, & le plus petit demi-diametre qui répond à celui de Saturne ou de Mercure, & qu'ainsi il devoit être égal à celui de Venus, c'est-à-dire, d'environ 15″. Il est vrai qu'on s'est déterminé dans la suite à diminuer cette parallaxe de $2''\frac{1}{2}$, & qu'on a cru devoir la réduire, parce qu'on s'est imaginé qu'en supposant la parallaxe horisontale de 15″, il s'ensuivroit que la Lune dont le diametre

est environ le quart de celui de la terre, seroit plus grosse que Mercure, c'est-à-dire, une Planete secondaire plus grosse qu'une Planete du premier ordre; ce qui semble détruire en quelque maniere l'ordre & l'harmonie qui ont dû être établis dans le systeme du monde : mais si on la réduit à $10''$ *, il s'ensuivra que Venus destituée de Satellite, & qui est bien plus près du Soleil, seroit plus grande que la terre, laquelle, de même que les plus grosses Planetes, est accompagnée d'un Satellite aussi remarquable que la Lune. Ce calcul a besoin d'être un peu réformé, le diametre de Jupiter étant plus petit qu'on ne l'a supposé ci-dessus : d'ailleurs on sçait aussi que le diametre du Soleil dans ses moyennes distances, est de $32' 12''\frac{1}{2}$, & non pas de $30'\frac{1}{2}$, comme l'avoit établi M. Huygens : dès lors il ne s'ensuit plus, comme on le verra au Chap. XXVI. que la Lune soit plus grosse que Mercure, & que par cette raison il faille réduire la parallaxe horisontale du Soleil, qu'on pourroit donc supposer dorénavant de $15''$, jusqu'à ce qu'elle ait été constatée par des observations décisives.

Comme la méthode ancienne dont se servent les Astronomes pour calculer les Eclipses du Soleil, suppose qu'on ait déterminé par le calcul les parallaxes de la Lune, tant en longitude qu'en latitude, & que d'ailleurs il est toujours nécessaire que le lieu de la Lune observé (lequel doit être comparé au lieu calculé pour en déduire les défauts des Tables, & corriger par-là les Elémens qui servent à la Théorie) soit toujours réduit au lieu vrai, ou plutôt que le

Maniere de calculer les différentes parallaxes de la Lune, pour un tems donné quelconque.

* » Je ne sçai, dit M. Hallei dans les Transactions Philosophiques, N° 347. » pourquoi on voudroit opposer à ce que l'on vient d'établir ci-dessus, l'autorité » de ceux qui prétendent que la parallaxe est plus petite, s'étant fondés unique- » ment sur les vibrations du Pendule à secondes, puisque les observations en sont » trop incertaines pour en déduire la juste quantité d'aussi petits angles. Du moins » peut-on assurer que celui qui tentera de rechercher la parallaxe par cette mé- » thode, s'appercevra tantôt qu'elle n'est pas sensible, & tantôt que la différence » est dans le sens contraire à la parallaxe; d'où l'on tireroit une distance infinie, » ou même plus qu'infinie, ce qui seroit absurde, &c.

lieu calculé ſoit réduit au lieu vu ou apparent, ce qui ne ſe peut pratiquer que par le calcul des parallaxes ; il eſt à propos d'expliquer ici la méthode de déterminer ces différentes parallaxes, la parallaxe horiſontale de la Lune étant une fois donnée. Il faut donc rechercher par les Tables pour le moment propoſé, le lieu de la Lune réduit à l'écliptique : ſoit maintenant HO l'horiſon, HZO le Méridien, Z le zénit, EC l'écliptique où ſe rencontre d'abord, ſelon le calcul des Tables Aſtronomiques, le lieu de la Lune ſans aucune latitude, ſçavoir en L. On abbaiſſera du zénit Z, le cercle de latitude ZN perpendiculairement au plan de l'écliptique, & le point N ſera le nonantieme degré. Or puiſque l'aſcenſion droite du Soleil eſt donnée d'ailleurs, comme auſſi l'heure ou la diſtance Equatorienne du Soleil au Méridien, on pourra donc ſçavoir quel eſt le point de l'Equateur qui paſſe en même tems au Méridien, ce qui donnera l'aſcenſion droite du milieu du ciel, & par conſéquent le point de l'écliptique qui ſe trouve auſſi dans le Méridien. Connoiſſant donc ce point de l'écliptique, de même que l'angle ZEN de l'écliptique avec le Méridien (ce qui ſe peut déduire ou des Tables qu'on trouve toutes calculées dans les Auteurs, ou bien ſelon les méthodes expliquées dans le Traité de la Sphere) on aura par conſéquent la valeur de l'arc de l'écliptique EL. D'un autre côté la déclinaiſon $EÆ$ du point E, c'eſt-à-dire, du milieu du ciel, eſt donnée ; c'eſt pourquoi dans le Triangle rectangle ZNE, on connoît le côté ZE, comme auſſi l'angle ZEN; on connoîtra donc l'arc EN, comme auſſi le point N qui eſt le nonantieme degré, & l'arc ZN qui eſt ſa diſtance au zénit, dont le complément NA ſera la meſure de l'angle de l'écliptique & de l'horiſon. Mais parce que le lieu de la Lune L eſt donné, on connoîtra l'arc NL: ainſi dans le triangle rectangle ZNL, puiſqu'on connoît les côtés ZN, NL, on trouvera par

PLANCHE VIII. *Fig.* 10.

conséquent l'angle ZLN qui est l'angle parallactique, & la distance de la Lune au zénit ZL. On fera aussi comme le sinus total, est au sinus de l'arc ZL, ainsi la parallaxe horisontale de la Lune déduite des Tables Astronomiques, est à sa parallaxe de hauteur en L, qui par conséquent sera connue. Soit donc OL la parallaxe de hauteur, Om la perpendiculaire abbaissée du point O sur l'écliptique : dans le petit triangle LOm, qu'on peut bien supposer rectiligne, on connoît outre l'angle droit, le côté LO & l'angle OLm égal à l'angle parallactique ZLN; on pourra donc connoître la valeur de l'arc Lm ou la parallaxe en longitude, comme aussi l'arc Om qui sera la parallaxe en latitude que l'on cherche.

L'angle parallactique, ce que c'est.

En second lieu si la Lune a une latitude australe ou boréale, ensorte qu'on sçache quel est son lieu réduit à l'écliptique, qu'on peut supposer en L, cet astre se trouvant dans quelque point P du cercle de latitude LP; comme il arrive toujours que l'angle NLP sera droit, & que l'angle NLZ est déja déterminé, on aura donc la valeur de son complément ZLP; c'est pourquoi dans le triangle ZLP connoissant les deux côtés, sçavoir ZL déja trouvé, & LP qui est la latitude de la Lune, & de plus l'angle ZLP, on pourra donc calculer la valeur du côté ZP, comme aussi celle de l'angle ZPL. On fera ensuite comme le sinus total, est au sinus de l'arc ZP, ainsi la parallaxe horisontale de la Lune, à un quatrieme terme, qui étant représenté par Pq, sera la parallaxe de hauteur de la Lune dans le cercle vertical. Soit mené présentement l'arc qd parallelement à l'écliptique. Dans le petit triangle dPq, qui peut bien être considéré comme plan ou rectiligne, on connoît outre l'angle droit, le côté Pq, comme aussi l'angle dPq complément a deux droits de l'angle donné ZPL; on pourra donc calculer dans ce triangle la valeur du côté Pd parallaxe de latitude, &

celle du côté qd qui sera la parallaxe de longitude que l'on cherche. Il est à remarquer qu'à cause de la latitude de la Lune qui ne sçauroit excéder ses Limites, les paralleles, ou les arcs dq compris entre deux cercles de latitude, ne doivent pas différer sensiblement de l'arc de l'écliptique, compris entre les mêmes cercles de latitude.

CHAPITRE VINGT-TROISIEME.

La Théorie du mouvement annuel de la Terre.

Il est tems d'expliquer enfin les Théories particulieres des Planetes.

APRE'S avoir traité jusqu'ici de la situation, de la distance, & généralement de tout ce qui regarde les Planetes en général, après avoir, dis-je, expliqué les Phénomenes qui dépendent tant de leurs mouvemens propres, que du mouvement réel de la Terre, combinés l'un avec l'autre, nous allons considérer les Théories particulieres des mouvemens de chaque Planete, ce qui pourra servir à déterminer en même tems avec exactitude non-seulement leurs périodes & leurs distances au Soleil, mais encore la vraie figure & la position de leur orbite. C'est ainsi qu'on donnera dans les derniers Chapitres les différentes regles par lesquelles on pourra calculer pour tel tems donné que ce soit, leurs vrais lieux dans le Zodiaque. Mais parce que la Théorie générale des Planetes suppose qu'on connoisse le mouvement de la Terre, il est donc nécessaire de commencer par la Théorie de la Terre, qu'on nomme communément la Théorie du Soleil.

Elles dépendent de la Théorie de la Terre.

Le lieu de la Terre est toujours connu lorsqu'on sçait par observation le lieu apparent du Soleil.

On a fait voir dans le septieme Chapitre que le mouvement apparent du Soleil dans l'écliptique que l'on observe dans le cours de l'année, a pour origine le mouvement réel de la Terre autour du Soleil, & qu'ainsi le Soleil vu de la Terre paroît décrire dans le Ciel le même cercle, sçavoir l'Ecliptique, que la Terre paroîtroit décrire dans le

le même tems à un spectateur placé dans le Soleil. En effet le lieu de la Terre vu du Soleil, est toujours diamétralement opposé à celui que le Soleil nous paroît occuper dans l'Ecliptique; & partant lorsque le Soleil nous paroît en ♈, la terre est réellement en ♎: lorsque le Soleil est au ♋, la Terre est au ♑; d'où l'on voit que le lieu apparent du Soleil étant donné par observation, on aura toujours en y ajoutant 180°, le lieu que la Terre vu du Soleil paroîtra pour lors occuper dans son orbite.

Des points des Solstices & des Equinoxes.

Maintenant on doit considérer que l'Ecliptique coupant le cercle Equinoctial en deux points opposés, le Soleil paroîtra donc deux fois chaque année dans le cercle Equinoctial, sçavoir, lorsque par son mouvement apparent il sera parvenu à l'une ou l'autre Section de ces deux cercles, mais dans tout autre tems de l'année il en paroîtra décliner plus ou moins au Nord ou au Midi: or les deux points de la plus grande déclinaison, seront aussi ceux de l'Ecliptique qui se trouvent également distans de l'une ou de l'autre section en ♈ ou ♎, c'est-à-dire, qui en seront eloignés chacun de 90°. De plus lorsque le Soleil est dans l'un ou l'autre de ces points éloignés de 90° des points ♈ ou ♎, il paroît à peine changer sa déclinaison pendant plusieurs jours, & partant les jours sont alors sensiblement égaux les uns aux autres. On a donc nommé ces mêmes points qui sont chacun le commencement du ♋ & du ♑, *les points des Solstices*; de même qu'on a nommé les points d'♈ & de ♎, où se coupent l'Equinoctial & l'Ecliptique, *les points des Equinoxes*, parce que quand le Soleil s'y trouve, les jours sont alors égaux aux nuits, le Soleil étant douze heures au-dessus de l'horison, & douze heures au-dessous.

Comme le Soleil paroît continuellement emporté selon l'ordre des signes dans la circonférence de l'Ecliptique, & s'avancer par conséquent chaque jour d'environ

un degré vers l'Orient, il eſt évident qu'il ne s'arrête pas effectivement davantage dans les points des Equinoxes, que dans ceux des Solſtices, mais qu'il s'avance ou s'en éloigne dès l'inſtant même qu'il y eſt parvenu : ainſi quoiqu'on nomme communément le jour des Equinoxes, celui auquel le Soleil rencontre l'un ou l'autre point équinoctial, (le jour étant alors auſſi long que la nuit) cela n'eſt cependant exactement vrai, que lorſque le Soleil rencontre le point Equinoctial au moment de Midi, ce qui eſt un cas fort rare : car ſi le Soleil étoit à ſon lever, par exemple, au point Equinoctial du Printems, le ſoir à ſon coucher il ne ſeroit plus dans l'Equateur, mais plus au Septentrion d'environ douze minutes, & en ce cas ce même jour ſurpaſſeroit un peu les 12 heures, & conſéquemment la nuit n'auroit pas 12 heures entieres : la différence eſt néantmoins aſſez petite, pour être négligée, puiſqu'elle n'eſt ſenſible qu'avec des horloges bien réglées.

Méthode d'obſerver le moment de l'Equinoxe.

Voici la Méthode de trouver par obſervation l'inſtant des Equinoxes, en ſuppoſant que l'on connoiſſe d'ailleurs la latitude d'un lieu. Il faut obſerver d'abord le jour de l'Equinoxe, la hauteur méridienne du Soleil par le ſecours d'un Quart-de-cercle ou d'un Octans diviſé avec ſoin en degrés, minutes, &c. Si cette hauteur méridienne ſe trouve égale au complément de la latitude du lieu, ceſt-à-dire, à la hauteur de l'Equateur, l'inſtant du Midi ſera pour lors l'inſtant même de l'Equinoxe ; mais s'il y a quelque différence, ce ſera ce qu'on nomme la déclinaiſon du Soleil : on obſervera donc de la même maniere le jour ſuivant la hauteur méridienne du Soleil, & par conſéquent on en déduira pour le même jour à Midi ſa vraie déclinaiſon. Si les deux déclinaiſons ſont l'une Auſtrale & l'autre Boréale, l'Equinoxe répondra à quelques-unes des 24 heures écoulées entre le Midi de chaque jour d'obſervation : mais ſi ces deux déclinaiſons ſont

toutes deux ou auſtrales ou boréales, alors ou le tems de l'Equinoxe ſera déja paſſé, ou bien il n'arrivera qu'après le Midi du ſecond jour auquel on aura obſervé la hauteur méridienne du Soleil; or de ces deux déclinaiſons données, on peut déduire très-facilement le moment de l'Equinoxe * de la maniere ſuivante.

Je ſuppoſe que CAB repréſente un arc de l'Ecliptique, $ÆAQ$ un arc pris ſur l'Equateur, & que ces deux arcs ſe coupent en A: la déclinaiſon du Soleil déduite de la premiere obſervation étant repréſentée par $CÆ$, celle du ſecond jour ſera repréſentée par ED: c'eſt pourquoi CE ſera le mouvement *diurne* du Soleil dans l'Ecliptique, c'eſt-à-dire, l'arc que le Soleil parcourt d'un Midi à l'autre de chaque jour d'obſervations. Or dans le triangle ſphérique rectangle $CÆA$, on connoît l'angle A, c'eſt-à-dire, *l'Obliquité* de l'Ecliptique (comme nous l'avons enſeigné dans le vingtieme Chapitre) on connoît encore $CÆ$ qui eſt la déclinaiſon du Soleil obſervée; c'eſt pourquoi on connoîtra l'arc CA: mais dans le triangle ALD

PLANCHE VIII. *Fig.* 11.

* On eſt parvenu à découvrir le moment des Equinoxes par une voie incomparablement plus certaine, en y employant les aſcenſions droites des Etoiles, ſelon la méthode expliquée, *page* 388. Il eſt vrai qu'on a fait uſage un grand nombre de fois de l'autre Méthode dans les derniers ſiecles; de maniere qu'il en faudroit corriger les obſervations. Car depuis Regiomontanus juſqu'à Tycho, il n'a pas été poſſible de bien déterminer la hauteur du pole ou de l'Equateur, parce qu'on n'avoit point égard aux réfractions. Mais comment s'aſſurer aujourd'hui de déterminer les hauteurs abſolues? Le Soleil parcourt environ $23' \frac{1}{2}$ en déclinaiſon en 24^h aux tems des Equinoxes: ainſi lorſqu'on ſe trompe de $5''$ dans la déclinaiſon, il en doit réſulter une erreur d'environ $5'$ dans le moment de l'Equinoxe. N'eſt-il donc pas plus avantageux au lieu de la méthode des Anciens qu'on vient de rapporter ci-deſſus, d'y employer les aſcenſions droites? Si lorſqu'on compare les paſſages au Méridien du Soleil & d'une Etoile par le ſecours d'une Lunette immobile fixée vers l'Equateur, on trouve que c'eſt une opération plus délicate que d'obſerver ſuivant la méthode ordinaire, la hauteur méridienne du Soleil, il vaudroit mieux en ce cas prendre pour le moment de l'Equinoxe, un milieu entre les réſultats qu'on auroit déduits de l'une & l'autre Méthode. Mais outre qu'il ſemble au contraire que la méthode des Anciens eſt moins ſimple, puiſqu'elle ſuppoſe plus d'opérations, comme de connoître la hauteur du pole, de vérifier l'inſtrument au zénit ou à l'horiſon, de découvrir l'erreur de ſes diviſions, on y ſuppoſe d'ailleurs quelques élémens qui ne ſont pas aſſez connus, tels que les réfractions & la parallaxe du Soleil, ce que l'on peut éviter par la nouvelle méthode, d'autant que les conditions qu'il faut remplir ſont déja connues, ou du moins très-faciles à exécuter lorſqu'on s'y eſt bien préparé.

rectangle en *D*, étant aussi connu l'angle *A* & le côté *DE*, on pourra calculer la valeur de l'arc *AE*; & par conséquent l'arc *CE*, qui est la somme (ou la différence) des arcs *CA* & *AE*, sera le mouvement diurne du Soleil: on fera donc comme *CE*, est à *CA*, ainsi 24 heures seront au tems écoulé entre le Midi de la premiere observation, & le moment de l'Equinoxe: ainsi l'heure de l'Equinoxe se trouvera en ajoutant (ou en retranchant selon le cas) ce même tems au Midi de la premiere observation.

Les observations de l'Equinoxe servent à trouver la grandeur de l'année solaire.

Pour trouver la grandeur de l'année Tropique, c'est-à-dire, le tems que le Soleil, ou plutôt la Terre, employe à parcourir l'Ecliptique, on observera encore l'année suivante le moment de l'Equinoxe. Or le tems écoulé entre ces deux Equinoxes, sera la grandeur de l'année: on la nomme *Année Tropique**, parce qu'il faut que tout cet intervalle de tems s'écoule pour que chaque saison se rétablisse dans le même ordre qu'auparavant. On doit remarquer qu'il est fort difficile d'établir la grandeur de l'année par deux observations consécutives du même Equinoxe, & qu'ainsi on risqueroit de se tromper trop sensiblement dans le mouvement de la Terre: la raison en est évidente. La plus petite erreur commise dans les observations, se multiplieroit dans la suite à mesure qu'on supputeroit le vrai mouvement de la Terre pour un grand nombre d'années, d'où il pourroit arriver à la fin qu'on trouveroit une erreur très-sensible dans l'époque de son moyen mouvement. Voilà pourquoi les Astronomes choisissent plutôt, parmi le grand nombre d'Observations anciennes des Equinoxes qui nous ont été conservées, les deux plus éloignées l'une de l'autre qu'il est possible: & c'est ainsi qu'ils ont divisé tout ce tems écoulé entre deux Equinoxes par le nombre des révolutions du Soleil, ce qui a donné au quotient la vraie grandeur de l'année. Il est évident en ce cas que l'erreur des Observations, bien loin de se multiplier,

* *Au lieu d'observer l'Equinoxe, Meton détermina autrefois l'arrivée du Soleil au Tropique du Cancer par l'égalité des ombres observées avant & après le Solstice.*

diminue au contraire tellement, qu'elle peut devenir tout-à-fait insensible.

Les Astronomes ont enfin établi par cette méthode la grandeur de l'année Solaire de $365^j\,5^h\,48'\,57''$. Ce tems differe un peu de celui qui répond à la révolution de la Terre autour du Soleil, qu'on nomme *Année Anomalistique* ou *Périodique;* car la *Précession des Equinoxes* (que nous avons expliquée dans le huitieme Chapitre) ou si l'on veut, le mouvement rétrograde des points Equinoctiaux, est de $50''$ par année: or ce mouvement se faisant contre l'ordre des Signes, le Soleil doit donc paroître rencontrer les Equinoxes l'année suivante dans des points différens de ceux où il les a quittés, & par conséquent le Soleil n'aura pas encore achevé son cercle entier, ou plutôt son orbite, lorsqu'il sera de retour aux mêmes points des Equinoxes. Enfin l'année Anomalistique ou Périodique a été conclue de $365^j\,6^h\,9'\,14''$.

Grandeur de l'année Anomalistique.

Il est aisé de voir présentement que si le mouvement du Soleil étoit toujours égal, c'est-à-dire, que si la Terre parcouroit chaque jour autour du Soleil des arcs égaux en des tems égaux, le mouvement apparent du Soleil dans l'Ecliptique seroit toujours égal. Ainsi divisant 360° par $365^j\,5^h\,48'\,57''$, le quotient $59'\,8''$ seroit le mouvement diurne du Soleil; d'où l'on tireroit facilement le lieu apparent du Soleil dans l'Ecliptique pour tel tems de l'année qu'on voudroit, soit en construisant pour chaque jour des Tables fondées sur l'addition continuelle du mouvement diurne $59'\,8''$, soit par une regle de proportion, &c. mais les Observations Astronomiques nous ont fait connoître que le mouvement apparent du Soleil n'est point du tout égal, puisqu'il parcourt des arcs égaux de l'écliptique, tantôt plus vîte, & tantôt plus lentement. La différence s'apperçoit principalement dans la comparaison que l'on fait du tems que le Soleil employe à parcourir le demi-

Le mouvement du Soleil dans l'Ecliptique, est sujet à quelque inégalité.

Maniere de construire la Table des moyens mouvemens du Soleil.

cercle boréal de l'Ecliptique, avec celui qu'il met à parcourir le demi-cercle austral. Cette différence est d'environ huit jours, & l'arc boréal est celui que le Soleil parcourt dans le plus grand espace de tems, au lieu que ce devroit être le même espace de tems pour l'un & l'autre arc, si le mouvement du Soleil étoit toujours égal.

En un mot si l'on observe chaque jour le mouvement apparent du Soleil dans l'Ecliptique, c'est-à-dire son mouvement diurne, on le trouvera vers le commencement de Janvier d'environ $61'$ (& c'est alors que le mouvement diurne du Soleil est plus grand qu'en aucun autre tems de l'année); au contraire au premier Juillet le mouvement diurne sera le plus petit qu'on puisse observer, car on le trouvera d'environ $57'$.

Comment on peut trouver par observation le mouvement diurne du Soleil.

Pour trouver le mouvement diurne du Soleil, on se servira de la méthode suivante*. Soit l'Ecliptique CB, l'Equateur $\text{Æ}Q$, & l'intersection de ces deux cercles en A; on observera avec un Quart-de-cercle la hauteur

* Cette méthode ne sçauroit être d'aucun usage au tems des Solstices, parce que la variation du Soleil en déclinaison, est alors presque insensible. C'est pourquoi il vaut mieux préférer les ascensions droites aux déclinaisons du Soleil. Pour cet effet il faudra observer deux jours de suite les passages au méridien du Soleil & de quelqu'Etoile fixe dont la hauteur & l'ascension droite soient connues: & comme les Etoiles de la premiere grandeur s'observent avec des lunettes de 3 à 4 piés en plein jour, & même en plein midi, on choisira toujours l'Etoile qui passera au méridien le plus près de l'heure de midi qu'il sera possible, afin d'éviter par-là les plus petites erreurs qui pourroient se glisser ou dans le mouvement de la pendule, ou dans les observations de la révolution de l'Etoile au méridien. On fera donc comme le nombre d'heures, de minutes & secondes écoulées à la pendule pendant la révolution de l'Etoile fixe, est au nombre d'heures, minutes & secondes écoulées entre le passage du Soleil & de l'Etoile au méridien le premier jour de l'observation, (on se servira de la même regle pour le second jour) ainsi l'arc entier de l'Equateur $= 360°$, sera à la différence en ascension droite entre le Soleil & l'Etoile au moment de midi: il est évident que si l'Etoile a passé au méridien après le Soleil, il faudra ôter ce quatrieme terme trouvé, ou cette différence en ascension droite de l'Etoile & du Soleil, de l'ascension droite de l'Etoile, & l'on aura l'ascension droite AF du Soleil. On ajoutera au contraire ce quatrieme terme trouvé à l'ascension droite de l'Etoile, si l'Etoile passe avant midi: ainsi l'ascension droite du Soleil AF étant connue, dans le triangle rectangle AFG rectangle en F, l'angle A & le côté AF sont connus, c'est pourquoi on trouvera la longitude du Soleil AG. On connoitra de la même maniere le jour suivant la longitude du Soleil AM; & la différence des arcs AG, AM sera le mouvement diurne du Soleil.

méridienne du Soleil : & parce qu'on peut connoître la latitude du lieu, & par conſéquent que la hauteur de l'Equateur a été déterminée ; la différence, s'il y en a, entre la hauteur méridienne du Soleil & celle de l'Equateur, ſera la déclinaiſon du Soleil. Suppoſons le lieu du Soleil dans l'Ecliptique en G, & ſa déclinaiſon FG, on connoît dans le triangle rectangle GFA, le côté FG & l'angle A; on trouvera donc l'arc AG diſtance du Soleil au point des Equinoxes, c'eſt-à-dire, la longitude du Soleil, ou ſon lieu dans l'Ecliptique pour l'inſtant du midi auquel on aura fait cette obſervation. On répetera le jour ſuivant la même opération, & ayant trouvé par le moyen de la déclinaiſon ML l'arc AM, qui ſera la longitude du Soleil pour le moment de midi, la différence des arcs AG, AM, ſera l'arc de l'Ecliptique GM que le Soleil a parcouru dans un jour. Or l'on trouvera toujours cet arc plus ou moins grand, ſelon les différentes ſituations de la terre dans ſon orbite.

PLANCHE VIII. *Fig.* 11.

Les anciens Aſtronomes ne vouloient admettre d'autres mouvemens dans les cieux, que ceux qui ſe font dans la circonférence d'un cercle, & qui ſont réguliers ; c'eſt pourquoi pour expliquer cette inégalité apparente du mouvement du Soleil, ils avoient établi que la Terre décrivoit d'un mouvement toujours égal autour du Soleil, (ou que le Soleil décrivoit autour de la Terre, ce qui revient préciſément au même) un cercle Excentrique, c'eſt-à-dire, un cercle dont le centre étoit différent du centre de l'Ecliptique : car comme ils plaçoient le Soleil (ou la Terre) au centre de l'Ecliptique, le mouvement de l'aſtre dans la circonférence de l'Excentrique étant toujours égal, le centre de l'écliptique étoit donc différent du centre autour duquel ſe faiſoient les mouvemens égaux; ainſi le mouvement de la Terre (ou du Soleil) vu du centre de l'Ecliptique, devoit être en ce cas ſujet à une inégalité.

Hypotheſe des Anciens pour expliquer les inégalités du mouvement de la Terre.

PLANCHE VIII. *Fig.* 12.

Si l'on suppose que le cercle ♈♋♎♑ représente l'Ecliptique au centre duquel est le Soleil, que *MPNA* soit l'orbite de la Terre, & que le point *C* en soit le centre, on aura *CS* pour distance de ces deux centres, & c'est ce qu'on nomme l'*Excentricité*. On suppose ici que la Terre se meut toujours également dans son orbite, c'est pourquoi tous les angles décrits autour du point *C*, seront toujours proportionnels aux tems, & la Terre vue du point *C* paroîtroit avoir en *A* un mouvement parfaitement égal à celui qu'elle auroit en *P* : mais étant vue du centre de l'Ecliptique *S*, elle paroîtra se mouvoir plus lentement en *A* qu'en *P*, parce qu'on jugera qu'elle parcourt dans des tems égaux un arc plus petit vers *A* que vers *P* ; & partant la Terre étant en *A*, un Observateur qui apperçoit le Soleil en ♋, lui attribuera un mouvement plus lent, que lorsqu'elle sera parvenue en *P*, & que le Soleil lui paroîtra au ♑.

Ce que c'est que l'Excentricité.

Mais comme l'arc de l'Excentrique *NAM* surpasse un demi-cercle, & qu'au contraire *NPM* est plus petit que le demi-cercle, il est évident qu'il faut un tems bien plus long pour parcourir l'arc *NAM*, que l'arc *NMP* : or dans le tems que la terre parcourt l'arc *NAM*, le Soleil paroît alors parcourir le demi-cercle boréal de l'Ecliptique ♈♋♎ ; & enfin lorsque la Terre parcourt l'arc *MPN*, le Soleil paroît se mouvoir successivement dans la demi-circonférence australe de l'Ecliptique ♎♑♈, d'où il suit (comme il est aisé de le concevoir) que le Soleil doit nécessairement paroître moins de tems à parcourir l'arc austral, que l'arc boréal de l'Ecliptique.

Selon l'hypothese des Anciens, on peut calculer géométriquement l'excentricité & la position de la ligne des Apsides.

Selon cette hypothese on peut déterminer de la maniere suivante l'excentricité de l'orbite de la Terre, & la position de la ligne des Apsides. On observera, 1°. le vrai tems des deux Equinoxes du Printems & d'Automne. 2°. On déterminera encore par observation le lieu du Soleil

Soleil dans l'Ecliptique quelque tems après l'Equinoxe du Printems, ou avant celui d'Automne; & ce sera, par exemple en ☊, la Terre se trouvant pour lors en ♎. Lorsque la Terre est une fois au point *N* de son orbite, le Soleil paroît pour lors en ♈; ensuite la Terre étant parvenue en *L* ou en ♒, le Soleil paroîtra au ☊; enfin la Terre se trouvant en *M*, le Soleil paroîtra en ♎: on menera donc les lignes droites *SL*, *CL*, au Lieu de la Terre en *L*, & encore les lignes droites *CM*, *MN*, & *CN*, enforte que les lignes *CM*, *SL* se coupent au point *O*: or les observations du Soleil donneront l'angle ♈ *S* ☊ & son complément à deux droits ♒ *S* ♈; & parce que le tems écoulé entre les observations est donné, l'arc *LM* ou l'angle *LCM*, aussi-bien que l'arc *NAM*, qui sont proportionnels au tems, seront par conséquent connus. C'est pourquoi dans le triangle isoscelle *MCN*, l'angle *MCN* étant donné, on connoîtra par conséquent les angles de la base *M* & *N*, puisque l'un & l'autre est égal à la moitié du complément à deux droits de l'angle *MCN*; mais dans le triangle *MOS* on connoît par observation l'angle *MSO*, c'est-à-dire, ♈ *S* ♒; on trouvera donc l'angle *MOS*, puisqu'il est le complément à deux droits des angles connus *M* & *MSO*, & par conséquent on connoîtra aussi son opposé au sommet *LOC*. Qu'on suppose donc le rayon du cercle excentrique de 100000 parties, & l'on résoudra le triangle *LCO*, dans lequel on connoît les angles & le côté *LC*, qui est le rayon du cercle excentrique; d'où l'on tirera la valeur de *OC*, & par conséquent (puisque le rayon *MC* est égal au rayon *LC*) on connoîtra *MO*. Présentement dans le triangle *MOS* tous les angles & le côté *MO* sont connus, on connoîtra donc *OS*: enfin dans le triangle *SOC* les côtés *SO*, *OC*, sont donnés, comme aussi l'angle *SOC*, qui est le complément à deux droits de l'angle *SOM*, on connoîtra donc l'excen-

tricité SC & l'angle OSC, auquel ajoutant l'angle MSO, on aura l'angle MSA, ou l'arc $\Upsilon ☊$, distance de l'Aphélie au point de l'Equinoxe du Printems, ce qui détermine la position de la ligne des Apsides.

Voilà la méthode dont se sont servis les anciens Astronomes, & d'où ils tiroient l'excentricité SC de 3450 parties, dont le rayon de l'excentrique en contiendroit 100000 : nous allons expliquer comment ils calculoient le mouvement ou le Lieu du Soleil pour un tems donné quelconque.

Soit AP la ligne des apsides dont la position a été déterminée sur l'orbite de la Terre, l'aphélie A, & la Terre en L, son mouvement étant toujours considéré comme égal & uniforme dans la circonférence d'un cercle. Cela posé l'arc AL ou l'angle ACL sera proportionnel au tems, & c'est ce qu'on nomme l'*Anomalie moyenne de la Terre*; & l'arc de l'Ecliptique $☊ ♒$ ou l'angle ASL s'appelle *Anomalie vraie*. Or l'anomalie moyenne AL étant donnée, son sinus LQ sera par conséquent connu, aussi-bien que son cosinus QC: mais à ce cosinus il faut ajouter l'excentricité donnée, ainsi leur somme sera la ligne SQ : on fera donc, Comme SQ, est à LQ, ainsi le rayon est à la tangente de l'angle QSL, dont on connoîtra par conséquent la valeur; ou bien on fera comme il suit. Dans le triangle SCL, les côtés SC, CL & l'angle SCL (qui est le complément à deux droits de l'anomalie moyenne) sont donnés, on connoîtra donc LSC, ou LSA, qui sera l'anomalie vraie, ce qui se trouve ordinairement en faisant ; comme $CL+CS$, est à $CL-CS$, ainsi la tangente de la moitié de l'angle LCA, à un quatrieme terme, qui sera la tangente de la moitié de la différence des angles CSL & CLS: or il faut remarquer que comme SC & CL sont toujours donnés, & que ce sont deux quantités constantes, la différence des logarithmes

des quantités $CL + CS, CL - CS$, ſera toujours une quantité conſtante : c'eſt pourquoi ſi on l'ajoute continuellement à la tangente logarithmique de la moitié de l'angle LCA qui eſt variable, on aura par une méthode plus facile la tangente logarithmique de la moitié de la différence des angles CLS & CSL : mais puiſqu'on connoît leur ſomme (égale à l'angle LCA) on connoîtra donc l'angle LSA qui détermine le lieu de la Terre dans l'Ecliptique vu du Soleil, & par conſéquent le point qui lui eſt diamétralement oppoſé ou qui en eſt éloigné de 180 degrés, ſera le vrai lieu du Soleil vu de la Terre.

On remarquera que dans le premier demi-cercle d'anomalie, ſçavoir ALP, l'anomalie moyenne ACL ſera toujours plus grande que l'anomalie vraie ASL, car l'angle extérieur ACL eſt toujours plus grand que l'intérieur oppoſé ASL du triangle CLS : & ſi de l'anomalie moyenne ACL, on ôte l'angle CLS, le reſte ſera l'angle LSC, c'eſt-à-dire, l'anomalie vraie. Au contraire dans le ſecond demi-cercle d'anomalie PRA, l'anomalie moyenne ſera toujours plus petite que l'anomalie vraie; car ſoit ſuppoſée la Terre en R, l'anomalie moyenne de l'arc APR, ou plutôt de l'arc PR (laiſſant à part le demi-cercle AMP) ſera ou l'arc PR, ou l'angle PCR, qui eſt toujours proportionnel : mais l'anomalie vraie (laiſſant toujours à part le demi-cercle) eſt l'angle PSR lequel eſt égal aux deux intérieurs PCR & CRS ; c'eſt pourquoi ſi à l'anomalie moyenne PCR, on ajoute l'angle CRS, on aura l'anomalie vraie PSR, & par conſéquent le lieu de la Terre dans l'Ecliptique. Les Aſtronomes ont appellé les angles CLS ou CRS *Equations*, ou *Proſthapheréſes*, parce qu'il faut tantôt les ajouter, & tantôt les ôter du mouvement moyen de la Terre pour avoir ſon mouvement vrai.

Ce que c'eſt que l'Equation ou la Proſthapheréſe.

Il eſt certain que cette Théorie des Anciens s'accordoit aſſez bien avec leurs obſervations du Soleil ; mais ces

observations n'étoient pas alors fort exactes, leurs instrumens étant fort grossiers en comparaison de ceux dont on se sert aujourd'hui; & d'ailleurs les mouvemens des autres Planetes ne s'accordoient plus avec cette Théorie, ainsi que Ptolomée en est convenu. Mais ce qu'ils ignoroient, & ce que l'on n'a découvert que depuis environ un siecle, c'est le rapport des diametres apparens du Soleil qu'on trouve de 31′ 29″ dans l'aphélie, & de 32′ 33″ dans le périhélie. Or la théorie des Anciens ne s'accorde plus avec ces observations, & par conséquent cette Théorie est bien éloignée d'être la véritable, comme il va être prouvé tout à l'heure; car les distances apparentes du Soleil sont entr'elles réciproquement comme les distances véritables de cet astre à la Terre. C'est pourquoi la vraie distance du Soleil à la Terre au tems de l'aphélie, seroit à sa distance au tems du périhélie, comme 1953″, est à 1889″. Mais pour que la Théorie des Anciens fût vraie, la distance de la Terre au Soleil en aphélie, devroit être à la distance de la Terre au Soleil dans le périhélie, comme 10345 à 9655, ce qui donne un rapport beaucoup plus grand que celui qu'on vient de déduire des diametres ou des distances apparentes du Soleil; puisqu'il s'ensuivroit de l'hypothese des Anciens que si l'excentricité étoit de 345 parties dont le rayon du cercle excentrique seroit 10000, en supposant le diametre du Soleil au temps du périhélie de 32′ 33″, il faudroit que le diametre du Soleil au temps de l'aphélie parût sous un angle de 30′ 22″, ce qui est manifestement contraire aux observations. Il a donc fallu conclurre qu'une Théorie qui suppose une si grande excentricité, ne pouvoit être que fort éloignée de la véritable; ensorte qu'il faudroit réduire à la moitié, l'excentricité des Anciens pour représenter les diametres apparens du Soleil tels qu'on les observe dans l'aphélie & dans le périhélie. Mais d'un autre côté cette

excentricité ne repréſenteroit plus dans cette même hypotheſe les mouvemens apparens du Soleil, tels qu'on les obſerve. Car dans la ſuppoſition que le centre du cercle excentrique ſeroit le même que le centre du moyen mouvement de la Terre; c'eſt-à-dire, que le centre d'où l'on apperçevroit ce mouvement toujours égal ou uniforme, on a trouvé par les obſervations du Soleil, que les Equations ou Proſthapheresſes ſont deux fois plus grandes qu'il n'étoit pas poſſible de les déduire dans l'hypotheſe ancienne, en ne prenant plus que la moitié de l'excentricité; d'où il ſuit que cette Théorie eſt néceſſairement fauſſe, & que par conſéquent elle a dû être rejettée auſſi-tôt qu'on eſt parvenu à déterminer avec quelque préciſion les diametres apparens du Soleil.

Kepler a corrigé la Théorie des Anciens.

C'eſt préciſément ce qui fut remarqué par le fameux Kepler, qui s'eſt aviſé le premier de couper en deux l'excentricité, enſorte que le centre du cercle Excentrique fût en *D*, au milieu de l'eſpace compris entre le Soleil, & le point *C*, d'où le mouvement de la Terre doit paroître à peu près égal ou uniforme. Car le point *C* qui ſe trouve en ce cas éloigné du centre du cercle Excentrique, de la moitié de l'Excentricité totale qu'admettoient les Anciens; ce point *C*, dis-je, peut-être regardé comme le centre du moyen mouvement, d'autant que le Spectateur qui y ſeroit placé, appercevroit en effet le mouvement de la Terre à peu près égal, ou moyen, entre le mouvement le plus rapide & le plus lent qu'elle paroît décrire dans l'Ecliptique, lorſque l'œil eſt au point *S*.

A la vérité Copernic & tous les anciens Aſtronomes ont regardé en quelque maniere comme une choſe abſurde de vouloir ſuppoſer un mouvement à la Terre, qui ſe feroit dans la circonférence d'un cercle dont le centre ne ſeroit pas le même que le centre du moyen mouvement; parce qu'il s'enſuivroit de-là que la Terre parcourroit

La terre ne ſe meut point dans la circon-

férence d'un cercle, mais son orbite est une Ellipſe.

néceſſairement d'un mouvement inégal la circonférence de ſon orbite, contre l'opinion ou axiome autrefois généralement reçu, que les mouvemens des corps céleſtes ſont toujours égaux & uniformes. Mais Kepler ayant conſulté les plus récentes & les plus exactes obſervations Aſtronomiques, & principalement celles de Tycho, parvint enfin à démontrer que Mars & les autres Planetes ne parcouroient point la circonférence d'un cercle, mais que leur orbite étoit une ellipſe dont le Soleil occupoit un des foyers; d'ailleurs que la Planete de Mars ne parcouroit point la circonférence de l'Ellipſe d'un mouvement égal, mais qu'elle étoit aſſujettie à une loi générale, ſçavoir, qu'un rayon tiré de la Planete au Soleil, devoit parcourir conſtamment des *Aires Elliptiques* proportionnelles aux tems; ce qui faiſant une loi générale pour les autres Planetes, conduiſoit néceſſairement à conclurre que la Terre ſuivoit la même loi en ſe mouvant autour du Soleil dans la circonférence d'une Ellipſe. Or cette Théorie s'eſt trouvée entierement conforme aux obſervations; mais il s'en eſt ſuivi dès-lors qu'il n'y a en effet aucun centre du mouvement égal ou uniforme, c'eſt-à-dire, d'où les Planetes puiſſent paroître parcourir des *angles proportionnels aux tems*. Voilà pourquoi pluſieurs Aſtronomes (encore attachés à l'opinion des Anciens, en ce qu'ils vouloient abſolument ſuppoſer un centre du mouvement égal) ont rejetté trop facilement la Théorie de Kepler, ayant toutefois conſervé à l'orbite de la Terre, la figure Elliptique qu'ils n'ont pu ſe diſpenſer d'admettre. Et parce que dans l'axe d'une Ellipſe on trouve toujours deux points qu'on nomme foyers, & qui ſont chacun également éloignés du centre de l'Ellipſe; ils ont ſuppoſé le Soleil à l'un de ces deux foyers, ayant conſidéré l'autre foyer, lequel eſt éloigné du Soleil du double de l'Excentricité, comme le centre du mouvement égal: c'eſt ainſi qu'ils ont voulu

que les Planetes décriviſſent autour de ce ſecond foyer des angles proportionnels aux tems ; ce qui véritablement ne peut cauſer d'erreur bien ſenſible dans les Ellipſes qui ſont peu excentriques, comme Kepler en convient lui-même, & comme on le démontrera dans la ſuite. La plus grande difficulté qui ſe rencontroit dans la Théorie de Kepler, c'étoit de trouver par une méthode directe & géométrique l'anomalie vraie de la Planete toutes les fois que l'anomalie moyenne étoit donnée ; car Kepler & les autres Aſtronomes n'ont point réſolu ce problême, & c'eſt peut-être encore pour cette raiſon que ces derniers ſe ſont principalement attachés à l'autre Théorie dont nous venons de parler. Mais quelques hypotheſes que les plus célebres Aſtronomes aient imaginées depuis Kepler, elles ſe ſont toujours trop écartées des loix de la Phyſique ; au lieu que la ſeule Théorie de Kepler s'y eſt trouvée entierement conforme, & a toujours répondu aux meilleures obſervations Aſtronomiques. Ainſi quoiqu'on n'ait encore fait uſage d'aucune méthode directe * pour trouver l'anomalie vraie des Planetes, l'anomalie moyenne étant donnée, on ne doit pas pour cela rejetter la Théorie de Kepler ſi conforme aux loix de la nature. Nous allons donner dans le Chapitre ſuivant la ſolution de ce fameux Probleme.

* Il y a environ vingt ans que M. Herman ayant trouvé une ſolution nouvelle de ce Probleme, l'a propoſée dans le premier Volume des Mémoires de l'Académie de Pétersbourg, où il expoſe en même tems ce qui a été publié avant lui à ce ſujet : il dit d'abord que Wren a été le premier qui ait tenté de réſoudre ce Probleme d'une maniere directe, l'ayant conſtruit par le moyen de la cycloide ; qu'enſuite M. Newton a donné une conſtruction à peu près ſemblable dans le Ier Liv. des Princ. Math. de la Phil. Nat. mais qu'à cauſe de la difficulté de décrire la Courbe qu'il propoſe, il a enſeigné aux Aſtronomes une approximation, en y employant la Méthode des ſuites infinies, comme on l'expliquera tout à l'heure : en quoi il a été ſuivi par Gregori & par Keill, &c. Quand l'excentricité de l'orbite de la Planete eſt très-petite, M. Herman fait voir qu'on peut calculer tous les angles au foyer de la Planete par la ſeule réſolution de deux Triangles rectilignes ; ainſi le Probleme de Kepler n'a aucune difficulté lorſqu'il s'agit d'orbites auſſi peu excentriques que celles de la Terre ou de Venus : mais la petite erreur qui en réſulte dans le calcul des autres orbites, & principalement dans celle de Mars & de Mercure qui ſont les plus excentriques, ſe peut facilement corriger en y employant l'approximation donnée par M. Newton, on en donnera ci-après quelques exemples, les calculs étant beaucoup trop longs lorſqu'on ſuit uniquement ce qui en a été propoſé par Keill ou par Gregori.

CHAPITRE VINGT-QUATRIEME.

Du mouvement des Planetes dans une Ellipſe, & ſolution du Probleme de Kepler, où l'on propoſe de couper l'aire Elliptique en raiſon donnée.

KEPLER eſt le premier qui ait démontré, 1°. Que toutes les Planetes parcouroient la circonférence d'une orbite qui n'eſt point circulaire, mais Elliptique, & au foyer de laquelle ſe trouve perpétuellement le Soleil. 2°. Que le mouvement des Planetes s'accéléroit & ſe rallentiſſoit de maniere que le rayon tiré de la Planete au centre du Soleil, parcouroit toujours des aires Elliptiques proportionnelles aux tems employés à parcourir ces eſpaces.

Cette admirable découverte du ſçavant Kepler, eſt due principalement aux obſervations du fameux Tycho, & l'on doit être d'autant plus diſpoſé à la recevoir, que c'eſt par ſon ſecours que M. Newton nous a dévoilé les loix générales qui s'obſervent dans le vrai ſyſteme du monde, c'eſt-à-dire, la vraie Phyſique des corps céleſtes ſi long-tems ignorée de tous les Philoſophes.

Dans les Planetes les quarrés des tems périodiques ſont entre eux comme les cubes de leurs moyennes diſtances au Soleil.

Les obſervations des mouvemens céleſtes ont fourni à Kepler la démonſtration de la loi ou regle ſuivante. *Dans toutes les Planetes les tems Périodiques ſont entr'eux comme les racines quarrées des cubes de leurs moyennes diſtances au Soleil*, ou comme les racines quarrées des cubes des grands axes de leurs Ellipſes, puiſque ces grands axes ſont toujours doubles des diſtances moyennes; ou bien encore dans les Planetes *les Quarrés des tems Périodiques ſont entr'eux comme les cubes des grands axes*. De ſorte que ſi dans deux Ellipſes différentes on nomme chacun des grands axes A & a, les tems périodiques de la révolution de chaque Planete T & t, on

on aura toujours $T^2 : t^2 :: A^3 : a^3$; & par conſéquent $T : t :: A^{\frac{3}{2}} : a^{\frac{3}{2}}$.

Les aires Elliptiques parcourues dans un même temps, par différentes Planetes, ſont entre elles en raiſon ſoudoublée des parametres de chaque Ellipſe.

D'où il ſuit que dans deux Ellipſes différentes deux aires quelconques étant ſuppoſées parcourues dans le même tems ou dans des tems égaux, ces aires ſeront entre elles en raiſon ſoudoublée des Parametres de ces Ellipſes, ce que l'on démontre en cette maniere. On ſçait que c'eſt une propriété générale pour toutes les Ellipſes, que les aires ſoient entre elles comme les rectangles des deux axes ; c'eſt-à-dire, que ſi on nomme les axes de la plus grande Ellipſe A & M, & ceux de la plus petite a & m ; on aura toujours, l'aire de la plus grande Ellipſe, eſt à l'aire de la plus petite, comme $A \times M$ eſt à $a \times m$; ainſi au lieu des aires de deux Ellipſes, on pourra toujours ſubſtituer à leurs places les rectangles des deux axes, puiſqu'ils ſont toujours en même rapport. Je ſuppoſe préſentement qu'on nomme X l'aire décrite dans la grande Ellipſe en un tems quelconque, & qu'on nomme auſſi x l'aire décrite dans la petite Ellipſe préciſément dans le même tems ; ſi l'on nomme enfin le tems donné y, les Parametres des Ellipſes L & l, & les tems périodiques T & t ; il s'enſuit de la Théorie que nous venons d'expliquer, que

$$X : A \times M :: y : T$$

& de même $a \times m : x :: t : y$

donc en raiſon égale $X \times a \times m : x \times A \times M :: t : T :: a^{\frac{3}{2}} : A^{\frac{3}{2}}$

mais parce que le petit axe eſt moyen proportionnel entre le grand axe & le Parametre, on aura $M = A^{\frac{1}{2}} \times L^{\frac{1}{2}}$ & $m = a^{\frac{1}{2}} \times l^{\frac{1}{2}}$, & partant $X \times a^{\frac{1}{2}} \times l^{\frac{1}{2}} : x \times A^{\frac{1}{2}} \times L^{\frac{1}{2}} :: a^{\frac{3}{2}} : A^{\frac{3}{2}}$; donc $X \times l^{\frac{1}{2}} = x \times L^{\frac{1}{2}}$; & par conſéquent $X : x :: L^{\frac{1}{2}} : l^{\frac{1}{2}}$, c'eſt-à-dire, que dans deux Ellipſes quelconques les aires décrites dans le même tems ſont en raiſon ſoudoublées des Parametres : *C. Q. F. D.*

Ainſi la loi qu'obſervent les Planetes en parcourant leur orbite, étant de parcourir des aires égales dans des

tems égaux; il eſt néceſſaire qu'elles parcourent la circonférence de leurs orbites avec une viteſſe qui ne ſçauroit être uniforme, mais preſque toujours inégale; de ſorte que lorſque la Planete va du Périhélie à l'Aphélie, ſon mouvement paroîtra ſe rallentir de jour en jour: & lorſqu'elle va de l'Aphélie au Périhélie, ſon mouvement doit paroître au contraire s'accélérer continuellement, de maniere que le tems où la Planete ſe meut le plus lentement, eſt toujours celui où elle paſſe par ſon Aphélie, de même qu'au Périhélie elle ſe meut avec plus de rapidité que dans tout autre point de ſon orbite. Cependant nous remarquerons que ſa viteſſe eſt toujours réciproquement comme les perpendiculaires abbaiſſées du centre du Soleil ſur chaque ligne droite, qui paſſant par le lieu de la Planete, eſt en même tems la tangente de ſon orbite: ſoit DAF une Ellipſe dont le foyer eſt S: ſoient auſſi les arcs AB, ab parcourus dans deux inſtans quelconques, mais cependant les plus petits qu'il ſoit poſſible, étant d'ailleurs parfaitement égaux entre eux: les triangles SAB, sab étant égaux par la ſuppoſition, puiſque ce ſont les aires que le rayon de l'Ellipſe, mobile autour du point S parcourt dans des tems égaux, il eſt clair que ſi on abbaiſſe du foyer ſur les tangentes AP, ap, les perpendiculaires SP, sp, le triangle SAB ſera égal à $\frac{1}{2} SP \times AB$ de même que le triangle sab égal à $\frac{1}{2} sp \times ab$: c'eſt pourquoi $SP : sp :: ab : AB$: mais les lignes ab, AB, étant les eſpaces parcourus dans des tems égaux, ſont entre elles comme les viteſſes de la Planete; on aura donc, la viteſſe en a, ſera à la viteſſe en A, comme la perpendiculaire SP, eſt à la perpendiculaire sp.

PLANCHE VIII. *Fig.* 12.

Nous allons rapporter deux problemes ſur les mouvemens des Planetes, qui ont été réſolus par le célebre Géometre M. de Moivre.

THEOREME I.

SOit donnée un orbite Elliptique APB dont une Planete parcoure la circonférence à chaque révolution autour du Soleil, qu'on ſuppoſe immobile au foyer S: le centre de l'Ellipſe étant au point C, la moitié du grand axe ſera repréſentée par CB & celle du petit axe par CD: ſoit auſſi le ſecond foyer en F, & le lieu de la Planete pour un tems donné au point P: on tirera les droites SP, FP, & l'on aura ſuivant ce qui va être démontré, *la viteſſe de la Planete lorſqu'elle eſt en* P, *eſt à la viteſſe en* D *lorſqu'elle eſt parvenue à ſa diſtance moyenne au Soleil, en raiſon ſoudoublée de ſa diſtance* F P *au* 2^{d} *foyer de l'Ellipſe* F, *à ſa diſtance au Soleil* S P: car menant par le point P la tangente EPG, & abaiſſant de chaque foyer ſur cette tangente les perpendiculaires SE, FG, enfin menant encore une autre tangente DH qui touche l'orbite de la Planete au point D, & ſur laquelle on abaiſſera du foyer S la perpendiculaire SH; on aura, ſelon ce qui a été démontré ci-deſſus (ou ſelon le Corollaire de la premiere propoſition du premier Livre des Principes de Mathématiques de la Philoſophie de M. Newton) la viteſſe de la Planete en P, eſt à la viteſſe en D, comme SH ou ſon égale CD, eſt à SE; & par conſéquent le quarré de la viteſſe en P, ſera au quarré de la viteſſe en D, comme $\overrightarrow{CD}$ à $\overrightarrow{SE}$, c'eſt-à-dire (ſuivant la propriété connue de l'Ellipſe, $\overrightarrow{CD}$ étant égal à $SE \times FG$) comme $SE \times FG$ eſt à $\overrightarrow{SE}$, ou plus ſimplement comme FG à SE: mais les triangles équiangles SEP, FGP donnent, FG eſt à SE, comme FP eſt à SP; donc le quarré de la viteſſe en P, eſt au quarré de la viteſſe en D, comme FP, eſt à SP, & par conſéquent la viteſſe en P, eſt à la viteſſe en D, comme $\sqrt{FP}$, eſt à $\sqrt{SP}$. *C. Q. F. D.*

PLANCHE VIII. *Fig.* 13.

THEOREME II.

LEs mêmes choſes étant ſuppoſées, on aura encore *le Rayon, eſt au Sinus de l'angle SPE, comme* $\sqrt{SP \times FP}$, *eſt à CD.*

Car on a $\overline{SP} : SP \times FP :: SP : FP :: SE : FG :: \overline{SE} : SE \times FG :: \overline{SE} : \overline{CD}$. Donc en raiſon alterne $\overline{SP} : \overline{SE} :: SP \times FP : \overline{CD}$, & partant $SP : SE :: \sqrt{SP \times FP} : CD$: mais SP, eſt à SE, comme le Rayon, eſt au ſinus de l'angle SPE; donc le Rayon, eſt au ſinus de l'angle SPE, comme $\sqrt{SP \times FP}$, eſt à CD . . . *C. Q. F. D.*

PLANCHE VIII. *Fig.* 12. La viteſſe angulaire d'une Planete, c'eſt-à-dire, l'angle qu'une Planete parcourt autour du Soleil dans un inſtant donné, eſt toujours réciproquement en raiſon doublée de ſes diſtances au Soleil, c'eſt-à-dire, réciproquement comme les quarrés de ſes diſtances à cet aſtre. Soient, par exemple AB, ab, deux arcs d'une Ellipſe qu'une même Planete a parcourue en tems égaux; on décrira du centre S & des intervalles SB, sb, les petits arcs BE, be, & prenant ſur SB la partie Sm égale à Sb, on décrira l'arc mn, & l'on aura, la viteſſe angulaire au point b, eſt à la viteſſe angulaire au point B, comme l'arc be, eſt à l'arc mn: mais parce que le rapport de be à mn, eſt compoſé des rapports de be à BE, & de BE à mn, & que les triangles BSA, bsa ſont ſuppoſés égaux; on aura d'abord be eſt à BE, comme SB eſt à sb: on aura auſſi BE, eſt à mn (puiſque ce ſont des arcs ſemblables) comme SB eſt à sm, ou comme SB, eſt à sb; & partant la viteſſe angulaire au point b, ſera à la viteſſe angulaire au point B, en raiſon compoſée de SB à sb & de SB à sb, c'eſt-à-dire, comme le quarré de SB, eſt au quarré de sb.

Mais pour faire comprendre encore plus facilement les inégalités du mouvement des Planetes, & les différens

degrés dont leur mouvement s'accroît ou se rallentit, il est nécessaire de comparer le mouvement d'une Planete dans les divers points de son orbite, avec le mouvement d'un corps qui parcourroit la circonférence d'un cercle, d'un mouvement toujours égal & uniforme. Soit donc *AEBF* l'orbite d'une Planete, au foyer de laquelle se trouve le Soleil en *S*; soit *AB* le grand axe, *OQ* le petit axe : on décrira du centre *S* & de l'intervale *SE* (que je suppose moyen proportionnel entre *AK* & *OK*, c'est-à-dire, entre les deux demi-axes) le cercle *CEGF* dont la surface sera par conséquent égale à celle de l'Ellipse, comme cela est démontré dans les sections coniques. Supposons présentement qu'un corps céleste parcourre la circonférence *CEGF* d'un mouvement toujours égal, mais de telle sorte qu'il acheve sa révolution précisément dans le tems que la Planete parcourt la circonférence entiere de son Ellipse; dans cette supposition lorsque la Planete sera à son Aphélie au point *A*, le corps céleste que nous supposons emporté d'un mouvement toujours égal & uniforme, se trouvera pour lors dans la ligne des apsides au point *C*, & partant son mouvement représentera le mouvement égal, ou le moyen mouvement de la Planete, puisqu'il décrira autour du point *S*, des secteurs de cercles proportionnels aux tems, lesquels seront égaux aux aires Elliptiques que la Planete a dû décrire dans le même tems.

PLANCHE VIII. *Fig.* 14.

Supposons présentement que le secteur de cercle *CSM* représente le mouvement moyen de ce corps ou l'angle proportionnel au tems qu'il a dû décrire autour du point *S*; on prendra sur l'Ellipse l'aire *ASP*, égale à l'aire *CSM*, & le lieu de la Planete dans son orbite sera par conséquent au point *P*, d'où il suit que l'angle *MSD*, qui est la différence entre le mouvement vrai & le mouvement moyen de la Planete, sera l'*Equation* ou la *Prosthapherese* : mais l'aire *ACDP* sera égale au secteur *DSM*, c'est pourquoi l'aire

$ACDP$ eſt toujours proportionnelle à la Proſthapheresſe ou à l'Equation; d'où l'on voit que cette aire eſt la plus grande qu'il eſt poſſible, préciſément dans le lieu qui répond à la plus grande Equation. Or le lieu où l'Equation eſt la plus grande qu'il eſt poſſible, ſe trouve au point E, qui eſt la ſection commune du Cercle & de l'Ellipſe, puiſque ſi la Planete s'eſt avancée au-delà de ce point, comme en R, l'Equation devient alors proportionnelle à la différence des aires ACE & mER, ſçavoir $GBRm$; car ſoit pour lors V le lieu du corps qui parcourt la circonférence du cercle d'un mouvement toujours égal, on aura le ſecteur CSV égal à l'aire Elliptique ASR: c'eſt pourquoi retranchant ce qui eſt de commun à ces deux eſpaces, on aura l'aire ACE moins l'aire REm égale au Secteur VSm, c'eſt-à-dire, égale à l'Equation. Il eſt évident auſſi que dans le périhélie au point B, la ligne du mouvement moyen convient alors exactement avec la ligne du mouvement vrai, puiſque le demi-cercle CEG eſt égal à la demi-Ellipſe AEB.

Des vrais lieux auſquels arrivent les plus grandes Equations.

Mais quand la Planete s'avance au-delà du Périhélie B, alors ſon mouvement vrai anticipe toujours ſur ſon moyen mouvement. Soit donc l'angle GSZ proportionnel au tems, on prendra l'aire BSY égale au Secteur GSZ, & le point Y ſera pour lors le vrai lieu de la Planete dans ſon orbite; d'où l'on voit que l'angle BSY ſera plus grand que l'angle GSZ, & qu'ainſi l'aire $GBYL$ ſera égale au Secteur ZLS, c'eſt-à-dire, égale à l'équation: enſuite lorſque l'aire $GBYL$ ſera la plus grande qu'il eſt poſſible, ſçavoir, au point F qui eſt la commune interſection du cercle & de l'Ellipſe, ce point F indiquera encore le lieu de la plus grande Equation; enfin au point A la viteſſe de la Planete doit être plus petite qu'en tout autre point de ſon orbite, ſa diſtance au Soleil SA étant alors la plus grande qu'il eſt poſſible; après quoi cette viteſſe doit s'accélérer

Du lieu de l'orbite de la Planete où ſa viteſſe eſt la plus petite.

de nouveau, à mesure que la Planete s'éloignera du point *A*, mais elle sera continuellement moindre que la vitesse moyenne, jusqu'au point *E* qui est la commune section du cercle & de l'Ellipse. Ainsi ce n'est qu'à ce point *E* que la vitesse angulaire de la Planete peut devenir égale à la vitesse moyenne, ce qui se peut démontrer en cette maniere.... Lorsque la Planete est arrivée au point *E* de son orbite, soit supposé le corps céleste qui parcourt la circonférence du cercle avec une vitesse égale au moyen mouvement de la Planete, au point *m* de cette circonférence: soient aussi les aires *n S E* & *I S m* décrites autour du point *S* dans le plus petit instant: ces aires étant égales, on aura $h E \times E S = I m \times S m$; c'est pourquoi comme les lignes *S m* & *E S* sont égales, l'arc $E h = I m$, & partant l'angle *n S E* sera égal à l'angle *I S m*, c'est-à-dire, la vitesse, angulaire de la Planete au point *E* sera égale à la vitesse moyenne: on voit aussi qu'à mesure que la Planete s'approchera du périhélie, sa vitesse surpassera de plus en plus la vîtesse moyenne, & que par conséquent son mouvement doit s'accélerer chaque jour, puisque sa distance au Soleil diminue continuellement; qu'enfin cette vitesse sera la plus grande qu'il est possible au point *B*, qui est le lieu de son Périhélie; car c'est dans ce point que la Planete est le plus près du Soleil.

Du lieu où la vitesse de la Planete est égale à sa vitesse moyenne.

Mais la Planete s'avançant au-delà du Périhélie, & montant vers son Aphélie, il est clair qu'elle doit laisser derriere elle le corps céleste qui parcourt la circonférence du cercle avec une vitesse égale à son moyen mouvement; & quoique la vitesse de la Planete diminue peu à peu chaque jour à mesure qu'elle s'éloigne du Soleil, elle surpassera néantmoins la vitesse moyenne, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à l'intersection *F* où elle deviendra pour lors égale à celle du corps céleste qui parcourt la circonférence du cercle: enfin cette même vitesse doit continuer à se ral-

lentir jusqu'à l'Aphélie, où elle paroîtra la plus petite, comme nous l'avons exposé auparavant.

Ainsi puisque toutes les Planetes sont emportées dans les différens points de leurs orbites avec des vitesses inégales, & qu'il n'y a d'autre égalité dans leurs mouvemens autour du Soleil, que par rapport aux aires qu'elles décrivent, cette aire augmentant toujours uniformément & dans la même raison que les tems employés à les décrire ; il est donc absolument nécessaire, si l'onveut déterminer le lieu d'une Planete dans son orbite pour un tems donné, de pouvoir déterminer à chaque instant l'aire qui est proportionnelle au tems ; & pour cet effet nous allons résoudre le Probleme suivant.

PROBLEME DE KEPLER.

Trouver la position d'une ligne droite, dont l'extrémité étant fixe au foyer d'une Ellipse, se meuve autour de ce point, de maniere qu'elle parcoure à chaque instant de sa révolution, une aire qui soit à l'aire de toute l'Ellipse en raison donnée.

PLANCHE VIII. *Fig.* 15.

SOIT une Ellipse APB, dont on ait déterminé un des foyers comme S; il faut trouver la position d'une ligne droite SP qui coupe l'aire ASP, comprise entre deux lignes droites & une ligne courbe, ensorte que le rapport de cette aire soit toujours à l'aire de toute l'Ellipse, comme le tems périodique de la Planete qui parcourt la circonférence de l'Ellipse, est à un tems donné quelconque : il est aisé de voir que la position de cette ligne étant ainsi donnée, on connoîtra le point P qui sera le vrai lieu de la Planete pour le tems proposé. Ou bien soit le demi-cercle AQB décrit sur le grand axe de l'Ellipse, on propose de mener par le point S la droite SQ, laquelle coupe l'aire ASQ, ensorte que le rapport de cette aire, à l'aire

l'aire entiere du cercle, ſoit en raiſon donnée : or par le moyen de cette ſection du cercle, on trouvera facilement la ſection de l'Ellipſe que l'on demande, en abaiſſant du point Q la perpendiculaire QH ſur le grand axe de l'Ellipſe, puiſque cette perpendiculaire rencontrant l'Ellipſe au point P, on pourra tirer la ligne SP qui ſera celle que l'on cherche, comme auſſi le point P le vrai lieu de la Planete. En effet on démontre dans les ſections coniques que le demi-ſegment Elliptique APH eſt au demi-ſegment circulaire AQH, comme HP, eſt à HQ, c'eſt-à-dire, comme l'aire de toute l'Ellipſe, eſt à l'aire du cercle entier : mais le triangle SPH eſt au triangle SQH (par la premiere propoſition du ſixieme Livre d'Euclide) dans un même rapport que celui que nous venons de trouver ; donc l'aire Elliptique ASP, ſera à l'aire circulaire ASQ, comme l'aire totale de l'Ellipſe, eſt à l'aire du cercle entier, & en proportion alterne on aura, l'aire Elliptique ASP ſera à l'aire totale de l'Ellipſe, comme l'aire circulaire ASQ, eſt à toute la ſurface ou l'aire totale du cercle ; d'où l'on voit que ſi l'on ſçait une fois la méthode de mener par le point S une ligne droite qui puiſſe couper l'aire du cercle en raiſon donnée, il ſera fort aiſé de couper enſuite l'aire Elliptique telle qu'on la demande.

Kepler qui a propoſé le premier ce problême, n'a jamais pu trouver une méthode directe pour calculer le vrai lieu d'une Planete à tel point de l'orbite que ce ſoit, & même il dit expreſſément qu'il n'y en a point de directe pour déterminer le vrai lieu, c'eſt-à-dire, l'anomalie vraie d'une Planete pour un tems donné. Ainſi il a fallu que Kepler calculât ſucceſſivement pour chaque point de la circonférence AQB (en ſuppoſant connu l'arc AQ qu'il nomme l'*Anomalie de l'Excentrique*) non-ſeulement le tems qui répond à l'aire ASQ laquelle eſt proportionnelle à l'anomalie moyenne, mais encore l'angle ASP,

c'eſt-à-dire, le lieu de la Planete, ou plutôt ſon anomalie vraie ou coégalée qui répond au même tems. Ainſi parce que Kepler n'a pu réſoudre ce probleme géométriquement, la plupart des Aſtronomes ont penſé à d'autres hypotheſes moins conformes aux loix de la Phyſique, croyant que Kepler s'attachoit à ſes propres idées préférablement à une théorie géométrique. Car s'imaginant que toute l'Aſtronomie de Kepler, au défaut de géométrie, étoit fondée ſur une ſimple hypotheſe, ils s'en ſont écartés, ne voulant ſe ſervir que de méthodes directes. Pour cet effet ils ſe ſont imaginé un point dans l'orbite des Planetes, autour duquel devoit ſe faire un mouvement toujours égal, c'eſt-à-dire, autour duquel les angles du mouvement de la Planete devoient toujours être proportionnels aux temps. Or ſelon cette hypotheſe l'anomalie moyenne de la Planete étant donnée, il étoit facile de déterminer géométriquement l'anomalie vraie ou coégalée. Mais on a bientôt remarqué que les calculs fondés ſur cette ſuppoſition, ne s'accordoient point avec les obſervations; de maniere qu'on eſt enfin convenu qu'il n'eſt pas poſſible qu'il y ait un point fixe dans le plan de l'orbite d'une Planete autour duquel (en ſuppoſant des rayons tirés de ce point au centre de la Planete) ſon mouvement ſe repréſenteroit par des angles proportionnels aux tems. Il n'y a donc de vraie Théorie, ou qui s'accorde avec les mouvemens des Planetes, que celle de Kepler que nous avons expliquée ci-deſſus, enſorte que les Aſtronomes ſeront éternellement flatés de cette belle découverte de Kepler: auſſi ce grand Aſtronome en faiſoit-il tant de cas, qu'il a mieux aimé ne pas abandonner la méthode indirecte qu'il étoit obligé de ſuivre pour faire ſes calculs, que de rechercher une autre hypotheſe qui répugneroit aux loix de la Phyſique.

Mais afin que l'on ne puiſſe plus reprocher ce défaut de Géométrie aux Aſtronomes qui ſuivent l'hypotheſe de

Kepler, on va donner ici la méthode géométrique de couper l'aire d'une Ellipſe, ou, ce qui revient au même, celle d'un cercle en raiſon donnée.

Soit $A \overset{\frown}{Q} B$ un demi-cercle décrit ſur le grand axe d'une Ellipſe, & dont le centre ſoit en C; ſoit auſſi en S le foyer de l'Ellipſe qu'occupe le Soleil: on abaiſſera du lieu de la Planete ſur l'axe, la perpendiculaire QH qui coupera le cercle en Q, & de cette maniere l'aire $A S \overset{\frown}{Q}$, ſera à l'aire du cercle entier, comme le tems propoſé, eſt au tems périodique de la Planete. C'eſt pourquoi ayant mené $C \overset{\frown}{Q}$ prolongé (lorſqu'il eſt beſoin) pour y abaiſſer la perpendiculaire SF; on aura l'aire $A S \overset{\frown}{Q}$ égale au ſecteur $A C \overset{\frown}{Q}$ plus au triangle $CS \overset{\frown}{Q}$; c'eſt-à-dire, égale à $\frac{1}{2} C \overset{\frown}{Q} \times A \overset{\frown}{Q} + \frac{1}{2} C \overset{\frown}{Q} \times SF$; enſorte que l'aire $A S \overset{\frown}{Q}$ ſera toujours proportionnelle à l'arc $A \overset{\frown}{Q}$ + la ligne droite SF, & cela toutes les fois que la Planete deſcendra de ſon Aphélie vers ſon Périhélie; mais lorſqu'elle ira du Périhélie vers l'Aphélie, l'aire BSq ſera toujours égale au ſecteur BCq — le triangle CSq, & partant cette aire ſera toujours proportionnelle à l'arc Bq — la droite Sf; il eſt donc certain que ſi l'on prend toujours l'arc AN ou Bn proportionnel au tems, on aura $A \overset{\frown}{Q} + SF = AN$, ou $Bq - Sf = Bn$, & partant SF ſera toujours $= \overset{\frown}{QN}$, ou $Sf = qn$. PLANCHE VIII. *Fig.* 16.

Il eſt évident de-là que ſi à l'arc donné $A \overset{\frown}{Q}$ on ajoute toujours l'arc $N \overset{\frown}{Q}$ égal à SF, on aura l'arc $\overset{\frown}{AN}$ proportionnel au tems, c'eſt-à-dire, égal à l'anomalie moyenne; ainſi l'anomalie vraie d'une Planete étant donnée, on trouvera facilement l'anomalie moyenne, ou bien le tems qui lui répond; car on fera comme $\overset{\frown}{QC}$, eſt à SC, ainſi $57^{\circ},29578$ (valeur d'un arc égal au rayon), eſt à un quatrieme terme, & ce ſera la valeur d'un arc égal à SC en degrés & en parties décimales de degrés: on nommera ce même arc B; & parce que SC, eſt à SF, comme le rayon, eſt au ſinus de l'angle SCF ou ſon oppoſé au ſommet

Le Probleme de Kepler étant énoncé d'une maniere inverſe, n'eſt plus ſi difficile à réſoudre.

ACQ qui eſt donné, on fera comme le rayon, eſt au ſinus de l'arc AQ, ainſi l'arc B, à un quatrieme terme qui exprimera en degrés & décimales de degré, la valeur d'un arc de la circonférence AQB égal à la ligne SF; or puiſqu'on a démontré que SF étoit égal à l'arc QN, l'arc QN étant enfin connu, on aura donc la valeur de l'arc AN qui eſt proportionnel au tems.

Voici un exemple de cette méthode ſur la Planete de Mars. Soit donné le rapport de l'excentricité de cette Planete à ſa diſtance moyenne, ou ce qui eſt la même choſe, à la moitié de ſon grand axe, comme 14100 eſt à 152369, on trouvera le logarithme de l'arc B valeur de SC égal à 0.7244446; c'eſt pourquoi ſi l'on demande quelle eſt l'anomalie moyenne de cette Planete, lorſque l'anomalie de l'Excentrique eſt d'un degré, on ajoutera le ſinus du logarithme d'un degré; ſçavoir 8.2418553 au logarithme de l'arc B; & la ſomme ſera 8.9662999 logarithme du nombre 0°.092533 valeur de QN en décimales de degrés, & partant on aura l'arc AN proportionnel au tems de 1°,092533, ou de 1° 5′ 33″.

De même ſi l'anomalie de l'excentrique eſt 30°, & qu'on ajoute à ſon ſinus logarithmique, le logarithme conſtant de l'arc B, la ſomme ſera 0.4234146 qui ſera le logarithme du nombre 2°, 651; & par conſéquent l'anomalie moyenne AN, qui répond aux 30° d'*anomalie de l'Excentrique*, ſera 32°, 651, ou 32° 39′ 3″.

Cette méthode, quoiqu'indirecte, eſt bien plus ſimple & bien plus commode pour les calculs que celle de Kepler: car cet Auteur ne nous donne pour trouver l'anomalie vraie, l'anomalie moyenne étant donnée, qu'une méthode indirecte fondée ſur une regle de *fauſſe poſition*.

Mais venons enfin à cette méthode dont nous avons déja parlé tant de fois, puiſqu'il s'agit de découvrir directement l'anomalie vraie ou coégalée qui répond à

l'anomalie moyenne donnée. Soit dans la même figure, l'arc AN l'anomalie moyenne que l'on ſçait être toujours proportionnelle au tems; il s'agit de déterminer la valeur de l'arc AQ qui eſt l'*anomalie de l'Excentrique*. Pour cet effet je nomme y l'arc NQ, e le ſinus de l'arc AN, & ſon coſinus f; je nomme encore g l'excentricité SC: or le ſinus de l'arc AQ eſt égal au ſinus de l'arc $AN-NQ=$ au ſinus $AN-y$; & par conſéquent ſelon ce qu'on trouvera démontré dans la Trigonométrie, ſi le ſinus d'un arc AN eſt e, le ſinus de l'arc $AN-y$, c'eſt-à-dire, le ſinus de AQ ſera $\frac{e-fy}{1}-\frac{ey^2}{1.2.}+\frac{fy^3}{1.2.3.}+\frac{eya}{1.2.3.4.}$ &c. mais le rayon qui eſt 1, eſt au ſinus de l'arc AQ, comme $SC=g$, eſt à SF ou $NQ=y$, & partant SF ſera égal à $ge-\frac{gfy}{1}-\frac{gey^2}{1.2.}+\frac{gfy^3}{1.2.3.}+\frac{gey^4}{1.2.3.4.}$ &c. or SF eſt égal à l'arc NQ ou y, comme on l'a démontré ci-deſſus; on aura donc cette équation $y=ge-\frac{gfy}{1}-\frac{gey^2}{1.2.}+\frac{gfy^3}{1.2.3.}+\frac{gey^4}{1.2.3.4.}$ &c. & partant $ge=y+\frac{gfy}{1}+\frac{gey^2}{1.2.}-\frac{gfy^3}{1.2.3.}-\frac{gey^4}{1.2.3.4.}$ &c. ſi l'on fait préſentement $ge=z$, $1+gf=a$, $\frac{g}{1.2.}=b$, $\frac{gf}{1.2.3.}=c$, & enfin $\frac{ge}{1.2.3.4.}=d$ l'équation deviendra $z=ay+by^2-cy^3-dy^4$ &c. d'où l'on tire ſelon la méthode du retour des ſuites donnée par M. *Newton*, $y=\frac{z}{a}-\frac{bz^2}{a^3}+\frac{\overline{2b^2+ac}\times z^3}{a^5}-\frac{\overline{5abc-5b^3+a^2d}\times z^4}{a^7}$; & parce que $b=\frac{ge}{2}=\frac{z}{2}$ & $d=\frac{z}{1.2.3.4.}$ on aura $y=\frac{z}{a}-\frac{z^2}{2a^3}+\frac{cz^3}{a^4}-\frac{5cz^4}{2a^5}$ &c. ſi l'arc AN excede 90° ou bien s'il eſt moindre que 270°, alors ge ou $z=y-gfy+\frac{gey^2}{2.}+\frac{gfy^3}{2.3.}-\frac{gey^4}{2.3.4.}$. Or $a=1-gf$; on aura donc $y=\frac{z}{a}-\frac{z^2}{2a^3}-\frac{cz^3}{a^4}$.

Cette ſuite exprime la valeur de l'arc QN en parties dont le rayon eſt 1,000000: mais pour convertir ces parties en degrés, on fera, comme le rayon, eſt à cette

série, ainsi $57°,29578$ valeur d'un arc égal au rayon, à un quatrieme terme ; c'est pourquoi (puisque le rayon est l'unité) si l'on multiplie cette même série par le nombre $57°,29578$ qu'on peut nommer R, l'on aura l'arc y que l'on cherche en degrés & en décimales de degrés, cet arc étant égal à $\frac{Rz}{a} - \frac{Rz^3}{2a^3} + \frac{Rcz^3}{a^4}$ &c.

Le premier terme $\frac{Rz}{a}$ suffit dans presque toutes les Planetes pour déterminer l'anomalie de l'excentrique ; car dans la Planete de Mars l'erreur ne peut aller à la deux-centieme partie d'un degré ; & pour déterminer l'anomalie de l'excentrique de la Terre, l'erreur n'excede pas la dix-millieme partie d'un degré. Mais nous allons appliquer ceci à des exemples.

L'Excentricité de l'orbite de la Terre est 0.01691, en supposant la distance moyenne ou $CQ = 1.00000$. C'est pourquoi si l'on propose de trouver l'anomalie de l'Excentrique, & l'anomalie coégalée lorsque l'anomalie moyenne est $30°$, on a

Le Logarithme de l'Excentricité 8.2281436	$=$ log. deg
Le Logarithme du sin. de $30°$	9.6989700
Le Logarithme R	1.7581226
Le Logarithme Rz	9.6852362
Le Logarithme de a à soustraire	0.0063137

Le Logarithme de l'arc y ou NQ 9.6789225 & le nombre qui répond à ce Logarithme est $0.47744 = 28'38''$. Quant aux autres termes ils ne peuvent donner qu'environ la dix-millieme partie d'un degré, c'est pourquoi on peut les négliger : ainsi de $30°$ ôtant $28'38''$, reste l'arc AQ de $29° 31'22''$. Or dans le triangle QCS les côtés QC, CS sont connus, aussi-bien que l'angle SCQ ; c'est pourquoi l'on connoîtra l'angle QSC. Voici l'analogie qu'il faut faire comme $QC + CS$ ou AS, est à $CQ - CS$

ou PS, ainſi la tangente de la moitié de la ſomme des angles CSQ & CQS, à la tangente de la moitié de la ſomme de leur différence ; & partant ſi du Logarithme de la tangente de la moitié de la ſomme de l'angle ACQ, on ôte toujours le Logarithme conſtant 0.0146893, le reſte ſera la tangente de la moitié de la différence des angles CQS & CSQ, ſçavoir (dans cet exemple) 14° 17′ 26″, & l'ajoutant à la demi-ſomme des angles inconnus, on aura l'angle ASQ de 29° 3′ 7″. Mais pour trouver l'angle ASP (fig. 15.) il faut diminuer la tangente de l'angle ASQ dans la raiſon du petit axe au grand axe de l'Ellipſe : ainſi on ôtera du Logarithme de cette tangente, le Logarithme conſtant 0.0000622, ſçavoir le Logarithme qui exprime le rapport du grand axe au petit axe de l'Ellipſe ; & le reſte ſera la tangente du Logarithme de l'angle ASP de 29° 2′ 54″, c'eſt-à-dire, de l'anomalie vraie ou coégalée.

Maniere de réduire l'anomalie de l'Excentrique à l'anomalie vraie.

L'Excentricité de l'orbite de Mars étant de 14100, dont ſa diſtance moyenne au Soleil eſt 152369, & par conſéquent le Logarithme qui exprime le rapport de SC à CQ étant 8.9663226 = Logarith. de g, on demande, 1°. quelle eſt l'anomalie de l'Excentrique de Mars, lorſque l'anomalie moyenne eſt d'un degré :

Le Logarithme de l'Excentricité	8.9663226
Le Logarithme du ſinus d'un degré	8.2418453
Le Logarithme du Rayon	1.7581220
Le Logarithme de Rz	8.9662899
Le Logarithme de a à ſouſtraire	0.0384299
Le Logarithme de $\frac{Rz}{a}$	8.9278600

or le nombre qui répond à ce Logarithme eſt 0.08497, & c'eſt la valeur de l'arc NQ ſans qu'on puiſſe ſe tromper de plus d'une trente-millieme partie.

2°. On demande l'anomalie de l'Excentrique lorſque

l'anomalie moyenne eſt de 45°.

Le Logarithme de l'Excentricité .. 8.9663226
Le Logarithme du ſinus de 45° ... 9.8494850
Le Logarithme de R 1.7581220
Le Logarithme de Rz 0.5739296
Le Logarithme de a à ſouſtraire ... 0.0275249
Le Logarithme de $\frac{Rz}{a}$ ..... 0.5464047, qui répond au nombre 3°.5189 un peu plus grand que le vrai nombre qu'on cherche; mais l'excès ne va gueres qu'à la cent cinquantieme partie d'un degré: & ſi l'on veut corriger cette erreur, on prendra le ſecond terme *de la ſuite rapportée ci-deſſus*, ſçavoir, $-\frac{Ra+2Rc\times z^3}{2a^4}$, & l'on trouvera 0.0065 qu'on ôtera de 3°.5189, & le reſte 3°.5124 approchera plus du vrai arc NQ que l'on cherche, puiſque l'erreur n'ira pas à la cent-millieme partie d'un degré.

3°. Si l'on cherche l'anomalie de l'excentrique qui répond à 100° d'anomalie moyenne, dans ce cas $a=1-gf=0.983930$.

Le Logarithme de g 8.9663226
Le Logar. du ſin. de 100° ou 80° .. 9.9933515
Le Logarithme de R 1.7581220
Le Logarithme de Rz 0.7177961
Le Logarithme de a à ſouſtraire ... 9.9929598
Le Logarithme de $\frac{Rz}{a}$ ..... 0.7248363, auquel répond le nombre 5.3068, qui ſurpaſſe le nombre véritable de la cinquantieme partie d'un degré ou environ. Et ſi l'on veut corriger cette erreur, on prendra le double du Logarithme $\frac{z}{a}$ & on y ajoutera le Logarithme de $\frac{Rz}{a}$, ce qui donnera le logarithme de $\frac{Rz^3}{a^3}$ auquel répond le nombre 0.04552, dont la moitié 0.02276 ſera égale à $\frac{Rz^3}{2a^3}$, & par conſéquent ſi l'on ôte ce nombre de 5.3068, le reſte

reſte $5^{\circ}.2841$ ſera la quantité de l'arc NQ; & partant l'arc AQ qui eſt l'anomalie de l'Excentrique, ſera $94^{\circ}.7159$, qui differe à peine du véritable arc que l'on cherche de la dix-millieme partie d'un degré. Il faut cependant remarquer ici, que quoique le ſecond terme de la ſuite ſoit $\frac{-Ra+2Rc\times z^3}{2a^4}$, néantmoins ſa partie $\frac{-Rcz^3}{4}$ ſuffit pour avoir l'arc AQ, c'eſt-à-dire, l'anomalie de l'Excentriqueà une dix-millieme partie de degré.

Lorſqu'on connoîtra l'arc AQ ou l'angle ACQ, on trouvera l'angle ASQ en réſolvant le triangle QCS, dont on connoît les côtés CQ, CS, & l'angle compris QCS; c'eſt pourquoi on trouvera l'angle QSA: on en prendra la tangente logarithmique, & on en ôtera le log. conſtant qui exprime le rapport du grand axe au petit axe de l'Ellipſe, & le reſte enfin ſera la tangente logarithmique de l'angle ASP, c'eſt-à-dire, de l'anomalie vraie ou coégalée.

CHAPITRE VINGT-CINQUIEME.

Solution du Probleme de Kepler donnée par M. Newton : hypotheſe Elliptique de Wardus.

LA méthode que l'on vient de donner dans le Chapitre précédent pour réſoudre le Probleme de Kepler, & celle de M. Newton qu'on trouve dans le premier Livre des Princip. Mathém. de la Philoſ. pag. 101. ſont toutes deux fondées ſur le même principe, ſçavoir, que la droite SF eſt égale à l'arc QN. Or la méthode de M. Newton eſt preſque ſemblable à celle dont on ſe ſert dans l'analyſe pour extraire les racines des équations affectées; & partant on doit être porté à en faire d'autant plus d'uſage, qu'elle donne également bien les lieux des Plane-

tes, soit dans des orbites qui approchent assez de la figure d'un cercle, soit dans celles qui sont les plus excentriques: car elle peut toujours y être employée avec la même facilité, ce qui est important dans la recherche du mouvement des Cometes. Il est vrai qu'on pourroit y parvenir aussi par l'autre méthode expliquée ci-dessus, pourvu qu'au lieu de l'arc AN, on prît un autre arc bien plus approchant de l'arc AQ, qu'on pourroit nommer A, & qu'en supposant le sinus de l'arc $A=e$, on cherchât le sinus de l'arc $A+y$ & qu'on fît $z=ge+A-AN$.

PLANCHE VIII. *Fig.* 17.

Mais comme la méthode de M. Newton est beaucoup plus expéditive, nous allons l'expliquer en faveur de ceux qui voudront construire des Tables Astronomiques selon la vraie Théorie des mouvemens célestes, après avoir abandonné les anciennes hypotheses: cette méthode est très-facile, & leur sera sans doute d'un très-grand secours.

L'Auteur donne ici la solution du Probleme de Kepler publiée par M. Newton, avec une démonstration ou Commentaire qu'il a communiqué autrefois à la Société Royale d'Angleterre.

On a déja fait voir que si l'arc AQ est l'anomalie de l'Excentrique, cet arc joint à la droite SF qui est la perpendiculaire abaissée du Soleil sur le rayon QC, doit toujours être proportionnel au tems, quand la Planete va de l'aphélie au périhélie; ou que l'arc BQ moins la droite SF est proportionnel au tems, lorsque la Planete va du Périhélie à l'Aphélie: partant si l'on prend l'arc AN ou BN proportionnel au tems, l'arc QN sera égal à la droite SF, ainsi pour trouver en degrés & décimales de degrés la mesure d'un arc de la circonférence AQB, qui soit égal à la droite SF; on fera comme CQ, est à CS, ainsi l'arc de $57°,29578$ égal au rayon du cercle, à un quatrieme terme qui exprimera la grandeur d'un arc de la circonférence AQB égal à SC. Soit nommé B le logarithme de cet arc; & parce que CS, est à SF, comme le rayon, est au sinus de l'angle ACQ; on fera comme le rayon, est au sinus de l'angle ACQ, ainsi l'arc dont le logarithme est B, à l'arc D qui sera égal à SF. Partant si pour le moment don-

né l'aire ASQ & l'arc AN étoient proportionnels au tems, & qu'on prît NP égal à D, le point P tomberoit en Q. Mais si l'aire ASQ ne répond pas exactement au tems, le point P tombera au-dessus ou au-dessous du point Q, selon que l'aire ASQ sera plus grande ou plus petite que celle qui doit être proportionnelle au tems. Soit donc nommée cette aire ASq: si l'on abaisse sur Cq la perpendiculaire SE, on aura suivant ce qui a été démontré ci-dessus, $SE = Nq$, & partant $SE - SF$ (ou $SF - SE$ selon le cas) c'est-à-dire, presque la ligne entiere $LE = qP = QP - Qq$ (ou bien $= Qq - QP$) : or si l'angle QCq est fort petit, on aura $CE : Cq :: LE : Qq :: QP - Qq : Qq$; & par conséquent $CE + Cq : Cq :: QP : Qq$. Semblablement lorsque l'arc BQ est plus petit que $90°$, alors $CQ - CE : CQ :: QP : Qq$: & lorsque la Planete est proche l'Aphélie ou le Périhélie, alors la ligne presque entiere $CE = CS$ & $CQ + CE = AS$; ainsi $QP : Qq :: AS : CA$, s'il arrive que l'arc AQ soit plus petit que $90°$: mais lorsque l'arc Bq est plus petit que $90°$, alors $SB : CB :: QP : Qq$; on fera donc, comme CS, est à CQ, ainsi le rayon, à une certaine quantité L, & on aura $CQ = \frac{CS \times L}{R}$: or le Rayon, est au cosinus de l'angle ACQ, comme SC, est à CF ou CE (car CF & CE sont à peu près égales,) c'est pourquoi on aura $CE = \frac{SC \times Cosin.\ AQ}{R}$; & par conséquent $QP : Qq :: \frac{SC \times L + SC \times Cos.\ AQ}{R} : \frac{CS \times L}{R} :: L + Cosin.\ AQ : L$, en supposant néanmoins l'arc AQ moindre que $90°$; car si cet arc excede $90°$, on aura $QP : Qq :: L - Cosin.\ AQ : L$.

De cette maniere si l'on prend l'arc AQ tant soit peu moindre ou plus grand que le vrai arc, il sera facile, suivant ce que nous venons de dire, de conclurre la quantité de l'arc Qq, qui lui doit être ajoutée ou qu'on en doit soustraire, afin d'avoir l'aire ASq à très-peu près propor-

tionnelle au tems : mais si à la place de AQ on prend l'arc Aq qu'on vient de trouver, & qu'on observe les mêmes regles que ci-dessus, on trouvera encore un autre arc Aq, & ainsi de suite en réitérant plusieurs fois le calcul, afin de parvenir à un nouvel arc Aq qui pourra approcher autant qu'on voudra du véritable arc que l'on cherche.

Application de la méthode de M. Newton à la Planete de Mars.

Cette méthode est si simple & si facile, qu'on la concevra plutôt par des exemples, que par un détail inutile, qu'il seroit peut-être trop long de rapporter. Ainsi nous allons l'appliquer aux mouvemens de la Planete de Mars. Dans l'orbite de cette Planete le logarithme B est 0.7244446, & la longueur L est de 1080631 parties, dont le Rayon est 100000.

I. Exemple.

Qu'on propose d'abord de trouver l'angle ACQ lorsque le mouvement moyen de la Planete ou l'arc proportionnel au tems n'est que d'un degré. On voit d'abord que CS est presque la dixieme partie de CA. Je suppose donc que AQ * est de $0°,9$, c'est-à-dire, d'une dixieme partie de degré plus petit que le moyen mouvement : on ajoutera le sin. log. $0°,9$ au logarithme de B, & la somme sera

* La méthode la plus simple de calculer l'anomalie vraie qui répond à l'anomalie moyenne, est de supposer d'abord avec M. Herman que l'orbite n'est pas fort excentrique ; car sans réduire les arcs en décimales de degrés, on menera par le centre C la ligne CQ parallele à SN, ensuite on déterminera comme il suit, l'angle ASN ou bien l'arc AQ dont il est nécessaire de connoître la valeur pour en déduire suivant l'approximation donnée par M. Newton, celle de l'arc Aq que l'on cherche. Pour cet effet il faut considérer que dans le triangle rectiligne NSC les côtés CN, CS (qui sont constans) étant connus, de même que l'angle ACN, ou NCS qui est l'anomalie moyenne, il sera facile de connoître l'angle NSC ou son égal ACQ. Car pour abréger le calcul dans cette méthode particuliere de déterminer l'anomalie vraie qui répond à l'arc AN de l'anomalie moyenne, on ajoutera suivant l'analogie connue (Trig. rectil. prop. 13.) le logarithme de la différence de $NC+CS$, $NC-SC$ (lequel est toujours un logarithme constant) à la tangente de $\frac{1}{2}ACN$, ce qui donnera la tangente de la $\frac{1}{2}$ différence des angles CNS, CSN; d'où il suit que si on l'ajoute à la moitié de l'arc $AN=\frac{1}{2}NQ+\frac{1}{2}AQ$, la somme sera l'angle ASN ou l'arc AQ. Ainsi le log. constant 0.0806085 (qui répond à la différence de $NC+CS$, $NC-CS$) étant ajouté à la tangente logar. de la moitié de l'angle ACN, lequel est supposé d'un degré dans ce premier exemple, la somme sera la tangente log. de 0° 24′ 55″ qu'il faudra ajouter à $\frac{1}{2}ACN$, pour avoir l'angle ACQ de 0° 54′ 55″.

L'angle ACQ étant une fois connu on ajoutera son sin. log. 8.2034118 comme il est expliqué ci-dessus au log. de B, & la somme sera 8.9278564 log. d'un nombre qui étant réduit en secondes, répondra à 304″, 90115 = 0° 5′. 4″, 9 = Nq, l'arc Qq n'étant gueres que de 0″, 1 dans cet exemple.

8.9205466 qui est le log. du nombre 0.083281; ce nombre exprimera un arc égal à $SF = NP$; & si l'arc AQ que l'on a pris eût été le vrai arc que l'on demande, $AN - NP$ seroit $= AQ$, & $QP = 0$: mais dans ce cas-ci $QP = 0.01671$; donc en ôtant la dixieme partie, puisque AS surpasse AC d'environ sa dixieme partie, il restera $Qq = 0.01504$ qu'il faudra ajouter à AQ, & l'on aura Aq 0°.91504 qui differe à peine de la millieme partie d'un dégré du véritable arc Aq.

II. Exemple.

2°. Si l'arc AN du moyen mouvement est deux degrés, on supposera $AQ = 1°.83$, ce qui est à peu près le double du premier AQ; & ajoutant le log. de B à son sinus logarithmique, la somme 9.2286992 sera le logar. du nombre 0.16931; & partant $QP = 0.00069$, d'où ôtant la dixieme partie, le reste sera $Qq = 0.00062$, & $Aq = 1°.83062$, qui differe à peine du vrai arc Aq de la dix-millieme partie d'un degré.

III. Exemple.

3°. Si l'arc proportionnel au tems est de 3°, on supposera $AQ = 2°,745 = 1,83 + 0.915$; & ajoutant le logarithme B à son sinus logarithmique, on aura le log. du nombre $0.25392 = NP$ & $AN - NP = 2.74608$; par conséquent $Qq = 0,001$, ou à très-peu près, & $Aq = 2°.746$: c'est pourquoi la seule addition de ces deux logarithmes donnera l'arc Aq qui ne doit pas différer du véritable de plus d'une millieme partie de degré.

IV. Exemple.

4°. Choisissons présentement un plus grand angle, & qu'on demande, par exemple, l'angle ACq lorsque le moyen mouvement est de 45°. On supposera d'abord l'arc AQ de 40° & ajoutant à son sinus le logarithme de B, la somme 0.5325121 sera le logarithme du nombre 3°, 4081, qui étant ôté de 45° le reste, sera $AN - NP = 41,5919$, qui surpassera l'arc AQ de 1°,5919; c'est pourquoi si l'on fait comme $L +$ le cosinus AQ, est à L, ainsi 1,5919, à un quatrieme terme, on trouvera l'arc Qq de

1°,4865,& partant $Aq = 41°,4865$ ce qui n'excede gueres plus de la millieme partie d'un degré le véritable arc qu'on cherche. Mais nous pouvons encore trouver, sans être obligés d'employer cette regle de proportion, l'arc AQ, en prenant un arc qui soit un peu plus petit que la différence des arcs AN, NP, c'est-à-dire, qui lui soit à très-peu de chose près égal, par exemple, AQ étant de 41°, 50; & cela en ajoutant son sinus logarith. au log. de B, afin d'avoir $NP = 3, 5132$, qui étant ôté de AN donnera 41, 4868 pour le nouvel arc AQ: cet arc non-seulement est plus aisé à calculer selon cette derniere maniere, mais il approche encore plus du véritable arc que n'étoit l'arc Aq trouvé par la méthode précédente.

V. Exemple. 5°. Lorsqu'on a trouvé l'arc Aq qui répond au moyen mouvement de 45°, si l'on veut continuer le calcul successivement pour chaque degré, on n'aura seulement que deux logarithmes à ajouter, & l'on aura tout d'un coup l'arc Aq pour tous les degrés correspondans du moyen mouvement de la Planete. Par exemple, lorsque l'anomalie moyenne est de 46°, je suppose que AQ soit pris de 42,40, on ajoutera son sinus logarithmique au logarithme de B, & partant ou aura $AN - PN = 42,4249$; on supposera donc que cette quantité exprime un nouvel arc AQ, & on en déduira Aq qui ne differera pas même de la millieme partie du vrai arc Aq. Semblablement lorsque l'anomalie moyenne sera 47°, je suppose que $AQ = 43°, 36 =$ à l'arc AQ qu'on vient de trouver + à l'excès de cet arc qui répond à un degré de moyen mouvement; & ajoutant son sinus logarithmique au logarithme de B, la somme sera le logarithme du nombre 3,6402 qu'il faudra ôter de l'arc AN, & le reste $AN - NP = 43°,3598$ sera égal au nouvel arc Aq, & cet arc differe à peine de l'arc véritable qu'on cherche, de la dix-millieme partie d'un degré.

VI. Exemple.

6°. Enfin si l'on propose de trouver l'arc Aq lorsque l'anomalie moyenne est de 100°*, on supposera $A\,Q$ de 96°, & ajoutant son sinus logarithmique au log. constant L, la somme sera le log. du nombre 5°, 273, & partant $AN - NP = 94,727$; c'est pourquoi supposant $A\,Q$ 94,72 & ajoutant le logarithme constant B au sinus logarithmique de $A\,Q$, on aura le logarithme du nombre 5, 285, qu'on ôtera de l'arc AN, & $AN - NP = 94°, 715 = Aq$ ou à très-peu près. Semblablement si l'anomalie moyenne est 101°, on fera $A\,Q$ de 95°, 71, d'où l'on tirera NP 5°, 2756 qui étant ôtés de 101° le reste $AN - NP = 95°, 7244$; & de cette maniere on operera successivement pour chaque degré d'anomalie moyenne, & l'on aura l'angle $A\,C\,Q$ sans autre calcul qu'une simple addition de deux logarithmes, dont il faut conserver toujours à part celui qui est constant, ce qui épargne de la peine au Calculateur.

Autre exemple dont on fait l'application à l'orbite d'une Comete.

Passons présentement à une orbite d'une espece très-différente, dont l'excentricité, par exemple, sera fort grande; de sorte que la distance de l'Aphélie à celle du Périhélie, seroit comme 70 est à 1. Telle est l'orbite de la Comete, qui selon les découvertes de M. Hallei, acheve sa révolution en 75 ans $\frac{1}{2}$. Dans cette orbite on aura AC ou $C\,Q$ de 35, 5 & CS de 34, 5 parties, telles que SB est 1, 0: & le logarithme de la constante B sera 1.7457133. Ainsi pour trouver Bq lorsque le moyen mouvement de la Comete à compter du Périhélie, est la centieme partie d'un degré; je supposerai $B\,Q$ 0.35; & ajoutant à son sin. le log. de la quantité constante B, on aura la somme

* Si l'on ajoute le logarithme constant 0.080608 5 à la Tang. log. $\frac{1}{2}$ AN qui est de 50°, on trouvera la valeur de l'arc AQ de 94° 42′ 30″, & continuant le calcul suivant l'Approximation de M. Newton, en ajoutant le sinus logarithmique de AQ au logarithme de B, la somme sera le logarithme d'un nombre qui réduit en secondes $= 19023'' = 5°.17'.03'' = Nq$, ou plus exactement 5° 17′ 02″, 797: Ainsi $Aq = 94°.42'.57''$, 204; & partant $Q\,q = 0'\,27''$, 204 dans cet exemple. Enfin on achevera de calculer l'angle $Q\,SA$, l'anomalie vraie, ou l'angle PSA, suivant ce qui a été expliqué à la fin du Chapitre 24. pag. 497.

ou le logarithme du nombre 0.34013, qui étant ajouté à l'arc AN, donnera 0,35013, or si cet arc eût été de 0,35, BQ auroit été pris fort exactement : mais la différence étant 0,00013, on multipliera (puisque CB est à SB comme 35,5 est à 1) on multipliera, dis-je, cette différence 0,00013 par 35,5, & on trouvera $Qq =$ 0,004615 ; c'est pourquoi l'arc BQ sera $=$ 0,354615, & l'erreur ne montera pas à trois dix-milliemes de degré. En second lieu soit le moyen mouvement de la Comete 0,02, on suppofera BQ de 0,71, & ajoutant le logarithme du sinus de ce nombre au logarithme de la constante B, on aura le logarithme de 0,68998, & partant $BN + NP = 0°,70998$: or la différence n'est que de 0,00002, c'est pourquoi si on la multiplie par 35,5, & qu'on ôte le produit de l'arc BQ, le reste $Bq = 0° 7092$, & l'on ne peut alors se tromper que de la dixmillieme partie d'un degré. Si le moyen mouvement est 0,03, on suppofera BQ 1,06, & ajoutant son sin. log. à la constante B, on aura le logarithme du nombre 1,03008, auquel on ajoutera BN, & la somme 1,06008 sera plus grande que BQ : or la différence qui est 0,00008, doit être multipliée par 35,5 & le produit sera ajouté à BQ pour avoir $Bq =$ 1,06284. Semblablement lorsque le moyen mouvement est 0,04, on fera $BQ = 1,4$, & on trouvera $NP = 1,3604$ à quoi il faudra ajouter 0,04 & la somme 1,4004 surpassera 1,4 de 0004 ; on multipliera cette différence par 35,5, & le produit 0142 sera égal à Qq ; c'est pourquoi $Bq = 1,41142$; & dans tous ces calculs les erreurs sont très-petites, & n'excedent gueres la millieme partie d'un degré.

Qu'on propose aussi de trouver l'arc Bq lorsque le moyen mouvement de la Comete est d'un degré : on fera $BQ = 20$ degrés, & ajoutant son sinus logarithmique au sinus logarithmique de B, on aura le sinus logarithmique du

du nombre 19, 045, auquel si on ajoute 1, la somme 20°, 045 surpassera 20° : or dans ce cas L— le cosinus BQ, sera à L, comme 1, est à 11, 5, ou à très-peu près : multipliant donc la différence 0, 045 par 11, 5, & le produit, 5175 étant ajouté à BQ, on aura 20, 5175. C'est pourquoi on fera pour la seconde fois $BQ = 20, 51$, & par un semblable calcul que le précédent, on trouvera $NP = 19, 5092$, & si on y ajoute BN la somme sera 20, 5092, ce qui donne un nombre moindre que BQ : & partant si on multiplie la différence, sçavoir, 0008 par 11, 5 & qu'on ôte le produit 0092, de BQ, le reste $Bq = 20°, 5008$.

Enfin qu'on suppose le moyen mouvement de 2°, on fera pour lors BQ de 30°, & on trouvera NP 27°, 84 : on y ajoutera 2°, & la somme 29, 84 sera plus petite que 30° ; multipliant donc la différence 0°, 16 par 6, 3 (puisque L— cosin. BQ, est à L, comme 1, est à 6, 3) on aura 1, 008 $= Qq$; & partant si l'on ôte cet arc de BQ, on aura Bq 28, 992 : on corrigera donc l'arc Bq en prenant BQ 29, & répétant le calcul, on aura $Bq = 28°, 9672$.

Lorsqu'on aura trouvé l'angle QAC, il sera aisé de trouver l'angle ASQ ; car dans le triangle QCS les côtés QC, CS sont connus aussi-bien que l'angle QCS, c'est pourquoi on trouvera la valeur de l'angle ASQ, & du côté SQ ; enfin on fera, comme le grand axe de l'Ellipse, est au petit axe, ainsi la tangente de l'angle ASQ, à la tangente de l'angle ASP qui sera l'anomalie vraie ou coégalée. On fera aussi comme la sécante de l'angle ASQ, est à la sécante de l'angle ASP, ainsi SQ, sera à la distance SP de la Comete au Soleil que l'on cherche. On pourroit plus facilement trouver encore ASQ & la droite SP en cherchant d'abord le sinus QH de l'arc AQ & son cosinus HC ; car on connoît SC en parties, dont CQ est 100000 ; c'est pourquoi on connoîtra HS, &

PLANCHE VIII. *Fig.* 15.

on fera enſuite, comme le grand axe, eſt au petit axe de l'Ellipſe, ainſi QH, eſt à PH, qui par conſéquent ſera connue. Enfin dans le triangle rectangle PHS, les côtés PH, HS ſont connus : c'eſt pourquoi on trouvera la valeur de l'angle PSH, qui eſt l'anomalie coégalée, & le côté PS qui ſera la diſtance de la Comete au Soleil.

Dans l'Aphélie & le Périhélie les points Q & N, ou le lieu vrai & le lieu moyen de la Planete, ne ſont qu'un même point : mais dans le Ier demi-cercle d'anomalie le lieu moyen de la Planete précede ſon lieu vrai, & au contraire le lieu vrai précede le lieu moyen dans le ſecond demi-cercle. Il n'eſt pas moins évident que ſi l'on détermine la poſition de la ligne des apſides de l'orbite de la Terre, on pourra déterminer dans quel tems le lieu moyen & le vrai lieu de la Terre vu du Soleil doivent ne paroître qu'un même lieu ; car quand le Soleil paroît dans le point de l'Ecliptique qui répond au Périhélie de l'orbite, alors la Terre eſt en Aphélie ; or il ſuit que ce tems étant donné, les Tables Aſtronomiques donneront le moyen mouvement de la Terre, & l'arc AN pour tel autre tems qu'on voudra ; puiſque les Tables donnent ces arcs proportionnels au tems & tous calculés. Ainſi lorſque l'arc AN eſt donné pour tel tems qu'on voudra, on trouvera l'anomalie vraie de la Terre, ou l'angle ASP, & par conſéquent le vrai lieu du Soleil dans l'Ecliptique ſuivant les méthodes que nous avons expliquées.

Maniere de trouver le lieu moyen du Soleil.

Outre la Théorie de Kepler que nous avons expoſée ci-deſſus, & qui eſt ſi conforme au mouvement de toutes les Planetes, il y a encore une autre hypotheſe Elliptique propoſée par deux célebres Mathématiciens, Iſmael Bouillaud & Sethus Wardus, qui ont enrichi l'Aſtronomie par leurs ſçavantes recherches. Nous allons expliquer cette Théorie d'autant plus volontiers, qu'elle eſt fondée ſur une Géométrie ſubtile & très-délicate, puiſque les

La Théorie de Wardus.

calculs des mouvemens des Planetes s'y font avec une facilité merveilleuſe. Dans cette hypotheſe on ſuppoſe avec Kepler que les orbites des Planetes ſont des Ellipſes, au foyer commun deſquelles ſe trouve le Soleil: on ſuppoſe outre cela que chaque Planete eſt mue dans la circonférence de ſon orbite ſelon cette loi conſtante, ſçavoir, que de l'autre foyer de l'Ellipſe ſon mouvement paroiſſe toujours égal; & partant que ſi l'on tire continuellement des rayons de la Planete à ce foyer, elle décrive des aires proportionnelles aux tems. Cela ſuppoſé lorſqu'on connoit le rapport des axes de l'Ellipſe décrite par la Planete, on trouve ſelon la méthode de Wardus l'anomalie vraie qui répond à l'anomalie moyenne de la maniere que nous allons l'expliquer tout à l'heure.

Méthode de Wardus. PLANCHE VIII. *Fig.* 18

Soit *ABP* l'Ellipſe décrite par la Planete; ayant tiré la ligne des apſides *AP*, & nommant *S* le foyer qu'occupe le Soleil, *F* l'autre foyer qui eſt le centre du mouvement moyen ou uniforme. Si l'on connoît l'angle *AFL* proportionnel au tems, c'eſt-à-dire, l'anomalie moyenne, alors le point *L* ſera le vrai lieu de la Planete dans ſon orbite, & l'angle *ASL* ſera l'anomalie vraie ou coégalée que l'on cherche. On prolongera donc *FL* vers *E*, & on fera la ligne *FE* égale au grand axe *AP* de l'Ellipſe; & parce que ſelon la propriété ſi connue de l'Ellipſe, la ſomme des droites *FL*, *SL* eſt égale à *AP*, *LE* ſera par conſéquent égale à *LS*, & le triangle *LSE* ſera iſoſcele: ainſi les angles *E*, *ESL* ſeront égaux, & l'angle extérieur *FLS* ſera égal à la ſomme de ces deux angles, c'eſt-à-dire, ſera double de l'un ou de l'autre angle *E* ou *LSE*. C'eſt pourquoi dans le triangle *FES*, les côtés *EF*, *FS* & l'angle *EFS* (complément à 180° de l'angle *AFE*) étant connus, on trouvera la valeur de l'angle *E*, dont le double ſera la valeur de l'angle *FLS* qui eſt l'équation; & partant l'angle *AFL* étant égal aux deux angles *FSL*,

FLS, on soustraira donc l'angle FLS (c'est-à-dire, l'équation du centre ou la Prostaphereſe) de l'anomalie moyenne, ou bien on l'y ajoutera ſi la Planete va du Périhélie à l'Aphélie, & l'on aura l'anomalie vraie de la Planete. *C. Q. F. T.*

Pour réſoudre le triangle EFS, dans lequel les côtés EF, FS, ſont donnés, & l'angle EFS, l'analogie eſt $\frac{1}{2}EF + \frac{1}{2}FS : \frac{1}{2}EF - \frac{1}{2}FS$, c'eſt-à-dire, AS, eſt à SP, comme la tangente $\frac{1}{2}AFE$, eſt à la tangente de la $\frac{1}{2}$ différence des angles E & FSE. Mais puiſque l'angle E eſt égal à l'angle LSE, FSL ſera la différence des angles E & FSE: c'eſt pourquoi l'angle qui réſulte de l'analogie, doit être doublé, & l'on aura l'anomalie vraie FSL de la Planete. Mais il y a encore quelque choſe de plus facile pour la pratique; car comme AS & SP ſont toujours deux quantités données ou qui ſont conſtantes, la différence de leurs logarithmes ſera par conſéquent donnée; c'eſt pourquoi on l'ajoutera à la tangente de la moitié de l'anomalie moyenne, & l'on aura la tangente de la moitié de l'anomalie vraie: enfin dans le triangle LFS puiſqu'on connoît tous les angles & le côté SF, on connoîtra donc la diſtance LS de la Planete au Soleil.

L'hypotheſe de Wardus n'eſt qu'une approximation.

PLANCHE VIII. *Fig.* 19.

On explique ici pourquoi cette hypotheſe ne ſatisfait pas entierement aux obſervations.

Il eſt bien certain que cette hypotheſe de Wardus eſt une approximation fort utile, puiſqu'elle épargne beaucoup de travail dans les calculs; mais ce n'eſt toutefois qu'une approximation, & cette hyppotheſe n'eſt pas toujours aſſez exacte, comme nous l'allons démontrer. Soit APB l'orbite d'une Planete, AQB un cercle qui lui eſt circonſcrit, l'arc AQ l'anomalie de l'excentrique, & AN l'anomalie moyenne proportionnelle au tems: on menera au centre C la droite NC, & par le point Q la droite QG qui lui ſera parallele; ainſi l'angle QGA ſera égal à l'angle NCA, & proportionel au tems & GC ſera preſque égal à CS, mais pourtant tant ſoit peu plus petite,

comme on le va démontrer. Car du foyer S on menera la perpendiculaire SF à QC, & elle ſera égale comme on l'a déja fait voir à l'arc QN, dont le ſinus eſt égal à GO; mais puiſque l'arc QN eſt fort petit, ſon ſinus lui ſera preſque égal; c'eſt pourquoi GO ſera preſque égal à SF, c'eſt-à-dire, qu'il ſera tant ſoit peu plus petit: or les triangles rectangles GOC & SFC ſont à très-peu près équiangles; car l'angle NCQ qui eſt la différence des angles NCG & SCF, eſt fort petit, & partant puiſque OG eſt preſque égal à SF (quoiqu'il ſoit réellement un peu plus petit) on aura CG preſque égal à CS, ou du moins tant ſoit peu plus petit: donc l'autre foyer de l'Ellipſe ſera au-deſſus du point G; mais ce ſera d'une très-petite quantité. Que ſi l'on mene PL parallele à GQ, le point L ſera auſſi au-deſſus du point G: mais ce ſera toujours d'une fort petite quantité; ainſi le point L & le ſecond foyer de l'Ellipſe ne feront preſque qu'un ſeul & même point. Mais l'angle PLA eſt égal à l'angle NCA qui eſt l'anomalie moyenne; donc ſi du Lieu de la Planete dans ſon orbite, on tire une ligne au foyer ſupérieur de l'Ellipſe, cette ligne formera avec l'axe de l'Ellipſe un angle qui ſera à très-peu de choſe près proportionnel au tems.

Lorſque les angles NCA & QCA, ou SCF ne different que très-peu, c'eſt-à-dire, lorſque l'angle NCQ eſt fort petit, & que l'excentricité de l'orbite eſt auſſi fort petite, les points G & L ne formeront qu'un ſeul & même point avec le foyer ſupérieur; & partant cette Théorie répond aſſez bien aux obſervations du mouvement de la Terre dans ſon orbite; car ſon orbite ne differe gueres d'un cercle. Mais pour les orbites de quelques autres Planetes telles que ſont Mars & Mercure, on s'apperçoit d'une différence, ou plutôt d'une erreur aſſez ſenſible. Auſſi M. Bouillaud ayant choiſi quatre lieux de Mars obſervés par Tycho, a-t-il fait voir que dans le premier

Iſmael Bouillaud a corrigé cette hypotheſe.

& troiſieme quartier d'anomalie, le lieu de Mars étoit plus avancé dans le ciel qu'il ne devroit être ſuivant cette hypotheſe ; & qu'au contraire dans le ſecond & IVe Quart l'anomalie vraie étoit plus petite que celle qui réſulte du calcul de la même hypotheſe. C'eſt pourquoi ce célebre Aſtronome a imaginé la correction ſuivante *. Soit décrit le cercle ADP qui ait pour diametre AP qui eſt le grand axe de l'Ellipſe, & ſoit AFL l'anomalie moyenne de la Planete : on menera par le point L la droite QLG perpendiculaire à l'axe, & qui rencontrera le cercle au point Q : ayant joint FQ qui rencontrera l'Ellipſe au point Y, le point Y ſera le lieu de la Planete qui répond à l'anomalie moyenne AFL : de plus l'angle correſpondant à l'anomalie moyenne, ſçavoir, l'angle AFQ, ſe trouve tout d'un coup, puiſque ſa tangente, eſt à la tangente de l'angle AFL, comme la moitié du grand axe de l'Ellipſe, eſt à la moitié du petit axe. Or puiſque l'angle AFQ ou AFY eſt donné, on trouvera l'anomalie vraie ASY, comme on l'a calculé auparavant par le moyen de l'angle AFL.

PLANCHE VIII. *Fig.* 18.

On a dû remarquer que tous les calculs & les méthodes que nous avons propoſés ci-deſſus, ſuppoſoient toujours qu'on connût la figure des orbites, leurs excentricités, & leurs poſitions. Nous enſeignerons dans la ſuite comment on peut déterminer toutes ces choſes dans les autres Planetes : mais nous allons rechercher ici la poſition & la figure de l'orbite de la Terre.

Recherches ſur la figure de l'orbite de la Terre.

1°. On obſervera le diametre du Soleil & ſon mouvement apparent quand la Terre eſt Aphélie & quand elle

* On a principalement rapporté cette méthode de Wardus avec l'approximation donnée par Bouillaud, parce que les Tables Carolines de M. Street (les meilleures qui aient été publiées juſqu'à ce jour ſur les mouvemens des Planetes) ont été conſtruites ſuivant ces principes, & qu'il eſt certain d'ailleurs que les autres méthodes publiées dans le dernier ſiecle ſont moins avantageuſes, comme l'a démontré Mercator dans les Tranſ. Phil. de l'année 1676. Au reſte on s'eſt attaché depuis environ ſoixante ans à la ſolution du Probleme de Kepler donnée par Newton ; de maniere qu'on a preſqu'entierement ceſſé de ſe ſervir dans les calculs Aſtronomiques des méthodes de Bouillaud & de Wardus.

eſt Périhélie. Dans le premier cas le diametre apparent du Soleil ſera le plus petit qu'il eſt poſſible, parce qu'alors la Terre eſt à ſa plus grande diſtance de cet aſtre : dans le ſecond cas au contraire comme la Terre eſt le plus près qu'elle puiſſe être du Soleil, le diametre apparent de cet aſtre ſera pour lors le plus grand. Or puiſque les diſtances du Soleil à la Terre ſont réciproquement proportionnelles aux diametres apparens, il s'enſuit que ſi l'on ſuppoſe qu'une droite quelconque *S P* repréſente la diſtance du Soleil à la Terre dans le Périhélie, on aura, comme le diametre apparent du Soleil dans l'Aphélie, eſt à ſon diametre apparent dans le Périhélie, ainſi la droite *P S*, ſera à la droite *S D*, laquelle ſur ſon prolongement *S P* donnera la diſtance de l'aphélie : on partagera donc *P D* en *C*, & *C S* ſera l'excentricité de l'orbite, & le point *C* le centre de l'Ellipſe. C'eſt pourquoi on pourra décrire une Ellipſe dont le point *S* ſera le foyer, *P D* le grand axe, & cette Ellipſe ſera ſemblable à celle que décrit la Terre dans ſa révolution autour du Soleil ; enſorte que le lieu de l'Ecliptique d'où l'on doit appercevoir le plus grand diametre apparent du Soleil, ou bien ſon oppoſé, d'où l'on doit apperçevoir le plus petit diametre apparent ; ces points, dis-je, donneront la poſition de la ligne des apſides. Cependant comme le diametre apparent du Soleil ne varie pas ſenſiblement pendant pluſieurs jours, ſoit dans l'aphélie, ſoit dans le Périhélie, il n'eſt par conſéquent gueres poſſible de déterminer la poſition de la ligne des apſides par les obſervations du diametre apparent du Soleil : il faudra donc employer pour cette recherche les obſervations du mouvement apparent du Soleil. Car les viteſſes angulaires de la Terre, & par conſéquent les viteſſes apparentes du Soleil qui lui ſont égales, ſont toujours entre elles réciproquement comme les quarrés des diſtances de la Terre au Soleil, comme nous l'avons démontré ci-deſſus.

PLANCHE VIII. *Fig.* 20.

Page 484.

Ainſi quand on voudra déterminer la figure de l'Ellipſe que parcourt la Terre dans ſon mouvement annuel, on obſervera la plus grande & la plus petite viteſſe du Soleil dans l'Ecliptique : on nommera la plus petite *A*, & la plus grande *B*, & l'on prendra une droite comme *S P*, qui repréſente la diſtance du Périhélie. On fera donc, comme *A*, eſt à *B*, ainſi *SP*, eſt à un quatrieme terme qu'on nommera *C*, & l'on prolongera *S P* vers *D*, enſorte que *S D* ſoit moyen proportionnel entre *S P* & ce quatrieme terme trouvé *C* : de cette maniere *S D* repréſentera la diſtance Aphélie. C'eſt pourquoi ſi l'on décrit une Ellipſe qui ait pour foyer le point *S*, & pour grand axe la ligne *PD*, cette Ellipſe ſera ſemblable à l'orbite de la Terre ; car puiſque *P S*, *S D*, & *C* ſont continuellement proportionnelles, on aura le quarré de *PS*, eſt au quarré de *DS* : : *SP* : *C* : : *A* : *B*. Ainſi ayant obſervé les points de l'Ecliptique où la viteſſe du Soleil eſt la plus grande & la plus petite, ces points ſeront ceux de la ligne des Apſides : ou bien enfin on pourroit obſerver deux points de l'Ecliptique de part & d'autre de l'Aphélie ou du Périhélie, auſquels la viteſſe du Soleil ſeroit préciſément égale : car ſi l'on partage l'arc entier compris entre ces deux points en deux parties égales, le point du milieu, & par conſéquent ſon oppoſé dans l'Ellipſe, ſeront les points de la ligne des Apſides. Mais toutes ces méthodes ne peuvent donner aſſez d'exactitude pour conſtruire des Tables Aſtronomiques, parce qu'elles ſuppoſent des obſervations beaucoup plus exactes qu'on ne les a faites juſqu'ici.

PLANCHE VIII. *Fig.* 21.

Maniere de déterminer la poſition de la ligne des Apſides.

La Théorie de Wardus nous donne une méthode bien plus certaine pour trouver tout-à-la fois par trois obſervations du lieu du Soleil (dont on ſuppoſe que les tems ou les intervalles des tems ſoient connus) la figure de l'orbite de la Terre, & la poſition de la ligne des Apſides. Soit *A B P D C* l'orbite de la Terre, & ſoit le point *S* le

La Théorie de Wardus donne aſſez bien la figure & la poſition de l'orbite de la Terre.

PLANCHE VIII. *Fig.* 22.

Sle foyer où se trouve le Soleil, le second foyer sera F, & la ligne des Apsides sera AP : soient donnés trois lieux de la Terre B,C,D, dans l'Ecliptique, ce qu'il est aisé de connoître, puisqu'ils sont opposés diamétralement aux trois lieux du Soleil qu'on suppose déterminés par observation. Du centre F & de l'intervalle FM égal au grand axe de l'Ellipse, on décrira un cercle $MHEL$ qui coupera aux points G, H, E les droites prolongées FB, FC, FD ; on menera aussi du foyer S les droites SB, SC, SD, & encore SG, SH, SE : or les angles BSC, BSD, & CSD sont donnés, puisque leurs mesures sont les arcs de l'Ecliptique compris entre les lieux des observations ; mais puisque dans cette Théorie, le mouvement de la Terre dans son orbite est tel, que les angles parcourus autour de l'autre foyer F, sont assez sensiblement proportionnels aux tems, les angles BFC, BFD & CFD seront connus ; car on les doit conclurre, en faisant comme le tems écoulé entre deux de ces observations (entre les deux premieres, par exemple,) est au tems de la révolution entiere de la Planete dans son orbite, ainsi $360°$, sont à l'arc qui répond au tems des deux observations qu'on a comparées. C'est pourquoi puisque le double de l'angle FGS, c'est-à-dire, l'angle FBS est égal à la différence des angles BFA, BSA, comme il a été démontré ci-dessus, & de même que le double de l'angle FHS, c'est-à-dire, l'angle FCS est égal à la différence des angles CFA & CSA ; il est donc clair que la différence des angles BSC & BFC sera égale à $2FGS + 2FHS$: mais parce que les angles BFC, BSC sont connus, on sçaura donc quelle est leur différence, & partant la somme des angles FGS, FHS. Or l'angle FGS est la différence des angles BFA, GSA, & l'angle FHS est aussi la différence des angles HFA & HSA ; c'est pourquoi les angles FGS & FHS seront égaux à la différence des angles BFC & GSH ; & parce qu'on con-

noît l'angle *BFC* & la ſomme des angles *FGS* & *FHS*, l'angle *GSH* ſera par conſéquent connu: on pourra trouver de la même maniere l'angle *GSE*. Semblablement le double de *FES* eſt égal à la différence des angles *DFA* & *DSA*, comme auſſi le double de *FHS* eſt égal à la différence des angles *CFA* & *CSA*; donc deux fois l'angle *FES*—2*FHS*= la différence des angles *CFD*,*CSD*; mais on connoît les angles *CFD*, *CSD*, on connoîtra donc la moitié de leur différence, ſçavoir, *FES*—*FHS*; or *FES*—*FHS* eſt égal à la différence des angles *CFD* & *HSE**, & d'ailleurs on connoît l'angle *CFD*, & la différence des angles *FES*—*FHS*, on ſçaura donc la valeur de l'angle *HSE*: c'eſt pourquoi tous les angles au foyer *F*, ſçavoir, *BFC*, *BFD*, & *CFD* étant connus, auſſi-bien que tous les angles au foyer *S*, ſçavoir, *BSC*, *BSD*, *CSD*, on connoîtra *GSH*, *GSE*, & *HSE*. Cela ſuppoſé,

Qu'on faſſe *SH* d'un certain nombre de parties déterminées, par exemple, de 100000: on prolongera la ligne *ES* juſqu'à ce qu'elle rencontre la circonférence du cercle en *L*, & en tirant les droites *HL*, *LG* & *HG*, dans le triangle *HLS*, l'on connoît l'angle *HSL*, complément à deux droits de l'angle connu *ESH*; on connoît encore l'angle *SLH* (qui eſt la moitié de l'angle *EFH*) & le côté *HS* de 100000, c'eſt pourquoi on connoîtra *SL*; & partant dans le triangle *SLG*, l'angle *LSG*, complément à deux droits de l'angle *ESG*, eſt connu, comme auſſi l'angle *SLG* (qui eſt la moitié de l'angle *EFG*) & le côté *SL*, c'eſt pourquoi le côté *SG* ſera connu: mais dans le triangle *HSG* on connoît les côtés *HS* & *SG*, & l'angle compris *HSG*, c'eſt pourquoi on connoîtra le côté *HG* & l'angle *SHG*: & dans le trian-

* *AFD*—*FSE*=*FES*, *AFC*—*FSH*=*FHS*, donc *FSE*—*FHS*=*AFD*—*FSE*—*AFC*+*FSH*=*CFD*—*HSE*.

gle Isoscele HFG, on connoît l'angle HFG & la base HG; donc on connoîtra HF qui est égale à la moitié du grand axe de l'Ellipse, & l'angle GHF qu'il faudra ôter de l'angle SHG pour avoir l'angle FHS. Enfin dans le triangle FHS, les côtés FH, HS & l'angle FHS étant donnés, on trouvera SF qui sera l'excentricité de l'orbite, & l'angle HSF, d'où ôtant l'angle HSC égal à FHS, le reste CSF sera l'angle qui déterminera la position de l'orbite & la position de la ligne des Apsides.

Cette méthode suppose que les angles décrits au foyer supérieur F de l'orbite de la Planete, sont toujours proportionnels aux tems, ce qui n'est pas tout-à-fait vrai : mais comme l'excentricité de l'orbite de la Terre est fort petite, les angles qui sont réellement décrits au foyer supérieur de l'Ellipse, different si peu de ceux qui seroient proportionnels aux tems, qu'il n'en peut résulter d'erreur bien sensible dans la recherche du lieu qu'occupe la ligne des Apsides, ni par conséquent dans l'excentricité de l'orbite de la Terre.

Le célebre M. Hallei à qui l'Astronomie est redevable de tant de pieces excellentes dont il a sçu l'enrichir, & qui méritera les éloges de tous les Mathématiciens dans la postérité la plus reculée, a inventé autrefois une méthode, laquelle est indépendante, soit du mouvement de la Théorie, soit de toute autre hypothese : il propose de trouver par observation la figure & la position de l'orbite terrestre.

Soit le Soleil en S, $ABCD$ l'orbite de la Terre, P la Planete de Mars, qui dans cette recherche doit être pour plusieurs raisons préférée aux autres Planetes. On observera d'abord le tems auquel le Lieu de Mars se trouve en opposition au Soleil ; car alors le Soleil & la Terre se trouvent dans une même ligne avec Mars ; & comme il arrive le plus ordinairement que Mars au moment de son PLANCHE VIII. *Fig.* 24.

opposition a quelque Latitude, il faudra déterminer le lieu où tombe la perpendiculaire abaissée de son lieu sur l'Ecliptique. Ainsi dans la figure, S, A & P sont dans une même ligne droite ; mais comme la révolution périodique de Mars est de 687 jours, il est évident qu'après ce même intervalle de tems écoulé, Mars vu du Soleil paroîtra au même point P, c'est-à-dire, dans le lieu où il paroissoit opposé au Soleil au tems de la premiere observation. Et d'autant que la Terre ne sçauroit revenir pour la seconde fois précisément au point A qu'après 730j$\frac{1}{2}$, il s'ensuit que lorsque Mars retournera en P, la Terre sera en B, ensorte que la ligne tirée au Soleil sera pour lors SB, qui n'est plus la même que la ligne tirée de la Terre à Mars, puisqu'on le verra dans ce second cas selon BP. Ayant donc observé les lieux du Soleil & de Mars, on connoîtra par conséquent tous les angles du triangle BPS, & prenant PS de 100000 parties, on calculera la position & la distance SB ou sa longueur dans les mêmes parties. De la même maniere après une autre Période de Mars la Terre étant en C, on trouvera tant la longueur que la position de la ligne SC, & semblablement pour la ligne SD, dont on déterminera la longueur & la position par une troisieme observation. C'est pourquoi la question se réduit à résoudre géométriquement un probleme où l'on suppose que trois lignes qui concourent au foyer d'une Ellipse, soient données de grandeur & de position, ce qui doit déterminer la longueur du grand axe, sa position & la distance des foyers de l'Ellipse. On trouvera dans les Transf. Philos. n°. 128. la solution que M. Hallei a donnée de ce Probleme.


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 12 Page 482.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 24.
Fig. A.
Fig. B.
Fig. C.
Fig. D.

CHAPITRE VINGT-SIXIEME.

De l'Equation du Tems.

QUOIQUE le Tems ſoit de ſa nature une quantité réelle, puiſqu'il en a toutes les propriétés, qu'il eſt ſuſceptible d'augmentation ou de diminution, & de divers autres rapports, ſoit d'égalités, ſoit d'inégalités, cependant pour parvenir à connoître la juſte quantité du tems écoulé, il faut avoir recours au mouvement des corps puiſque ç'en eſt la vraie meſure, & que nous n'avons pas d'autres moyens de juger des intervalles de tems écoulés, ni de les comparer entre eux. Le tems, comme l'on voit, en tant que meſurable, ſuppoſe donc le mouvement: en effet s'il arrivoit que tout ce qui eſt dans l'Univers pût devenir entierement immobile, dès-lors nous ne pourrions plus déterminer en aucune maniere la quantité du tems, mais la durée des choſes s'écouleroit ſans diſtinction de ſes parties.

Le mouvement eſt la meſure du Tems.

Au reſte parce que le tems s'écoule néceſſairement d'une maniere conſtante & uniforme, il eſt évident que le mouvement le plus propre à nous en faire connoître la quantité, & par conſéquent à nous ſervir de meſure, doit être préciſément celui qui de ſa nature eſt ſimple & uniforme; en un mot ce doit être principalement ce même mouvement qui fait qu'un corps s'avance toujours également, ou lequel étant une fois imprimé à un corps, s'y conſerve, & lui doit faire parcourir dans des tems égaux des eſpaces égaux, & par conſéquent décrire des périodes égales.

Le mouvement uniforme eſt proprement la meſure du tems.

Dans l'uſage ordinaire on ſe ſert du mouvement le plus remarquable, choiſiſſant celui qui ſe préſente preſque à chaque inſtant aux yeux de tout le monde. Tel eſt le mou-

Les mouvemens du Soleil & de la Lune, ont été regardés jusqu'ici comme les mesures du tems les plus naturelles & les plus avantageuses qui aient été données aux hommes.

vement des astres, & sur-tout celui du Soleil & de la Lune. Il faut avouer aussi que ces mouvemens n'ont pas seulement été choisis du consentement général de tous les hommes, mais que ç'a été le dessein de Dieu de les destiner à cet usage, le Créateur ayant dit, comme nous le lisons dans la Genese : *Fiant luminaria in Firmamento cœli, & dividant diem ac noctem, & sint in signa & tempora, & dies & annos* *. D'où l'on voit que les mouvemens célestes, & particulierement ceux du Soleil, ont été regardés comme les plus propres à nous faire distinguer les âges & les tems. Aussi a-t-on vu jusqu'aux Poëtes adopter cette idée, quoiqu'imparfaitement, lorsqu'ils demandent si l'on ose soupçonner de l'erreur dans le mouvement du Soleil,

. . . . . *Solem quis dicere falsum*
Audeat ? Virg. Georg. I. 463.

On pourroit répondre que les Astronomes l'ont bien osé, lorsqu'après des recherches assez suivies ils ont découvert que le mouvement du Soleil n'étoit point uniforme, mais que tantôt il étoit sujet à s'accélérer, & tantôt à se ralentir ; d'où il a dû s'ensuivre que le Soleil ne peut être véritablement la mesure exacte du tems, puisque celui-ci s'écoule d'une maniere égale & uniforme.

Il faut donc présentement distinguer le tems qui nous est désigné par le mouvement du Soleil, & que l'on nomme *Apparent*, d'avec celui qui s'écoule uniformément, & que les Astronomes appellent *Tems Egal* ou *Tems moyen* : c'est à ce dernier qu'ils ont coutume de rapporter tous les mouvemens célestes. Car le mouvement apparent du Soleil dans l'Ecliptique étant inégal, & la route apparente qu'il décrit étant d'ailleurs inclinée à l'Equateur, il faut de nécessité que ni les jours, ni les heures, ne soient plus exactement les mêmes, ou d'égales durées, comme nous l'allons démontrer tout-à-l'heure.

Ce que c'est que le tems vrai ou apparent, & le tems moyen.

Genes. 1. v. 14. * Dieu dit encore, *que des corps de lumiere soient faits dans le Firmament du ciel, afin qu'ils séparent le jour de la nuit, & qu'ils servent de signes pour marquer les tems & les saisons, les jours & les années.* Traduction de M. de Saci.

Comme la Terre tournant autour de ſon axe entraîne ſucceſſivement les plans de tous ſes méridiens, ſi l'on conçoit qu'un de ces plans paſſe deux fois conſécutives par le centre du Soleil, le jour ſolaire ſera égal au tems écoulé pendant cette révolution du méridien; en un mot on entend par jour ſolaire le tems qui s'écoule entre le moment du midi & celui du jour qui ſuit immédiatement. Il eſt évident que ſi la Terre n'avoit d'autre mouvement que celui dont nous venons de parler, tous les jours ſolaires ſeroient en ce cas égaux entre eux, & préciſément de même durée que le tems écoulé entre chaque révolution de la Terre autour de ſon axe. Mais parce que dans le tems même que la Terre emploie à tourner autour de ſon axe, elle s'avance un peu vers l'Orient, il faut donc que chacun de ſes méridiens, après avoir achevé une révolution entiere, anticipe quelque peu ſur la révolution ſuivante, & cela afin que ſon plan convienne avec celui qui paſſe par les centres de la Terre & du Soleil. Soit, par exemple, S le Soleil, AB un arc de l'orbe terreſtre, ſi la ligne MD repréſente le plan de quelque Méridien dont le plan paſſe par le centre du Soleil lorſque la Terre eſt en A, il eſt aiſé de voir que ſi la Terre parcourt l'arc AB dans le même tems qu'elle acheve une révolution autour de ſon axe, il doit s'enſuivre que lorſqu'elle ſera parvenue en B, le Méridien MD ſe trouvera en md, c'eſt-à-dire, dans un plan parallele au premier; & partant ce même Méridien ne paſſera pas encore par le centre du Soleil; ou ce qui revient au même, tous les habitans ſitués ſous ce Méridien ne compteront pas encore midi : il faudra donc que le plan md faſſe un mouvement angulaire tel que dBf afin de paſſer par le centre du Soleil; & par conſéquent il eſt vrai de dire que généralement les jours ſolaires ſont d'une plus longue durée, que la révolution de la Terre autour de ſon axe. Au reſte ſi les plans des

PLANCHE IX. *Fig.* 1.

On explique ici pourquoi les jours ſolaires doivent être inégaux entre eux.

Méridiens, ou plutôt si l'axe de la Terre étoit perpendiculaire au plan de l'orbe annuel, & s'il étoit vrai que la Terre parcourût son orbe d'un mouvement toujours égal, il est certain qu'après une révolution du Méridien, *md* étant parallele à *MD*, l'angle *dBf* seroit égal à l'angle *BSA*, l'arc *df* semblable à l'arc *AB*, & qu'enfin (en quelqu'endroit que ce fût de l'orbe annuel) l'angle *ASB* étant toujours égal à l'angle *dBf*, les tems seroient toujours d'une même durée : ainsi tous les jours solaires seroient égaux entre eux, & le tems apparent ne differeroit plus du tems moyen, c'est-à-dire, du tems égal & uniforme. Mais ni l'une ni l'autre des deux suppositions que nous venons de faire, n'a lieu dans la nature. En effet il n'est pas vrai de dire que la Terre se meut également chaque jour dans son orbite, puisqu'elle y parcourt dans son Aphélie un arc qui est le plus petit de tous, & qu'au contraire dans le Périhélie elle décrit, dans un même espace de tems, un autre arc qui est le plus grand de tous ceux qu'elle doit parcourir. De plus il faut considérer que les plans des Méridiens ne sont pas perpendiculaires à l'Ecliptique, mais uniquement à l'Equateur, ou aux petits cercles qui lui sont paralleles ; & partant les mouvemens angulaires *dBf* qu'il a fallu supposer outre les révolutions entieres du Méridien pour composer le jour solaire, ces mouvemens, dis-je, ou plutôt les arcs qui les mesurent, ne doivent plus être égaux aux arcs *AB*. Ainsi ces deux mêmes causes dont nous venons de parler, jointes ensemble, nous produisent différens angles, & par conséquent des jours solaires inégaux entre eux.

La même chose se peut expliquer en ne faisant uniquement attention qu'au mouvement apparent du Soleil.

Il sera peut-être plus facile de concevoir ce que l'on vient d'expliquer, si au lieu de supposer le mouvement réel de la Terre, on fait plutôt attention au mouvement apparent du Soleil : d'ailleurs c'est celui-ci qui nous a été donné pour être la mesure du tems apparent. C'est

pourquoi

pourquoi il eſt à propos de ſçavoir qu'on entend par jour ſolaire ou naturel, la ſomme des deux intervalles écoulés entre une révolution entiere du premier mobile, pendant laquelle tous les points de l'Equateur paſſent ſucceſſivement par notre Méridien, & le tems qu'emploie à y paſſer l'arc de l'Equateur qui répond au mouvement diurne apparent du Soleil vers l'Orient.

Les arcs diurnes de l'Equateur ne ſçauroient être égaux aux arcs diurnes & correſpondans de l'Ecliptique. PLANCHE IX *Fig.* 2.

On remarquera préſentement que l'arc de l'Equateur qui paſſe par le Méridien en même tems que l'arc diurne de l'Ecliptique, ne lui eſt pas toujours égal, mais tantôt plus grand, tantôt plus petit, & cela quand bien même on ſuppoſeroit que le Soleil auroit un mouvement égal & uniforme dans l'Ecliptique. L'unique cauſe de cette différence vient de la poſition oblique de l'Ecliptique à l'égard de l'Equateur, comme il eſt facile de l'appercevoir par le ſecours de la ſeconde figure. Soit $\Upsilon \Omega$ un quart de la circonférence de l'Ecliptique, ΥE le quart de celle de l'Equateur, ΥA un arc d'un degré, & qu'on ſuppoſe de cette grandeur, parce qu'il ne differe pas beaucoup du mouvement diurne du Soleil dans l'Ecliptique. En effet le Soleil décrit chaque jour $59' 8''$ par ſon moyen mouvement. Soit auſſi l'arc AB un arc du Méridien ou cercle de déclinaiſon paſſant par le Soleil, & qui eſt compris entre l'Ecliptique & l'Equateur. Dans le triangle rectangle ΥBA étant donné ΥA d'un degré, & l'angle $A\Upsilon B$ qui eſt l'obliquité de l'Ecliptique ou ſon inclinaiſon de $23° \frac{1}{2}$ à l'égard de l'Equateur, on trouvera le côté ΥB de $55' 01''$. Qu'on ſuppoſe auſſi l'arc de l'Ecliptique ΥC de $89°$, l'on trouvera l'arc ΥD de l'Equateur qui lui répond de $88° 54' 34''$. Mais parce que quand l'arc $\Upsilon \Omega$ eſt de $90°$, l'arc ΥE de l'Equateur qui lui répond eſt auſſi de $90°$, il s'enſuit que la différence des arcs ΥE, ΥD, c'eſt-à-dire, l'arc DE, ſera de $1° 05' 26''$; ainſi les deux arcs ΥB, DE different comme l'on voit de $10' 25''$; quoique les deux

arcs correspondans de l'Ecliptique ΥA, $C\Omega$ soient parfaitement égaux entre eux. Il est donc certain qu'à des arcs égaux de l'Ecliptique, peuvent répondre des arcs fort inégaux de l'Equateur, & que par conséquent les arcs diurnes de l'Equateur, lorsqu'ils passent au Méridien & mesurent le jour solaire, seront fort inégaux entre eux.

La premiere cause de l'inégalité des jours apparens.

Mais ce n'est pas-là seulement l'unique cause de l'inégalité des arcs diurnes de l'Equateur, puisqu'il est vrai que le mouvement apparent du Soleil dans l'Ecliptique, est lui-même fort inégal. En effet le Soleil se meut plus lentement & par conséquent paroît demeurer un plus long intervalle de tems dans les six signes Septentrionaux, que dans les six méridionaux, la différence étant de huit jours; d'où l'on voit que quand bien même il n'y auroit aucune obliquité dans la route du Soleil, cette différence de vitesse suffiroit pour rendre inégaux les arcs diurnes de l'Equateur. Ainsi l'inégalité sera la plus grande lorsque les deux causes qu'on vient d'expliquer, sçavoir, l'inégalité du mouvement du Soleil, & celle qui dépend de l'obliquité de l'Ecliptique, se trouveront concourir, ou accumuler les différences dans un même sens. Elles peuvent d'ailleurs être détruites l'une par l'autre, ou totalement ou en partie, ce qui en diminue l'inégalité, comme il arrive chaque fois que les arcs de l'Equateur décroissent à cause de l'obliquité de l'Ecliptique, & croissent au contraire à cause du mouvement du Soleil vers le Périgée. En un mot quoiqu'elles concourent aussi dans d'autres cas à augmenter l'inégalité des jours apparens, cependant il faut toujours distinguer ces deux causes qui ne dépendent nullement l'une de l'autre, mais produisent leur effet séparément.

La seconde cause de leur inégalité.

Puisque le mouvement apparent du Soleil vers l'Orient vient d'être enfin reconnu pour inégal, il est nécessaire de

l'abandonner, & d'en chercher quelqu'autre propre à mesurer le tems, puisque celui-ci s'écoulant d'une maniere uniforme, les jours naturels & apparens ne peuvent plus servir à mesurer les mouvemens des autres corps célestes. C'est pour cette raison que les Astronomes ont imaginé d'y substituer d'autres jours moyens & d'égales durées, auxquels ils sont convenus de comparer les mouvemens des Astres. Et d'autant que les mêmes mouvemens se trouvent toujours par leurs Tables Astronomiques calculés en tems moyens ou d'égales durées, il est donc nécessaire de réduire ensuite ce tems moyen en tems apparent, si l'on en veut déduire les mouvemens tels qu'ils nous paroissent, lorsque nous conformant à l'usage vulgaire il s'agit de mesurer ou de compter le tems selon le mouvement apparent du Soleil. Tout au contraire si quelque Phénomene céleste, si quelque Eclipse, par exemple, a été observée, & qu'on veuille la comparer aux Tables Astronomiques, comme l'observation se fait toujours en tems apparent, il faudra le réduire en tems égal ou tems moyen, autrement on trouveroit une erreur ou différence qu'il faudroit se donner bien de garde d'attribuer aux Tables, ou à la négligence de l'Observateur.

Comment on peut déterminer les jours moyens, ou dont les durées soient toujours égales.

Or puisque nous n'appercevons aucun corps dans la nature qui conserve parfaitement & d'une maniere uniforme son mouvement, & que cependant ce seroit celui-là qu'il faudroit choisir pour désigner les jours ou les heures d'une égale durée, il faut donc recourir à quelques suppositions, comme de feindre un astre qui parcourroit l'Equateur en s'avançant vers l'Orient, sans jamais accélérer ni rallentir son mouvement, mais qui acheveroit sa révolution entiere dans l'Equateur dans le même intervalle de tems que le Soleil emploie à parcourir l'Ecliptique. Ainsi le mouvement apparent de cet astre désigneroit

De quelle maniere on a établi les jours égaux ou moyens.

véritablement le tems moyen ou égal, ſon mouvement diurne dans l'Equateur étant de $59' 8''$, préciſément égal au moyen mouvement du Soleil dans l'Ecliptique. Partant les jours moyens où d'égales durées ſeroient déſignés par le paſſage de cet aſtre au Méridien, le jour moyen étant la ſomme du tems qui s'écoule pendant une révolution entiere de l'Equateur de $360°$ plus $0° 59' 8''$ de la révolution ſuivante : car cette addition continuelle de $59' 8''$ étant parfaitement la même chaque jour, il s'enſuit que les jours moyens ſeront parfaitement égaux.

Equation du Tems, ce que c'eſt.

Maintenant puiſque le Soleil nous paroît chaque jour s'avancer plus ou moins vîte vers l'Orient, ſur-tout ſi l'on rapporte ſon mouvement à l'Equateur, il eſt hors de doute qu'il ne paſſe quelquefois au Méridien un peu plutôt que l'Aſtre Suppoſé, & quelquefois auſſi un peu plus tard. Or la différence qui en réſulte, eſt celle qui ſe trouve entre le tems vrai ou apparent, & le tems moyen. On pourra la déterminer ſi l'on compare le lieu de l'Aſtre Suppoſé dans l'Equateur avec le point du même Equateur qui paſſe au Méridien en même tems que le Soleil; car la différence des deux arcs étant convertie en tems égal, donnera, comme l'on voit, celle qui ſe trouve entre le Tems vrai, & le Tems moyen. C'eſt cette différence qu'on nomme l'*Equation du Tems*, c'eſt, dis-je, le tems qui s'écoule pendant le paſſage au Méridien d'un arc de l'Equateur compris, entre le point du même cercle qui déſigne l'aſcenſion droite du Soleil, & le lieu de l'aſtre que l'on a ſuppoſé ſe mouvoir uniformément dans l'Equateur.

Elle renferme deux Elémens qui la compoſent.

PLANCHE IX. *Fig.* 3. & 4.

Soit $\text{Æ}Q$ un arc de l'Equateur, EC un arc de l'Ecliptique dans lequel S repréſente le lieu du Soleil. Si l'on fait paſſer par le Soleil le cercle de déclinaiſon SA qui rencontre au point A l'Equateur, A ſera le vrai point de ce cercle qui doit paſſer au Méridien en même tems que le Soleil. Soit préſentement m le lieu de l'Aſtre

Supposé, qui parcourt l'Equateur d'un mouvement égal & uniforme, il est évident que le Soleil étant au Méridien, l'astre supposé differera de son lieu réduit de la quantité mA. Si le point m est plus oriental que le point A, l'astre supposé arrivera plus tard au Méridien que le point A, c'est-à-dire, plus tard que le Soleil, de sorte que le tems apparent précedera pour lors le tems égal ou moyen. Mais si le point m est plus occidental que le point A, ce point m arrivera plutôt au Méridien, & partant le tems apparent sera précedé par le tems moyen. Ainsi l'arc mA converti en heures, minutes, &c. est l'Equation du tems qu'il faudra ajouter ou retrancher du tems apparent, selon que le point m sera oriental ou occidental à l'égard du point A, ce qui servira à le réduire en tems moyen: or afin de découvrir la situation du point A à l'égard du point m, & par conséquent la valeur de l'arc mA, on prendra sur l'Equateur l'arc Υs ou $\simeq s$ égal à l'arc ΥS ou $\simeq S$ de l'Ecliptique, & l'arc sm sera la différence entre le vrai lieu du Soleil, & son lieu moyen: cet arc est donné si l'on sçait le degré d'anomalie du Soleil. D'ailleurs l'arc As est la différence entre l'hypotenuse ΥS d'un triangle rectangle ΥSA & la base ΥA: enfin cette différence est facile à calculer par la Trigonométrie, ainsi l'arc Am sera donné, puisqu'il est égal à la somme ou à la différence des arcs As, sm.

Dans quels cas le tems vrai suit le tems moyen.

De quelle maniere l'Equation du tems est composée, de deux parties.

On voit encore par la figure que dans le premier & le troisieme quart de la circonférence de l'Ecliptique, le point s tombe à l'Orient à l'égard du point A, & partant que cet arc As converti en tems, est soustractif, puisque le point s arrive plus tard au Méridien que le point A. Dans le second & quatrieme quadrant de l'Ecliptique, le point s tombant à l'Occident du point A, ce point arrive par conséquent au Méridien avant le point A, & partant l'arc As converti en tems, doit être ajouté au tems appa-

On explique ici séparément l'effet de chacune des parties qui composent l'Equation du tems.

rent, puiſque ſi l'on compte midi il eſt déja paſſé relativement au point *s*. Soit, par exemple, l'arc *As* de 2°. 0′ tel qu'il eſt en effet lorſque le Soleil eſt au vingt-huitieme degré du Belier, cet arc converti en tems répond à 8′* qu'il faut par conſéquent ajouter au tems vrai ou apparent pour avoir celui auquel le point *s* doit paroître au Méridien.

* *L'Equation en ce cas eſt ſouſtractive ; & 12h ſe réduiſent à 11h 52′ de Tems moyen.*

D'un autre côté dans le premier demi-cercle d'anomalie (c'eſt-à-dire, pendant le ſiecle où nous vivons) depuis le huitieme ou neuvieme degré de l'Ecreviſſe juſqu'au huitieme ou neuvieme degré du Capricorne, le moyen mouvement du Soleil eſt plus rapide que ſon mouvement vrai ; & partant dans le même demi-cercle le point *m* ſera conſtamment plus oriental que le point *s*, ainſi l'arc *ms* converti en tems doit être retranché du tems auquel le point *s* arrive au Méridien. Mais au contraire dans l'autre demi-cercle d'Anomalie, c'eſt-à-dire, après le paſſage du Soleil au Périgée, ſon moyen mouvement eſt plus lent que ſon mouvement vrai, & par conſéquent le lieu moyen ſuit le lieu vrai ; d'où il arrive que le point *m* tombera à l'Occident du point *s*, & qu'il paroîtra par conſéquent plutôt au Méridien. Ainſi l'arc *ms* converti en tems, doit être ajouté à l'inſtant auquel le point *s* arrivera au Méridien. Or il eſt aiſé de voir qu'étant donné l'intervalle de tems écoulé entre les paſſages au Méridien des points *m* & *s*, comme auſſi entre les points *m* & *A*, on aura par conſéquent l'intervalle écoulé entre le tems vrai ou apparent & le tems moyen, c'eſt-à-dire, l'Equation du tems.

Des deux différentes Tables de l'Equation du tems.

Pour réduire le tems apparent en tems moyen toutes les fois qu'il ſera néceſſaire, les Calculateurs ont conſtruit deux ſortes de Tables, l'une pour l'arc *sm* à chaque degré d'Anomalie moyenne du Soleil ; enſorte que ſi le point *m* eſt à l'Occident du point *s*, le ſigne de l'Equation eſt marqué additif ; mais ſi c'eſt dans le ſens contraire, il

eſt marqué ſouſtractif. L'autre Table eſt conſtruite pour l'arc sA: c'eſt la différence entre le lieu du Soleil dans l'Ecliptique & ſon aſcenſion droite. Les Equations ſont marquées de même dans cette ſeconde Table par les ſignes d'addition ou de ſouſtraction, c'eſt-à-dire, ſelon que le point s eſt occidental ou oriental à l'égard du point A*. Ainſi la ſomme de ces deux différentes Equations lorſqu'elles ſont toutes deux de mêmes dénominations, c'eſt-à-dire, ſi toutes deux ſont additives ou ſouſtractives; ou bien leur différence, ſi elles ont diverſes dénominations, donnera l'Equation abſolue, qui eſt l'Equation du Tems que l'on cherche.

*Voyez les deux Tables page 154.

De la Table générale de l'Equation du Tems.

Il eſt arrivé auſſi que les Calculateurs ont conſtruit une Table générale **, laquelle eſt compoſée des deux Equations ci-deſſus: mais elle n'eſt pas perpétuelle ni de longue durée. Elle peut cependant ſervir ſans erreur bien ſenſible pendant près d'un ſiecle; puiſque dans l'eſpace de cent ans les mêmes degrés d'anomalie répondent à très-peu près aux mêmes degrés de l'Ecliptique. Il ſeroit mieux cependant de ne conſtruire cette Table générale que pour un intervalle de cinquante ans tout au plus: or de cette maniere les deux Equations n'en compoſent plus qu'une ſeule. Mais comme la Préceſſion des Equinoxes fait varier le lieu de l'Apogée du Soleil, ou plutôt le lieu de l'Aphélie de la Terre, enſorte qu'il doit enfin (de même que les Etoiles fixes), s'avancer d'une quantité trop ſenſible vers l'Orient; il eſt aiſé de voir que les mêmes degrés d'Anomalie ne répondant plus aux mêmes points de l'Ecliptique, une ſeule & unique Table ne ſçauroit être exacte, car elle ſeroit ſujette à de grandes erreurs dans les autres ſiecles.

Au reſte l'aſtre que nous avons ſuppoſé ſe mouvoir uni-

** Cette Table générale ſe trouve dans la plupart des Ephémérides, & dans quelques autres Livres intitulés: *Tables Aſtronomiques*, &c.

Premier cas où l'on détermine quand est-ce que les jours solaires commencent à devenir plus longs que les jours moyens.

formément dans l'Equateur, & qui mesure le Tems moyen, doit s'avancer toujours vers l'Orient, comme nous l'avons dit: mais le point *A* qui désigne l'ascension droite du Soleil, & par conséquent le tems apparent, anticipe ou suit alternativement le point *m*, de maniere qu'il doit se trouver tantôt à l'Orient du point *m*, tantôt à l'Occident, & partant convenir quelquefois précisément avec ce même point *m*. Or quand le mouvement du point *A*, relativement à l'Astre Supposé, se fait vers l'Orient, alors ce point *A* devient plus oriental que l'Astre Supposé, & les jours apparens plus longs que les jours moyens. En effet plus le point *A* se meut rapidement vers l'Orient, plus les jours solaires deviendront longs, puisqu'outre une révolution entiere de l'Equateur, il y a une plus grande portion d'arc de la révolution suivante à ajouter, pour composer le jour solaire, & cela à cause d'un plus grand espace qui reste à parcourir vers l'Orient. Il est donc vrai de dire que dès-lors même que le mouvement relatif du point *A* commence à se faire vers l'Orient, les jours solaires commencent aussi à devenir plus longs que les jours moyens. Remarquez qu'on ne prétend parler ici que du mouvement qui se fait relativement à l'Astre Supposé *m*, car le mouvement absolu de chacuns se fait toujours vers l'Orient. Au contraire quand le point *A*, quoique toujours plus oriental que *m*, commence à s'approcher de l'Astre Supposé *m*, ou plutôt quand le point *A* commence à rendre vers l'Occident relativement au point *m*, alors les jours solaires deviennent plus courts que les jours moyens. Enfin lorsque le point *A* se sera éloigné le plus qu'il est possible de l'astre *m*, soit à l'Orient, soit à l'Occident, alors les jours solaires seront égaux aux jours moyens; & c'est dans ces points-là qu'arrivent les plus grandes équations. On voit encore que quand le mouvement du point *A* vers l'Orient est le plus rapide, alors les jours solaires

II. Cas où l'on examine quand est-ce qu'ils doivent devenir plus courts.

III. Cas où l'on fait voir quand les jours solaires sont égaux aux jours moyens.

IV. & dernier Cas.

sont

ſont les plus longs de tous, & qu'au contraire les jours ſolaires ſont les plus courts qu'il eſt poſſible, lorſque le point *A* ſe meut le plus lentement qu'il eſt poſſible, c'eſt-à-dire, lorſque ſon mouvement vers l'Occident eſt le plus grand relativement au point *m*.

Dans quels tems de l'année arrivent les plus grandes équations du tems.

Pendant ce XVIIIe ſiecle lorſque le Soleil eſt au dixieme degré du Scorpion, le point *A* eſt le plus éloigné qu'il eſt poſſible de l'aſtre ſuppoſé *m* vers l'Occident, ſa diſtance étant alors de $4^{\circ}\ 0'\ 45''$; & partant la plus grande équation eſt alors de $0^{h}\ 16'\ 11''$. Dès ce moment-là les jours ſolaires commencent à augmenter juſqu'à ce que le Soleil ſoit parvenu au $22^{\circ}\frac{1}{2}$ du Verſeau. De même lorſque le point *A* eſt le plus avancé qu'il eſt poſſible vers l'Orient, & qu'il eſt éloigné de l'aſtre ſuppoſé *m*, de $3^{\circ}\ 42'\frac{1}{2}$, la plus grande équation du tems eſt de $0^{h}\ 14'\ 50''$, & dès cet inſtant même le mouvement relatif du point *A* ſe fait vers l'Occident, juſqu'à ce que le Soleil parvienne au vingt-quatrieme degré du Taureau où le point *A* eſt $1^{\circ}\ 1'\frac{1}{2}$ plus occidental que l'aſtre ſuppoſé *m*, enſorte que la plus grande équation du tems eſt alors de $4'\ 6''$. Enſuite le point *A* ſemble retourner encore vers l'Orient juſqu'à ce que le Soleil ſoit au $3^{\circ}\frac{1}{4}$ du Lion; & ce point *A* eſt alors diſtant du point *m* de $1^{\circ}\ 28'\frac{1}{4}$ qui répondent à l'Equation du tems $0^{h}\ 5'\ 53''$. Enfin le mouvement relatif du point *A* ſe fait vers l'Occident juſqu'à ce que le Soleil ſoit de retour au dixieme degré du Scorpion, d'où ce même point *A* recommencera derechef à s'avancer vers l'Orient. Il eſt évident par-là que toutes les fois que les points *m* & *A* ſe rencontreront, le tems apparent conviendra pour lors avec le tems moyen.

Si donc l'on éprouve ce qui doit arriver à une horloge à pendule parfaitement bien conſtruite, & dont le mouvement ſeroit réglé ou accommodé au mouvement moyen du Soleil, & qu'on en faſſe une fois convenir les aiguilles

avec le tems moyen, il eſt certain que cette horloge, dont la marche eſt ſuppoſée uniforme, marquera conſtamment un tems différent de l'heure vraie ou tems apparent, & cela toute l'année, excepté quatre fois ſeulement à des jours fort éloignés, comme le 15 Avril, le 17 Juin, le 31 Août, & le 24 Décembre. Dans tous les autres tems l'heure marquée par les aiguilles de l'horloge anticipera ou retardera ſur l'heure marquée par le Soleil, & la plus grande différence ſera ſur-tout le 3 Novembre, où ſon mouvement ſemblera le plus lent, c'eſt-à-dire, lorſqu'elle paroîtra à midi retarder de 16′ 11″.

Si l'on cherche enfin dans quels points doivent arriver les plus grandes équations, on les trouvera en y employant la ſolution du Probleme ſuivant, qui eſt de M. Hallei : mais pour entendre plus facilement le Probleme de cet illuſtre Aſtronome, il faut démontrer d'abord la propoſition ſuivante.

LEMME.

Si une figure plane eſt projettée orthographiquement ſur un plan donné, c'eſt-à-dire, ſi de chacun de ſes points on abaiſſe des perpendiculaires ſur le plan propoſé, la projection qui ſe fera de la figure ſur le plan où elle eſt projettée, ſera à la figure elle-même, comme le coſinus de l'inclinaiſon des deux plans, eſt au rayon.

LEs figures planes, quelque compoſées qu'elles ſoient, ſe peuvent réduire, comme l'on ſçait, en parallélogrammes ou en triangles, dont les baſes ſeront paralleles à la commune ſection des deux plans : ainſi ces mêmes baſes ſeront paralleles au plan de Projection, & par là tant les baſes que leurs projections ſeront égales & paralleles, comme on l'a démontré au Chapitre XIII.

Mais les perpendiculaires abaiſſées du ſommet de chaque triangle ſur leurs baſes, ſeront auſſi perpendiculaires à la commune ſection des deux plans *: & partant l'inclinaiſon des perpendiculaires à l'égard du plan de projection, ſera égale à l'inclinaiſon des deux plans. Or les projections de ces perpendiculaires ſont à ces mêmes perpendiculaires, comme le coſinus de l'inclinaiſon des deux plans, eſt au rayon; il eſt donc vrai de dire que chaque Triangle ou Parallélogramme eſt projetté en un autre, dont la baſe (ſoit du Triangle, ſoit du Parallélogramme) doit être une baſe égale, & dont la hauteur ſera à la hauteur ſur le plan de projection, comme le coſinus de l'inclinaiſon des deux plans, eſt au rayon. D'ailleurs les Triangles ou les Parallélogrammes qui ont des baſes égales, ſont entre eux comme les Perpendiculaires abaiſſées des ſommets ſur leurs baſes; il s'enſuit donc que la projection d'un Triangle quelconque, ſera au Triangle correſpondant dans le plan propoſé, en raiſon donnée & que par conſéquent les projections de tous les Triangles pris enſemble, c'eſt-à-dire, la projection entiere de la figure, ſera à la ſomme de tous les Triangles dans leſquels on a partagé la figure propoſée, dans la même raiſon conſtante, c'eſt-à-dire, comme le coſinus de l'inclinaiſon des plans, eſt au rayon.

* *Euclid. Liv. I. Prop. 29.*

Maintenant ſi l'on conçoit l'orbite terreſtre projettée par des perpendiculaires ſur le plan de l'Equateur, cette projection ſera une Ellipſe dont la circonférence ſera parcourue par le point qui eſt à l'extrémité de la ligne perpendiculaire abaiſſée du lieu de la Terre ſur le plan de l'Equateur. Ce point par ſon mouvement déſignera l'aſcenſion droite de la Terre ou ſon mouvement réduit à l'Equateur vu du Soleil, auquel ſera toujours égal le mouvement du Soleil en aſcenſion droite, vu de la Terre. Soit $\Upsilon A \triangleq C$ l'Ellipſe qui repréſente la projection de l'orbite terreſtre, S le point

PLANCHE IX. *Fig. 5.*

qui correſpond au centre du Soleil, $\Upsilon S \simeq$ la commune ſection de l'Ecliptique & de l'Equateur, A le point de l'Ellipſe où tombe la perpendiculaire abaiſſée de la Terre, l'angle ΥSA meſurera l'aſcenſion droite du Soleil. Or je dis que le point A qui déſigne le mouvement en aſcenſion droite, ſe doit mouvoir de telle ſorte dans l'Ellipſe $\Upsilon A \simeq C$, qu'il décrira autour du point S des aires proportionnelles aux tems. Car ſuppoſons que dans un tems donné le point A ſe meuve ſelon l'arc AB de l'Ellipſe, & qu'on ait mené les lignes AS & BS, la figure ASB repréſentera la projection de l'aire elliptique que la Terre décrit pendant le même tems dans le plan de l'Ecliptique autour du Soleil ; & par conſéquent la projection ASB, ſera à l'aire correſpondante de l'orbite terreſtre, comme le coſinus de l'inclinaiſon de l'Ecliptique & de l'Equateur, eſt au rayon. Mais l'aire totale elliptique $\Upsilon A \simeq C$, eſt à l'orbite terreſtre préciſément dans le même rapport ; donc en raiſon alterne la figure ASB, ſera à l'aire elliptique toute entiere, comme le tems employé à parcourir l'aire qu'on a ſuppoſée dans l'orbite de la Terre, (dont ASB eſt la projection), eſt au tems périodique de la Terre, c'eſt-à-dire, au tems employé à décrire l'Ellipſe entiere $\Upsilon A \simeq C$. Il eſt donc vrai de dire que le point A ſe meut autour du point S de telle ſorte, qu'il décrit des aires proportionnelles aux tems.

PLANCHE IX. *Fig. 6.* Ceci étant ſuppoſé, ſi du centre S & de l'intervalle SA, qui eſt moyen proportionnel entre le grand & le petit axe de l'Ellipſe, on décrit un cercle ; ſa ſurface ou ſon aire ſera égale à celle de l'Ellipſe, comme on le démontre dans les Traités des Sections coniques. Mais ce cercle coupera l'Ellipſe en quatre points E, F, G, H. Or ce ſont ces points-là qui doivent déſigner l'aſcenſion droite du Soleil lorſque les équations du tems ſont les plus grandes qu'il eſt poſſible. Car ſi l'on imagine un point M dans la cir-

conférence du cercle & qu'on le faſſe mouvoir uniformément, il eſt clair que le mouvement de ce point repréſentera celui de l'aſtre qu'on a ſuppoſé ci-deſſus, & qu'il décrira autour du point *S* des ſecteurs circulaires proportionnels aux tems. Et parce que la ſurface ou l'aire totale du cercle eſt égale à celle de l'Ellipſe, il s'enſuit que celles des ſecteurs du cercle, & celles des ſecteurs elliptiques décrites dans le même tems autour du point *S*, ſeront égales entre elles. C'eſt pourquoi ſuppoſons d'abord que le point *M* dans la circonférence du cercle, & le point correſpondant dans la circonférence de l'Ellipſe, ſe trouvent dans une même ligne droite *SM*, & qu'enſuite ils paroiſſent l'un en *m* & l'autre en *A*, alors l'aire Elliptique *LSA* ſera égale à l'aire circulaire *MSm*. D'ailleurs puiſque l'arc *Mm* eſt en-dehors au-delà de l'Ellipſe, l'angle *MSm* ſera plus petit que l'angle *MSA*; de ſorte que la différence de ces angles ſera meſurée par l'arc *mA*, qui eſt l'équation du tems. Enſuite lorſque le point *A* qui déſigne l'aſcenſion droite, ſera parvenu à l'interſection commune du cercle & de l'Ellipſe, ſon mouvement angulaire autour du Soleil en cet endroit, ſera égal à celui du point *m*. Car ſoient les aires correſpondantes *mSn*, *ASF* parcourues dans des tems infiniment petits, & qui ſoient égales; il eſt évident que le produit de *qF* par *SF* ſera égal à celui de l'arc *mn* par *Sm*; & partant à cauſe des lignes égales *SF*, *Sm*, les arcs *Fq*, *mn* ſeront égaux entre eux. Ainſi le mouvement en aſcenſion droite au point *F*, ſera donc en ce cas égal à celui du point *m*, ou de l'aſtre ſuppoſé dans l'Equateur: la même démonſtration peut ſervir pour les points *G*, *H*, *E*. Mais puiſqu'on a fait voir ci-deſſus que ce n'eſt uniquement que dans les points où le mouvement en aſcenſion droite eſt égal au moyen mouvement de la Terre ou de l'aſtre ſuppoſé, qu'arrivent les plus grandes équations du tems, ces plus grandes

équations ſeront par conſéquent aux points *F*, *G*, *H*, *E*.

Si l'on veut ſçavoir encore en quels points arrivent les plus longs & les plus courts jours, voici la ſolution que M. Hallei en a communiquée. Il faut ſuppoſer d'abord que l'Ellipſe ♈♋♎♑ ſoit comme ci-devant la projection de l'orbe de la Terre, enſorte que le point *S* réponde au centre du Soleil. Le point *K* étant le centre de l'Ellipſe, on prolongera *KS* de part & d'autre, de maniere que *KG* & *SH* ſoient à *KS* (qui eſt la projection de l'excentricité) comme le quarré du rayon eſt au quarré du ſinus de l'obliquité de l'Ecliptique : on menera par le point *K* la ligne ♈♎ parallele à la commune ſection de l'Ecliptique & de l'Equateur, & par le même point on lui élevera à angles droits la ligne ♋*K*♑. Enſuite par le point *G* on menera *GF* parallele à ♋♑, & par le point *H* la droite *FH* parallele à ♈♎. Enfin par les points *S* & *K* on fera paſſer une hyperbole dont les aſymptotes ſoient *FG*, *FH*. Cette hyperbole & ſon oppoſée *CD* couperont l'Ellipſe dans les points que l'on cherche, c'eſt-à-dire, que quand le Soleil arrivera aux points de l'Ecliptique qui correſpondent, par exemple, aux points *D* & *B*, alors les jours ſeront les plus longs, mais ſur-tout en *B* ils ſeront plus longs qu'en *D* : au contraire les points de l'Ecliptique qui ſont correſpondans en *A* & *C*, détermineront les plus courts jours, & ſur-tout en *A* ils ſeront plus courts qu'en *C*.

PLANCHE IX. *Fig.* 7.

La démonſtration doit paroître évidente ſi l'on ſe rappelle que le point qui déſigne l'aſcenſion droite du Soleil ſe meut tellement dans la circonférence de l'Ellipſe, qu'il décrit des aires proportionnelles aux tems, comme on l'a fait voir ci-deſſus. Mais comme la viteſſe angulaire de ce point eſt conſtamment en raiſon renverſée du quarré de ſa diſtance au point *S*; il ſuit donc que les viteſſes ſeront les plus grandes lorſque les lignes droites tirées du point *S* à

la circonférence de l'Ellipſe, ſeront les plus petites ; & qu'au contraire les vîteſſes ſeront les plus petites, lorſque les lignes droites menées du point *S* à la circonférence de l'Ellipſe ſeront les plus grandes. Or il eſt certain ſelon la conſtruction précédente, & par la *Propoſ. 62. du 5. Liv. des Sections Coniques d'Apollonius* *, que les hyperboles que l'on vient de décrire, coupent l'Ellipſe dans les points *A* & *C* où les droites *SA*, *SC* ſont les plus grandes, & au contraire dans les points *B* & *D* où les droites *SB*, *SD* ſont les plus petites ; car c'eſt dans ces mêmes points que tombent du point *S* les lignes droites perpendiculaires à la courbe *SB*, *SC*, *SD*, *SA*. Il eſt donc vrai de dire que le mouvement du Soleil en aſcenſion droite ſera le plus rapide en *B* & *D*, & partant les jours les plus longs qu'il eſt poſſible ; mais qu'au contraire le mouvement le plus retardé ſera en *C* & *A*, & qu'en ces deux derniers points la durée du jour apparent ſera la plus petite.

* *Edit. d'Oxford de l'année 1710.*

CHAPITRE VINGT-SEPTIEME.

De la Théorie des autres Planetes.

La Théorie des autres Planetes, ſuppoſe néceſſairement celle de la Terre.

APRE'S avoir expliqué la Théorie du mouvement annuel de la Terre, après avoir donné les différentes méthodes pour trouver la figure de ſon orbite, & la poſition de la ligne des Apſides, ce qui étoit abſolument néceſſaire pour conſtruire des Tables du Soleil, & par conſéquent pour calculer à tel tems donné que ce ſoit, le lieu de la Terre dans l'Ecliptique, ou ſon lieu oppoſé, qui eſt celui du Soleil ; nous allons paſſer à la Théorie des autres Planetes, laquelle, comme on l'a déja fait voir, ſuppoſoit néceſſairement que l'on connût la Théorie du mouvement de la Terre.

Le lieu Géocentrique & le lieu Héliocentrique d'une Planete supérieure, ne sont qu'un seul & même point au tems de son opposition au Soleil.

Nous commencerons d'abord par déterminer les tems des révolutions des Planetes, c'est-à-dire, le tems que chacune employe à parcourir la circonférence de son orbite. Pour cet effet nous remarquerons, 1°. que lorsque les Planetes supérieures sont Achroniques, c'est-à-dire, en opposition au Soleil, nous les voyons de la Terre répondre précisément au même point de l'Ecliptique, que si notre œil étoit transporté dans le Soleil. En second lieu lorsque les Planetes inférieures sont en conjonction avec le Soleil, ou qu'elles passent sur son disque apparent, nous les voyons de la Terre précisément dans le lieu de l'Ecliptique opposé à celui où notre œil les rapporteroit s'il étoit placé dans le Soleil. C'est pourquoi il faudra se souvenir que toutes les fois qu'une Planete supérieure nous paroît en opposition au Soleil, alors sa longitude *Géocentrique* est la même que sa longitude *Héliocentrique*; mais que quand une Planete inférieure nous paroît en conjonction avec le Soleil, ou avec quelque point de son disque lumineux, son lieu Héliocentrique est alors directement opposé à son lieu Géocentrique; c'est-à-dire, à son lieu vu de la Terre. Outre cela lorsque les Planetes inférieures se trouvent dans leurs plus *Grandes Elongations* au Soleil, alors l'angle qui est formé au centre du Soleil par les deux lignes droites tirées l'une à la Terre, & l'autre à la Planete, est toujours le complément de l'élongation de la Planete au Soleil, (car on peut bien supposer que dans des orbites qui sont à très-peu près circulaires, la tangente de cet orbite est toujours perpendiculaire à la ligne droite menée du Soleil au point d'attouchement); & partant cet angle au Soleil sera déterminé. Mais puisqu'on connoît le point de l'Ecliptique où est la Terre dans le tems de la plus grande élongation, on aura donc pour le même tems le point de l'Ecliptique où la Planete inférieure doit être vue du Soleil, c'est-à-dire, son vrai Lieu Héliocentrique.

Je

Je suppose présentement qu'on observe deux années de suite, c'est-à-dire, deux fois successivement, le tems de l'opposition d'une Planete supérieure au Soleil; ce sera si l'on veut la Planete de *Jupiter*: il suit de ce que nous venons d'expliquer tout-à-l'heure, que l'on aura par ce moyen l'arc que Jupiter aura parcouru dans son orbite, ou, ce qui est la même chose, l'arc vu du Soleil qu'il aura paru décrire sur son orbite dans le tems écoulé entre ces deux oppositions. On fera donc, comme cet arc de son orbite, est à la circonférence entiere 360°, ainsi le tems écoulé entre les deux oppositions observées, à un quatrieme terme. Ainsi ce quatrieme terme sera à très-peu près le tems de la révolution périodique de Jupiter. On appliquera la même regle aux Planetes inférieures; car ayant observé deux fois de suite leurs lieux Héliocentriques, on connoîtra à très-peu près le tems de leurs révolutions périodiques. Je dis à très-peu près, car cette regle suppose que le mouvement de la Planete se fait dans un cercle, & que son mouvement soit uniforme; ce que l'on sçait n'être pas exactement vrai. Ainsi cette méthode ne donne pas d'abord assez bien les tems des révolutions des Planetes.

Premiere méthode pour déterminer les tems des révolutions périodiques des Planetes.

Voici donc l'autre méthode qu'il faut employer lorsqu'on veut connoître avec encore plus d'exactitude, les tems des révolutions des Planetes. On observera le lieu d'une Planete lorsqu'elle est proche de son nœud, & l'on comparera ce tems avec celui de son retour au même nœud; car le tems écoulé entre ces deux observations sera le vrai tems de la révolution périodique de la Planete: ce qui est évident, puisque toutes les Planetes (comme on l'a vu dans les Chapitres précédens) se meuvent dans des orbites inclinées au plan de l'Ecliptique. Or comme le Soleil se trouve au foyer commun de toutes ces orbites, & que par conséquent les communes sections de leurs plans avec celui de l'Ecliptique se font nécessairement dans des li-

Autre méthode encore plus exacte.

gnes qui passent par le centre du Soleil, & qui prolongées de part & d'autre jusqu'aux Etoiles fixes, désignent les lieux des nœuds dans le Ciel ; il est clair que chaque Planete ne doit revenir qu'une seule fois au même nœud à chaque révolution périodique. D'ailleurs les nœuds des Planetes sont ou fixes & immobiles dans le Ciel étoilé, ou du moins s'ils ont quelque mouvement, ce mouvement ne peut être bien sensible dans le tems d'une révolution. On connoîtra donc ainsi fort exactement les tems des révolutions périodiques de toutes les Planetes, si l'on a deux bonnes observations de chacune de ces mêmes Planetes lorsqu'elles ont passé à leurs nœuds, c'est-à-dire, dans le lieu de l'Ecliptique, où elles se sont trouvées n'avoir aucune latitude.

Cette derniere méthode sert encore à déterminer la position des nœuds.

PLANCHE IX. *Fig.* 8.

Ces mêmes observations donneront encore la position des nœuds des Planetes, c'est-à-dire, les lieux de l'Ecliptique où se termine la ligne des nœuds, en un mot la commune section du plan de l'Ecliptique, & l'orbite de la Planete observée. Nous avons déja averti qu'on supposoit pour cet effet la Théorie de la Terre, ensorte que *ATB* en soit l'orbite : soit aussi *CND* celle de la Planete, la commune section *NSn* des plans de ces deux orbites, sera la position de la ligne des nœuds. Et si l'on suppose que dans le tems de la premiere observation la Terre se trouve en *T* & la Planete en *N*, le lieu de la Planete vu de la Terre se connoissant par observation, & la Théorie de la Terre donnant le vrai lieu du Soleil pour le même tems, on connoîtra par conséquent l'arc de l'Ecliptique compris entre le lieu de la Terre & celui de la Planete, c'est-à-dire, qu'on connoîtra l'angle *NTS*. Dans la seconde observation soit supposée la Terre en *t* & la Planete de retour au même nœud, c'est-à-dire, au point *N* de son orbite, on trouvera, comme on a fait au tems de la premiere observation, l'arc de l'Ecliptique compris entre le

lieu de la Terre & celui de la Planete, en un mot l'angle *NtS*. Cela suppoſé,

Dans le Triangle rectiligne *TSt*, on connoît par la Théorie du Soleil les côtés *TS*, *ts* & l'angle *TSt*. Ainſi on trouvera par la Trigonométrie rectiligne les angles *STt*, *StT*, & le côté *Tt*. Maintenant ſi de l'angle donné *STt*, on ôte l'angle *NTS* qui eſt donné par l'obſervation, le reſte ſera l'angle *NTt*: mais ſi l'on ajoute à l'angle donné *StT* l'angle donné *NtS*, la ſomme ſera l'angle *NtT*. Ainſi dans le Triangle *NtT* on connoît deux angles & le côté *Tt* qui vient d'être trouvé, c'eſt pourquoi on connoîtra la diſtance *NT* de la Planete à la Terre au tems de la premiere obſervation. Mais dans le Triangle *NTS* étant donnés les côtés *NT*, *TS* & l'angle compris *NTS* qui eſt donné par obſervation, on connoîtra le côté *NS* diſtance du nœud de la Planete au centre du Soleil, & l'angle *TSN* qui détermine la poſition du nœud de la Planete. Enfin puiſque la Théorie du Soleil ou de la Terre donne le lieu de la Terre dans l'Ecliptique vu du Soleil, l'angle *TSN* étant connu, on aura donc tout d'un coup le lieu de l'Ecliptique où doit être vu du Soleil le point *N* qui eſt le lieu du nœud de la Planete; & partant le point *n* qui lui eſt oppoſé, ſera le lieu de l'autre nœud: d'où l'on voit que par cette méthode la poſition des nœuds ſe détermine aſſez facilement & avec préciſion.

Nous ne ſçaurions gueres nous diſpenſer ici, après avoir expliqué la méthode de déterminer la poſition des nœuds, de rechercher en ſuivant la même route l'inclinaiſon des orbites de chaque Planete au plan de l'Ecliptique. Le lieu du nœud étant donné, la Théorie du Soleil fera connoître ſucceſſivement les tems où la Terre ſe trouvera dans la ligne des nœuds de chaque Planete. On obſervera donc dans le même tems la latitude Géocentrique de la Planete & ſa longitude, ou plutôt ſa diſtance

On détermine encore par le moyen de ces Obſervations & de quelques autres, faites proche les limites, l'inclinaiſon des orbites de chaque Planete au plan de l'Ecliptique.

au nœud opposé à celui où se trouve la Terre. Or on va prouver que la latitude Héliocentrique de la Planete sera égale à cette latitude observée, toutes les fois que la Planete vue du Soleil paroîtra à la même distance du nœud.

PLANCHE IX. *Fig. 9.* Car soit *CPD* l'orbite de la Planete, *NSn* la ligne des nœuds; lorsque l'on a observé la Planete en *P*, alors le Soleil, la Planete & la Terre se trouvoient exactement dans un même plan, sçavoir, celui de l'orbite de la Planete. Soit donc abaissée du point *P* la perpendiculaire *PE*, & tirée la droite *NE* qui sera dans le plan de l'Ecliptique; le plan du triangle *NPE* sera donc perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, & l'angle *PNE* sera la latitude observée de la Planete. C'est pourquoi l'on menera par le point *S* la droite *Spf* parallele à *NP*, & de même la droite *pe* parallele à *PE*; d'où il suit que le plan qui passera par les lignes *Sp*, *pe* sera parallele au plan du Triangle *NPE*, & par conséquent perpendiculaire à l'Ecliptique. Ainsi la ligne *Se* commune Section de ce plan avec celui de l'Ecliptique, sera parallele à *NE* & à cause des lignes *Sp*, *Se* paralleles à *NP*, *NE*, l'angle *pSe* sera égal à l'angle *PNE* qui est la latitude de la Planete observée de la Terre, lorsqu'elle étoit située au nœud de la Planete.

Soit donc supposé présentement *nf* une portion de l'orbite de la Planete prolongée jusqu'au Ciel, *nh* une portion de l'Ecliptique, & *fh* l'arc d'un cercle de latitude qui passeroit par le point *f*; dans le Triangle sphérique rectangle *nhf*, la distance *nh* de la Planete au nœud, & sa latitude *hf* sont donnés, c'est pourquoi on connoîtra par la Trigonométrie l'angle *hnf* qui est l'inclinaison de l'orbite de la Planete au plan de l'Ecliptique.

Maniere de déterminer le lieu héliocentrique d'une

Je suppose présentement cette inclinaison connue, & que l'on ait aussi observé le lieu d'une Planete au tems de son opposition au Soleil, ou lorsqu'elle est Achronique;

je dis que l'on connoîtra pour lors son vrai lieu héliocentrique, ou le lieu qu'elle occupe dans son orbe. Car soit *ATB* l'orbite de la Terre, *DPE* l'orbite de la Planete, & *P* le vrai lieu de la Planete, *T* celui de la Terre, & enfin *NSn* la ligne des nœuds qui passe par le Soleil au point *S*. Le lieu de la Planete réduit à l'Ecliptique sera dans la ligne *ST* qui passe par le lieu de la Terre, suivant ce que nous avons expliqué ci-dessus; & si l'on observe l'angle *PTE* qui est la latitude géocentrique de la Planete, l'angle *PST* qui est la latitude héliocentrique de la Planete étant aussi connu (parce que l'on a par observation la distance de la Planete à son nœud) & enfin la distance *ST* du Soleil à la Terre qui est donnée par la Théorie; il s'ensuit que dans le Triangle *PST* tous les angles & le côté *ST* seront connus: c'est pourquoi on connoîtra *PS* distance de la Planete au Soleil. Mais l'angle *PSn* est encore connu, puisque la latitude héliocentrique de la Planete * est connue; on aura donc ainsi le lieu héliocentrique de la Planete que l'on cherche. De cette maniere si on détermine encore deux fois le lieu de la Planete dans son orbite lorsqu'elle est Achronique & sa distance à l'égard du Soleil, on aura trois lignes données de grandeur de position, dont les extrémités aboutissent d'une part à la circonférence de l'orbite de la Planete, & de l'autre part se réunissent au Soleil qui est l'un des foyers de cette orbite. D'où il suit que pour déterminer l'orbite de la Planete, sa figure, & sa position, il faut décrire une Ellipse dont le Soleil soit le foyer, & qui passe par les trois points donnés, ce qui est un probleme de Géométrie à résoudre, & dont on va donner la solution.

Planete & sa distance au Soleil lorsqu'on l'observe aux tems de son opposition. PLANCHE IX. *Fig.* 10.

* *Ou bien sa distance au nœud comptée sur l'Ecliptique.*

Si cependant la Planete n'étoit point Achronique ou en opposition au Soleil, on trouveroit néantmoins par observation sa distance au Soleil, & son lieu héliocentrique, comme il suit. Soit *PAE* l'orbite de la Planete,

PLANCHE IX. *Fig.* 11.

On peut déterminer par une seule observation la longitude héliocentrique d'une Planete & sa distance au Soleil, lors même qu'elle n'est pas Achronique. PLANCHE IX. *Fig.* 11.

TGH l'orbite de la Terre, laquelle soit supposée dans cet exemple au point T; soit aussi P le lieu de la Planete, S celui du Soleil, & NS la ligne des nœuds. On abaissera du point P sur le plan de l'Ecliptique la perpendiculaire PB, & l'on tirera BT que l'on prolongera jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne des nœuds au point N; il est évident que le plan du Triangle NPB sera perpendiculaire au plan de l'Ecliptique. Mais si par le point T on éleve à ce plan une perpendiculaire, elle rencontrera dans ce Triangle le plan de l'orbite de la Planete au point C. Enfin du point T on abaissera sur la ligne des nœuds la perpendiculaire TD, & ayant tiré la ligne DC, on aura l'angle TDC qui représentera l'inclinaison * de l'orbite de la Planete au plan de l'Ecliptique. Ayant donc observé l'angle PTB qui est la latitude géocentrique de la Planete, & l'angle BTS son élongation ou sa différence en longitude avec le Soleil; dans le Triangle NTS on a (selon la Théorie de la Terre) le côté TS qui est sa distance au Soleil au moment de l'observation, comme aussi l'angle TSN qui est la différence en longitude entre le lieu de la Terre & le lieu du nœud de la Planete: de plus on a l'angle STN complément à 180° de l'élongation de la Planete observée; on aura donc par la Trigonométrie rectiligne le côté TN. Mais dans le Triangle rectangle TDS le côté TS & l'angle TSD ou TSN étant donnés, on connoîtra le côté TD. C'est pourquoi dans le Triangle TDC, étant donnés TD, & l'inclinaison de l'orbite (représentée par l'angle TDC) on aura par conséquent le côté TC. De même dans le Triangle rectangle CTN, étant donnés TC, TN, on aura l'angle TNC, & partant dans le Triangle NTP, tous les angles seront connus, puisque PTN est le complément à 180° de la latitude observée, & que l'angle PNT vient d'être déterminé: connoissant donc le côté TN de

* *Cette méthode est générale, & peut très-bien s'appliquer au calcul de l'orbite des Cometes.*

ce Triangle, on calculera le côté TP. Or dans le Triangle PTB rectangle en B, on a TP & l'angle PTB, qui eſt la latitude obſervée ; on connoîtra donc auſſi la valeur des côtés TB & PB. Enfin dans le Triangle TSB, étant donnés les côtés TB, TS & l'angle compris BTS, on trouvera SB (qui ſera la diſtance accourcie de la Planete au Soleil), & l'angle TSB ; d'où il ſuit que l'on aura par le moyen de cet angle, le lieu héliocentrique de la Planete réduit au plan de l'Ecliptique. Mais pour connoître ſon vrai lieu héliocentrique, c'eſt-à-dire, le lieu de la Planete dans le plan de ſon orbe, on réſoudra d'abord le Triangle rectangle PBS, dans lequel les côtés PB, BS ſont connus, & l'on ſçaura la valeur de l'angle PSB, c'eſt-à-dire, la latitude héliocentrique. Enſuite étant connue l'inclinaiſon de l'orbite & la latitude héliocentrique de la Planete, on pourra calculer à l'ordinaire ſa vraie diſtance au nœud ſur la circonférence de ſon orbite, & partant le lieu qu'elle y occupe vu du Soleil.

De cette maniere ſi l'on détermine encore deux autres lieux héliocentriques de la Planete & ſes diſtances au Soleil, on aura non-ſeulement le foyer de ſon orbite lequel eſt au centre du Soleil, mais auſſi la longueur & la poſition de trois lignes, ou trois points donnés par leſquels on fera paſſer une Ellipſe qui ſera l'orbite de la Planete.

M. Hallei a imaginé auſſi une méthode pour déterminer les lieux héliocentriques d'une Planete & ſes diſtances au Soleil : elle ſuppoſe ſeulement que l'on connoiſſe le tems de la révolution périodique de la Planete. Soit KLB l'orbite de la Terre, S le Soleil, P la Planete, ou plutôt le point de l'Ecliptique où tombe la perpendiculaire abaiſſée du centre de la Planete. Suppoſant donc premierement la Terre en K, on obſervera la longitude géocentrique de la Planete, & ayant déduit de la Théorie la longitude apparente du Soleil, on aura par conſéquent PLANCHE IX *Fig.* 12.

l'angle *PKS*. Enſuite lorſque la Planete aura fait une révolution entiere ſur ſon orbite, & qu'elle ſe trouvera pour la ſeconde fois en *P* dans un tems que la Terre eſt au point *L* de ſon orbe, on obſervera derechef le lieu géocentrique de la Planete, & l'on aura donc encore l'angle *PLS* qui eſt l'élongation de la Planete. Or étant donnés les tems de ces deux obſervations, on a par conſéquent les lieux de la Terre dans l'Ecliptique vus du Soleil & ſes diſtances au centre de cet aſtre ſelon la Théorie; c'eſt pourquoi dans le Triangle *LSK* on a les deux côtés *LS*, *SK* & l'angle compris *LSK*, on aura donc les angles *SLK*, *SKL*, & le côté *LK*. Alors ſi des angles donnés *PKS* & *PLS* on ôte les angles connus *LKS* & *KLS*, les angles *PKL*, *PLK* qui reſtent, ſeront enfin connus. Ainſi dans le Triangle *PLK* étant donnés la baſe *KL* & les deux angles aux extrémités de cette baſe, on connoîtra le côté *PK*. Et dans le Triangle *PKS*, étant donnés les côtés *PK*, *KS* & l'angle compris *PKS*, on calculera le côté *SP*, qui ſera la diſtance accourcie de la Planete au Soleil: ayant auſſi calculé la valeur de l'angle *KSP*, on connoîtra enfin la longitude héliocentrique de la Planete, & par conſéquent ſa diſtance au nœud ſur la circonférence de l'Ecliptique. Mais puiſque la tangente de la latitude géocentrique de la Planete, eſt à la tangente de la latitude héliocentrique, comme la diſtance accourcie de la Planete au Soleil, eſt à cette même diſtance accourcie à l'égard de la Terre, & que par obſervation on connoît la latitude géocentrique de la Planete, on aura donc enfin la latitude héliocentrique de la Planete, laquelle étant connue auſſi-bien que la diſtance accourcie de la Planete au Soleil, on pourra déterminer enfin la vraie diſtance de la Planete au Soleil. C'eſt ainſi qu'on peut découvrir trois différens lieux de la Planete vus du foyer de ſon orbite, comme auſſi les trois diſtances correſpondantes

de

de la Planete à ce foyer, c'eſt-à-dire, à l'égard du Soleil. Ce qui ſuffit pour découvrir enfin la figure de l'orbite & la poſition de la ligne des Apſides, en décrivant une Ellipſe dont le Soleil ſoit au foyer, & qui paſſe par les trois points donnés. Il reſte à préſent à expliquer la méthode dont on pourra ſe ſervir pour déterminer cette Ellipſe.

Maniere de décrire une Ellipſe dont on connoit l'un des foyers, & qui paſſe par trois points donnés. PLANCHE IX. *Fig.* 13.

Soient trois lignes droites SD, SC, SB dont la longueur & la poſition ſont données, & qui aboutiſſent au foyer S. On tirera les lignes DC, BC, que l'on prolongera de telle ſorte que DF, ſoit à CF, comme DS, eſt à CS. De même que CE, ſoit à BE, comme CS, eſt à BS. Enſuite on tirera FE ſur laquelle on abaiſſera du point S la perpendiculaire SG: cette derniere ligne déterminera la poſition de l'axe. Il faut préſentement mener DK, CI, BH, paralleles à SG, & l'on coupera SG prolongée autant qu'il eſt néceſſaire en A & a, enſorte que GA, ſoit à SA, comme KD, eſt à SD; comme auſſi Ga, ſoit à Sa dans le même rapport de KD, à SD, & l'on fera sa égale à SA. Alors les points A & a ſeront les ſommets de l'Ellipſe, c'eſt-à-dire, les extrémités de ſon grand axe Aa, & les points S & s ſeront les deux foyers. Donc ſi par les deux ſommets & par le moyen des deux foyers on décrit une Ellipſe, ce ſera la courbe qui repréſente véritablement l'orbite de la Planete que l'on cherche. Car puiſque DS, eſt à CS, comme DF, eſt à CF, ou comme DK, eſt à CI, on aura donc (*permutando*) DS, eſt à DK, comme CS, eſt à CI: de même on aura SB, eſt à BH, comme CS, eſt à CI, ou comme DS, eſt à DK. Mais comme DS, eſt à DK, ainſi (ſelon la conſtruction) SA eſt à AG: & parce que $SA : AG :: Sa : aG$; on aura donc $SA : AG :: Sa - SA$ ou $Ss : aG - AG$ ou Aa. Et partant $DS : DK :: SC : CI :: SB : BH :: Ss : Aa$. Or telle ſeroit la propriété d'une Ellipſe, dont le foyer étant en S, auroit pour grand axe Aa, comme on le démontre

dans les traités des Sections Coniques *. Il eſt donc certain que l'Ellipſe décrite autour des foyers S & s, & qui a pour grand axe Aa, paſſera par les points B, C, D.

* *Milnii Elem. Conic. Part. IV. Prop. 9. Voyez la 3e. édition faite à Oxfort en 1723.*

Enfin comme dans l'Aſtronomie il eſt néceſſaire de découvrir par le calcul les deux axes, l'excentricité & la poſition du grand axe de l'orbite, & qu'on a coutume de préférer les nombres qui en réſultent aux conſtructions Géométriques, quelques ſimples & élégantes qu'elles puiſſent être, j'expliquerai donc ici comment on y doit procéder. Dans les Triangles DSC, BSC on connoît les côtés DS, CS, BS, & les angles compris DSC, CSB, on pourra d'abord calculer les côtés DC, BC, & les angles SDC, SCD, SCB, & SBC. Et parce que l'on connoît le rapport de DF, à CF, & que le côté DC eſt donné, on connoîtra donc auſſi CF & DF. De même puiſqu'on connoît le rapport de CE, à BE, & que le côté CB eſt donné, on connoîtra donc auſſi CE & BE : mais l'angle BCD eſt donné, puiſqu'il eſt égal aux deux angles connus DCS, BCS; on connoîtra donc l'angle FCE qui eſt ſon complément à deux droits. C'eſt pourquoi dans le Triangle FCE étant donnés les côtés CF, CE & l'angle compris FCE, on trouvera l'angle CEF ou ſon complément à 90°, ſçavoir, l'angle ICE, auquel ſi l'on ajoute l'angle connu SCB, on aura la valeur de l'angle total SCI. Mais parce que Aa eſt parallele à IC, l'angle CSa ſera donc égal à l'angle SCI, & partant la poſition de l'axe ſera connue, puiſque l'angle CSa eſt donné. Enfin dans le Triangle rectangle EBH, puiſqu'on connoît BE & l'angle E, on aura par conſéquent la valeur de BH : ainſi le rapport de BS, à BH ſera connu, lequel eſt le même que celui de Ss à Aa, de SA à AG, ou de Sa à aG; d'où l'on voit que les extrémités du grand axe ou les ſommets de l'Ellipſe, de même que les foyers Ss ſeront déterminés, & qu'il n'y aura qu'à ſuivre la

forme du calcul que nous venons d'indiquer.

Après avoir expliqué ci-dessus de quelle maniere on peut trouver par observation le lieu d'une Planete vu du centre du Soleil, il restoit encore à faire voir comment on doit rechercher le lieu & la situation de son Aphélie *, & c'est ce que nous venons d'exposer tout-à-l'heure. On pourra donc au tems de chaque observation connoître la distance de la Planete à son Aphélie, c'est-à-dire, son anomalie vraie ou égalée. Connoissant encore l'excentricité de l'orbite, & le tems de la révolution de la Planete, il sera facile d'en déduire le lieu moyen & l'anomalie moyenne de cette même Planete, selon les principes qui ont été établis lorsqu'on a traité *de la Solution du Probleme de Kepler*. Ainsi le mouvement moyen de la Planete sera donné au tems de l'observation proposée, & partant le lieu que cette Planete occuperoit dans son orbe si elle étoit emportée d'un mouvement continuel, égal & uniforme. Ce qui étant une fois supposé, il est aisé de connoître son lieu moyen pour tel autre tems donné que ce soit. Car on fera, Comme le tems périodique de la Planete, est au tems écoulé entre l'observation proposée, & le moment auquel on cherche le lieu moyen de la Planete, ainsi le cercle entier ou 360°, est à un quatrieme terme : ce quatrieme terme sera un arc qu'il faudra retrancher ou ajouter au lieu moyen qui répond à l'observation proposée, selon que le tems pour lequel on fait le calcul, précede ou suit le moment de cette observation, & l'on aura ainsi le lieu moyen que l'on cherche.

Or il est avantageux chaque fois que l'on veut connoître le lieu moyen d'une Planete pour un tems donné, de le trouver calculé dans des Tables Astronomiques où l'on a eu soin de réduire le lieu moyen ou l'anomalie moyenne des Planetes au tems de quelque Ere célebre ; telle que la Nativité de *Notre Seigneur Jesus-Christ*, l'Ere de *Nabonas-*

* *Lorsque le lieu moyen de la Planete se trouve concourir avec son lieu vu du Soleil, la position du grand axe de l'orbite est donnée; ce qui fournit une méthode bien simple pour restituer le lieu de l'Aphélie & l'époque des moyens mouvemens, si l'on a observé la Planete à son passage par l'Aphélie & par le Périhélie.*

ſar, celle de la Création du Monde, la Fondation de Rome, ou le commencement de *la Période Julienne*. Il a donc fallu trouver dans ces Tables, par la méthode expliquée ci-deſſus, le lieu moyen des Planetes pour ces Eres propoſées, & ſur-tout pour les midis de tems moyen, & non pas de tems vrai ou apparent. Ces lieux moyens des Planetes ainſi déterminés, ſe nomment *les Epoques* ou *les Racines* des moyens mouvemens, puiſque ce ſont autant de points fixes d'où l'on part pour calculer tous les autres mouvemens.

On eſt enfin convenu de faire commencer l'année au 31. Décembre à Midi de tems moyen.

Si l'on compte le tems en années écoulées, ſoit depuis la Nativité de Jeſus-Chriſt, ſoit depuis le commencement de la Période Julienne, il eſt aſſez avantageux que le commencement de l'année ſoit compté du Midi qui précede le premier jour de Janvier, c'eſt-à-dire, de maniere qu'à midi du premier Janvier on compte déja un jour complet, ou vingt-quatre heures de tems écoulées.

Comment ont été conſtruites les Tables des moyens mouvemens.

Mais pour revenir aux Tables des moyens mouvemens, pour les conſtruire, on fera les Regles de proportion qui ſuivent. 1°. Comme le tems périodique d'une Planete, eſt à une année commune, ou de 365 jours, ainſi le cercle entier de 360°, à un quatrieme terme qui exprimera par conſéquent le moyen mouvement de la Planete dans l'eſpace d'une année entiere. 2°. Comme le tems périodique, eſt à un jour, ainſi le cercle entier, eſt à un quatrieme terme qui ſera le moyen mouvement diurne de la Planete. Enfin continuant de la même maniere, on aura les mouvemens horaires de la Planete, comme auſſi le mouvement qui répond aux minutes, ſecondes, &c. Au reſte ſi l'on ajoute le moyen mouvement annuel continuellement à lui-même, on aura le moyen mouvement dans l'eſpace de deux, trois & quatre années : mais il eſt à remarquer que comme chaque quatrieme année eſt biſſextile ou de 366 jours, il faut néceſſairement ajouter le mouvement

moyen d'un jour à la somme des moyens mouvemens qu'on a trouvés pour cette quatrieme année. Ensuite on continuera d'ajouter comme auparavant le moyen mouvement d'une année, & l'on aura le moyen mouvement pour cinq, six & sept années, mais il faudra de plus ajouter le mouvement qui répond à un jour, à la somme des moyens mouvemens & d'une année, pour avoir celui de la huitieme année qui est encore bissextile, qu'on pourroit trouver aussi en doublant le moyen mouvement qui répond à la quatrieme année. Et continuant de même on aura une suite de tous les moyens mouvemens vis-à-vis des années qui leur répondent, ayant soin toutefois de rejetter 360°, ou le cercle entier lorsque la somme excedera ce nombre, puisqu'il est évident que les Planetes après avoir achevé leurs périodes de 360°, se trouvent précisément au même lieu pour en recommencer une autre.

Ayant ainsi continué les moyens mouvemens qui répondent à chaque année jusqu'à 20 ans, on peut ensuite doubler, tripler, &c. pour avoir les moyens mouvemens qui répondent à 40, 60, 80, & 100 ans. Et si l'on ajoute à ceux-ci le mouvement pour dix années, on aura celui qui répond à 30, 50, 70, 90 & 100 ans. De même ajoutant continuellement à lui-même le mouvement qui répond à 100 ans, & ayant soin de rejetter (chaque fois qu'il est nécessaire) 360°, lorsque la somme excede ce nombre, on aura les moyens mouvemens qui répondent à 200, 300, 400, 500 ans, que l'on peut ainsi continuer jusqu'à 1000: & de la même maniere on aura le moyen mouvement qui répond à 2000, 3000, 4000 ans, &c. ensorte que l'on prolongera les nombres aussi loin qu'on voudra.

Après avoir recueilli ces moyens mouvemens, on les rangera dans des Tables dressées exprès, & c'est ainsi qu'ont été construites celles des moyens mouvemens dans

la plupart des Tables Aſtronomiques. Quelques-uns * les ont nommées cependant Tables des Anomalies moyennes, parce qu'ils ont compté les moyens mouvemens depuis le lieu de l'Aphélie. Et c'eſt à cette occaſion que nous ferons remarquer ici que ſi au lieu de compter depuis l'Aphélie, on aime mieux conſerver l'ancienne forme, & compter depuis le point de l'Equinoxe du Printems, il faut bien prendre garde de ne pas employer pour Ier terme dans les Regles de proportion que l'on a propoſées ci-deſſus, le tems périodique de la Planete, mais ſeulement celui qu'elle emploie à parcourir le Zodiaque. Ce dernier eſt un peu moins long à cauſe de la préceſſion des Equinoxes, puiſque ces points s'avancent contre l'ordre des Signes.

* *Voyez les Tables Caroliines & celles du Soleil, de M. de Louville.*

Enfin ſi l'on ne ſuppoſoit pas que les points des Aphélies ſont immobiles, il faudroit auſſi avoir égard au peu de mouvement qu'on leur a attribué. C'eſt pourquoi il faudra dreſſer des Tables générales qui contiennent, non pas ſeulement les mouvemens de l'Aphélie cauſés par la préceſſion des Equinoxes, mais auſſi ceux qui ſont particuliers à l'Aphélie de chaque Planete ; & ces Tables ſeront diſpoſées comme celles des moyens mouvemens en années, dixaines d'années, centaines, milliemes, &c. Car on peut ſuppoſer ces mouvemens égaux & uniformes dans toutes les Planetes, (excepté la Lune*, où le mouvement de l'Aphélie eſt ſujet à quelque inégalité) puiſque les obſervations ne nous apprennent rien qui détruiſe cette ſuppoſition. Par ces Tables ainſi conſtruites, on trouvera toujours facilement pour un tems quelconque les diſtances, ſoit des Etoiles fixes, ſoit de l'Aphélie au point des Equinoxes.

* *Saturne, & même la Terre.*

Quelques Aſtronomes ont auſſi dreſſé d'autres Tables à la ſuite de celles-ci, & qui contiennent les anomalies vraies correſpondantes aux anomalies moyennes, de degrés en degrés avec leurs différences, & dont on peut avoir les

minutes & secondes par des parties proportionnelles. Il est facile, comme l'on voit, de dresser ces Tables en se servant de la solution du Probleme de Kepler ; mais il est plus en usage, principalement pour calculer les mouvemens du Soleil & de la Lune, de dresser d'autres Tables qui contiennent les Equations ou Prosthapheréses qui sont les différences entre les Anomalies vraies & moyennes.* Car ces Equations étant ôtées ou ajoutées à l'anomalie moyenne, selon que la Planete se trouvera dans le premier ou dans le second demi-cercle de son Anomalie, donnent pour lors l'Anomalie vraie que l'on cherche.

* *Comme aussi les distances, ou plutôt les logarithmes des distances de chaque Planete au Soleil.*

Puisque le lieu de l'Aphélie & celui du nœud de la Planete sont connus, on aura par conséquent leur distance ; & partant puisque l'Anomalie vraie de la Planete est donnée, on aura sa distance au nœud, qu'on nomme autrement l'*Argument de la latitude*. Or cet arc étant donné, on calculera trigonométriquement la latitude héliocentrique de la Planete & sa distance accourcie, c'est-à-dire, la ligne droite qui est terminée d'une part au Soleil, & de l'autre au point de l'Ecliptique où tombe la perpendiculaire abaissée du lieu de la Planete. Et de cette maniere on aura toujours par le calcul pour un tems donné le lieu de la Planete dans son orbe vu du Soleil, sa latitude & sa distance accourcie au Soleil, ce qui étant connu, on trouvera son lieu géocentrique vu de la Terre de la maniere qui suit.

Argument de la latitude ; ce que c'est.

On cherchera d'abord le lieu de la Terre dans l'Ecliptique & sa distance au Soleil : or le lieu héliocentrique de la Planete, sa latitude & sa distance accourcie étant donnés au même instant. Soit *TCF* l'orbite de la Terre que l'on suppose en *T*, *APE* l'orbite de la Planete supposée en *P*, le point *S* le centre du Soleil, & *SN* la ligne des nœuds. On abaissera du lieu de la Planete sur le plan de l'Ecliptique la perpendiculaire *PB*, & ayant mené la ligne *SB* qui sera par conséquent dans le plan de l'Eclip-

Calcul du lieu géocentrique des Planetes.

PLANCHE IX. *Fig.* 14.

tique, le point *B* ſera le lieu de la Planete réduit à l'Ecliptique, & on trouvera ce lieu par la Trigonométrie Sphérique, puiſque l'arc *PN* eſt donné, & qu'on connoît d'ailleurs l'inclinaiſon de l'orbite de la Planete ſur le plan de l'Ecliptique. Mais le lieu de la Terre vu du Soleil eſt connu, & par conſéquent on a la différence en longitude entre la Terre & la Planete repréſentée par l'angle *TSB*, qu'on nomme l'*Angle de Commutation*. Dans le Triangle *TSB* on connoît le côté *TS* qui eſt donné par la Théorie du mouvement de la Terre, & le côté *SB* qui eſt la diſtance accourcie de la Planete au Soleil. Connoiſſant donc les deux côtés & l'angle compris * du Triangle *TSB*, il ſera facile de connoître l'angle *STB*, qui eſt l'élongation de la Planete au Soleil, c'eſt-à-dire, l'arc de l'Ecliptique compris entre le Soleil & le lieu réduit de la Planete. On connoîtra auſſi *TB* qui eſt la diſtance accourcie de la Planete à l'égard de la Terre. Or le lieu du Soleil eſt donné, puiſqu'il eſt oppoſé diamétralement au lieu de la Terre : il s'enſuit donc qu'on connoîtra le lieu de la Planete réduit à l'Ecliptique vu de la Terre. De plus dans les deux Triangles *PBS*, *PBT* la tangente de l'Angle *PSB*, eſt à la tangente de l'angle *PTB*, comme *TB*, eſt à *SB* : mais comme *TB*, eſt à *SB*, ainſi le ſinus de *TSB* qui eſt l'angle de commutation, eſt au ſinus de *STB* qui eſt l'angle de l'élongation. Et partant comme le ſinus de l'angle de commutation, eſt au ſinus de l'angle de l'élongation, ainſi la tangente de la latitude héliocentrique, ſera

Angle de Commutation.

* Suivant la méthode de Street démontrée dans les Tables Carolines, il faut ôter le logarithme de la diſtance de la Terre au Soleil, du logarithme de la diſtance accourcie de la Planete au Soleil, ou au contraire ; c'eſt-à-dire, le plus grand logarithme du plus petit, puiſque ce dernier doit être quelquefois augmenté du logarithme du rayon ; & le reſte ſera le logarithme de la tangente d'un angle dont il faut ôter 45°; on ſera enſuite, comme le rayon ou la tangente de 45°, eſt à la tangente du reſte qu'on vient de trouver, ainſi la tangente de la demi-ſomme des angles inconnus, eſt à la tangente de la demi-différence des mêmes angles. Dans les Planetes ſupérieures la ſomme de la moitié des angles inconnus. & de leur demi-différence, ſera l'*Elongation*, & la différence ſera la *Parallaxe* du grand orbe ; mais ce ſera tout le contraire pour les Planetes inférieures.

C'eſt

à la tangente de la latitude géocentrique *C. Q. F. T.*

C'eſt ainſi que les Aſtronomes ont coutume de calculer pour un tems donné quelconque le lieu géocentrique d'une Planete & ſa latitude vue de la Terre.

Au reſte comparant les tems périodiques des Planetes avec leurs diſtances au Soleil, nous voyons d'abord qu'elles obſervent une harmonie ou loi conſtante, ſçavoir :

Que les quarrés des Tems périodiques ſont toujours, dans les Planetes du premier ordre, proportionnels aux cubes de leurs moyennes diſtances au Soleil.

Les Périodes & diſtances moyennes des ſix Planetes, d'abord établies par Képler & Bouillaud, ont été réduites par Street, comme dans la Table ſuivante *.

Révolutions Périodiques.	Jours.	H.	M.	S.	Diſtances moyennes.
♄	10759 :	6 :	36′ :	26″	953800
♃	4332 :	12 :	20 :	25	520110
♂	686 :	23 :	27 :	30	152369
♁	365 :	6 :	08 :	30	100000
♀	224 :	16 :	49 :	24	72333
☿	87 :	23 :	15 :	53	38710

Le grand Mathématicien M. Huygens a autrefois déterminé les grandeurs & les diametres véritables des Planetes, en les comparant au Soleil. On peut voir dans ſon *Syſtema Saturnium* les méthodes qu'il a employées, & dont on va rapporter le réſultat.

* M. Newton a donné dans la troiſieme Edition du Livre des Princ. Mathem. de ſa Philoſ. les Tems périodiques des révolutions comme il ſuit :

♄	♃	♂	♁	♀	☿
10759,275	4332,514	686,9785	365,2565	224,6176	87,9692

Il a changé auſſi les diſtances moyennes au Soleil de Saturne & de Jupiter, qu'il avoit déduites du tems périodique de leurs révolutions, comparé à celui de la révolution de la Terre autour du Soleil, & les a établi de $\frac{954006}{1000000}$ & $\frac{520096}{1000000}$, ou de 954006 & 520096, dont la moyenne diſtance du Soleil à la Terre eſt 100000.

» Copernic nous ayant enseigné dans son nouveau syste-
» me si merveilleusement imaginé, quelle proportion gar-
» dent entre elles les Planetes quant à leurs distances, relati-
» vement au Soleil; on est enfin parvenu depuis la décou-
» verte du Téleſcope à mesurer avec précision leurs diame-
» tres apparens, & par ce moyen on s'est assuré combien
» les unes sont réellement plus grandes que les autres. Car
» ayant égard à leur grandeur apparente & à leur distance,
» il en résulte leurs véritables grandeurs, & par conséquent
» le rapport des groſſeurs des unes à l'égard des autres, ou
» relativement au Soleil. » Comme il est facile de le déduire des principes que l'on a établis dans le premier Chapitre.

» En effet pour commencer par la Planete de Saturne,
» le diametre de son anneau * lorsqu'il est dans ses plus pe-
» tites distances à l'égard de la Terre, est de 68″ ** tout au
» plus. Or comme cette plus petite distance de Saturne est
» d'environ huit fois plus grande que la moyenne distance
» de la Terre au Soleil, il s'ensuit que si Saturne venoit à
» s'approcher de nous autant que le Soleil dans ses moyen-
» nes distances, le diametre de son anneau paroîtroit alors
» octuple de ce qu'il a été observé jusqu'ici, c'est-à-dire, de

** Cette observation de M. Huygens a été faite avant qu'on eût perfectionné le Micrometre.

* Au commencement du mois de Juin de l'année 1719, M. Pound ayant mesuré avec le Téleſcope de M. Huygens, dont la longueur est de 123 pieds Anglois, le diametre de l'anneau de Saturne, l'a trouvé de 43″; d'où il a déduit son diametre apparent dans les moyennes distances de 42″: & parce que le diametre de Saturne a paru relativement à celui de son Anneau, comme 3 est à 7, on en peut déduire le diametre de Saturne de 18″. Mais selon M. Newton, ce diametre tel qu'on vient de le conclurre, n'est autre chose que celui qui doit paroître vu par les plus grandes & par les meilleures lunettes d'approche, d'autant que les grandeurs apparentes des corps célestes, obſervées avec les plus longues lunettes, sont encore altérées par la dilatation de la lumiere, qui les borde pour ainſi-dire, quoiqu'ils le soient bien moins que si l'on se ſervoit de plus petites lunettes. C'est pourquoi si l'on corrige le diametre apparent que l'on a établi ci-dessus, par l'erreur qui doit être attribuée à l'irradiation de la lumiere, on réduira le diametre de Saturne à 16″ tout au plus.

On fera donc, 100000 : 954006 : : 16″ : à un quatrieme terme qui sera 152″, 64; ou bien 2′ 32″$\frac{2}{3}$; & c'est le diametre de Saturne tel qu'il nous paroîtroit si cette Planete s'approchoit autant de nous que la Terre est éloignée du Soleil dans ses moyennes distances. Le diametre du Soleil dans ses moyennes distances est de 32, 10″ ou 12″$\frac{1}{2}$. Mais M. Newton l'ayant réduit à 32′ 5″, il sera vrai de dire que le diametre de Saturne est à celui du Soleil, comme 1, est à 12, 61, ou bien comme 5 est à 63.

» 9′4″. Et puisque le diametre du Soleil dans ses moyennes » distances est de 30′30″, il est donc vrai de dire que le rap- » port du diametre de l'anneau de Saturne, au diametre du » Soleil, est comme 9′ 40″, à 30′ 30″, c'est-à-dire, à peu » près comme 11 est à 37. Mais le diametre de Saturne est » au diametre de son anneau comme 4 est à 9, ou comme » 5 est à 11, le diametre de Saturne sera donc au diametre » du Soleil comme 5 est à 37. »

» Jupiter * lorsqu'il est le plus proche de nous qu'il est » possible, paroît sous un angle de 64″, & sa distance à la » Terre étant alors à la moyenne distance de la Terre au » Soleil, comme 26 est à 5; si l'on fait comme 5 est à » 26, ainsi 64″ sont à un quatrieme terme : on trouvera » 5′ 35″ pour l'angle sous lequel paroîtroit Jupiter s'il » s'approchoit autant de la Terre qu'en est éloigné le So- » leil dans sa moyenne distance. Supposant donc comme » ci-dessus le diametre du Soleil 30′ 30″, le rapport du » diametre de Jupiter à celui du Soleil, sera par consé- » quent comme 5′ 35″ à 30′ 30″, c'est-à-dire, comme 1 » à $5\frac{1}{2}$, ou un peu davantage.

» Lorsque Venus ** s'approche le plus de la Terre, son

* Le diametre de Jupiter observé avec la même lunette de 123 pieds, & réduit à sa moyenne distance à l'égard du Soleil ou de la Terre, a toujours paru tout au plus 40″, ou 38, & le plus souvent de 39″; il en faut ôter environ 2″ pour la dilatation de la lumiere. Mais par les passages des Satellites sur son disque, M. Newton l'a établi de $37''\frac{1}{4}$; c'est pourquoi on fera 100000 : 520096 : : $37''\frac{1}{4}$: 193″, 73 ou bien 3′ $13''\frac{1}{2}$, & l'on aura le diametre de Jupiter tel qu'il nous paroîtroit s'il s'approchoit autant de nous que le Soleil dans ses moyennes distances à la Terre : supposant donc comme ci-dessus le diametre du Soleil de 32′ 5″, le rapport du diametre de Jupiter à celui du Soleil, sera comme 1 est à 9, 936.

** *Horoxius* & *Crabtree* qui sont les seuls qui observerent dans le dernier siecle le passage de Venus sur le Soleil, ont déterminé son diametre l'un de 1′ 12″, & l'autre de 1′ 3″. Mais parce qu'il faut nécessairement diminuer les diametres apparens des corps lumineux observés sur un fond obscur, ainsi qu'on l'a pratiqué ci-dessus à l'égard de Saturne, de Jupiter & du Soleil, il paroit au contraire qu'il faudroit augmenter les diametres des corps opaques observés sur un fond lumineux; car sans nous arrêter aux principes de l'Optique, cela, comme l'a remarqué M. Newton, est vérifié par les observations de M. Huygens & d'Hévélius qui ont observé Venus hors du disque du Soleil, & à même distance sous un angle de 1′ 24″ ou 25″. Supposant donc le diametre de Venus lorsqu'elle a passé sur le disque du Soleil de 1′ $17''\frac{1}{2}$, & le rapport des distances de Venus & du Soleil à la

» diametre apparent eſt de 85″. Or cette diſtance de Ve-
» nus Périgée eſt à la moyenne diſtance de la Terre au So-
» leil à peu près comme 21 eſt à 82. Donc ſi Venus ve-
» noit à ſe trouver au centre du Soleil, elle ne paroîtroit
» plus que ſous un angle de 21″ 46‴. Il eſt donc conſtant
» que le diametre de Venus eſt à celui du Soleil, comme
» 21″ 46‴ ſont à 30′ 30″, c'eſt-à-dire, comme 1 eſt à 84.

» A l'égard de Mars*, lorſque cette Planete eſt Péri-
» gée, ſon diametre n'excede gueres 30″. Or puiſque la
» plus petite diſtance de Mars à la Terre eſt pour lors à la
» moyenne diſtance de la Terre au Soleil comme 15 eſt
» à 41, on a donc le rapport du diametre de Mars au dia-
» metre du Soleil, comme 1 eſt à 166, d'où il s'enſui-
» vroit que le diametre de Mars eſt deux fois plus petit que
» celui de la Planete de Venus. « Voyez *le Syſtema Saturnium de M. Huygens*, où l'on donne la deſcription & l'uſage de l'inſtrument dont on s'eſt ſervi pour meſurer ces diametres.

Au reſte ſelon les obſervations d'Hévélius, ** on a con-

Terre, comme 264: 984, l'angle ſous lequel Venus auroit dû paroître, ſi elle eût été autant éloignée de nous que le Soleil dans ſes moyennes diſtances ſe réduit à 20″ 8, tout au plus, & par conſéquent ſon diametre ſeroit à celui du Soleil comme 1 eſt 92, 75.

* Vers le tems de l'oppoſition de Mars au Soleil, le 5 Septembre de l'année 1672, le diametre de Mars meſuré par M. Picard avec une lunette de 20 pieds, garnie d'un Micrometre, a paru de 26″ tout au plus. Il en faut retrancher 5″, à cauſe de l'erreur cauſée par la dilatation de la lumiere. Mais parce que Flamſteed a meſuré le diametre de Mars à peu près dans le même tems, & qu'il lui a paru (à la vérité avec une plus petite lunette) tantôt de 21″, & tantôt de 27″ plus grand que celui qu'on a rapporté ci-deſſus; on pourroit donc réduire le diametre de Mars ſeulement à 22″½. Or la proportion des diſtances de Mars à la Terre, & de la Terre au Soleil étant alors comme 4 à 10, ou plutôt comme 38 à 100; il s'enſuit que Mars auroit paru, s'il eût été obſervé à la même diſtance de la Terre que le Soleil, ſous un angle d'un peu plus de 8″¼, ou plus exactement de 8″, 6 pour une diſtance égale à la moyenne diſtance du Soleil à la Terre. Or comme 8″, 6 : 32′ 5″ :: 1 : 223, 8.

** En 1723. M. Bradlei a obſervé le diametre de Mercure au tems de ſon paſſage ſur le diſque du Soleil avec la même Lunette de 123 pieds dont on s'étoit déja ſervi pour meſurer les diametres de Jupiter & de Saturne: ce diametre parut alors ſous un angle de 10″ 45‴. Réduiſant donc le diametre à ce qu'il paroîtroit ſi Mercure étoit autant éloigné de nous, que le Soleil eſt éloigné de la Terre dans ſes moyennes diſtances, on aura 7″¼ pour le diametre de Mercure; d'où l'on voit clairement que le diametre de Mercure, eſt au diametre du Soleil, comme 1, eſt

clu que le diametre de Mercure étoit encore beaucoup plus petit, puiſque ſon diametre étant comparé à celui du Soleil eſt, comme 1 à 290.

La grandeur de la Terre comparée au Soleil, n'eſt pas la même ſelon divers Auteurs. Ceux qui ſuppoſent la parallaxe horiſontale de 15″, donnent par conſéquent 13750 demi-diametres pour la diſtance de la Terre au Soleil; d'où il s'enſuivroit que le diametre du Soleil ſeroit à celui de la Terre comme * 30′ 30″ ſont à 30″, ou comme 61 eſt à 1. Or l'on peut en donner ici une raiſon * aſſez forte pour prouver que ce rapport doit être augmenté. C'eſt que la Lune ayant un diametre qui eſt un peu plus grand que le quart du diametre terreſtre, ſi l'on ſuppoſe la parallaxe horiſontale du Soleil de 15″, il s'enſuivroit alors que la Lune ſeroit plus groſſe que Mercure, c'eſt-à-dire, qu'une Planete ſecondaire ſeroit plus grande qu'une Planete du premier ordre, ce qui eſt contraire à l'ordre & à la ſymmétrie qui ſemble devoir convenir au vrai ſyſteme du monde. C'eſt pourquoi ſi l'on diminue la parallaxe horiſontale, c'eſt-à-dire, ſi l'on ne ſuppoſe plus que 10″ pour le demi-diametre apparent de la Terre vue du Soleil, il s'enſuivra pour lors que la Lune eſt plus petite que Mercure, puiſque l'on a pour la diſtance de la Terre au Soleil près de 20000 demi-diametres terreſtres: or en ce cas le diametre du Soleil doit ſurpaſſer environ 91 ½ fois celui de la Terre, & c'eſt à ce dernier rapport qu'il ſemble qu'on pourroit s'arrêter juſqu'à ce que par l'obſervation de Venus vue ſur le diſque du Soleil, lorſqu'elle le traverſera l'an

* *Remarquez qu'il importe peu, pour établir le vrai ſyſteme du monde, que la Lune ſoit plus groſſe que Mercure, mais que d'ailleurs le diametre des Satellites de Jupiter ou du 4e Satellite de Saturne, ſurpaſſe celui de la Lune ou de Mercure, & qu'il approche vraiſemblablement de celui de Mars, quelques-uns de ces Satellites étant preſque auſſi gros que Venus.*

à 266: mais il y a une correction à faire au diametre obſervé, lequel eſt un peu trop petit, parce que Mercure étoit opaque, & qu'il étoit vu ſur le diſque du Soleil. C'eſt pourquoi pour peu que l'on augmente ce diametre comme de 1″ ou 1″ ½, on réduira le rapport donné ci-deſſus à 1 : 235.

* Ou plus exactement comme 32′ 5″ eſt à 30″, c'eſt-à-dire, comme 64, 166 eſt à 1; à l'egard de la Lune, ſi l'on ſuppoſe avec M. Newton le rapport de ſa parallaxe horiſontale à ſon demi-diametre apparent, comme 3,66 : 1, il s'enſuivra que le diametre de la Lune eſt à celui du Soleil comme 1 : 235,3.

1761, on puisse donner un rapport bien plus exact & plus certain. La Table suivante exprime les rapports du diametre du Soleil à celui des autres Planetes.

			Selon Keill.	mais plus exactement
Le diametre du Soleil est au diametre de	Saturne	comme 1000 est à	137	079, 3
	Jupiter		181	100, 7
	Mars		006	04, 47
	La Terre		010	015, 58
	Venus		012	010, 75
	Mercure		004	004, 25

Et puisque les Spheres sont comme les cubes de leurs diametres, on aura

Le Soleil est à	Saturne	comme 1000000000, à	2571353	500000
	Jupiter		5929741	1021140
	Mars		216	89
	La Terre		1000	3785
	Venus		1728	1240
	Mercure		64	76

Il suit de-là que le Soleil surpasse toutes les Planetes prises ensemble de 116 fois *, que Saturne est 400 fois plus petit que le Soleil, mais il contient d'ailleurs ** deux mille quatre cens fois moins de matiere; Jupiter qui est la plus grosse de toutes nos Planetes, est néantmoins plus de 160 fois moindre que n'est le Soleil, & il ne contient tout au plus que la mille-trente-troisieme partie de matiere. Quant à notre Terre si on la compare au Soleil, c'est un corps très-petit, & qui n'est qu'un point en comparaison, puisqu'elle est un million de fois plus petite. En suivant le même raisonnement lorsqu'on compare les Planetes entre elles, on voit que Jupiter est plus gros que toutes les autres prises ensemble, qu'il est 2000 fois plus gros que la Terre. Enfin Venus est un peu plus grosse que la Terre, mais il y a deux Planetes que la Terre surpasse en grosseur, sçavoir, Mars & Mercure.

** *Phil. natur. Princ. Math. lib. III. Prop. 8. Coroll. 2.*

Jupiter surpasse en grosseur toutes les autres Planetes prises ensemble.

* Ou plus exactement 655 fois, & Saturne est environ 2000 fois plus petit que le Soleil: à l'égard de Jupiter on trouve qu'il est 980 fois plus petit que le Soleil. Mais la Terre est 264300 fois plus petite que le Soleil: Jupiter n'est que 270 fois plus gros que la Terre. Enfin Venus seroit environ trois fois plus petite que la Terre.

De la conſtruction des Tables du Mouvement des Planetes.

LEs Tables Rudolphines de Képler, celles de Bouillaud, & principalement les Tables Carolines de Street, dont on ſe ſert depuis bientôt un ſiecle, pour vérifier les Elémens qui ſervent à calculer les mouvemens des Planetes, ont été fondées ſur un grand nombre d'obſervations faites par Tycho, & comparées à celles des Caldéens, du fameux Hipparque, & des autres Aſtronomes d'Alexandrie; c'eſt-à-dire aux plus anciennes obſervations qui nous aient été conſervées depuis environ 2000 ans. Ces trois Auteurs ſont entrés non-ſeulement dans un très-grand détail, lorſqu'ils ont comparé leurs Tables à ces anciennes obſervations: mais on voit encore dans leur procédé, & par le compte qu'ils en ont rendu, que ce n'a pas été ſans beaucoup de lumieres, ni ſans avoir réuni, pour ainſi dire, ſous un même point de vue bien des circonſtances particulieres, qu'ils ſe ſont déterminés, après un travail immenſe, ſur le choix de ces anciennes obſervations. Car il eſt facile de concevoir que les premiers Aſtronomes n'ayant ni les inſtrumens ni les connoiſſances qu'on a acquiſes preſque ſucceſſivement depuis Ptolomée juſqu'au 17e ſiecle, il a fallu néceſſairement entrer dans une exacte critique de leurs obſervations: c'eſt ainſi qu'on a été obligé de reſtituer les lieux des Etoiles auxquelles Ptolomée a comparé les Planetes, cet Auteur leur ayant attribué un mouvement en longitude beaucoup trop lent, ſçavoir d'un degré en 100 ans, ſuppoſition dont il ſe ſert dans le calcul des vrais lieux des Planetes, qu'on trouve rapporté dans ſon Almageſte, & cela pendant un intervalle de plus de 400 ans. De la même maniere on a dû corriger les lieux du Soleil tirés des

Les Aſtronomes qui ont ſuccédé à Tycho, ont aſſez exactement établi les moyens mouvemens des Planetes.

hypotheſes de Ptolomée, pour en déduire plus exactement les tems des oppoſitions des Planetes, & leurs vraies longitudes héliocentriques : enfin il a fallu y appliquer d'autres Parallaxes, & les réduire, à l'aide de la Chronologie & des nouvelles corrections publiées par les Géographes modernes, à notre maniere de compter le tems, & à un Méridien bien plus occidental. En quoi M. Bouillaud a certainement beaucoup contribué à l'avancement de cette partie de l'Aſtronomie, s'étant appliqué plus particulierement à ce genre de travail, & ayant enfin rétabli pluſieurs paſſages du texte de Ptolomée, outre diverſes obſervations qu'il a tirées des manuſcrits Grecs de la Bibliotheque du Roi.

Ainſi nous croyons devoir avertir, que dans l'Aſtronomie Philolaïque de cet Auteur, comme auſſi dans les Tables Caroline, on trouve non-ſeulement la Théorie & les Tables générales du mouvement des Planetes, mais encore une hiſtoire ou collection des meilleures & des plus précieuſes obſervations anciennes & modernes. Car outre les obſervations de Tycho ſur les oppoſitions des Planetes ſupérieures au Soleil, on voit auſſi, (& cela plus particulierement dans les Tables Carolines) qu'on y a fait uſage des conjonctions inférieures de Venus & de Mercure, ces deux Planetes ayant été vues pour la premiere fois ſur le Soleil dans le dernier ſiecle. L'obſervation du paſſage de Mercure ſur le Soleil, faite à Paris par Gaſſendi le 7 Novembre 1631, a été d'abord rapportée dans l'Aſtron. Philol. comme auſſi les deux autres obſervations, ſçavoir le paſſage de Venus ſur le Soleil, du 3. Décembre 1639. & celui de Mercure ſur le diſque de cet aſtre lumineux proche ſon nœud deſcendant, ſe trouvent dans les Tables Caroline de Street. L'avantage qu'ont eu ces derniers Auteurs ſur Képler, n'eſt que trop viſible, ſi l'on conſulte leurs propres ouvrages, où ils

comparent

comparent non-seulement les mouvemens des Planetes inférieures qui résultent de leur Tables, avec les observations dont nous venons de parler, mais encore avec plusieurs conjonctions des Planetes supérieures aux Etoiles que l'on trouve dans le Recueil des ouvrages de Gassendi. Personne n'ignore que ce célebre Philosophe, qui a tenu à juste titre l'un des principaux rangs parmi les grands hommes, qui par leurs ouvrages & par leur érudition, ont fait honneur au siecle de Louis XIV. s'est presque continuellement appliqué avec une attention toute particuliere à rechercher les mouvemens des Planetes.

Avantage qu'on a retiré des observations de Gassendi sur la Planete de Mercure, au tems de ses grandes digressions à l'égard du Soleil.

Ainsi pour revenir aux mouvemens de la Planete de Mercure, nous devons avertir ici que Bouillaud & Street se sont fondés principalement sur les observations faites par Gassendi pendant l'Eté de l'année 1636, lorsque cette Planete étant dans sa grande élongation, se trouvoit aux environs de son Aphélie & de son Périhélie. Cette circonstance assez rare avoit échappé jusques-là aux Astronomes : enfin le 3 Mai 1661, l'Auteur des Tables Caroline observa à Londres, conjointement avec M. Huygens, le passage de Mercure sur le Soleil, ce qui n'a pas peu contribué à lui faciliter les moyens de perfectionner les Tables du mouvement de cette Planete inférieure, Mercure ayant été vu dans l'espace de trente ans, deux fois sur le Soleil, c'est-à-dire, dans ses Nœuds ascendant & descendant.

Bien-tôt après M. Hallei eut une occasion encore plus favorable de vérifier les Elémens qui servent à construire les Tables de Mercure, ayant eu le premier l'avantage d'observer * l'entrée & la sortie de Mercure sur le Soleil, ce qui donnoit la position du Nœud d'une maniere

* En 1677 le 28 Octobre, vieux style, M. Hallei a déterminé dans l'Isle de Ste Hélene, qui est 0^h $33'$ $30''$ à l'Occident de Paris, la conjonction en longitude de Mercure au Soleil à 0^h $10'$ $50''$, sa latitude boréale étant 0° $4'$ $41''$.

beaucoup plus préciſe qu'on ne l'avoit établi par les obſervations des années 1631 & 1661, ces deux premieres n'étant pas d'ailleurs à beaucoup près auſſi completes qu'on le pouvoit déſirer.

Cependant quoique Mercure ait été vu encore deux fois ſur le Soleil, ce n'a été qu'en 1723 que M. Hallei s'eſt déterminé à publier les Elémens des Tables de cette Planete, dont on peut dire que le mouvement eſt aſſez exactement connu aujourd'hui. On pourra d'ailleurs s'en aſſurer ſi l'on ſe donne la peine de comparer ces mêmes élémens à deux autres obſervations completes qui ont été faites en 1736 & 1743, le Ciel ayant été ſi favorable pour obſerver les deux dernieres fois Mercure à ſon Nœud aſcendant, que non-ſeulement on a eu l'avantage de bien déterminer ſon entrée & ſa ſortie ſur le diſque du Soleil, mais auſſi ſa poſition ſur le diſque au moment de ſon paſſage par le Méridien; ce qui donne, comme l'on ſçait, plus immédiatement ſon aſcenſion droite & ſa déclinaiſon.

Voici donc les élémens du mouvement de cette Planete, publiés par M. Hallei dans les Tranſactions Philoſophiques de l'année 1723 n° 386: les époques en ont été réduites au nouveau ſtyle, & au Méridien de Paris.

1661	Longit. moy. de ☿	2ˢ 2° 15′ 33″	Aphélie	8ˢ 12° 09′ 14″	♀	1ˢ 14° 06′ 28″
1701		3 01 52 26		8 12 44 17		1 14 41 06

Le moyen mouvement de Mercure déduit des obſervations de 1677 & 1723, a été établi en 100 années Juliennes de 2ˢ 14° 02′ 13″: mais il faut remarquer quant au mouvement de l'Aphélie qui a dû ſervir à le conſtater, que M. Hallei s'eſt ſervi de celui qui eſt établi par M. Newton dans le Scholium de la Prop. XIV. du troiſieme Livre des Princ. Math. de la Phil. Natur. Selon M. Newton, le mouvement de l'aphélie ſeroit beaucoup plus lent que ne le ſuppoſent les Aſtronomes, ce qui ne doit pas nous étonner, Mercure n'ayant jamais été auſſi

Selon M. Newton le mouvement de l'Aphélie

souvent ni aussi exactement observé que les autres Planetes. On peut donc s'en tenir aujourd'hui au mouvement déduit de la Théorie, c'est-à-dire, à ce dernier résultat qui fait le mouvement de l'Aphélie de 1° 27′ 20″ en 100 ans, à raison de $52''\frac{1}{2}$ par année.

de Mercure est plus lent que ne l'avoient supposé les Astronomes.

Si l'on peut se fonder avec quelque certitude sur les mouvemens moyens de Mercure & de son Aphélie établis ci-dessus ; à plus forte raison doit-on se flater de connoître encore mieux le mouvement du Nœud, puisqu'il a été déduit des observations immédiates. M. Hallei l'établit donc par les deux passages de Mercure, dont on vient de parler de 39′ 50″ en 46 ans, ce qui donne 1′ 30″ de plus que selon la précession de l'Equinoxe, & fait voir que le Nœud a un mouvement réel selon la suite des signes, à raison de $3'\,15''\frac{1}{2}$ en 100 ans depuis la premiere Etoile d'Υ ; c'est-à-dire, que son mouvement en 100 ans depuis le point de l'Equinoxe, est de 1° 26′ 35″ ou 36″.

Le mouvement du nœud de Mercure.

Il ne reste plus qu'à établir la plus grande excentricité & la moyenne distance de Mercure au Soleil : M. Hallei admet cette derniere, la même que celle qui est rapportée dans les Tables Carolines, sçavoir de $\frac{38710}{100000}$ parties de la moyenne distance de la Terre au Soleil, il donne aussi la plus grande équation du centre de 23° 42′ 37″.

Quoique Bouillaud & Street ayent fait usage de plusieurs observations de Gassendi, lorsque Mercure a passé proche son Périhélie & dans son Aphélie, ce qui a fait connoître sa plus grande & sa plus petite élongation, & par conséquent son excentricité, cependant il est à remarquer que M. Hallei n'a point dit par quelles observations nouvelles il s'est déterminé à conserver la moyenne distance publiée par Street, ce qu'il étoit important de discuter dès qu'il a voulu diminuer l'excentricité de l'orbite de Mercure ; d'autant que 20 ans auparavant, sçavoir au

Difficultés qu'on peut proposer de résoudre touchant la plus grande équation du centre de Mercure.

commencement du siecle, M. de la Hire qui a publié des Tables Astronomiques, semble retenir l'excentricité ancienne, puisqu'il fait la plus grande Equation du centre de Mercure $24^{\circ}\,16'\frac{7}{8}$ ou $17'$, la même que selon Bouillaud.

Sans examiner ici les motifs qui ont déterminé M. de la Hire à ne point nous détailler les méthodes ou approximations dont il a pu se servir dans la construction de ses Tables; sans nous arrêter, dis-je, à objecter qu'il n'a pas même rendu compte des observations ni des élémens qui ont dû lui servir de fondement pour les construire, (ce qui étoit contraire à l'usage établi dans le dernier siecle parmi les Astronomes) on peut dire seulement qu'on sçait à n'en pouvoir douter, que M. de la Hire avoit assez assidûment observé Mercure * dans ses digressions Orientales & Occidentales, ensorte que si les observations des hauteurs & des Azimuts qu'il prenoit le soir ou le matin sont un jour publiées, on parviendra peut-être à discuter avec quelque certitude ce point essentiel touchant la plus grande équation du centre de Mercure. Au reste il est bon d'avertir qu'au lieu de hauteurs & d'azimuts, il auroit été à souhaiter que M. de la Hire eût déterminé les lieux de Mercure par ses distances aux Etoiles, comme le pratiquoit Gassendi; d'autant qu'avec de simples fils à plomb il est presqu'impossible de jamais bien conclurre les ascensions droites. D'ailleurs les clochers, les tours, & les autres objets de l'horison, dont M. de la Hire s'est servi le plus souvent qu'il lui a été possible, ne donnoient pas à beaucoup près la même exactitude qu'on pourroit l'esperer aujourd'hui, en y employant un excellent instrument des passages: enfin l'inconstance des réfractions, lesquelles changent du chaud au froid, a dû apporter certainement des erreurs assez grandes dans les ascensions droites & dans les déclinaisons observées; d'où il faut conclurre que puisque MM. de la Hire & Hallei n'ont

* *M. de la Hire a observé aussi quelquefois Mercure dans le Méridien. Mem. de l'Acad. 1706, & 1707.*

Les diverses erreurs qui ont pû influer sur les positions de Mercure, lorsqu'on la vu proche l'horison.

pas assez insisté sur cet article, & que les refractions n'étoient pas encore assez connues du tems de Bouillaud & Street, l'excentricité de l'orbite de Mercure est vraisemblablement de tous les Elémens de sa Théorie celui qui a été établi avec le moins d'exactitude.

L'excentricité de Mercure n'est pas encore assez connue.

Il n'en est pas de même de l'inclinaison de son orbite au plan de l'Ecliptique : M. Hallei assure que par des observations décisives du Lieu de cette Planete déterminé proche le Limite boréal, cette inclinaison a été établie de $6^{\circ}\ 59'\ 20''$; ce qui doit être préféré, comme l'on voit, aux recherches de ceux qui ont voulu la déterminer lorsque Mercure a passé à son nœud ascendant, cette Planete étant vue pour lors sur le disque du Soleil.

Inclinaison du plan de l'orbite de Mercure à l'égard de l'Ecliptique.

Les Tables du mouvement des autres Planetes qu'on auroit pu facilement construire si les élémens en avoient été restitués de même que ceux de Mercure, semblent exiger non-seulement un plus grand nombre d'observations que celles qu'on a publiées jusqu'à ce jour, mais aussi une Théorie beaucoup plus difficile que celle qu'on vient d'exposer, à moins qu'on n'en excepte la Théorie de la Lune. En effet les excentricités de Satùrne & de Jupiter étant variables (comme les observations le prouvent inconteſtablement, & comme en sont convaincus aujourd'hui tous les Astronomes) il est certain que tant que les Auteurs des Tables n'auront point fait un choix particulier des observations les plus convenables, les plus rares & les plus exactes, on ne pourra jamais se flater de bien rétablir les moyens mouvemens de ces Planetes, ni les autres inégalités qui se trouvent soit dans leur plus grande équation du centre, soit dans le mouvement de leur Aphélie. D'ailleurs ne reste-t-il pas aussi à restituer, en y employant les plus récentes & les principales positions observées de ces deux Planetes, comme aussi celles de Mars, de Venus & de Mercure (corrigées par l'Aberra-

La Théorie des Planetes supérieures est encore fort imparfaite.

L'excentricité de l'orbite de Saturne n'est point invariable.

Dans les observations du mouvement des Planetes, on ne doit pas oublier d'avoir égard à l'Aberration, pour réduire leurs Lieux apparens & véritables.

tion & les autres élémens nouvellement connus) leur plus grandes équations du centre ou diverſes excentricités, le lieu de leur Aphélie, l'inclinaiſon de leur orbite au plan de l'Ecliptique, & le vrai mouvement de leurs nœuds.

En l'année 1761 on pourra déterminer exactement la poſition & le mouvement du ☊ de Venus.

La poſition du nœud de Venus & ſon vrai mouvement, ne ſçauroient être mieux connus que par le paſſage de cette Planete ſur le diſque du Soleil qu'on attend en l'année 1761. Mais puiſqu'il s'agit de développer ici d'une maniere plus évidente le plan du travail que ſe propoſent les Aſtronomes d'aujourd'hui pour perfectionner les Elémens des Tables, & la Théorie des Planetes; puiſqu'on ſçait, dis-je, à préſent que ces mouvemens ſont bien moins connus que ceux du Soleil & de la Lune, & qu'il arrive ſouvent qu'on s'apperçoit d'une erreur de près de 10′ entre le calcul & l'obſervation du lieu de Saturne, la plus élevée de nos Planetes ſupérieures; on va rapporter d'abord le réſultat des recherches faites pendant le dernier ſiecle par les Aſtronomes qui ont ſuccédé à Tycho; & on tâchera de donner auſſi par extrait ce qui a été publié à ce ſujet depuis environ 60 ans, c'eſt-à-dire dans preſque toutes les occaſions où les Modernes ont tenté de corriger les Elémens du mouvement des Planetes.

Les Epoques qui ſuivent ont été réduites au nouveau ſtyle & au Méridien de Paris, & les années commencent, ſelon notre ſuppoſition ordinaire (ou que les Aſtronomes regardent aujourd'hui comme la plus commode) à midi de tems moyen, le 31 Décembre de l'année qui précéde immédiatement.

	Selon *Kepl.r.*	Selon *Bouillaud.*	Selon *Street.*
Epoques ♄ 1601	6s 28° 04′ 35″½	6s 28° 04′ 14″½	6s 28° 05′ 02″
1701	11 21 31 58½	11 21 29 38½	11 21 32 52
Le moyen mouv. diurne	2 01	2 01	2 00
en 100 années Jul.	4 23 19 24	4 23 27 25	4 23 29 50

Les Aphélies & les nœuds étant immobiles dans le Ciel étoilé ſelon les Tables Caroliines de Street, on a fait

uſage des anomalies moyennes que donne cet Auteur pour époques, en y ajoutant le mouvement de la premiere Etoile d'♈, à raiſon de 1° 23′ 20″ en 100 ans ; ce qui ſuppoſe la préceſſion annuelle de l'Equinoxe de 50″ au lieu de 48″ qu'admet ſeulement le même Auteur. En effet il eſt vraiſemblable qu'il s'eſt attaché principalement à bien établir les révolutions anomaliſtiques des Planetes.

Inégalités dans le moyen mouvement de Saturne & de Jupiter, apperçues par Flamſteed vers la fin du dernier ſiecle.

Dans les Tranſactions Philoſophiques de l'année 1683, Flamſteed avoit remarqué à l'occaſion d'une des conjonctions de Saturne à Jupiter, que le moyen mouvement de ce dernier étoit ſuppoſé beaucoup trop lent dans les Tables les plus eſtimées ; & au contraire celui de Saturne un peu trop rapide.

Cela ſe trouve confirmé par les Tables Aſtronomiques de M. de la Hire publiées en 1702, où le moyen mouvement de Saturne en 100 années Juliennes, n'eſt plus ſuppoſé que de 4ˢ 23° 19′ 24″ : mais il s'en faut bien que les diverſes queſtions propoſées ſur le moyen mouvement de Saturne, ſoient entierement décidées.

Le moyen mouvement de l'Aphélie & du nœud de Saturne, n'eſt point encore connu.

Les Auteurs ſont encore bien moins d'accord ſur le mouvement de l'Aphélie, car on a le Lieu de l'Aphélie ſelon *Kepler* en $\left\{\begin{matrix}1601 & 8ˢ\,25°\,57'\,32'' \\ 1701 & 8\;\;28\;\;03\;\;42\end{matrix}\right.$ Selon *Bouillaud* $\left\{\begin{matrix}8ˢ\,25°\,59'\,44'' \\ 8\;\;29\;\;10\;\;00\end{matrix}\right.$

En 100 ans différence 2 06 10 — 3 10 16

Mais Street donnant uniquement la diſtance de l'Aphélie de Saturne à la premiere Etoile d'♈ de 7ˢ 28° 30′ 00″, on aura donc le lieu de l'Aphélie pour $\left\{\begin{matrix}1601 & 8ˢ\,26°\,06'\,50'' \\ 1701 & 8\;\;27\;\;30\;\;10\end{matrix}\right\}$ enſorte que ſelon cet Auteur la différence de mouvement en 100 ans, ſçavoir 1° 23′ 20″, eſt égale au mouvement apparent des Etoiles ou des points des Equinoxes.

	Selon *Kepler*.	Selon *Bouillaud*.	Selon *Street*.
Le ☊ de ♄ en 1601	3ˢ 20° 59′ 57″	3ˢ 20° 30′ 47″½	3ˢ 20° 06′ 50″
1701	3 22 59 02	3 21 14 02½	3 21 30 10
Différence en 100 ans	1 59 05	Différ. 0 43 15	1 23 20

L'inclinaiſon de l'orbite que Kepler avoit d'abord ſup-

L'inclinaison de l'orbite de Saturne, n'est pas la même selon divers Auteurs.

posée de 2° 32′ 00″, a été réduite par Street à 2° 30′ 00″, mais M. de la Hire l'a fait plus grande, sçavoir 2° 33′ 30″, & d'autres Astronomes modernes au contraire la diminuent & la rapprochent* de celle qui a été supposée par Bouillaud & Street. On ne connoît donc pas encore assez au juste la vraie inclinaison de l'orbite de cette Planete au plan de l'Ecliptique, & cela vraisemblablement parce qu'elle n'est pas constante ; ce qui doit influer, comme l'on voit, dans la recherche du Lieu du nœud, & doit faire conclurre que ni la position, ni les mouvemens des nœuds de Saturne, ne sont point encore déterminés.

* *Mém. de l'Acad. année 1704.*

Il reste à rapporter l'excentricité de l'orbite, & la moyenne distance de Saturne au Soleil, lesquelles, selon Kepler, contiennent $\frac{542\,07}{100\,000}$ & $\frac{95\,1000}{100\,000}$ parties de la moyenne distance de la Terre au Soleil, ce qui donneroit la plus grande équation du centre de 6° 32′ selon Kepler, que Bouillaud avoit augmenté d'environ 5′, & que M. de la Hire a réduite à 6° 30′ 00″ dans ses Tables.

La plus grande équation du centre paroît inconnue.

Cette excentricité étant variable, il doit s'ensuivre que ni la moyenne distance de Saturne au Soleil, ni la plus grande équation de son orbite ne sont pas encore connues.

Grande différence dans l'époque des moyens mouvemens de Saturne pour l'année 1701, entre M. de la Hire & les anciens Astronomes qui l'avoient déduite des observations de Tycho.

La grande différence qui se trouve entre les époques du moyen mouvement de Saturne pour 1701, & celle qu'on tire des Tables de M. de la Hire, sçavoir au 31 Décembre $11^{s}\,21°\,14′\,00″$, suffit pour faire connoître que les équations qui conviennent au mouvement moyen de Saturne, n'étant pas connues aux trois Auteurs dont on a parlé ci-dessus, il faudroit si l'on vouloit se servir de leurs Tables, retrancher 15′ à 20′ de leurs Epoques pour calculer ensuite les lieux de Saturne pendant tout ce 18e siecle : mais en voilà assez pour faire appercevoir que la Théorie de Saturne est la plus imparfaite, & que tous les Elémens y sont encore, pour-ainsi-dire, à refaire.

Quand

Recherches sur l'inclinaison de l'orbite de Jupiter au plan de l'Ecliptique.

Quand Jupiter qui approchoit de son opposition au Soleil parut en 1673 en conjonction avec θ de la Vierge, ou la neuvieme Etoile selon le Catalogue de Tycho, cette Planete étoit alors Aphélie, & avoit à peine passé son Limite boréal. Flamsteed ayant donc observé son vrai lieu pendant presque tout le mois de Mars, en le comparant à cette Etoile (& ayant déterminé par-là sa longitude & sa latitude) en a fait usage pour rechercher l'inclinaison de son orbite au plan de l'Ecliptique. Comme on remarquoit alors une différence considérable dans le lieu du nœud que Bouillaud avoit placé 2° 31′ plus avant que selon l'un des résultats de Képler; Flamsteed fait connoître d'abord qu'une si grande différence ne sçauroit apporter plus de 23″ d'erreur dans l'inclinaison de l'orbite qui doit résulter du calcul de son observation. Mais ce qui devroit être le plus à craindre (& à quoi il sera toujours facile de remédier) c'est l'erreur qui a dû venir de la supposition du lieu de l'Etoile, dont la longitude se comptoit pour lors ♎ 13° 37′ 11″, & la latitude boréale 1° 45′ 00″. Flamsteed en ayant donc déduit au 20 Mars v. st. à $8^{h}\frac{1}{4}$ du soir la latitude géocentrique de Jupiter ♎ 13° 35′ 33″, & sa latitude apparente 1° 35′ 40″$\frac{1}{2}$; c'est-à-dire, la longitude héliocentrique ♎ 13° 03′ 33″, & la latitude 1° 18′ 07″ boreale, il a conclu que dans la supposition que le ☊ de Jupiter auroit été au ♋ 8° 45′, l'inclinaison * de son orbite au plan de l'Ecliptique seroit de 1° 18′ 20″: mais il a calculé aussi que cette inclinaison devoit être 26′ 40″ plus petite que la latitude de l'Etoile; ensorte

Grande différence dans le Lieu du nœud entre Képler & Bouillaud.

* M. de la Hire de même que Képler, a établi l'inclinaison de l'orbite de Jupiter au plan de l'Ecliptique de 1° 19′ 20″. Selon Bouillaud on a l'inclinaison 1° 21′ 48″, que Street a réduite à 1° 20′ 00″, & que feu M. Cassini a conclue en 1673 & 1690, de 1° 19′ 40″. La déclinaison apparente de l'Etoile θ observée par M. Picard étoit en 1673 de 3° 46′ 50″, d'où l'on tire celle de Jupiter le 31 Mars à minuit de 3° 54′ 45″, & de même à son passage au Méridien le jour suivant 3° 52′ 00″: ces dernieres observations peuvent donner fort exactement l'inclinaison de l'orbite pour l'année 1673; car Jupiter passoit au Méridien 23″$\frac{1}{2}$ & 52″ de tems avant l'Etoile.

qu'ayant établi dans la suite la latitude de 1° 45′ 30″, comme il paroît par le Catalogue Britannique, on pourroit donc conclurre l'inclinaison de l'orbite de 1° 18′ 50″.

De quelle maniere on est parvenu à vérifier si les nœuds de Jupiter étoient immobiles dans le Ciel étoilé.

Pour s'assurer si les nœuds de Jupiter étoient immobiles dans le Ciel étoilé, M. Pound s'étoit proposé de comparer Jupiter aux mêmes Etoiles qu'avoit choisies Gassendi, & dont ce Philosophe avoit fait usage pour observer deux conjonctions consécutives 83 ans auparavant. Le lieu de la Ire des deux Etoiles qui a dû être éclipsée, ou qui selon le résultat des observations a dû raser le bord de Jupiter (étant seulement de 15″ plus boréale que le centre le 3 Déc. 1716 à 7^h 55′ du matin) étoit alors selon le Catalogue de Flamsteed en ♓ 28° 17′ avec une latitude australe de 0° 21′ 55″. Mais lorsque Gassendi * la vit en conjonction le 9 Décembre 1633, elle n'étoit que de cinq demi-diametres de Jupiter plus boréale que le centre de cette Planete. En second lieu l'autre Etoile éclipsée deux mois après, sçavoir le 23 Janvier 1717, à 1^h du matin ou environ, n'a dû être plus boréale que le centre de Jupiter, que de 17″ à 18″, & son lieu restitué par M. Pound étoit alors ♓ 22° 13′ avec une latitude australe de 0° 13′½: mais le 6 Fevrier 1634. Jupiter étant dans sa station, la même observée par Gassendi parut aussi en conjonction, & seulement de trois diametres plus australe que le centre. Ainsi le calcul * fait avec le plus grand soin par MM. Hallei & Pound, nous apprend que les nœuds de Jupiter n'ont pas été, dans ce long espace de 83 ans, sensiblement mobiles. Enfin ils les ont placés * à 2^s 8° 35′ depuis la premiere Etoile d'♈, c'est-à-dire que le lieu du ☊ étoit au commencement de 1717 au ♋ 7° 48′ 30″, ou bien en 1701 ♋ 7° 35′ 10″.

* *In Commentar. de Rebus Cœlestibus.*

* *Cette recherche ne doit point exclurre les inégalités qu'on a apperçues en certains cas, dans le mouvement du nœud.*

* M. de la Hire donne pour 1701 le lieu du ☊ de Jupiter ♋ 7° 11′ 44″: on peut voir dans les Mémoires de l'Académie de 1706, une ☌ de ♍ à Regulus, qui s'écarte de cette position qu'il a donnée au nœud. Mais si l'on prend un milieu entre les divers résultats que feu M. Cassini a trouvés en 1681 & 1693, on aura 7° 30′ pour 1701: il a trouvé aussi le 18 Juin 1705, ♋ 7° 17′.

	Selon *Kepler.*	Selon *Bouillaud.*	Selon *Street.*
Epoques de ♄ 1601	5ˢ 09° 49′ 52″	5ˢ 09° 53′ 27″	5ˢ 09° 51′ 27″
1701	10 16 03 19	10 16 06 48	10 16 07 18
Le moy. mouv. diurne	04 59	04 59	04 59
en 100 années Jul.	5 06 18 26	5 06 18 20	5 06 20 50
Aphélie de ♄ 1601	♎ 6° 52′ 00″	♎ 8° 01′ 21″	♎ 7° 26′ 50″
1701	8 10 38	10 29 52	8 50 10
En 100 années Julien.	1 18 38	2 28 31	1 23 20
☊ de ♄ 1601	♋ 5° 25′ 58″	♋ 8° 37′ 23″	♋ 5° 36′ 50″
1701	5 31 48	9 18 26	7 00 10
En 100 années Julienn.	0 05 50	0 41 03	1 23 20

Suppoſant avec Kepler la moyenne diſtance de Jupiter au Soleil de $\frac{519650}{1000000}$ de la moyenne diſtance du Soleil à la Terre, l'excentricité de l'orbite de Jupiter ſera de $\frac{25058}{100000}$ que Street fait ſeulement de $\frac{25050}{100000}$, de ſorte que la plus grande équation du centre de Jupiter ſelon les Tables Rudolphines, n'eſt que de 5° 31′ 37″; & quoique Bouillaud & M. de la Hire l'ayent fort augmentée, l'ayant donnée l'un de 5° 34′ 00″, & l'autre de 5° 36′ 55″, ce qui paroît confirmé par les recherches de MM. Caſſini & Maraldi, publiées dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1706, où l'on fait cette équation de 5° 35′ 15″; cependant il ſemble d'ailleurs que cette plus grande équation du centre a paru plus petite, ce qui feroit ſoupçonner qu'elle pourroit être variable, de même que le mouvement de l'Aphélie & l'excentricité de l'orbite de cette Planete, ſur laquelle Saturne doit agir, quoique bien plus foiblement que Jupiter ſur Saturne.

L'époque pour 1701 du moyen mouvement de Jupiter ſelon les Tables ou le réſultat des obſervations de M. de la Hire étoit au 31 Décembre à midi de tems moyen, 10° 16° 11′ 09″. Ces nombres excedent ſenſiblement ceux des époques qu'on a déduites ci-deſſus des obſervations les plus anciennes comparées à celles de Tycho; d'où il eſt évident que la différence pourroit s'accroître

* *En 1692 M. de la Hire avoit déja remarqué qu'il falloit ajouter 6′ à l'époque pour 1601 des Tables Rudolphines, & avancer le lieu de l'Aphélie de 1° 40′.*

& devenir plus grande au commencement du siecle suivant: c'est pourquoi il est important de rechercher soigneusement les époques des moyens mouvemens, tant de Saturne que de Jupiter, qu'on ignore aujourd'hui, & cela vraisemblablement parce qu'on ne les a pas encore dégagées des diverses inégalités qui les affectent, & qu'à peine y soupçonnoit-t-on du tems de Kepler. En restituant totalement les époques & les moyens mouvemens de Saturne & de Jupiter, les Astronomes se trouveront à portée de vérifier de combien la premiere de ces deux Planetes s'est rallentie, & de combien la seconde a dû accélerer son mouvement depuis Tycho jusqu'à présent.

L'action de Jupiter sur Saturne, & celle de Saturne sur Jupiter, ne doivent plus être négligées lorsque ces Planetes approchent de leur conjonction.

La différence de quelques minutes qui est assez sensible, & qui résulte de la comparaison de l'époque des moyens mouvemens de Jupiter pour 1701, à celle de Kepler & de Bouillaud, a été confirmée par les recherches de MM. Cassini & Maraldi, rapportées dans le Volume cité ci-dessus; car ayant comparé divers lieux de Jupiter observés dans son opposition au Soleil & dans ses moyennes distances (suivant la méthode que Bouillaud a détaillée, & qui consiste à y comparer alternativement le Lieu moyen avec le Lieu vrai des deux côtés de l'Aphélie) ils ont trouvé qu'il falloit ajouter $5'\frac{1}{2}$ à l'époque du moyen mouvement établie par Bouillaud. Dans le même Mémoire on conclud le Lieu de l'Aphélie pour le commencement de 1701 en $\simeq 9^\circ 53'$, ce qui résulte du milieu de plusieurs différentes déterminations dont les résultats s'éloignent des deux tiers d'un degré: enfin M. de la Hire avoit établi le Lieu de l'Aphélie pour le même tems en $\simeq 10^\circ 17' 15''$.

La méthode dont se servent les Astronomes pour découvrir la plus grande équation du centre.

Dans la Planete de Mars les différences ne sont plus si excessives, sans doute parce que son excentricité est constante, & que le mouvement de son Aphélie est plus égal & uniforme: aussi est-ce de toutes les Planetes celle

Elémens qui ont pu servir à construire les Tables des mouvemens de Mars.

dont le mouvement de l'Aphélie eſt le mieux connu, & que M. Newton a choiſi pour en déduire le mouvement des Aphélies des Planetes inférieures.

	Selon *Kepler*.	Selon *Bouillaud*.	Selon *Street*.
Epoques ♂ 1601	10ˢ 01° 29′ 49″	10ˢ 01° 30′ 28″	10ˢ 01° 29′ 49″
1701	0 02 38 32	0 02 38 37	0 02 43 41
Moyen mouv. diurne	31 27	31 27	31 27
en 100 années Jul.	2 01 40 10	2 01 39 36	2 01 45 20
L'Aph. de ♂ 1601	☊ 28° 59′ 52″	☊ 28° 59′ 52″	☊ 28° 48′ 50″
1701	♍ 00 51 27	♍ 01 11 13	♍ 00 12 10
En 100 années Juliennes	1 51 35	2 11 21	1 23 20
☊ de ♂...1601	♉ 16 44 30″	♉ 16° 44′ 32″	♉ 16° 46′ 50″
1701	17 50 45	18 04 55	18 10 10
En 100 années Juliennes	1 06 15	1 20 23	1 23 20

Suppoſant avec Kepler la moyenne diſtance de Mars au Soleil de 152350, dont la moyenne diſtance du Soleil à la Terre eſt 100000, l'excentricité de Mars ſeroit de $\frac{14115}{100000}$, c'eſt-à-dire, un peu plus grande que celle de Street qui l'a réduite à $\frac{14100}{100000}$ de la moyenne diſtance du Soleil à la Terre. Kepler fait auſſi la plus grande équation du centre de $10°37'\frac{1}{2}$, laquelle ayant été vérifiée, s'eſt trouvée conforme aux obſervations, comme il paroît par le réſultat des recherches faites à ce ſujet, & publié il y a trente ans par MM. Caſſini & Maraldi. Bouillaud l'avoit à la vérité déterminée d'une minute & un tiers plus petite, mais M. de la Hire au contraire l'a augmentée juſqu'à $10°40'\frac{2}{3}$.

M. de la Hire a déduit encore de ſes obſervations les époques des mouvemens de Mars; c'eſt pourquoi les ayant réduites au 31 Décembre 1701 à midi de tems moyen, on a celle des moyens mouvemens 0ˢ 02° 41′ 05″, ce qui tient à peu près un milieu entre Bouillaud & Street: il a établi auſſi le ☊ au ♉ 17° 25′ 20″.

La détermination du lieu de l'Aphélie par M. de la Hire, qui le place en 1701 à ♍ 0° 35 25″, s'accorde aſſez avec ce qui ſe trouve dans les Mémoires de l'Aca-

De quelle maniere on peut parvenir à restituer le Lieu de l'Aphélie.

démie des Sciences de l'année 1706, où l'on assure que par les observations du lieu de Mars faites alternativement proche l'Aphélie & le Périhélie, on a reconnu qu'il falloit le supposer de 20 minutes moins avancé que selon les Tables Rudolphines.

M. Newton ayant pris vraisemblablement un milieu entre les deux résultats du mouvement de l'Aphélie de Mars, donnés par Kepler & Bouillaud, l'établit de $1^{\circ}\,58'\frac{1}{2}$ en 100 ans, c'est-à-dire, de 35″* plus grand que selon la précession des Equinoxes; mais il semble que le mouvement de cet Aphélie pourroit être encore mieux connu, en y employant les plus récentes observations comparées à celles de Tycho, & du dernier siecle.

** M. Newton a établi dans la suite le mouvement de l'Aphélie de 33′ 20″.*

Quoique M. de la Hire ait déterminé plus exactement le Lieu du nœud de Mars pour 1701, que selon les Rudolphines de Kepler; quoiqu'il le place, dis-je, au ♉ $17^{\circ}\,25'\,20''$, cependant la détermination rapportée dans le Volume de l'Académie cité ci-dessus, paroît encore plus exacte; c'est pourquoi on aura le lieu du ☊ en ♉ $17^{\circ}\,13'\frac{1}{2}$. On ne connoît pas néanmoins encore assez le mouvement du nœud de Mars pour assurer s'il est fixe dans le Ciel étoilé, ou s'il a un mouvement réel soit direct, soit rétrograde. La plupart des Astronomes depuis Kepler lui donnent un mouvement rétrograde relativement aux Etoiles fixes: enfin il n'y a gueres que les conjonctions précises de cette Planete aux Etoiles Zodiacales, qui puissent nous conduire à décider cette question.

L'inclinaison de son orbite au plan de l'Ecliptique est assez connue, à cause que dans l'opposition de cette Planete au Soleil sa latitude géocentrique est très-grande; Kepler l'a déterminée de $1^{\circ}\,50'\,30''$, Bouillaud & Street de $1^{\circ}\,51'\,04''$, $1^{\circ}\,52'\,00''$, & M. de la Hire $1^{\circ}\,51'\,00''$. Enfin feu M. Cassini ayant observé la plus grande latitude géocentrique de $6^{\circ}\,50'\,40''$ le 7 Août 1687, on en a

conclu la latitude héliocentrique ou l'inclinaiſon de l'orbite de Mars au plan de l'Ecliptique de 1° 50′ 45″.

Le mouvement du nœud de Venus dont M. de la Hire a publié diverſes obſervations en 1692 (& qui eſt preſque la ſeule Planete dont il ait fait connoître qu'il eût entrepris de reſtituer les élémens) a été déja calculé ; mais il faudroit encore comparer les plus récentes obſervations à celles qui ont été faites dans le dernier ſiecle, puiſque ſans cela la poſition du nœud, & par conſéquent la Théorie de Venus doit être fort imparfaite. Difficultés ſur le mouvement du nœud de Venus.

	Selon *Kepler*.	Selon *Bouillaud*.	Selon *Street*.
Epoques ♀ 1601	11s 04° 48′ 34″	11s 04° 50′ 24″	11s 4° 43′ 49″
1701	5 22 36 00	5 22 35 37	5 22 17 17
Moyen mouv. diurne	1 36 08	1 36 08	1 36 08
en 100 années Jul.	6 19 23 34	6 19 21 21	6 19 09 35
Aphélie de ♀ 1601..	♒ 1° 14′ 20″	♒ 5° 23′ 05″	♒ 2° 36′ 50″
1701.....	3 24 25	6 47 36	4 00 10
En 100 années Juliennes	2 10 05	1 24 31	1 23 20
☊ de ♀....1601	♓ 13° 00′ 45″	♓ 14° 07′ 38″	♓ 12° 52′ 50″
1701....	14 19 05	14 57 54	14 16 10
En 100 années Juliennes	1 18 20	0 50 16	1 23 20

Selon l'obſervation d'Horoxius du paſſage de Venus ſur le Soleil, le 4 Décembre 1639 ſelon le N. ſtyle, M. de la Hire conclud que le nœud Aſcendant de cette Planete devoit être alors au ♈ 13° 22′ 45″ : mais Street l'établit à ♈ 13° 23′ $\frac{3}{5}$ ou 25′ $\frac{1}{4}$. Enfin M. de la Hire ayant déterminé la longitude & la latitude de Venus, pluſieurs jours avant & après ſa conjonction inférieure au Soleil (laquelle a dû arriver le 15 Nov. 1691 à 11h 4′ du ſoir de tems vrai) le Lieu du nœud deſcendant qui réſulte d'une aſſez longue ſuite d'obſervations, ſeroit ſelon le même Auteur, au ♎ 13° 19′ 04″, c'eſt-à-dire 0° 52′ 13″ moins avancé que ne le donnent les Tables Rudolphines de Kepler. Mais il paroît que dans la ſuite il a diminué cette grande différence, l'ayant peut-être attribuée pour la plus grande partie aux erreurs des obſervations : car il ſoupçonnoit alors Le Lieu du nœud au tems du paſſage de Venus ſur le Soleil obſervé par Horroxius.

le nœud de Venus immobile (sans doute dans le Ciel étoilé) autant qu'on en peut juger des différens résultats qu'il rapporte. M. de la Hire s'apperçut aussi pour lors que Kepler faisoit l'époque des moyens mouvemens de Venus de $13'\frac{1}{4}$ trop avancé, ce qu'il semble avoir examiné depuis un peu plus particulierement. Mais voici les époques qu'il donne, ou plutôt que l'on a réduites au 31 Décembre. ♀ 1701 5ˢ 22° 18′ 54″, l'Aphélie ≏ 6° 56′ 10″, le ☊ ♓ 13° 54′ 20″; il fait enfin la plus grande équation du centre de 0° 50′ 00″, & l'inclinaison de l'orbite de 3° 23′ 5″ que Kepler & Bouillaud avoient supposée, l'un de 0° 47′ 36″, l'inclinaison de l'orbite étant de 3° 22′ 00″; & l'autre 0° 54′ 36″, avec une inclinaison 3° 22′ 52″. Au reste M. de la Hire ne paroît pas avoir constaté l'excentricité ni même la moyenne distance de Venus au Soleil, que Kepler a faites de $\frac{500}{100000}$, $\frac{724000}{1000000}$, & l'Auteur des Tables Carolines $\frac{517}{100000}$, $\frac{72333}{1000000}$.

Les époques des mouvemens de Mercure, selon M. de la Hire, réduites au 31 Décembre à midi de tems moyen, sont comme il suit: 1701 ☿ 3ˢ 02° 08′ 26″, l'Aphélie ♓ 13° 03′ 40″, & le ☊ ♉ 14° 53′ 14″.

	Selon *Kepler*.	Selon *Bouillaud*.	Selon *Street*.
Epoques ☿ 1601	0ˢ 21° 53′ 33″	0ˢ 21° 53′ 05″	0ˢ 21° 59′ 47″
1701	3 02 11 32	3 02 12 38	3 01 47 35
Moyen mouv. diurne	4 05 32	4 05 32	4 05 32
en 100 années Jul.	2 14 23 31	2 14 25 05	2 13 53 20
L'Aphélie....1601	♓ 12° 49′ 46″	♓ 11° 37′ 47″	♓ 11° 24′ 50″
1701	15 44 28	14 31 29	12 48 10
En 100 années Juliennes	2 54 42	2 53 42	1 23 20
Le ☊.....1601	♉ 12° 25′ 20″	♉ 12° 30′ 39″	♉ 13° 18′ 50″
1701	14 47 25	15 09 57	14 42 10
En 100 années Julienn.	2 22 05	2 39 18	1 23 20

La moyenne distance que M. Hallei paroît avoir déduite, de même que Street & Newton, de la regle de Kepler, en y employant le tems de la révolution périodique de Mercure autour du Soleil, tient assez exactement un milieu entre celles de Kepler & Bouillaud. Mais l'excentricité que Kepler a faite de $\frac{8150}{100000}$ de la moyenne distance du Soleil à la Terre, supposant la moyenne distance de Mercure au Soleil de $\frac{388606}{1000000}$, a été diminuée par Street qui l'a faite de $\frac{7275}{100000}$.

CHAPITRE

CHAPITRE VINGT-HUITIEME.

Où l'on traite des ſtations des Planetes.

SI la Terre n'avoit aucun mouvement ſur ſon orbe, les Planetes inférieures nous paroîtroient ſtationaires lorſqu'elles viendroient à parcourir l'arc de leur orbite, où la ligne tirée de la Terre à la Planete eſt tangente à cette orbite. Car il eſt évident que la Planete y parcourant un petit arc, ſe trouve par conſéquent dans la ligne droite qui tend vers la Terre, puiſqu'une petite partie de la tangente eſt confondue avec cet arc, enſorte que ſon mouvement paroît détruit, ne pouvant être apperçu. On peut dire la même choſe à l'égard des Planetes ſupérieures, & principalement à l'égard de celle qui eſt la plus éloignée du Soleil & de la Terre, laquelle ſi elle n'avoit en effet aucun mouvement, ne manqueroit pas de nous paroître ſtationaire quand la Terre, en parcourant l'orbe annuel, ſe trouveroit dans la tangente tirée de la Planete à ſon orbe. Au reſte, parce qu'il eſt certain que la Terre & les Planetes ne ſont pas immobiles dans l'un & dans l'autre cas, mais qu'elles ſont emportées d'un mouvement continuel autour du Soleil; il ſuit que lorſqu'une Planete inférieure ſe trouvera dans la tangente tirée de la Terre à ſon orbite, alors le mouvement propre de la Terre qui ſe fait pendant que la Planete inférieure parcourt l'arc de ſon orbite qui ſe confond avec cette tangente, occaſionnera un mouvement apparent dans la Planete, & qu'ainſi elle ne doit pas être encore ſtationaire à notre égard. Par une raiſon toute ſemblable on voit auſſi que quand la Terre parcourt l'arc de ſon orbe qui ſemble ſe confondre avec la tangente ou ligne droite tirée à une Planete ſupérieure, le mouvement propre de cette Planete qui ſe fait pendant cet

Les Planetes inférieures ne ſont pas ſtationaires lorſque nous les voyons dans la ligne droite qui eſt tangente à leurs orbes.

Il en eſt de même des Planetes ſupérieures qui ne ſont jamais ſtationaires, quand elles ſe trouvent dans la tangente de l'orbe terreſtre.

intervalle de tems, empêche qu'elle ne paroisse stationaire, & doit changer son lieu apparent. Il est donc vrai de dire que les Planetes inférieures ne paroissent pas stationaires, quand elles nous paroissent dans la ligne droite qui touche leur orbe, ni que les Planetes supérieures ne sçauroient être stationaires, quand elles se trouvent dans la ligne qui touche l'orbe annuel, & qu'on suppose toujours tirée de la Terre à la Planete.

L'unique cas auquel une Planete doit paroître stationaire.

Cependant comme l'on observe que généralement toutes les Planetes paroissent tantôt directes, & tantôt rétrogrades, il est nécessaire qu'entre ces mouvemens progressifs & rétrogrades elles paroissent enfin stationaires; en un mot, qu'elles paroissent immobiles pendant un certain tems, (quoique de peu de durée) dans le même point du Ciel. Or une Planete doit paroître constamment répondre au même point du Ciel, tant que la ligne droite qui passe par la Terre & par la Planete sera dirigée au même point des Cieux; & il est évident que cette ligne droite y doit répondre tant qu'elle sera parallele à elle-même. Bien plus, on a prouvé que généralement toutes les lignes droites paralleles tirées de quelques points que ce soit de l'orbe annuel, étoient dirigées sensiblement à une même Etoile, parce que la plus grande distance de ces lignes paralleles, qui peut devenir égale au diametre de l'orbe annuel, est nulle, & se réduit à rien, en comparaison de la distance des Etoiles fixes.

Pour trouver donc les points des stations des Planetes, il faut tâcher de découvrir les tems auxquels la ligne, où la Planete est vue de la Terre, demeure sensiblement parallele à elle-même. Pour cet effet on doit faire attention que dans le triangle formé par les lignes qui joignent les centres du Soleil, d'une Planete, & de la Terre, il y a toujours deux côtés constans, ou qui ne varient pas, sçavoir les distances de la Terre & de la Planete au Soleil,

mais que la baſe ou ligne droite qui joint les centres de la Planete & de la Terre eſt variable. Or puiſque les côtés de ce Triangle (à ne les conſidérer que dans des orbes circulaires & concentriques) ſont toujours de même grandeur, il ſuit que le rapport des ſinus des angles faits à la baſe, ſera toujours le même; car les ſinus de ces angles ſont proportionnels aux côtés oppoſés, comme on le démontre dans la Trigonométrie.

PLANCHE IX *Fig.* 15. Dans le tems des ſtations l'augmentation & la diminution des angles faits à la Terre & à la Planete, ſont réciproquement comme les tems périodiques.

Soit préſentement un cercle *BDG* qui repréſente l'orbite d'une Planete, on ſuppoſe que le Soleil occupe le centre de ce cercle, & que l'orbite de la Terre *AHK* lui ſoit concentrique. Si la Terre eſt en *A*, & la Planete au point *B* de ſon orbite, dans le triangle *ASB* les ſinus des angles *A* & *B* formés ſur la baſe *AB*, ſeront entre eux comme les côtés oppoſés *SB*, *SA*. Suppoſant enſuite qu'après un très-petit intervalle de tems la Terre ſe mouvant dans ſon orbe, parcourre le petit arc *AC*, & que pendant le même tems la Planete décrive le petit arc *BD* de ſon orbe, il eſt évident que les mouvemens angulaires de la Planete & de la Terre à l'égard du Soleil, ſeront entre eux réciproquement comme les tems de leurs révolutions périodiques, puiſque plus le tems périodique eſt de longue durée, moins la Planete parcourt d'eſpace dans ſon orbe dans un tems donné. C'eſt pourquoi l'angle *ASC*, qui eſt le mouvement angulaire de la Terre, eſt à l'angle *BSD*, qui eſt le mouvement angulaire de la Planete, comme le tems périodique de la Planete, eſt au tems périodique de la Terre, c'eſt-à-dire, dans une raiſon donnée, & qui eſt toujours la même.

Qu'on imagine auſſi une ligne droite parallele à *AB*, qui joigne les centres *C* & *D* de la Terre & de la Planete: en ce cas la Planete, ſuivant ce qui a été dit ci-deſſus, ſera ſtationaire: de plus la droite *SA* coupera *CD* en *M*, & la droite *SD* prolongée coupera *AB* en *E*. Or à cauſe

des paralleles AB, CD, on aura (selon la vingt-neuvieme Proposition du premier Livre des Elémens d'Euclide) l'Angle SMD égal à l'angle A. Mais (selon la trente-deuxieme Proposition du premier Livre des Elémens d'Euclide) l'angle SMD est égal aux deux autres angles C, & MSC pris ensemble ; on aura donc l'angle C égal à l'angle A, moins l'angle MSC ou CSA. De même à cause des Paralleles AB, CD, l'angle SDC sera égal à l'angle SEA, lequel (selon la trente-deuxieme Proposition du premier Livre des Elemens d'Euclide) est égal aux angles SBA & BSE pris ensemble : donc l'angle SDC sera égal aux angles SBA, BSE, pris ensemble. Ainsi l'augmentation momentanée de l'angle SBA, est égale au mouvement angulaire de la Planete au Soleil fait pendant le même intervalle de tems. Mais puisqu'on vient de faire voir que la diminution momentanée de l'angle A étoit égale à l'angle ASC qui est le mouvement angulaire de la Terre à l'égard du Soleil ; il est donc vrai de dire que les mouvemens angulaires sont en ce cas, en raison donnée, c'est-à-dire, réciproquement entre eux comme les tems périodiques.

Une Planete vue de la Terre paroîtra donc stationaire lorsque le changement momentané de l'angle à la Terre, sera au changement momentané de l'angle à la Planete, comme le tems périodique de la Planete, est au tems périodique de la Terre.

PLANCHE IX. *Fig.* 16.

Les cosinus des angles, dont la raison des sinus est constante, sont dans la raison directe

Supposons maintenant deux angles ou arcs dont les sinus demeurent dans un rapport constant ; je dis que leurs cosinus (ou sinus de complément au Quart-de-cercle) seront entre eux en raison composée de la raison directe des sinus de ces mêmes arcs, & de la raison inverse des changemens momentanés de ces angles ou de ces mêmes arcs. Soient, par exemple, deux arcs AM, CM, dont les sinus soient AB, CD, & leurs cosinus SB, SD;

on suppose que les arcs AM, CM, décroissent & se réduisent aux arcs EM, GM, tels que les sinus EK, GL, de ces derniers arcs, soient proportionnels aux sinus AB, & CD, des premiers, lesquels n'en different que très-peu. Il est évident de-là que les décroissemens AF, CH, leur seront aussi proportionnels. Mais AE, CG sont les décroissemens momentanés de ces mêmes arcs; & d'ailleurs on peut les considérer ici comme des lignes droites. Ayant donc mené FE, HG, paralleles à SM, les triangles AFE, ASB, seront équiangles, car les angles B & AFE sont droits, de plus l'angle EAF est égal à l'angle ASB, l'un & l'autre étant le complément à un droit de l'angle SAB. On démontrera de même que les triangles CHG, CSD, sont équiangles; c'est pourquoi à cause des triangles semblables, on aura

$$CG : CH :: CS : SD$$
$$AF : AE :: SB : AS \text{ ou } CS$$

Ainsi multipliant les antécédens par les antécédens, & les conséquens par les conséquens, on aura $AF \times CG : CH \times AE :: SB \times CS : SD \times CS :: SB : SD$; c'est-à-dire, que SB sera à SD en raison composée de la raison de AF à CH, & de celle de GC à AE: mais la raison de AF à CH est la même que celle des sinus AB, CD; & la raison de CG à AE n'est autre chose que le rapport des décroissemens des arcs AM, CM, dans un tems de peu de durée. Il est donc vrai de dire que SB, cosinus de l'arc AM, sera à SD cosinus de l'arc CM, en raison composée de celle des sinus des mêmes arcs, AB, CD, & de la raison inverse des décroissemens de ces arcs exprimée par le rapport de CG à AE.

des sinus, & dans la raison inverse des changemens momentanés.

Présentement si l'on conçoit un triangle formé de trois lignes tirées par les centres, du Soleil, de la Planete stationaire, & de la Terre, on aura, le cosinus de l'angle à la Terre qui est en A, est au cosinus de l'angle à la

Cette Proposition ou lemme qu'on vient de démontrer, nous conduit à dé-

couvrir les tems des ſtations des Planetes.

PLANCHE IX. *Fig.* 15.

Planete en *B*, en raiſon compoſée de celle des ſinus des angles *A* & *B*, & de la raiſon inverſe des petites variations arrivées aux angles *A* & *B*. Mais on voit d'abord que la raiſon des ſinus eſt la même que celle des diſtances de la Planete & de la Terre à l'égard du Soleil, ſçavoir, *SB*, *SA*; & le rapport des variations des angles *A* & *B* a été prouvé ci-deſſus égal à celui des tems périodiques de la Planete & de la Terre, leſquels peuvent être nommés *t* & *T*. C'eſt pourquoi pour trouver le moment auquel une Planete doit paroître ſtationaire, on fera uſage de cette regle. Le coſinus de l'angle à la Terre *, eſt au coſinus de l'angle à la Planete, en raiſon compoſée de celle des tems périodiques de la Terre & de la Planete, & de la raiſon inverſe de leur diſtance au Soleil.

* *Le rapport A : B eſt compoſé de SB : SA, & de T : t, étant égal à SB × T : t × SA.*

Il ſuit de-là qu'on peut déterminer les points des ſtations des Planetes par une conſtruction géométrique, ce qui ſe peut pratiquer de la maniere qu'on va l'expliquer.

PLANCHE IX. *Fig.* 17. On détermine les points des ſtations par une conſtruction géométrique.

Soit *AH* une partie de la circonférence de l'orbite terreſtre, *GBK* un autre arc concentrique qui repréſente l'orbite de la Planete, *S* le centre commun de ces deux arcs. On retranchera de la ligne *SA* la partie *SE*, enſorte que *SA*, ſoit à *SE*, comme le tems périodique de la Terre, eſt au tems périodique de la Planete. On décrira enſuite une demi-circonférence *ABE*, qui ait pour diametre la ligne *AE*, & qui coupe l'orbite de la Planete en *B*. Le point *B* ſera l'un des points de ſtation de la Planete, & l'angle *SAB* ſera égal à l'élongation de la Planete au Soleil quand elle paroîtra dans ſa ſtation vue de la Terre. Pour le prouver, on ménera les lignes droites *ABF*, *EB*, & parallelement à *EB*, la droite *SF*: ainſi puiſque l'angle *ABE* qui eſt au demi-cercle, eſt droit, l'angle *AFS* ſera droit auſſi, puiſqu'il lui eſt égal.

De plus *AS* : *AF* :: comme le Rayon : au coſinus de l'angle *A*; & *BF* : *SB* :: comme le coſinus *SBF* : au

Rayon ; c'eſt pourquoi multipliant les antécédens par les antécédens, & les conſéquens par les conſéquens, on aura $AS \times BF : AF \times SB ::$ coſin. SBF : coſin. de l'angle A. La raiſon du coſinus de l'angle A, au coſinus de l'angle SBF, eſt compoſée de la raiſon de AF à BF, & de celle de SB à AS : mais la raiſon de AF à BF, eſt égale à celle de AS à SE, ou de T à t ; il eſt donc vrai de dire que la raiſon du coſinus de l'angle A, au coſinus de l'angle SBF, eſt égale à celle de $T \times SB$, & de $t \times SA$. Or parce que l'on a fait voir que lorſque les coſinus des angles A & B ont un ſemblable rapport, c'eſt alors que la Planete eſt ſtationaire. Il eſt donc certain que le point B eſt le lieu où la Planete doit paroître dans ſa ſtation.

Il n'eſt pas moins évident que lorſqu'une Planete inférieure vue de la Terre paroît dans ſa ſtation, la Terre doit auſſi paroître ſtationaire vue de cette même Planete inférieure, de maniere qu'elle paroîtra conſtamment répondre aux mêmes Etoiles fixes. Car la Terre doit paroître ſtationaire tant que la ligne qui joint les centres de la Planete & de la Terre, demeurera parallele à elle-même, puiſque tant que cette ligne conſervera ſon parallélîſme, elle ſera toujours dirigée au même point du Ciel.

Ceci nous fournit donc un moyen de rechercher la poſition des Planetes ſupérieures à l'égard de la Terre & du Soleil, pour le tems auquel elles doivent nous paroître ſtationaires, c'eſt-à-dire, en conſtruiſant le probleme comme ſi la Terre étoit une Planete inférieure, & déterminant le lieu & le tems auſquels, vue de la Planete ſupérieure, elle paroîtra ſtationaire.

Au reſte ſi les tems périodiques des Planetes étoient en effet proportionnels à leurs diſtances au Soleil, les points A & E ſe réuniroient au point G, & en ce cas une Planete ſeroit ſtationaire lorſque l'angle en A ſeroit nul, c'eſt-à-dire, au tems de la conjonction de la Planete

L'unique cas auquel un corps céleſte paroîtroit ſtationaire dans ſa conjonction ou ſon oppoſition.

Autres cas auſquels il n'y auroit plus de ſtation.

inférieure avec le Soleil. Mais ſi SE a un plus grand rapport à SA que SG à SA, c'eſt-à-dire, ſi SE devenoit plus grand que SG, alors le cercle ABE ne couperoit plus l'orbite de la Planete, & partant la Planete paroîtroit toujours directe, & ne ſeroit plus ſtationaire. Au reſte ni l'un ni l'autre de ces deux cas n'a lieu à l'égard des Planetes, comme on le va démontrer.

Les Planetes ne ſont dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas.

Soit nommée p la diſtance de la Terre au Soleil, & q la diſtance SG ou SB de la Planete. Puiſque leurs tems périodiques ont été nommés T & t, & que ſelon la regle ou loi générale expliquée dans le quatrieme Chapitre à l'égard des Planetes, on a $T^2 : t^2 :: p^3 : q^3$, on aura donc $T : t :: \sqrt{p^3} : \sqrt{q^3}$, ou bien $:: p^{\frac{3}{2}} : q^{\frac{3}{2}} :: p \times p^{\frac{1}{2}} : q \times q^{\frac{1}{2}}$. Mais on a auſſi $T : t :: SA : SE$; il doit s'enſuivre que $p \times p^{\frac{1}{2}} : q \times q^{\frac{1}{2}} :: SA$ ou $p : \frac{q \times q^{\frac{1}{2}}}{p^{\frac{1}{2}}}$, & ce quatrieme terme ſera donc égal à SE. Or parce que p ſurpaſſe q, on aura donc $q \times p^{\frac{1}{2}}$ plus grand que $q \times q^{\frac{1}{2}}$, & partant q ſera plus grand que $\frac{q \times q^{\frac{1}{2}}}{p^{\frac{1}{2}}}$, c'eſt-à-dire, SB ou SG plus grand que SE: ainſi le cercle qui a pour diametre AE, coupera néceſſairement l'orbite de la Planete. D'où l'on doit conclurre que de la Terre nous devons voir les Planetes, ſans qu'on en puiſſe excepter aucune, ſtationaires dans certains points de leurs orbites.

Si l'on veut déterminer par le calcul l'angle à la Terre, ou l'élongation d'une Planete au Soleil, quand elle doit paroître ſtationaire, on y procédera comme il ſuit. Suppoſons que r ſoit le rayon, & qx le ſinus de l'angle à la Terre, le ſinus de l'angle à la Planete ſera donc px, en ſuppoſant que p ſoit à q dans la raiſon des ſinus ou diſtances au Soleil; & puiſque le ſinus de l'angle à la Terre eſt qx, ſon coſinus ſera $\sqrt{r^2 - q^2x^2}$, & le coſinus de l'angle à la Planete ſera $\sqrt{r^2 - p^2x^2}$, & partant, ſuivant ce qui

a

a été démontré ci-dessus, $\sqrt{r^2-q^2x^2} : \sqrt{r^2-p^2x^2} :: T \times q : t \times p$. Et en quarrant les termes de cette derniere proportion, on aura $r^2-q^2x^2 : r^2-p^2x^2 :: T^2 \times q^2 : t^2 \times p^2$. Mais $T^2 : t^2 :: p^3 : q^3$, c'est pourquoi au lieu de T^2, t^2, si l'on substitue les deux autres quantités qui leur sont proportionnelles, on aura $r^2-q^2x^2 : r^2-p^2x^2 :: p^3q^2 : q^3p^2$, c'est-à-dire, comme p est à q; d'où l'on tire $qr^2-q^3x^2 = pr^2-p^3x^2$, ou bien $p^3x^2-q^3x^2 = pr^2-qr^2$; & enfin $x = r \times \frac{\sqrt{p-q}}{\sqrt{p^3-q^3}}$, & par conséquent qx sinus de l'angle de la Terre $= qr \times \frac{\sqrt{p-q}}{\sqrt{p^3-q^3}} = \frac{qr}{\sqrt{p^2+pq+q^2}}$.

Or puisque le quarré du cosinus d'un arc quelconque est égal au quarré du Rayon moins le quarré du sinus du même arc, on aura le quarré du cosinus de l'élongation de la Planete au Soleil, lorsqu'elle deviendra stationaire, égal à $r^2-\frac{r^2q^2}{p^2+pq+q^2} = \frac{r^2p^2+r^2pq}{p^2+pq+q^2}$, & partant la racine ou le cosinus sera $r \times \sqrt{\frac{p^2+pq}{p^2+pq+q^2}}$. Mais parce que le cosinus, est au sinus, comme le rayon, est à la tangente: on fera donc $r \times \sqrt{\frac{pp+pq}{pp+pq+qq}}$, est à $\frac{qr}{\sqrt{p^2+pq+qq}}$, c'est-à-dire, $\sqrt{pp+pq}$, est à q, comme r, est à un quatrieme terme, sçavoir, $\frac{rq}{\sqrt{pp+pq}}$, & ce quatrieme terme sera la tangente de l'angle à la Terre. Le calcul devient facile par cette derniere analogie, puisque si l'on ôte la demi-somme des logarithmes de p & de $p+q$, du logarithme de q, on aura le logarithme de la tangente de l'angle à la Terre: enfin on pourra aussi déduire de cette analogie la construction suivante, qui est encore plus simple que l'autre.

Autre construction plus facile.

Soit HAQ un arc de l'orbite d'une Planete supérieure, GBD l'orbite d'une Planete inférieure, S le centre

PLANCHE IX. *Fig.* 18.

commun des deux orbites, on prolongera la ligne AS jusqu'à ce qu'elle rencontre l'orbite de la Planete inférieure en D. Enſuite on décrira un demi-cercle qui aura pour diametre la ligne AD. Du centre S on élevera ſur la ligne AD la perpendiculaire SLC, prolongée juſqu'à ce qu'elle rencontre le demi-cercle en C; & l'on tirera AC, ſur laquelle prenant AF égale à SD, on abaiſſera du point F, ſur AD, la perpendiculaire FE. On prendra auſſi ſur SC la ligne SL, égale à AE, & tirant AL, l'angle SAL ſera celui que l'on cherche; c'eſt-à-dire, que le point B, ſera celui de la ſtation de la Planete. Car le quarré de SC, eſt égal au rectangle de AS par $SD = pq$; & partant le quarré de AC ſera égal aux quarrés de AS, $SC = p^2 + pq$. Mais comme AC, eſt à AF, ainſi AS, eſt à AE; & les droites AS, SL, ſont entre elles comme le rayon, eſt à la tangente de l'angle SAL, c'eſt-à-dire, $\sqrt{p^2+pq}$, eſt à q, comme le rayon, eſt à la tangente de de l'angle SAL qu'il falloit trouver.

Le calcul qu'on vient de propoſer, de même que les deux conſtructions précédentes, ne conviennent plus aux orbes elliptiques, ou qui ſont fort excentriques.

Ce que nous venons de dire, ſuffiroit peut être pour déterminer les ſtations des Planetes, ſi leurs orbes étoient de véritables cercles concentriques; mais à cauſe de l'excentricité de leurs orbites, qui d'ailleurs ſont elliptiques, il faut bien obſerver que les angles, ſoit au Soleil, ſoit aux Planetes, ne ſont pas tout à fait conſtans, mais variables, & par conſéquent ſujets à changer ſelon les divers lieux que les Planetes occuperont ſucceſſivement dans leurs orbites au tems de chaque ſtation. C'eſt pourquoi comme en ce cas il y auroit une infinité d'angles différens à conſidérer ſelon les diverſes poſitions de la Terre ou de la Planete dans ſon orbite (leſquelles peuvent varier à l'infini aux tems des ſtations) on ne ſçauroit donc plus les déterminer par le moyen d'une équation algébrique. En un mot le Probleme ne ſçauroit être conſtruit d'une maniere générale, non pas même par le ſecours des Courbes Al-

gébriques, quelques tentatives qui en aient été déja faites plusieurs fois par les Géometres. Au reste si le lieu de la Planete dans son orbite est donné, on pourra dès-lors trouver la position de la Terre dans son orbe pour le tems auquel on verroit la Planete stationnaire, c'est-à-dire, demeurer quelque tems au même lieu. Car il s'agit en ce cas d'un Probleme qui est déterminé, & qui a deux différentes solutions, selon les deux racines de l'Equation qui renferme les conditions du Probleme. Le célebre M. Hallei nous en a communiqué la solution, qu'on va donner après avoir préparé le Lecteur par le Lemme suivant.

LEMME.

Quelles que soient les orbes des Planetes & de la Terre, si du lieu qu'elles occupent au tems des stations, on mene des lignes droites Tangentes à ces orbes, & qu'on les prolonge jusqu'à leur rencontre, les parties de ces Tangentes prises depuis le point d'attouchement, jusqu'au point de concours, seront proportionnelles aux vîtesses de la Terre & de la Planete.

PLANCHE IX. Fig. 19.

Soient FG, AH, deux parties quelconques des orbites de la Terre & d'une Planete, AB, CD les petits espaces parcourus dans un même temps lorsqu'elles se trouvent dans leurs stations. On menera CE, AE, qui touchent ces orbites en A, C, & on les prolongera jusqu'a ce qu'elles concourent au point E. Or parce que l'on suppose que pour lors la Planete est stationaire, BD sera, comme on l'a prouvé ci-devant, parallele à AC, & par conséquent * CD, sera à AB, comme CE, est à AE. Mais puisque CD & AB sont les espaces décrits dans le même instant ou dans un même intervalle de tems, ces espaces seront donc entre eux comme les vîtesses des Planetes, & partant il est vrai de dire que les Tangentes CE, AE seront entre elles comme les vîtesses des mêmes Planetes. Ce Lemme ou Théoreme a déja été publié dans les *Actes de Berlin*, par M. *Jean Bernoulli*, & l'on voit d'abord qu'il suit natu-

* *Prop 2. du sixieme Livre d'Eucl.*

rellement du parallélisme des lignes AC, BD. Cependant le même Auteur n'a point fait voir qu'il en ait fait usage pour le Probleme dont nous allons donner la solution. Voici donc celle de M. Hallei.

PROBLEME.

Trouver le lieu de la Terre, d'où une Planete vue dans un point donné de son orbite, paroîtra stationaire.

PLANCHE IX. *Fig.* 20.

Soit S le Soleil, $\Pi K L A$ l'orbite terrestre que nous supposerons encore circulaire, soit aussi $\pi P \alpha$ l'orbite elliptique de la Planete, & P son lieu donné. On menera la droite $V P Q$ qui touche l'orbite de la Planete en P & qui rencontre l'orbe terrestre en V & Q: on divisera cette ligne $V Q$ en deux également au point R. On élevera aussi la perpendiculaire $P B$ enforte qu'elle soit à $V R$ ou $R Q$ comme la vîtesse de la Planete est à la vîtesse de la Terre. Du centre R on décrira le demi-cercle $V b d Q$ qui ait pour diametre $V Q$, & l'on menera du point B deux Tangentes indéfinies à ce demi-cercle, sçavoir $B b \Sigma$, $B d T$: du centre R on abaissera les perpendiculaires $R b$, $R d$, & l'on fera ΣK égal Σb, comme aussi $T L$ égal à $T d$. Je dis que les points K, L seront ceux que l'on cherche dans l'orbe terrestre: car à cause des Triangles semblables $R b \Sigma$, $B P \Sigma$, on a, ΣP est à $P B$ comme Σb ou ΣK est à $R b$ ou $R V$, ou bien (*permutando*) ΣP est à ΣK, comme $P B$ est à $R V$, c'est-à-dire, selon la construction qu'on vient de faire, comme la vîtesse de la Planete est à la vîtesse de la Terre. Mais Σb touche le demi-cercle au point b, & partant le quarré de Σb * est égal au rectangle $V \Sigma Q$. Et puisque ΣK a été fait égal à Σb, il faut nécessairement, son quarré étant égal à ce rectangle, que ΣK touche * l'orbe

* *Prop.* 36. *du* 3e *Liv. d'Eucl.*

* *Prop.* 37.

de la Terre au point *K*. C'eſt pourquoi les Tangentes de l'une & l'autre orbite ΣP, ΣK ſeront en même raiſon que les vîteſſes, & partant la Planete *P*, vue de la Terre en *K*, doit paroître ſtationaire. On démontrera de la même maniere que les droites *TP*, *TL* ſont en même raiſon que les vîteſſes, & que *TL* touche l'orbe terreſtre au point *L*. Enfin tirant les droites *SK*, *SL*, ces lignes prolongées dans le Ciel déſigneront les lieux de la Terre vûs du Soleil, & les angles *KSP*, *LSP* ſeront les angles de commutation que l'on cherche. Si la ligne *SA* eſt la ligne des Apſides de la Terre, *KSA*, *LSA* ſeront les angles de l'Anomalie vraie de la Terre : de maniere qu'on pourroit corriger ainſi avec aſſez d'exactitude l'erreur qui auroit été commiſe dans la ſuppoſition que l'on a faite de la vîteſſe de la Terre.

Le Probleme d'un autre genre que l'on pourroit propoſer ici c'eſt de *déterminer le temps d'une ſtation*. Mais on n'en peut donner la ſolution par les regles ordinaires de la Géométrie. M. *Hallei* en a trouvé une ſolution indirecte, & qui eſt proprement une méthode d'approximation *. Il ſe ſert pour y parvenir des deux Théoremes de M. *Moivre*, que nous avons rapportés au Chapitre XXIV. pag. 483 & 484. parce qu'ils ſont d'un grand uſage dans l'Aſtronomie.

Voici donc la méthode d'approximation de M. Hallei.

* Dans le ſecond Volume des Mémoires de l'Académie de Peterſbourg, page 82. M. Mayer a donné une ſolution directe de la premiere Partie du Probleme qu'on trouve dans les Tables Rudolphines. Kepler s'y étoit propoſé de découvrir pour chaque degré d'anomalie d'une Planete, l'angle de commutation au moment qu'elle doit paroître ſtationaire. Il s'agit donc de trouver d'abord cet angle, lorſque les anomalies, tant de la Terre que de la Planete, ſont données au tems de la ſtation ; & c'eſt ce que M. Mayer détermine ſans être obligé de ſuppoſer l'orbite terreſtre circulaire. Mais quoiqu'il ait donné peu de tems après la ſolution du ſecond cas, où l'on propoſe de déterminer la ſtation, etant donnée la poſition de la ligne des apſides, tant de la Planete que de la Terre, & l'anomalie de la Planete ; cependant il vaut mieux s'en tenir à la méthode indirecte qu'il indique, ſçavoir, de ſuppoſer d'abord l'anomalie de la Terre à peu près connue ; ce qui réduit le ſecond cas au premier ; enſuite par approximation on pourra déterminer les ſtations.

Lorſque l'on veut déterminer avec exactitude le tems des ſtations d'une Planete, il faut d'abord rechercher, ſoit par une des conſtructions Géométriques données ci-deſſus, ſoit par quelqu'autre tâtonnement, ou par les Ephémérides, le jour de la ſtation propoſée. Enſuite ſelon les meilleures Tables Aſtronomiques on calculera pour le moment de midi le lieu du Soleil & celui de la Planete, tant héliocentrique que géocentrique. On prendra auſſi dans les mêmes tables les Logarithmes des diſtances de la Terre & de la Planete au Soleil ; & afin de réduire leurs mouvemens à un même plan, on recherchera la diſtance accourcie de la Planete. On aura donc un Triangle STP, dans lequel, ſelon les Tables Aſtronomiques, les points S, T, P, repréſentent les lieux du Soleil, de la Terre, & de la Planete. On prolongera auſſi juſqu'au point Q de concours les Tangentes Tt & Pp des orbites de la Terre & de la Planete. Or ſi par haſard il arrivoit que les vîteſſes réelles des deux Planetes fuſſent entre elles en ce moment comme PQ eſt à TQ, c'eſt-à-dire, comme le ſinus de l'angle PTQ eſt au ſinus de l'angle TPQ, il ſeroit vrai de dire que ces deux Planetes ſe trouvent préciſement dans le point de ſtation que l'on cherche ; puiſqu'en ce cas le mouvement de la Terre à chaque inſtant, ſçavoir de T en t le long de la Tangente TQ, ſeroit au mouvement correſpondant de la Planete de P en p ſelon la Tangente PQ comme TQ eſt à PQ, & partant les lignes droites TP, tp ſeroient paralleles * ; d'où il s'enſuivroit que les deux Planetes ſeroient alors ſtationaires l'une à l'égard de l'autre.

PLANCHE IX. *Fig.* 21.

* *Prop.* 2 *du* 6e *Liv. d'Eucl.*

Or étant données les diſtances ST, SP, on a * par conſéquent le rapport que les vîteſſes réelles de ces deux Planetes ont entre elles, ſçavoir Tt, Pp. Car les vîteſſes moyennes de différentes Planetes (c'eſt-à-dire qu'elles ont réellement lorſqu'elles ſe trouvent dans leurs orbes à des

* *Cela ſe détermine de même que le rapport des vîteſſes angulaires dans une même orbite, pag.* 484.

distances du foyer égales à la moitié du grand axe) ces vîtesses, dis-je, sont entr'elles en raison inverse & soudoublée de leurs axes. De plus la moyenne vîtesse d'une Planete P ou T, est à sa vîtesse, en quelque point de son orbite qu'elle se trouve, en raison soudoublée de celle qui se trouve entre sa distance au Soleil qui est à un des foyers, & sa distance à l'autre foyer de l'Ellipse & qu'on peut nommer PF ou TF. Supposant donc que R est la moitié du grand axe de la Planete supérieure, & r de la Planete inférieure, on aura selon les rapports composés, comme la vitesse de la Planete inférieure, est à celle de la Planete supérieure, ou bien comme Tt, est à pP, ainsi $\sqrt{R \times SP \times TF}$, est à $\sqrt{r \times ST \times PF}$. On cherchera donc le logarithme de ce rapport, qu'on réduira selon les différentes obliquités de la Tangente PQ, au plan de l'Ecliptique. * *Theor.* I. page 483.

Les mêmes distances donneront encore les angles STQ SPQ. Car le rayon*, est au sinus de l'angle STQ, comme $\sqrt{ST \times TF}$, est à la moitié du second axe de l'orbite terrestre. De même le rayon, est au sinus de SPQ, comme $\sqrt{SP \times PF}$, est à la moitié du second axe de la Planete. Ou bien l'on fera comme la distance Aphélie de la Planete, est à la distance Périhélie, ainsi la Tangente de la moitié de l'angle dont elle est éloignée de son Périhélie, est à la Tangente d'un autre angle. Celui-ci étant ôté de la moitié de l'autre, le reste ** sera le complément à 90° de l'angle SPQ, autrement ce sera son excès au-delà de 90°, selon le cas où l'on s'appercevra qu'il doit-être aigu ou obtus. Enfin on réduira cet angle, lorsqu'il sera nécessaire, au plan de l'Ecliptique. Cela supposé, on retranchera l'angle STQ de l'angle STP, & à l'angle SPQ on ajoutera l'angle SPT pour avoir les angles QTP, QPT, & les sinus de ces angles, s'ils ont le même rapport que les vîtesses * *Theor.* II.

** Cette différence d'angles, selon la Théorie de Wardhus, est égale à $\frac{1}{2}SPF$, ou $\frac{1}{2}STF$, c'est-à-dire, à la moitié de l'équation du centre.

réelles en T & P, seront précisément ce que l'on cherche.

Si le contraire arrive on mettra à part la différence ou l'erreur qui résulte de cette premiere supposition, & alors si le rapport des vîtesses est moindre que celui des sinus, on diminuera l'angle TSP en ajoutant ou en soustrayant, selon le cas, le moyen mouvement diurne de l'une & l'autre Planete; & on fera le contraire si le rapport des vîtesses est plus grand. On recherchera donc de nouveau par un calcul semblable au premier, les Logarithmes des rapports ci-dessus, & cela pour le midi du jour suivant ou précédent, selon que le cas semble l'exiger. Ensuite on comparera la différence qui résulte de ces Logarithmes, c'est-à-dire, l'erreur de la seconde supposition avec celle qui a été trouvée par le premier calcul. La somme ou la différence de ces erreurs, selon que les signes seront différents ou semblables, sera à 24 heures, comme l'une des erreurs, est à l'intervalle écoulé entre le midi qui répond à cette même erreur, & le tems de la station. Cette regle de *Fausse Position* doit paroître évidente à ceux qui pratiquent souvent ces sortes de calculs.

De cette maniere on déterminera à quelques minutes près le tems vrai des stations. Mais pour faire disparoître entierement l'erreur qui proviendroit de l'augmentation faite ci-dessus aux logarithmes (laquelle ne varie pas tout-à-fait uniformément) on recommencera, si l'on veut, le calcul pour le tems de la station déja trouvé, ou qui n'en est pas bien éloigné; & ce dernier calcul vérifiera le premier. Mais on n'a besoin d'employer cette précaution que pour Mars & Mercure.

Pour rendre la chose plus évidente, j'ajouterai ici un exemple du calcul de la station de Jupiter, arrivée le 9 du mois de Novembre 1717. c'est-à-dire, le 20. Novembre selon le nouveau style.

Exemple


Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.

Exemple du calcul des Stations.

	Le $\frac{9}{10}$ Novembre à Midi.				Le $\frac{10}{11}$ Novembre à Midi.			
Anom. moy. de ♅	9^s	10°	00′	00″	9^s	10°	05′	00″
Moyen mouv. du ☉	7	00	07	00	7.	1	6	8
♅ Longit. héliocent. à compter depuis la Iere ✶ d'♈.	2	25	11	00	2	25	15	53
☉ — Iere ✶ d'♈	6	28	53	17	6	29	54	00
Logar. de la distance de ♅ au ☉	5.	720650			5.	720680		
Logar. de la distance de ♄ au ☉	4.	994267			4.	994186		
Longitud. géocent. de ♅	3	5	4	28	3	5	4	27
Angle *STP*	113	48	49		114	49	33	
Angle *SPT*	9	53	28		9	48	34	
Angle *STQ*	89	23	54		89	23	54	
Angle *SPQ*	92	41	20		92	41	14	
Angle *PTQ*	24	25	42		25	25	39	
Et l'Angle *TPQ*	102	34	48		102	29	48	
Logar. du rapport des vitesses.	0.	368210			0.	368321		
Logar. du rapport des sinus de *TPQ*, *PTQ*.	0.	372912			0.	356757		

Erreur selon la premiere supposition. 0. 004702+ — Erreur selon la seconde supposition. 011564—

Ainsi puisque l'une des erreurs est en excès & l'autre en défaut, on fera comme la somme de ces erreurs 16266, est à l'une des deux 4702, ainsi 24^h, sont a 6^h 56′. D'où l'on voit que la station de Jupiter a dû arriver le $\frac{9}{20}$ Novembre à 6^h 56′ du soir.

Longitude de la Ire Etoile d'♈ selon Tycho & Flamsteed, en 1601. 0°27°36′50″.
Ainsi le $\frac{9}{20}$ Novembre 1717. elle auroit été de 0 29 14 13

CHAPITRE VINGT-NEUVIEME.

Des Parties du Tems.

LEs Parties du Tems sont connues de tout le monde: le Tems a été divisé en heures, jours, semaines, mois & années. Le jour naturel, qui a pour origine le mouvement apparent du Soleil d'Orient en Occident, est l'espace qui s'écoule depuis le passage du Soleil par le méri- Du jour naturel, ce que c'est.

dien ou par quelqu'autre cercle horaire, jusqu'à son retour au même cercle. On le nomme jour naturel pour le distinguer du jour artificiel qui est le plus en usage, ou qu'on désigne uniquement par le mot de jour par opposition à la nuit.

Les différentes Nations ne commencent pas à compter les premieres heures du jour au même tems.

Toutes les nations ne s'accordent pas à la même heure pour compter le commencement du jour. Les Babyloniens ont voulu commencer au lever du Soleil, mais les Juifs & les Athéniens comptoient du coucher, ce qui se pratique encore en Italie, en Autriche, & en Boheme: ensorte que quand le Soleil a achevé sa course & qu'il paroît à l'horison Occidental, on compte pour lors la vingtquatrieme heure, & de même celle qui suit immédiatement le coucher du Soleil, est la premiere heure du jour.

Ceux qui commencent le jour au lever du Soleil, ont du moins cela de commode qu'ils sçavent combien il s'est écoulé de tems depuis le lever du Soleil: mais ceux qui commencent à compter depuis le coucher du Soleil, prétendent avoir un autre genre d'utilité, c'est de sçavoir par le moyen de l'heure combien il reste encore de tems jusqu'à la fin du jour, afin de proportionner à cet intervalle la longueur du chemin qui leur reste à faire dans les voyages, ou aux divers genres de travaux qu'ils entreprennent. Cependant on remarquera que l'une & l'autre méthode de compter a un grand désavantage, c'est qu'on n'y sçauroit appercevoir tout d'un coup l'heure du midi ni l'heure de minuit; il faut en faire le calcul, puisque dans les différentes saisons de l'année, le midi, par exemple, tombe à diverses heures du jour. Autrefois les Egyptiens comptoient depuis minuit, & même le fameux Hipparque avoit introduit cette maniere de compter dans l'Astronomie, en quoi il a été suivi par Copernic & les autres Astronomes. Mais la plus grande partie des Moder-

nes a trouvé plus commode de commencer à midi, & ce dernier usage a prévalu. Au reste l'ancien usage de compter depuis minuit subsiste encore dans presque toute l'Europe, principalement en France, en Angleterre, & en Espagne.

Quant aux heures il y en a d'égales & d'autres qu'on a supposées inégales. Les heures égales sont celles qui sont la vingt-quatrieme partie du jour naturel, & les Astronomes peu satisfaits de cette méthode grossiere de diviser les heures en demi & en quart, ont introduit une division qui est recue aujourd'hui assez généralement. Ils partagent l'heure en 60 minutes, & chaque minute en 60 secondes. Des heures égales & inégales.

A l'égard des heures inégales, on en voit d'abord l'origine. Comme les heures doivent être la douzieme partie du jour artificiel ou la douzieme partie de la nuit, il est évident qu'en différens tems de l'année elles doivent varier de telle sorte que celles d'Eté soient beaucoup plus longues pendant le jour que celles d'Hiver, & au contraire celles de nuit beaucoup plus courtes : mais aux tems des Equinoxes celles de la nuit sont pour lors égales à celles du jour ; & c'est pour cette raison qu'on les appelle *heures Equinoxiales*. Les Juifs & les Romains s'en servoient autrefois, & elles se sont conservées encore aujourd'hui en Orient parmi les Turcs. Dans cette façon de compter, le midi arrive toujours à la sixieme heure. Ces heures se nomment * *Planetaires*, parce qu'au commencent de chacune on a placé le nom de quelqu'une des sept Planetes. Par exemple le jour du Soleil, la premiere heure que l'on compte au lever du Soleil est attribuée au Soleil lui même, & en prend le nom : la suivante prend son nom de Venus, la troisieme de Mercure, & ainsi de suite sçavoir la Lune, Saturne, Jupiter, & Mars ; d'où il arrive que

* Ou *Temporaneæ*.

le jour suivant la premiere heure au lever du Soleil tombe sur l'heure de la Lune, & partant lui donne son nom, ce qui se continue de la même maniere jusqu'à la fin de la Semaine.

De la Semaine.

La Semaine est une assemblage ou durée de sept jours : les jours de la semaine ont reçu différens noms. L'Eglise Chrétienne appelle Dimanche le premier jour que le vulgaire nommoit le jour du Soleil, & qu'il n'y a plus que les Phanatiques qui l'appellent Sabbath. Le second jour de la semaine est appellé dans l'Eglise la seconde Férie, le troisieme jour la troisieme Férie, & ainsi de suite. Enfin l'Eglise nomme Sabbath le septieme jour de la semaine. Le vulgaire a retenu cependant les noms usités du tems des Romains, qui, comme nous l'avons dit, ont reçu leurs noms des Planetes.

Le mouvement de la Lune est proprement la mesure du Mois.

Le mois est proprement l'espace de tems que la Lune mesure par son mouvement en parcourant le Zodiaque : elle parcourt environ douze fois ce cercle chaque année. Il y a un autre mois à peu-près égal à celui-ci, qui est mesuré par le mouvement du Soleil; c'est le tems que cet astre emploie à parcourir un signe du Zodiaque, ou la douzieme partie de l'Ecliptique. Mais l'un & l'autre de ces mois sont Astronomiques & different des mois Civils, lesquels suivant l'usage établi dans chaque Royaume ou République, contiennent plus ou moins de jours.

Les Egyptiens avoient autrefois établi les mois de trente jours, & les cinq de surplus dont il composoient l'année, se nommoient Epagomenes, & parconséquent se comptoient ou s'ajoutoient au de-là du nombre des mois.

De l'année Lunaire & Solaire, vague & fixe.

L'Année est ou Astronomique ou Civile. Nous avons expliqué au Chapitre XXIII. les différentes especes d'années, qu'on nomme Tropiques & Périodiques. L'Année Civile est la même chose que l'Année Politique, laquelle a été reçue dans un Royaume, ou dans une République.

Il y en a de deux sortes, sçavoir les Années Lunaires, & les Années Solaires, selon qu'on s'est proposé de les rendre conformes aux mouvemens de la Lune ou du Soleil. D'ailleurs il y a deux sortes d'Années Lunaires, sçavoir l'Année vague & l'Année fixe. L'Année Lunaire vague est de douze mois synodiques, ainsi elle contient douze lunaisons, étant de 354 jours après lesquels l'Année Civile recommence. Cette Année se trouve plus courte de 11 jours que l'Année Solaire mesurée par le mouvement du Soleil, qui est la seule regle des saisons. Aussi le premier jour des Années Lunaires se trouve-t-il répandu successivement dans les différentes saisons de l'Année Solaire, & cela dans l'espace de 32 ans; ce qui a fait nommer vague cette Année Lunaire. Les Arabes, les Turcs & généralement tous les Mahométans suivent aujourd'hui cette forme d'année.

Années Lunaires vagues.

Ces Années Lunaires sont encore en usage parmi les Arabes & les Mahométans.

Comme il arrive que douze lunaisons ne composent pas tout-à-fait l'Année Solaire, mais qu'il s'en manque 11 jours; il s'ensuit que dans l'espace de trois Années Solaires, 36 Lunaisons ou trois Années Lunaires, en different au moins de 33 jours. C'est pourquoi pour conserver les mois à peu près dans les mêmes saisons de l'Année Solaire, on a ajouté un mois entier à la troisieme Année Lunaire; ce que l'on a pratiqué autant de fois qu'il a été nécessaire pour que le commencement de l'Année se retrouvât toujours dans la même saison. Le mois ainsi ajoûté s'appelloit *Emboliſmique* ou *Intercalaire*. Dans l'espace de 19. ans on comptoit sept de ces sortes de mois intercalaires, & l'Année Lunaire accommodée à cette forme, se nomme Année Lunaire fixe: les Grecs s'en sont servis, & à leur exemple les Romains, jusqu'au tems de Jules Cesar.

Cependant on doit bien remarquer que l'année civile, qui est assujettie au mouvement du Soleil, est aussi de

deux sortes, sçavoir, l'année fixe, & l'année vague. Cette derniere se nomme Egyptienne, parce que les Egyptiens s'en sont servis fort long-tems. Elle contenoit précisément 365 jours, & différoit d'environ six heures de l'année Tropique. En négligeant cet intervalle de quelques heures, il arrive que de quatre ans en quatre ans, cette année vague anticipe d'un jour sur la période Solaire, & par conséquent en quatre fois 365 ans, c'est-à-dire, en 1460 ans, son commencement doit répondre successivement aux différentes saisons de l'année.

L'année Solaire, vague ou Egyptienne.

Puisque l'année Egyptienne de 365 jours est d'une moins longue durée, ou differe d'environ six heures de la vraie année Solaire; pour remédier à ce défaut, ou plutôt pour rendre ces années conformes aux années Solaires, il a fallu avoir égard à ces heures écoulées: mais comme il étoit nécessaire que le commencement de l'année Politique fût toujours le même, c'est-à-dire, qu'il tombât constamment à la même heure du jour, on a voulu faire ensorte que l'année ne commençât pas tantôt à une heure du jour, & tantôt à une autre heure, ce qui arriveroit si chaque année on ajoutoit aux 365 jours les six heures dont nous venons de parler. C'est pourquoi on a cru qu'il valloit mieux laisser accumuler ces six heures dans l'espace de trois années; car étant ajoutées aux six heures de la quatrieme année, elles forment un jour entier; ensorte que ce jour étant lui-même ajouté aux 365 jours de la quatrieme année, cette derniere convient pour lors avec la Période des mouvemens du Soleil. Jules César fut le premier qui sentit l'avantage de ce nouveau plan de correction qu'il a fallu faire à l'année vague. Il ordonna donc qu'on ajouteroit un jour, ou qu'on intercaleroit chaque quatrieme année, laquelle de cette maniere s'est trouvée de 366 jours. Ce jour a été ajouté au mois de Fevrier, & comme dans l'année commune le 24 Fevrier se nommoit le

De l'année Julienne fixe.

sixieme des Calendes de Mars, ou le sixieme jour avant les Calendes, César ordonna que ce jour seroit compté deux fois chaque quatrieme année, ensorte que dans cette année-là il y avoit en effet deux jours dont chacun portoit le nom * de sixieme jour avant les Calendes de Mars. Cela fut cause que ces quatriemes années furent nommées Bissextiles. Telle est la forme de l'année instituée par Jules César, qui étoit d'autant plus autorisé à entreprendre cette réformation, que cela le regardoit, étant Grand Pontife. On l'a donc appellée de son nom année Julienne : chaque quatrieme année, comme nous l'avons dit, est Bissextile, ou de 366 jours, & les trois autres sont des années communes, ou de 365 jours.

* *Bis Sexto ante Calendas Martii.*

Il faut néantmoins remarquer que le tems attribué à l'année Solaire dans le Calendrier de Jules César, est un peu trop long ; car le Soleil acheve sa révolution périodique dans l'Ecliptique en 365 jours $5^h\ 49'$; & partant cet astre recommence plutôt sa course que selon l'année Julienne. Si le Soleil, par exemple, se trouve dans une année au point de l'Equinoxe à l'instant du Midi le 20 du mois de Mars, l'année suivante le Soleil paroîtra $11'$ plutôt qu'on ne le compte (selon les $365^j\ 6^h$ de l'année Julienne) au point Equinoxial, & l'année qui suit immédiatement il reparoîtra dans l'Equateur $22'$ auparavant, & ainsi de suite. Le Soleil anticipant donc toujours de $11'$ sur l'année civile, cette différence produira enfin un jour d'anticipation sur l'année Julienne dans l'espace de 131 ans. Ainsi l'Equinoxe tel qu'il paroît dans le Ciel après ce tems écoulé, ne doit plus tomber au même jour de l'année civile, mais peu à peu il anticipera chaque siecle vers le commencement de l'année, & cela en rétrogradant si sensiblement, qu'à la fin l'erreur qui en résulte sera remarquée de tout le monde.

L'année Julienne un peu trop longue.

Or il faut sçavoir que du tems du Concile de Nicée,

Les PP. du Concile de Nicée qui retinrent la forme de l'année Julienne, avoient fixé l'Equinoxe du Printems au 21. Mars.

lorsqu'il fut question de fixer les termes du tems auquel on doit célébrer la Pâque, l'Equinoxe du Printems se trouvoit pour lors au 21 Mars ; mais cet Equinoxe ayant continuellement anticipé, on s'est apperçu l'an 1582. lorsqu'on proposa de réformer le Calendrier de Jules César, que le Soleil entroit déja dans l'Equateur des le 11 Mars, c'est-à-dire, dix jours plutôt que du tems du Concile dont on vient de parler. Le Pape Grégoire XIII. voulant restituer cet Equinoxe au 21 Mars, retrancha ces dix jours du Calendrier, & ordonna qu'au lieu du 11 Mars, on compteroit dorénavant le 21 du même mois. Et de peur que le même embarras ne subsistât dans les tems à venir, il fut ordonné (qu'excepté les 400emes années) au lieu de compter comme Bissextile chaque centieme année de l'Ere Chrétienne, on la laisseroit s'écouler comme une année commune. Cette nouvelle forme d'année a été nommée *Grégorienne*, du nom du Pape Grégoire XIII. par l'autorité duquel elle a été établie. La France, l'Espagne, l'Allemagne & l'Italie, en un mot tous les pays qui sont sous l'obéissance du Pontife Romain, ont reçu cette réforme ; & enfin les Hollandois, de même que plusieurs autres Protestans d'Allemagne, l'ont adoptée au commencement de ce siecle. Cependant les Peuples de la Grande-Bretagne & la plupart de ceux du Nord de l'Europe, ont conservé jusqu'ici l'ancienne forme du Calendrier Julien.

De l'année Grégorienne dont on se sert en France, en Espagne, & en Italie.

Elle a été adoptée il y a environ 40 ans par les Hollandois, les Danois, & par les Protestans d'Allemagne.

Dans la Perse * on a retenu aussi l'ancienne forme de l'année

* Golius, dans ses Notes sur Alfergan, *pag. 27. & suiv.* est entré dans un grand détail sur la forme ancienne & nouvelle de l'année Persienne, laquelle a été suivie de la plupart des Auteurs Orientaux ; il nous apprend particulierement que sous le Sultan Gelaluddaulé Melicxa *, on entreprit de corriger la grandeur de l'année, & d'établir une nouvelle époque. Il fut donc réglé que de quatre ans en quatre ans on ajouteroit un jour à l'année commune, laquelle seroit ainsi de 366 jours. Mais parce qu'on avoit reconnu que l'année Solaire n'étoit pas exactement de 365 jours 6 heures, il fut ordonné qu'alternativement (après sept ou huit intercalations) on intercaleroit la cinquieme, & non pas la quatrieme année : de cette maniere il paroit qu'ils connoissoient

** Vers le milieu du onzieme siecle.*

l'année Egyptienne *, d'où il arrive que les Equinoxes ne se trouvent bien-tôt plus dans le même mois de l'année, mais se répetent successivement dans les autres ; & qu'enfin ce n'est qu'au bout d'une période de 1460 ans, que l'année recommence au même point de l'année Solaire. Ce long intervalle de tems a été nommé *la Grande année Caniculaire*, ou la *Période Sothiacale*, parce qu'elle a pour commencement le premier jour du mois *Thoth*, ou bien le premier jour de l'année auquel l'Etoile du Grand Chien paroît à son lever héliaque. Car le mot de *Sothis* en langue Egyptienne, signifie Chien, ce qui répond au mot Grec Ἀστρονύων, ou Σῖριος, qui est un mot Ethiopien, c'est-à-dire, *Sirius*, selon les Astronomes.

* *Ainsi* 1461 *années de* 365 *jours, répondent à* 1460 *années Julienes. Mais les anciens Egyptiens n'avoient pas encore reconnu que l'année Tropique est un peu moins longue que l'année Sydéréale, le mouvement apparent des Etoiles n'ayant pas été apperçu avant Hipparque.*

Les Anciens distribuoient le tems non-seulement en années, mais aussi en certaines collections d'années, telles que le *Jubilé* de 49 ou 50 ans, le siecle de 100 ans : mais la plus célebre de toutes, est l'*Olympiade* dont parlent si souvent les Auteurs Grecs, laquelle contient seulement un espace de quatre années.

Enfin comme il y dans le Ciel certains points fixes d'où commencent à compter les Astronomes lorsqu'il est question de calculer les mouvemens des Planetes ; de même il y a dans la durée ou dans les tems écoulés, certains points qu'on prend pour époques, & qui sont comme les racines dont se servent les Chronologistes dans leurs calculs. La plus grande partie des Historiens s'y est

De l'Ere Chrétienne.

déja fort exactement la grandeur de l'année, puisque selon cette forme, l'année Persienne seroit de $365^j\ 5^h\ 49'\ 31''$, ce qui differe à peine de l'année Grégorienne que les Européens ou Occidentaux se sont avisés de rechercher plus de 500 ans après les Asiatiques. Or depuis la mort d'Jezdagirde, le dernier des Rois de Perse, lequel fut tué par les Sarrazins, l'année Persienne étoit de 365 jours, sans qu'on se souciât d'y admettre aucune intercalation ; & il paroit que plus anciennement après 120 années écoulées, le premier jour de l'an qui avoit rétrogradé très-sensiblement, étoit remis au même lieu qu'auparavant, en ajoutant un mois de plus à l'année, qui devenoit pour lors de 13 mois. Mais l'année dont tous les Auteurs qui ont écrit en Arabe ou Persan, ont fait usage dans leurs Tables Astronomiques, est semblable aux années Egyptiennes, lesquelles sont toutes égales, étant de 365 jours sans intercalation.

conformé, en nous racontant les évenemens qui répondent à une longue suite de siecles. Ces Racines sont nommées plus communément *Eres* * ou *Epoques* : c'eſt toujours de ces ſortes d'Eres qu'on compte les années & les tems. La plus célebre, & celle qui eſt la plus uſitée parmi nous, eſt la Naiſſance de Notre Seigneur Jeſus-Chriſt : cette Ere commence aux Calendes de Janvier, qui ſuivent immédiatement la Nativité.

Au reſte quoique cette époque ſoit généralement établie, & même reçue parmi tous les Chrétiens, cependant les Anglois & les Peuples d'Irlande, dans les Actes publics ou dans les affaires d'Egliſe, ſe ſervent d'une époque qui eſt poſtérieure d'une année entiere. Ils commencent l'année non pas à la Nativité de Jeſus-Chriſt, mais à la Fête de l'Incarnation ou Conception, que l'on célebre le huit avant les Calendes du mois d'Avril. D'où il arrive que depuis l'Incarnation de Notre Seigneur juſqu'à la Fête de l'Annonciation de la Vierge, de l'année 1718 par exemple, les Anglois comptent 1717. années completes ; & que depuis la Nativité de Notre Seigneur juſqu'à la Fête de la Nativité de l'année 1717. ils comptent ſeulement 1716 années écoulées, quoique ce même intervalle de tems dans tout le reſte de la Chrétienté, contienne 1717. années accomplies.

En cela les Anglois ſe conforment à la Chronologie de Denis le Petit, qui a inventé l'Ere, ſelon laquelle le jour de la Conception ſeroit arrivé le VIII. des Calendes du mois d'Avril de la premiere année de cette même Ere, & Jeſus-Chriſt ſeroit né l'Hiver ſuivant, à la fin de la quarante-ſixieme année depuis la réformation du Calendrier par Jules Céſar. Cette façon de compter avoit d'abord

* Lequel a pour racine le mot Arabe, *Arach*, ou *Erach*, qui ſignifie qu'on a fixé le tems. Voyez cette opinion dans les Notes de Golius ſur Alfergan, page 53. On a prétendu auſſi que ce mot étoit un abrégé des quatre lettres initiales ou majuſcules de l'époque des Eſpagnols . . . *Ab Exordio Regni Auguſti.*

été généralement reçue ; mais elle n'eſt plus en uſage aujourd'hui que parmi les peuples d'Angleterre. Dans tout le reſte de la Chrétienté on a abandonné inſenſiblement cette époque, pour y ſubſtituer une autre opinion *, ſçavoir, que Jeſus-Chriſt eſt né au commencement de l'Hiver qui a précédé immédiatement l'Incarnation établie par Denys, ſçavoir, à la fin de la quarante-cinquieme année Julienne; de maniere qu'on y ſuppoſe la naiſſance de Jeſus-Chriſt une année avant celle que donneroit l'Ere de Denys le Petit.

Malgré cette différence, les Anglois dans la plus grande partie de l'année conviennent quant à la numération avec le reſte de la Chrétienté ; il n'y a uniquement que pendant les trois premiers mois écoulés depuis les Calendes de Janvier juſqu'au VIII. des Calendes du mois d'Avril, qu'ils comptent en effet une année de moins, & qu'ils different en cela des autres Chrétiens.

Une autre époque encore fameuſe, eſt celle de la Création du monde, mais c'eſt auſſi celle qui a été ſujette à plus de difficultés, puiſque les uns prétendent que le monde a été créé 3950 ans avant la naiſſance de Jeſus-Chriſt ; & d'autres environ 3983 ans. Dailleurs l'Egliſe Grecque & les Empereurs d'Orient ont fait uſage d'une autre époque, qui ſuppoſe le monde beaucoup plus ancien, puiſqu'il auroit été créé ſelon leur Ere, 5509 ans avant la Naiſſance de Jeſus-Chriſt.

Entre les Auteurs prophanes, la plus célébre & la plus ancienne époque, eſt celle des Olympiades, qui pourtant n'a commencé que l'Eté de l'année 776. avant Jeſus-Chriſt, ou plutôt aux Calendes du mois de Juillet, La premiere Olympiade.

* On remarquera qu'il y a au moins trois années d'erreur dans la ſuppoſition vulgaire de l'Ere Chrétienne, puiſque dans l'Hiſtoire des Juifs de Joſephe il eſt parlé d'une Eclipſe qui fut obſervée en Judée peu de tems avant la mort d'Hérode ; & qu'ainſi Notre Seigneur étant né ſous Hérode, il faudroit commencer à compter du tems qui a précédé, & non pas de celui qui l'a ſuivi, les années de l'Ere Chrétienne.

en y faisant remonter les années Juliennes selon nos Chronologistes.

La Fondation de Rome.

Peu de tems après cette époque, on en trouve une autre, qui est celle de la Fondation de Rome, mais elle est différente, l'une étant Varronienne, & l'autre Capitoline: celle de Varron suppose la Fondation de Rome 753 ans avant Jesus-Christ, & l'autre seulement 752 ans *.

L'Ere de Nabonassar.

La troisieme époque appellée l'Ere de Nabonassar, si célebre parmi les Astronomes qui en ont fait presque un continuel usage, tombe au 26 Fevrier de l'an 747. avant l'Ere Chrétienne, c'est-à-dire, en y faisant remonter l'année Julienne. Comme ce jour-là fut le premier de l'année Egyptienne, Ptolomée, & après lui Copernic, se sont servi des années Egyptiennes pour calculer les mouvemens des Astres: cette maniere de calculer en se servant des années Egyptiennes, avoit cela de commode pour les Astronomes, qu'on n'etoit point embarassé par les intercalations, ausquelles il ne faut pas oublier d'avoir égard dans notre façon de compter aujourd'hui.

** On du regne de Philippe Aridée, qui lui a succédé.*

Enfin on trouve aussi l'époque de la mort d'Alexandre,* qui commence au 12. Novembre de l'année 324. avant Jesus-Christ, ce jour étant le premier de l'année vague Egyptienne. C'est de cette époque que Theon, Albategnius, & autres Mathématiciens, ont commencé à compter en Années Egyptiennes: on remarquera qu'il s'est écoulé préciséments 424 années Egyptiennes entre les deux Eres de Nabonassar, & de la mort d'Alexandre. Outre ces Eres dont nous venons de parler, il y a encore celle des Abyssins, qu'on nomme autrement l'Ere des Martyrs ou de Diocletien; celle des Arabes & des Turcs,

* Ou bien seulement 748 ans avant l'Ere Chrétienne: de ces Epoques l'une est fondée sur l'Astrologie, ayant été calculée par Tarutius ami de Varon, & la derniere plus certaine est fondée sur les dattes des jeux séculaires & des Fêtes rapportées par Fabius Pictor, l'un des plus anciens Ecrivains de Rome.

qu'on nomme l'Hegire, & qui commence à la fuite ou retraite de Mahomet de la Mecque à Médine ; celle des Perſes, appellée l'Ere de Jeſdagird. On trouvera dans les Hiſtoriens & parmi les Chronologiſtes un plus long détail ſur ces dernieres. Mais la plus commode de toutes, eſt la Période Julienne, & qui embraſſe ou comprend preſque toutes les autres. Cette Période eſt de 7980 ans, & l'origine de ce nombre n'eſt autre choſe que le produit des trois ſuivans 15, 19, 28, multipliés l'un par l'autre. Le premier des trois eſt le cycle de l'Indiction, le ſecond eſt le cycle de Meton, & le troiſieme eſt le cycle Solaire. Or la premiere année de cette Période eſt celle où ces trois nombres commencent en même tems.

L'Hégire qui commence au 16. Juillet de l'année 622.

On va ajouter ici une Table où l'on a fait la réduction des premieres années de chaque Ere, aux années de la Période Julienne, comme auſſi aux années qui précedent ou ſuivent la Naiſſance de Jeſus-Chriſt.

	Années avant J. C.	Années de la Per. Jul.
L'Epoque de la Création du Monde, ſelon la maniere de compter chez les Grecs du tems des Empereurs d'Orient	5508	
L'Epoque vulgaire de la Création du Monde	3950	765
La premiere des Olympiades	776	3938
La Fondation de Rome ſelon Varron	753	3961
La Fondation de Rome ſelon les Faſtes du Capitole	752	3962
L'Ere de Nabonaſſar	747	3967
La Mort d'Alexandre le Grand, ou l'Epoque de Philippe	324	4390
	An après J. C.	
La premiere année de l'Epoque vulgaire de l'Ere chrétienne.	1	4714
L'Ere Dioclétienne	284	4997
L'Hégire des Arabes, des Turcs, & des Mahométans	622	5335
L'Epoque des Perſans depuis le commencement du regne d'Jezdagird, petit-fils de Coſroës	632	5345

CHAPITRE TRENTIEME.

Du Calendrier, & des Cycles ou Périodes.

Distribution des jours de l'année en semaines par les sept premieres lettres de l'Alphabet.

LE Calendrier n'eſt autre choſe qu'une certaine diſpoſition des jours ſelon les mois de l'année civile, & la diſtribution de ces mêmes jours en ſemaines, à la quelle on joint les Fêtes & les autres jours ſolemnels. La diſtribution par ſemaines, ſe fait en y employant les ſept premieres lettres de l'Alphabeth *A, B, C, D, E, F, G*. On commence par le premier Janvier, & à ce jour répond la lettre *A*; au ſecond jour la lettre *B*; au troiſieme jour la lettre *C*; & ainſi de ſuite juſqu'à la lettre *G*, qui répond au ſeptieme jour. On recommence enſuite le huitieme jour, où doit répondre la lettre *A*, comme auſſi la lettre *B* au neuvieme, la lettre *C* au dixieme, & ainſi de ſuite en recommençant ſelon la ſuite des lettres : d'où l'on voit que chaque jour de l'année répond toujours à quelques-unes de ces lettres dans le Calendrier; & qu'enfin la lettre *A* par où l'on a commencé, répondra néceſſairement au dernier jour de Décembre. En effet ſi l'on diviſe 365 jours par ſept, qui répond à une ſemaine, on aura au quotient 52 ſemaines & un jour de plus. Or s'il n'y avoit ce jour de ſurplus, il eſt évident que toutes les années commenceroient préciſément par le même jour de la ſemaine; & que tel jour d'un mois, par exemple, tomberoit tous les ans ſur un même jour fixe ou déterminé de la ſemaine. Mais puiſqu'il y a donc, outre les 52 ſemaines complettes dans chaque année, un jour de plus, il arrive de là que par quelque jour de la ſemaine que ce ſoit qu'ait commencé une année, elle doit finir de néceſſité par le même, & que le premier jour de l'année ſuivante

commencera par celui qui suit immédiatement. Ainsi dans une année commune, de 365 jours comme nous l'entendons ici, lorsque le premier jour est un Dimanche, le dernier jour de l'année sera aussi un Dimanche, & le premier de l'année suivante sera un Lundi.

Des Lettres Dominicales.

Selon cette disposition de lettres dans l'année commune dont nous venons de parler, il est évident que celle qui répondra au premier Dimanche du mois de Janvier, doit pendant tout le cours de l'année indiquer ou répondre au Dimanche, ensorte qu'à quels quantiemes que ce soit que tombe cette lettre dans les autres mois, ces jours seront toujours ceux du Dimanche, & par là cette lettre pourra donc être nommée la Lettre Dominicale pour cette année. Il en est de même des autres Lettres, puisque celle qui vient à tomber au premier Lundi du mois de Janvier d'une année, doit se retrouver dans le Calendrier vis-à-vis de tous les Lundis de la même année, & les indiquera par un moyen aussi simple & aussi naturel.

Si le premier jour de Janvier étoit un Dimanche auquel répondroit la lettre *A*, le dernier jour de la même année seroit encore un Dimanche, comme on l'a déja fait voir; & partant l'année suivante commenceroit par un Lundi, & le Dimanche tomberoit donc au septieme jour vis-à-vis la lettre *G*: ainsi cette derniere seroit la lettre Dominicale pendant la seconde année. Et parce que quand l'année commence par un Lundi, elle finit aussi par un Lundi; le premier jour de l'année qui suit, sera donc un Mardi, & le premier Dimanche de celle-ci tombera au sixieme jour du mois de Janvier, vis-à-vis la lettre *F* dans le Calendrier. Ainsi raisonnant toujours de la même maniere, la lettre Dominicale de l'année suivante sera *E*, de telle sorte que ces lettres Dominicales doivent toujours rétrograder sans interrompre le même ordre dans lequel elles ont été établies, c'est-à-dire,

qu'elles rétrograderont selon *G, F, E, D, C, B, A.* Dans les Calendriers qu'on publie chaque année, & qu'on appelle *Almanachs** du mot Arabe, on a soin d'écrire toujours la lettre Dominicale par une majuscule, ou lettre capitale, afin qu'on puisse plus facilement connoître celle qui répond à cette année-là, & appercevoir, pour ainsi-dire, du premier coup d'œil tous les Dimanches de l'année.

* *Etrennes qui étoient des especes d'Ephémérides.*

Or si toutes les années étoient Egyptiennes, ou de 365 jours seulement, il est certain qu'après sept années les mêmes jours du mois répondroient comme auparavant aux mêmes jours de la semaine. Mais à cause que nous faisons chaque quatrieme année Bissextile, ou de 366 jours, cet ordre est interrompu, puisqu'outre les 52 semaines, il y a pour lors deux jours de plus. On voit donc en ce cas que si l'année commence par un Dimanche, elle finira par un Lundi; & que le premier de l'année suivante, c'est-à-dire, immédiatement après cette année Bissextile, sera un Mardi; qu'enfin le premier Dimanche tombera vis-à-vis le sixieme jour du mois, & répondra pour lors à la lettre *F*, qui sera par conséquent la lettre Dominicale pendant cette même année qui suit la Bissextile. Il arrive donc qu'à chaque Bissextile qui revient tous les quatre ans, l'ordre des lettres Dominicales est interrompu, ou qu'il ne revient qu'après 28 ans, ou quatre fois sept années.

Du Cycle Solaire.

Voilà l'origine de ce cycle de 28 ans, qu'on nomme *Cycle Solaire* après lequel tems écoulé les jours de l'année se retrouvent précisément aux mêmes jours de la semaine. Dans ce cycle toutes les années Bissextiles ont deux lettres Dominicales, dont la premiere ne sert que jusqu'au 24. Fevrier, ou jusqu'au 25. qui est intercalaire; l'autre indique tous les Dimanches du reste de l'année. Dans l'année Bissextile le 24. Fevrier & le 25. sont regardés

regardés comme un même jour, & l'un & l'autre eſt marqué par la même lettre *F* : ainſi l'ordre des lettres étant interrompu, les mêmes qu'auparavant n'indiquent plus les jours ſemblables de la ſemaine. Par exemple, ſi la lettre Dominicale eſt d'abord la lettre *E*, le 24. Fevrier ſera un Lundi, & le 25. un Mardi : l'un & l'autre cependant ſeront déſignés par la même lettre *F*, enſorte que la lettre ſuivante *G*, qui depuis le commencement de l'année indiquoit le Mardi, répondra dans tout le reſte de l'année au Mercredi ; & comme le premier du mois de Mars ſera un Dimanche auquel répondra la lettre *D* dans le Calendrier, cette lettre ſera donc ainſi Dominicale pendant tout le reſte de l'année.

Au reſte il faut ſçavoir qu'on a établi qu'une année Biſſextile ſeroit la premiere du cycle Solaire, & que les lettres Dominicales qui lui répondent ſeroient *G* & *F*. Celle de la ſeconde année du cycle eſt *E*, de la troiſieme *D*, de la quatrieme *C* : mais la cinquieme année du cycle étant Biſſextile, aura pour lettres Dominicales *B* & *A*, & ainſi de ſuite. La Table ſuivante fait voir quelle eſt la lettre Dominicale qui répond à chacune des années du cycle Solaire.

1	G	F	5	B	A	9	D	C	13	F	E	17	A	G	21	C	B	25	E	D
2	E		6	G		10	B		14	D		18	F		22	A		26	C	
3	D		7	F		11	A		15	C		19	E		23	G		27	B	
4	C		8	E		12	G		16	B		20	D		24	F		28	A	

Pour découvrir l'année du cycle Solaire qui répond à une année quelconque de l'Ere Chrétienne, on ajoutera le nombre 9 à l'année propoſée, parce qu'au tems de la premiere année de Jeſus-Chriſt, neuf années du cycle Solaire s'étoient écoulées : enſuite diviſant cette ſomme par 28, le quotient déſignera le nombre des cycles écoulés depuis la premiere année du cycle Solaire qui précede Jeſus-Chriſt, juſqu'à l'année propoſée ; & le

reste du dividende sera le cycle Solaire de l'année courante que l'on cherche. Enfin s'il ne restoit rien après la division, ce seroit une marque que l'année proposée est la vingt-huitieme du cycle.

Outre les Fêtes de l'année fixées à certains jours marqués, il y a d'autres Fêtes qu'on nomme mobiles, parce qu'à chaque année elles ne répondent plus aux mêmes jours, & que par conséquent elles ne sont plus assujetties au mouvement du Soleil, mais qu'elles dépendent du mouvement de la Lune. Telle est la *Fête de Pâque*, instituée chez les Juifs par le commandement de Dieu, & à laquelle a succédé parmi nous la *Pâque Chrétienne*, en mémoire de la Résurrection de Notre Seigneur. Or selon ce qui est dit au *Chapitre* 13. *du Lévitiq.* Dieu a ordonné qu'on célébreroit la Pâque le premier mois, & le soir du quatorzieme jour. Mais l'année des Juifs étant Lunaire, & de plus embolismique, avoit été tellement reglée, qu'on nommoit le premier mois, celui dont le quatorzieme jour, où la Pleine Lune, tomboit, soit au jour même de l'Equinoxe, soit immédiatement après. L'Eglise Chrétienne n'a pas cru devoir s'éloigner beaucoup de cette Regle. Elle n'a pas voulu seulement que la Pâque fût célébrée le quatorzieme jour, mais le Dimanche * qui suit immédiatement ce quatorzieme jour, s'étant principalement fondée sur ce que Notre Seigneur est ressuscité le Dimanche immédiatement après la Pâque des Juifs.

Comment on doit déterminer le tems auquel on doit célébrer la Pâque.

Maintenant pour déterminer le tems auquel on doit célébrer la Pâque, il faut d'abord établir le tems de l'Equinoxe, qu'on s'imaginoit devoir toujours arriver vers le 21 Mars, lequel jour fut fixé pour cet effet constamment au 21. du même mois de l'année Julienne. Comme on ne songeoit pas alors que l'Equinoxe pût jamais s'en

* Cela fut décidé au Concile de Nicée, tenu l'an 325. de l'Ere Chrétienne.

écarter, le Calendrier Ecclésiastique fut donc construit suivant cette supposition : d'ailleurs on avoit résolu d'appeller *premier mois* ou *mois Paschal*, celui dont le quatorzieme jour tomberoit ou le jour même de l'Equinoxe, c'est-à-dire, au 21. de Mars, ou le jour qui suivroit immédiatement. Mais les mois des Juifs étant Lunaires, & le quatorzieme jour du mois étant, comme nous l'avons dit, celui qui précédoit le jour de la Pleine Lune, pour célébrer la Pâque il falloit avoir égard au mouvement de la Lune, & s'en servir pour déterminer les tems des Nouvelles & Pleines Lunes. Les Juifs n'avoient point d'autres regles que celle de l'observation. Ils attendoient soigneusement que la Lune fût à son lever héliaque, ou parût pour la premiere fois hors des rayons du Soleil, un peu après le coucher de cet Astre, enforte qu'ils appelloient ce jour-là le premier jour de la Lune. Mais l'Eglise Chrétienne assemblée avoit résolu que l'on compteroit les Lunaisons par le moyen du cycle de Meton, lequel cycle remet toutes les Lunaisons variables au même jour après une Période de 19 ans. On voit par là que l'ancienne Eglise avoit reçu cet autre cycle dans son Calendrier : elle s'en est servie jusques vers la fin du seizieme siecle, comme de regle unique pour déterminer les Lunaisons.

Les Juifs ont toujours déterminé le premier jour du mois Lunaire par observation.

Mais les Chrétiens se servoient uniquement du nombre d'or ou cycle de Meton.

Le *Cycle de Meton*, ainsi appellé du nom de Meton son inventeur, est véritablement le cycle Lunaire ou Période de 19 années, après laquelle les Nouvelles & Pleines Lunes moyennes reviennent précisément aux mêmes jours du mois. Ainsi à quelque jour que ce soit que les Nouvelles & Pleines Lunes arrivent dans une certaine année, on peut être assuré qu'après 19 ans écoulés, ces Nouvelles & Pleines Lunes tomberont encore aux mêmes jours du mois, & même (selon l'opinion de Meton, adoptée par les Peres de la primitive Eglise)

Ce que c'est que le nombre d'or, ou cycle de Meton.

qu'elles répondront aux mêmes heures & minutes des jours correſpondans. Cette opinion, autrefois générale, a été cauſe que du tems du Concile de Nicée (lorſqu'il fallut décider authentiquement dans quel tems on célébreroit la Pâque) on crut devoir n'adopter d'autre regle que celle qui réſulte du cycle Lunaire, qui pour cet effet fut ſuivie dans le Calendrier.

Il faut avouer auſſi * que les Anciens avoient une ſi grande idée de la commodité & de l'excellence de ce cycle, qu'ils le firent graver en lettres d'or, & c'eſt de là qu'on a appellé *Nombre d'or*, le nombre du cycle de Meton qui répond à chaque année propoſée.

On pouvoit le fixer chaque année par obſervation, ou en ſe ſervant des Tables Aſtronomiques.

Voici donc de quelle maniere les nombres d'or répondoient aux jours du Calendrier, ou du moins de quelle maniere ils ont dû y répondre. Ayant pris une année quelconque pour le commencement du cycle, & faiſant enſorte que le nombre d'or I lui réponde; il ne s'agiſſoit plus que de trouver par obſervation les jours de chaque mois auſquels arrivoient les Nouvelles Lunes, & marquer vis-à-vis des jours de cette même année-là le caractere I. Or parce que les Nouvelles Lunes ſeroient arrivées, par exemple, au 23. Janvier, 21. Fevrier, 23. Mars, 21. Avril, 21. Mai, 19. Juin, & ainſi de ſuite, on auroit donc mis dans la colonne du cycle Lunaire vis-à-vis ces jours-là, le nombre I: mais l'année ſuivante obſervant de même les Nouvelles Lunes, il falloit mettre encore, ainſi que le pratiquoient les Anciens, le nombre I I dans la colonne du cycle Lunaire ou nombre d'or, vis-à-vis les jours de chaque obſervation, ſçavoir, vis-à-vis le 12. Janvier, le 10. Fevrier, le 12.

* L'erreur d'environ 11 minutes qu'on n'avoit pas encore reconnue dans l'année Julienne, & celle qu'on a remarquée dans la Période de Meton, étant conſtatées, on eſt enfin convenu que les deux cycles, Solaires & Lunaires étoient vicieux, & ne pouvoient ſervir de regle conſtante pour calculer le jour de la Pâque conformément aux obſervations & aux décrets du Concile de Nicée.

Mars, le 10. Avril, & ainſi de ſuite. De même la troiſieme année il a fallu mettre le caractere III vis-à-vis des jours auſquels les Nouvelles Lunes ont été obſervées, & ainſi de ſuite les autres années, juſqu'à ce que le cycle entier de 19 ans fût achevé. Cependant au lieu de l'obſervation de la premiere phaſe du Croiſſant, il auroit été beaucoup plus sûr (car c'eſt-là ce que l'on auroit pû pratiquer de plus exact) d'employer pour la diſpoſition de ces nombres les Tables Aſtronomiques, en calculant pour chaque mois, & par conſéquent pour chaque année du cycle Lunaire, les Nouvelles Lunes moyennes, & marquant les caracteres ci-deſſus vis-à-vis les jours auſquels on trouve qu'elles ont dû arriver. Mais de quelque maniere qu'on s'y ſoit pris, il eſt certain que le mois Lunaire Aſtrononomique étant de 29 jours $12^h\ 44'\ 3''$; comme le vulgaire ne ſçauroit diſtinguer ces petites quantités qui ſuivent le nombre de jours, on a été obligé de ſuppoſer alternativement les mois Lunaires d'un certain nombre de jours entiers, comme de 30 & 29 jours, dont ceux-ci ſe nomment creux ou ſimples, & ceux-là pleins, & cela pour ſatisfaire pleinement aux 29 jours 12 heures du mois Aſtronomique. Enfin parce qu'outre ces 29 jours 12 heures, ou 29 jours & demi, nous avons encore 44′, ou preſque trois quarts d'heure de ſurplus dans chaque Lunaiſon, il doit s'enſuivre qu'au bout de 32 Lunaiſons la ſomme de ces minutes accumulées, vaudra un jour entier. Ce jour doit donc s'ajouter à un des mois ſimples, & c'eſt ainſi que les Lunaiſons du Calendrier peuvent s'accorder avec les Lunaiſons obſervées dans le Ciel, ou déterminées par les Tables Aſtronomiques.

Pourquoi on ſuppoſe les mois Lunaires alternativement de 29 & de 30 jours.

Préſentement ſi l'année du cycle Lunaire eſt donnée l'on aura par le moyen du Calendrier Eccléſiaſtique les jours des Nouvelles Lunes pendant le reſte de cette

même année; car dans chaque mois le nombre d'or ou du cycle désignera le jour auquel arrive la Nouvelle Lune moyenne, de sorte qu'en y ajoutant 14 jours, on aura celui de la Pleine Lune.

Erreur de Meton & des Auteurs des anciens Calendriers, dans la supposition du Nombre d'or.

On croyoit anciennement que le cycle de dix-neuf ans comprenoit exactement 235 Lunaisons, & qu'après une révolution des années du cycle Lunaire, non-seulement les Nouvelles Lunes revenoient aux mêmes jours de chaque mois, mais aussi aux mêmes heures. Mais la chose bien examinée ne s'est pas trouvée véritable; car dans l'espace de 19 années Juliennes, il y a 6939 jours 18 heures; & s'il est certain, selon les plus exactes observations des Astronomes modernes, que chaque Lunaison soit de $29^j\ 12^h\ 44'\ 3''$, il s'ensuit que 235 Lunaisons répondroient à $6939^j\ 16^h\ 31'\ 45''$. Il n'est donc pas vrai de dire que 235 Lunaisons répondent exactement à 19 années Juliennes; mais il s'en faut environ une heure & demie. Ainsi les Nouvelles Lunes, après 19 années écoulées, n'arriveront pas précisément à la même heure qu'auparavant, mais environ une heure & demie plutôt; de maniere que dans l'espace de 304 ans les Nouvelles Lunes anticiperont d'un jour dans l'année Julienne. Le nombre d'or suffit donc seulement pour marquer assez bien les Nouvelles Lunes dans l'espace de 300 ans, sans que l'erreur monte à plus d'un jour, ou vingt-quatre heures: & lorsque les Peres du Concile de Nicée résolurent d'adopter dans leur Calendrier le cycle de 19 ans, ce cycle marquoit pour lors assez

* Il ne faut pas confondre le Nombre d'or, ou Cycle Lunaire de Meton, avec la Période ou *Saros* Caldaique, qui ne contient que 223 Lunaisons. Cette Période ou Saros étant de 18 ans & environ 11 jours, ramene les Eclipses à peu près dans les mêmes points, soit du Ciel, soit de l'argument annuel; au lieu qu'il s'en faut bien que les Pleines Lunes qui arrivent aux mêmes jours tous les 19 ans, se retrouvent dans une position semblable, tant à l'égard du nœud, que de l'anomalie moyenne, le lieu de l'Apogée de la Lune étant d'ailleurs dirigé bien différemment à l'égard de la ligne qui doit passer par le Soleil.

bien les Nouvelles Lunes, ce qui se continuoit à peu près de même pendant quelques centaines d'années. Mais depuis, comme ces Lunaisons ont anticipé d'un jour de 304 en 304 ans, elles arrivent aujourd'hui cinq jours plutôt que dans le Calendrier établi du tems du Concile de Nicée; ou, ce qui revient au même, les Nouvelles Lunes céleſtes anticipent de cinq jours celles qui réſultent du Nombre d'or de l'ancien Calendrier Eccléſiaſtique. Malgré ces difficultés l'Egliſe Anglicane a conſervé l'ancienne méthode de calculer les Nouvelles Lunes par les Nombres d'or *, tels qu'ils ont été reçus dans le Calendrier du tems du Concile de Nicée; & ces Nouvelles Lunes ainſi calculées, ſe nomment *Eccleſiaſtiques*, pour les diſtinguer des véritables. Enfin la Table générale & perpétuelle dont on ſe ſert dans la Liturgie en Angleterre, a été calculée pour le tems de Pâques par le moyen de ces Nombres d'or, ſelon les différente lettres Dominicales.

* *Les Epactes du Calendrier Grégorien qui ont été ſubſtituées au Nombre d'or, n'étant pas non plus aſſez exactes.*

On ne doit pas négliger d'avertir ici que la premiere année de l'Ere Chrétienne répondoit au nombre d'or 2, c'eſt-à-dire, que le cycle Lunaire a dû commencer ſa période l'année qui a précédé immédiatement la Naiſſance de Jeſus-Chriſt. C'eſt pourquoi ſi à une année courante quelconque on ajoute 1, & qu'on diviſe la ſomme par 19, en négligeant le quotient, ce qui reſte ſera le nombre d'or de cette année-là.

Comment on peut calculer le Nombre d'or pour une année propoſée.

D'un autre côté ſi on multiplie les cycles Lunaires & Solaires, l'un par l'autre, il en réſultera une troiſieme Période de 532 ans, laquelle a été appellée *Dionyſienne* *, du nom de Denys le Petit ſon inventeur. Ce cycle contient donc une ſomme d'années, leſquelles étant révolues, non-ſeulement les Nouvelles & Pleines Lunes, reviennent à très-peu près aux mêmes jours du mois; mais auſſi chaque jour du mois ſe retrouve préciſément

* *Victoriana.*

Le grand Cycle Paſchal.

aux mêmes jours de la ſemaine. En un mot les lettres Dominicales & les Fêtes mobiles reparoiſſent dans le même ordre qu'auparavant : c'eſt auſſi ce qui a fait donner à ce cycle le nom de Grand Cycle Paſchal.

Si l'on propoſe donc pour une année quelconque de l'Ere Chrétienne, de découvrir l'année correſpondante de la Période Dionyſienne, on ajoutera le nombre 457 à l'année courante, & diviſant la ſomme par 532, on négligera le quotient, & le reſte ſera le nombre qui indique l'année de la période qu'on cherche.

On peut propoſer auſſi un Probleme d'un autre genre, ſçavoir, étant données les années des cycles Solaire & Lunaire, trouver l'année de la Période Dionyſienne. Par exemple, ſoit donnée l'année 17 du cycle Lunaire, & l'année 21 du cycle Solaire, on demande quel eſt le nombre qui, diviſé par 19, donnera, en négligeant le quotient, le nombre 17 pour reſte, & de plus qui diviſé par 28, donnera, ſans avoir égard au quotient, le nombre 21 pour reſte. Or pour trouver ce nombre il en faut chercher deux autres, dont l'un ſoit multiple du nombre 28, mais qui étant diviſé par 19, donne, outre le quotient, le nombre 17 pour reſte, & dont l'autre ſoit auſſi multiple du nombre 19, mais étant diviſé par 28, donne outre le quotient, le nombre 21 pour reſte. Car il eſt clair que la ſomme de ces deux nombres ſatisfera à la queſtion propoſée.

Pour découvrir ces deux nombres par l'analyſe, ſuppoſons que le premier ſoit $28x$, qui eſt multiple du nombre 28; & parce que ce multiple étant diviſé par 19, donne, outre le quotient, le nombre 17 pour reſte; ôtons ce nombre 17 de $28x$, & le reſte ſera un multiple du nombre 19; & partant 19 ſera un diviſeur de $28x - 17$. Mais le nombre 19 eſt auſſi diviſeur de $19x$; ce nombre 19 ſera donc auſſi diviſeur de la différence des nombres, ſçavoir

ſçavoir, $9x-17$, ainſi ce dernier ſera un multiple du nombre 19. Soit maintenant $9x-17=19n$ (n exprimant un nombre entier) on aura $x=\frac{19n+17}{9}$. C'eſt pourquoi x étant un nombre entier, 9 ſera un diviſeur de $19n+17$. Mais le même nombre 9 eſt auſſi diviſeur de $18n+9$; il s'enſuit donc que ce nombre 9 ſera diviſeur de $n+8$, & partant $\frac{n+8}{9}$ eſt un nombre entier : ſoit donc $n=1$, & l'on aura x égal à 4; d'où il ſuit que $28x=112$, ſera le premier des deux nombres qu'on cherche.

Soit auſſi le ſecond nombre $19y$, puiſqu'il eſt multiple de 19, il s'enſuit donc que $\frac{19y-21}{28}$ ſera un nombre entier, & qu'ainſi $19y-21=28n$, d'où l'on tire $y=\frac{28n+21}{19}$. C'eſt pourquoi puiſque le nombre 19 diviſe auſſi $19n+19$, il ſera par conſéquent diviſeur de $9n+2$; d'où l'on doit conclure que $\frac{9n+2}{19}$ eſt un entier qu'on peut ſuppoſer égal à p, & l'on aura l'équation $9n+2=19p$, ou $n=\frac{19p-2}{9}$. Mais puiſque 9 diviſe $18p$ ſans reſte, il ſera par conſéquent diviſeur de $p-2$, & partant $\frac{p-2}{9}$ eſt un nombre entier ou égal à zéro : ſuppoſons-le égal à zéro, on aura $p=2$ & $n=\frac{19p-2}{9}=4$, & partant $19y=28n+21=133$. Ainſi l'un des deux nombres étant 112, & l'autre 133, leur ſomme 245 doit ſatisfaire à la queſtion propoſée, c'eſt-à-dire que toutes les fois que le cycle Solaire ſera 21, & le nombre d'or ou cycle Lunaire 17, l'année correſpondante de la période Dionyſienne ſera 245.

Le même probleme peut encore ſe réſoudre en y employant deux quantités multiples déterminées & conſtantes, c'eſt-à-dire, qui ſoient telles que l'une puiſſe être diviſée ſans reſte par 28, mais qu'étant diviſée par 19, &

négligeant le quotient, le reſte ſoit 1. Semblablement que l'autre quantité puiſſe être diviſée ſans reſte par 19, mais qu'étant diviſée par 28, le reſte ſoit 1. Ces deux quantités pourront être trouvées de la même maniere que ci-deſſus. Car ſuppoſant la premiere quantité égale à $28x$, & l'autre égale à $19y$, puiſque le nombre 19 doit diviſer ſans reſte $28x-1$, il s'enſuit qu'il diviſera auſſi ſans reſte $9x-1$: faiſant donc $\frac{9x-1}{19}=n$, on aura $x=\frac{19n+1}{9}$, & partant $\frac{n+1}{9}$ ſera un nombre entier, & le plus petit nombre qui puiſſe être pris pour n ſera 8. C'eſt pourquoi ſi $n=8$, on aura $x=\frac{19n+1}{9}=17$; d'où l'on voit que la premiere quantité qu'on a fait égale à $28x$, a dû être 476. Soit auſſi $\frac{19y-1}{28}=n$, on aura $y=\frac{28n+1}{19}$: faiſant donc $\frac{9n+1}{19}=p$, on aura $n=\frac{19p-1}{9}$, & partant $\frac{p-1}{9}$ ſera ou un nombre entier, ou $=0$. Si l'on a donc $p-1=0$, il s'enſuit que $p=1$ & $n=\frac{19p-1}{9}=2$, d'où l'on voit que $19y=28n+1=57$. Ainſi les deux quantités que l'on cherche étant 476 & 57, il eſt évident qu'en multipliant 476 par quelque nombre que ce ſoit, pourvû qu'il ſoit moindre que 19, ſi l'on diviſe enſuite le produit par 19, négligeant le quotient, le reſte ſera le nombre qui multiplie 476. Semblablement ſi $\frac{19y-1}{28}=17$, on aura $y=\frac{28n+1}{19}$: ſoit donc $\frac{9n+1}{19}=p$, donc $n=\frac{19p-1}{9}$ & $\frac{p-1}{9}$ ſera un nombre entier ou égal à zéro. Si $p-1=0$, on a $p=1$ & $n=\frac{19p-1}{9}=2$; d'où l'on voit que $19y=28n+1=57$. C'eſt pourquoi les nombres que l'on cherche ſont 476 & 57 : & parce que diviſant 476 par 19, il reſte 1, il s'enſuit que ſi l'on multiplie 476 par un nombre quelconque moindre que 19, & ſi l'on diviſe enſuite le produit par 19, négligeant le quotient, le reſte

sera le nombre qui multiplie 476. De même parce que divisant 57 par 28, le reste est 1, si l'on multiplie 57 par un nombre quelconque plus petit que 28, & si l'on divise le produit par 28, le reste sera le nombre dont on s'est servi pour multiplier.

On tire de là une regle générale pour découvrir l'année de la période Dionysienne, telle qu'il suit.

Il faut multiplier le nombre du cycle Solaire par 57, & le nombre du cycle Lunaire par 476; car la somme des produits étant divisée par 532, si l'on néglige le quotient, le reste sera le nombre qui indiquera l'année de la période Dionysienne.

Regle pour trouver l'année de la Période Dionysienne.

Outre les cycles Solaires & Lunaires, il y a encore un autre cycle qu'on nomme l'*Indiction Romaine*, parce qu'il étoit d'usage à Rome du tems des Empereurs & dans les Actes signés par les Césars ou Pontifes. Ce cycle n'a aucun rapport aux mouvemens célestes, ce n'est seulement qu'une période de 15 ans, laquelle étant achevée étoit suivie d'une autre qui recommençoit. Or l'année qui a précédé la Naissance de Jesus-Christ, le nombre de l'Indiction étoit 3 : ainsi ajoutant 3 à l'année de l'Ere Chrétienne, & divisant ensuite par 15, le reste fera connoître l'année de l'Indiction.

En multipliant les trois cycles Solaire, Lunaire, & de l'Indiction, on a pour produit la Période Julienne de 7980 ans. Cette période commence 764 ans avant la Création du Monde, & n'étant pas encore achevée, il est évident qu'elle doit renfermer tous les évenemens qui sont arrivés sur la Terre, & tous les faits historiques, ensorte qu'il ne peut y avoir qu'une année dans toute cette période qui réponde aux mêmes nombres des trois cycles dont elle est composée. C'est pourquoi si les Historiens avoient eu soin de marquer dans leurs Annales les cycles de chaque année, il n'y auroit plus d'incerti-

De la Période Julienne.

tude dans les Epoques ni dans la Chronologie.

Maniere de trouver l'année de la Période Julienne.

L'année qui a précédé immédiatement l'Ere Chrétienne, étoit la 4713 de la Période Julienne : ainsi étant donnée l'année de l'Ere Chrétienne *, on trouvera l'année de la Période Julienne en y ajoutant 4713, car la somme sera l'année de cette Période : au contraire si l'on retranche de l'année de la Période Julienne le nombre 4713, le reste fera connoître l'année de l'Ere Chrétienne.

Probleme.

Etant donnée l'année du cycle Solaire, celle du cycle Lunaire & de l'Indiction, on propose de trouver l'année de la Période Julienne. Ce Probleme se peut résoudre de la même maniere que celui de la Période Dionysienne dont on a donné la solution ci-dessus, c'est-à-dire, en déterminant trois nombres qui soient tels que le premier soit multiple des nombres 19 & 15 (ou de 285, qui est leur produit) mais qu'étant divisé par 28, le reste soit le nombre du cycle Solaire ; que le second soit multiple des nombres 28 & 15, ou de leur produit 420, mais qu'étant divisé par 19, le reste soit le nombre du cycle Lunaire ; qu'enfin le troisieme soit multiple des nombres 28 & 19, mais qu'étant divisé par 15, le reste soit le nombre du cycle de l'Indiction. Or si la somme de ces nombres est plus petite que 7980, ce sera l'année de la Période Julienne que l'on cherche. Mais si elle est plus grande, on la divisera par 7980 ; & négligeant le quotient, le reste sera le nombre de la Période Julienne.

Ce Probleme peut encore se résoudre en y employant trois Multiplicateurs constans & déterminés, de maniere que le premier soit multiple du nombre 285, mais qu'é-

* Quelques Auteurs dans leurs Tables Astronomiques, ou dans leurs Ephémérides, comptent les années selon cette Période ; mais quoique Kepler & Bouillaud en aient fait usage, cependant c'est dans l'Astronomie de Mercator publiée en 1676. qu'on s'en sert uniquement : cet Auteur a publié outre les Tables du Soleil & de la Lune de Tycho, celles des Planetes de Kepler sous une forme qu'il a jugée plus commode que les Rudolphines, en réduisant les minutes & secondes de degré en décimales du cercle.

tant divisé par 28, le reste soit 1; que le second soit multiple du nombre 420, mais qu'étant divisé par 19, le reste soit 1; qu'enfin le troisieme soit multiple du nombre 532, mais qu'étant divisé par 15 le reste soit 1. Ces nombres se peuvent découvrir de la même maniere qu'il a été enseigné dans la solution du Probleme, qu'on a donnée au sujet de la Période Dionysienne, & l'on doit trouver 4845, 4200, 6916. C'est pourquoi étant une fois connus, la regle générale pour trouver les années de la Période Julienne, les cycles étant donnés, est celle qui suit.

Regle pour trouver l'année de la Période Julienne.

On multipliera le nombre 4845 par le nombre du cycle Solaire, le nombre 4200 par le nombre du cycle Lunaire, & le nombre 6916 par l'année de l'Indiction. Ensuite on divisera la somme des trois produits par 7980, & négligeant le quotient, le reste sera l'année de la Période Julienne. Exemple : soit pour l'année 1718 le nombre du cycle Solaire 19, celui du cycle Lunaire 9, & de l'Indiction 11. Si l'on multiplie 4845 par 19, le produit sera 92055 : de même si l'on multiplie 4200 par 9, le produit sera 37800 : enfin multipliant 6916 par 11, le produit sera 76076. Or la somme des produits est 205931, qui étant divisée par 7980, négligeant le quotient, le reste sera 6431, qui a dû être l'année de la Période Julienne.

M.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S.	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840
0		17782	14771	13010	11761	10792	10000	9331	8751	8239	7782	7368	6990	6642	6320
1	35563	17710	14735	12986	11743	10777	9988	9320	8742	8231	7774	7361	6984	6637	6315
2	32553	17639	14699	12962	11725	10763	9976	9310	8733	8223	7767	7354	6978	6631	6310
3	30792	17570	14664	12939	11707	10749	9964	9300	8724	8215	7760	7348	6972	6625	6305
4	29542	17501	14629	12915	11689	10734	9952	9289	8715	8207	7753	7341	6966	6620	6300
5	28573	17434	14594	12891	11671	10720	9940	9279	8706	8199	7745	7335	6960	6614	6294
6	27782	17368	14559	12868	11654	10706	9928	9269	8697	8191	7738	7328	6954	6609	6289
7	27112	17302	14525	12845	11636	10692	9916	9259	8688	8183	7731	7322	6948	6603	6284
8	26532	17238	14491	12821	11619	10678	9905	9249	8679	8175	7724	7315	6942	6598	6279
9	26021	17175	14457	12798	11601	10663	9893	9238	8670	8167	7717	7309	6936	6592	6274
10	25563	17112	14424	12775	11584	10649	9881	9228	8661	8159	7710	7302	6930	6587	6269
11	25149	17050	14390	12753	11566	10635	9869	9218	8652	8152	7703	7296	6924	6581	6264
12	24771	16990	14357	12730	11549	10621	9858	9208	8643	8144	7696	7289	6918	6576	6259
13	24424	16930	14325	12707	11532	10608	9846	9198	8635	8136	7688	7283	6912	6570	6254
14	24102	16871	14292	12685	11515	10594	9834	9188	8626	8128	7681	7276	6906	6565	6248
15	23802	16812	14260	12663	11498	10580	9823	9178	8617	8120	7674	7270	6900	6559	6243
16	23522	16755	14228	12640	11481	10566	9811	9168	8608	8112	7667	7264	6894	6554	6238
17	23259	16698	14196	12618	11464	10552	9800	9158	8599	8104	7660	7257	6888	6548	6233
18	23010	16642	14165	12596	11447	10539	9788	9148	8591	8097	7653	7251	6882	6543	6228
19	22775	16587	14133	12574	11430	10525	9777	9138	8582	8089	7646	7244	6877	6538	6223
20	22553	16532	14102	12553	11413	10512	9765	9128	8573	8081	7639	7238	6871	6532	6218
21	22341	16478	14071	12531	11397	10498	9754	9119	8565	8073	7632	7232	6865	6527	6213
22	22139	16425	14040	12510	11380	10484	9742	9109	8556	8066	7625	7225	6859	6521	6208
23	21946	16372	14010	12488	11363	10471	9731	9099	8547	8058	7618	7219	6853	6516	6203
24	21761	16320	13979	12467	11347	10458	9720	9089	8539	8050	7611	7212	6847	6510	6198
25	21584	16269	13949	12445	11331	10444	9708	9079	8530	8043	7604	7206	6841	6505	6193
26	21413	16218	13919	12424	11314	10431	9697	9070	8522	8035	7597	7200	6836	6500	6188
27	21249	16168	13890	12403	11298	10418	9686	9060	8513	8027	7590	7193	6830	6494	6183
28	21091	16118	13860	12382	11282	10404	9675	9050	8504	8020	7583	7187	6824	6489	6178
29	20939	16069	13831	12362	11266	10391	9664	9041	8496	8012	7577	7181	6818	6484	6173
30	20792	16021	13802	12341	11249	10378	9652	9031	8487	8004	7570	7175	6812	6478	6168
31	20649	15973	13773	12320	11233	10365	9641	9021	8479	7997	7563	7168	6807	6473	6163
32	20512	15925	13743	12300	11217	10352	9630	9012	8470	7989	7556	7162	6801	6467	6158
33	20378	15878	13716	12279	11201	10339	9619	9002	8462	7981	7549	7156	6795	6462	6153
34	20248	15832	13688	12259	11186	10326	9608	8992	8453	7974	7542	7149	6789	6457	6148
35	20122	15786	13660	12239	11170	10313	9597	8983	8445	7966	7535	7143	6784	6451	6143
36	20000	15740	13632	12218	11154	10300	9586	8973	8437	7959	7528	7137	6778	6446	6138
37	19881	15695	13604	12198	11138	10287	9575	8964	8428	7951	7522	7131	6772	6441	6133
38	19765	15651	13576	12178	11123	10274	9564	8954	8420	7944	7515	7124	6766	6435	6128
39	19652	15607	13549	12159	11107	10261	9553	8945	8411	7936	7508	7118	6761	6430	6123
40	19542	15563	13522	12139	11091	10248	9542	8935	8403	7929	7501	7112	6755	6425	6118
41	19435	15520	13495	12119	11076	10235	9532	8926	8395	7921	7494	7106	6749	6420	6113
42	19331	15477	13468	12099	11061	10223	9521	8917	8386	7914	7488	7100	6743	6414	6108
43	19228	15435	13441	12080	11045	10210	9510	8907	8378	7906	7481	7093	6738	6409	6103
44	19128	15393	13415	12061	11030	10197	9499	8898	8370	7899	7474	7087	6732	6404	6099
45	19031	15351	13388	12041	11015	10185	9488	8888	8361	7891	7467	7081	6726	6398	6094
46	18935	15310	13362	12022	10999	10172	9478	8879	8353	7884	7461	7075	6721	6393	6089
47	18842	15269	13336	12003	10984	10160	9467	8870	8345	7877	7454	7069	6715	6388	6084
48	18751	15229	13310	11984	10969	10147	9456	8861	8337	7869	7447	7063	6709	6383	6079
49	18661	15189	13284	11965	10954	10135	9446	8851	8328	7862	7441	7057	6704	6377	6074
50	18573	15149	13259	11946	10939	10122	9435	8842	8320	7855	7434	7050	6698	6372	6069
51	18487	15110	13233	11927	10924	10110	9425	8833	8312	7847	7427	7044	6692	6367	6064
52	18403	15071	13208	11908	10909	10098	9414	8824	8304	7840	7421	7038	6687	6362	6059
53	18320	15032	13183	11889	10894	10085	9404	8814	8296	7832	7414	7032	6681	6357	6055
54	18239	14994	13158	11871	10880	10073	9393	8805	8288	7825	7407	7026	6676	6351	6050
55	18159	14956	13133	11852	10865	10061	9383	8796	8279	7818	7401	7020	6670	6346	6045
56	18081	14918	13108	11834	10850	10049	9372	8787	8271	7811	7394	7014	6664	6341	6040
57	18004	14881	13083	11816	10835	10036	9362	8778	8263	7803	7387	7008	6659	6336	6035
58	17929	14844	13059	11797	10821	10024	9351	8769	8255	7796	7381	7002	6653	6331	6030
59	17855	14808	13034	11779	10806	10012	9341	8760	8247	7789	7374	6996	6648	6325	6025
60	17782	14771	13010	11761	10792	10000	9331	8751	8239	7782	7368	6990	6642	6320	6021

M.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
S.	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440	1500	1560	1620	1680	1740
0	6021	5740	5477	5229	4994	4771	4559	4357	4164	3979	3802	3632	3468	3310	3158
1	6016	5736	5473	5225	4990	4768	4556	4354	4161	3976	3799	3629	3465	3307	3155
2	6011	5731	5469	5221	4986	4764	4552	4351	4158	3973	3796	3626	3463	3305	3153
3	6006	5727	5464	5217	4983	4760	4549	4347	4155	3970	3793	3623	3460	3302	3150
4	6001	5722	5460	5213	4979	4757	4546	4344	4152	3967	3791	3621	3457	3300	3148
5	5997	5718	5456	5209	4975	4753	4542	4341	4149	3964	3788	3618	3454	3297	3145
6	5992	5713	5452	5205	4971	4750	4539	4338	4145	3961	3785	3615	3452	3294	3143
7	5987	5709	5447	5201	4967	4746	4535	4334	4142	3958	3782	3612	3449	3292	3140
8	5982	5704	5443	5197	4964	4742	4532	4331	4139	3955	3779	3610	3446	3289	3138
9	5977	5700	5439	5193	4960	4739	4528	4328	4136	3952	3776	3607	3444	3287	3135
10	5973	5695	5435	5189	4956	4735	4525	4325	4133	3949	3773	3604	3441	3284	3133
11	5968	5691	5430	5185	4952	4732	4522	4321	4130	3946	3770	3601	3438	3282	3130
12	5963	5686	5426	5181	4949	4728	4518	4318	4127	3943	3768	3598	3436	3279	3128
13	5958	5682	5422	5177	4945	4724	4515	4315	4124	3940	3765	3596	3433	3276	3125
14	5954	5677	5418	5173	4941	4721	4511	4311	4120	3937	3762	3593	3431	3274	3123
15	5949	5673	5414	5169	4937	4717	4508	4308	4117	3934	3759	3590	3428	3271	3120
16	5944	5669	5409	5165	4933	4714	4505	4305	4114	3931	3756	3587	3425	3269	3118
17	5939	5664	5405	5161	4930	4710	4501	4302	4111	3928	3753	3585	3423	3266	3115
18	5935	5660	5401	5157	4926	4707	4498	4298	4108	3925	3750	3582	3420	3264	3113
19	5930	5655	5397	5153	4922	4703	4494	4295	4105	3922	3747	3579	3417	3261	3110
20	5925	5651	5393	5149	4918	4699	4491	4292	4102	3919	3745	3576	3415	3259	3108
21	5920	5646	5389	5145	4915	4696	4488	4289	4099	3917	3742	3574	3412	3256	3105
22	5916	5642	5384	5141	4911	4692	4484	4285	4096	3914	3739	3571	3409	3253	3103
23	5911	5637	5380	5137	4907	4689	4481	4282	4092	3911	3736	3568	3407	3251	3101
24	5906	5633	5376	5133	4903	4685	4477	4279	4089	3908	3733	3565	3404	3248	3098
25	5902	5629	5372	5129	4900	4682	4474	4276	4086	3905	3730	3563	3401	3246	3096
26	5897	5624	5368	5125	4896	4678	4471	4273	4083	3902	3727	3560	3399	3243	3093
27	5892	5620	5364	5122	4892	4675	4467	4269	4080	3899	3725	3557	3396	3241	3091
28	5888	5615	5359	5118	4889	4671	4464	4266	4077	3896	3722	3555	3393	3238	3088
29	5883	5611	5355	5114	4885	4668	4460	4263	4074	3893	3719	3552	3391	3236	3086
30	5878	5607	5351	5110	4881	4664	4457	4260	4071	3890	3716	3549	3388	3233	3083
31	5874	5602	5347	5106	4877	4660	4454	4256	4068	3887	3713	3546	3386	3231	3081
32	5869	5598	5343	5102	4874	4657	4450	4253	4065	3884	3710	3544	3383	3228	3078
33	5864	5594	5339	5098	4870	4653	4447	4250	4062	3881	3708	3541	3380	3225	3076
34	5860	5589	5335	5094	4866	4650	4444	4247	4059	3878	3705	3538	3378	3223	3073
35	5855	5585	5331	5090	4863	4646	4440	4244	4055	3875	3702	3535	3375	3220	3071
36	5850	5580	5326	5086	4859	4643	4437	4240	4052	3872	3699	3533	3372	3218	3069
37	5846	5576	5322	5082	4855	4639	4434	4237	4049	3869	3696	3530	3370	3215	3066
38	5841	5572	5318	5079	4852	4636	4430	4234	4046	3866	3693	3527	3367	3213	3064
39	5836	5567	5314	5075	4848	4632	4427	4231	4043	3863	3691	3525	3365	3210	3061
40	5832	5563	5310	5071	4844	4629	4424	4228	4040	3860	3688	3522	3362	3208	3059
41	5827	5559	5306	5067	4841	4625	4420	4224	4037	3857	3685	3519	3359	3205	3056
42	5823	5554	5302	5063	4837	4622	4417	4221	4034	3855	3682	3516	3357	3203	3054
43	5818	5550	5298	5059	4833	4618	4414	4218	4031	3852	3679	3514	3354	3200	3052
44	5813	5546	5294	5055	4830	4615	4410	4215	4028	3849	3677	3511	3351	3198	3049
45	5809	5541	5290	5051	4826	4611	4407	4212	4025	3846	3674	3508	3349	3195	3047
46	5804	5537	5285	5048	4822	4608	4404	4209	4022	3843	3671	3506	3346	3193	3044
47	5800	5533	5281	5044	4819	4604	4400	4205	4019	3840	3668	3503	3344	3190	3042
48	5795	5528	5277	5040	4815	4601	4397	4202	4016	3837	3665	3500	3341	3188	3039
49	5790	5524	5273	5036	4811	4597	4394	4199	4013	3834	3663	3497	3338	3185	3037
50	5786	5520	5269	5032	4808	4594	4390	4196	4010	3831	3660	3495	3336	3183	3034
51	5781	5516	5265	5028	4804	4590	4387	4193	4007	3828	3657	3492	3333	3180	3032
52	5777	5511	5261	5025	4800	4587	4384	4189	4004	3825	3654	3489	3331	3178	3030
53	5772	5507	5257	5021	4797	4584	4380	4186	4001	3822	3651	3487	3328	3175	3027
54	5768	5503	5253	5017	4793	4580	4377	4183	3998	3820	3649	3484	3325	3173	3025
55	5763	5498	5249	5013	4789	4577	4374	4180	3995	3817	3646	3481	3323	3170	3022
56	5758	5494	5245	5009	4786	4573	4370	4177	3991	3814	3643	3479	3320	3168	3020
57	5754	5490	5241	5005	4782	4570	4367	4174	3988	3811	3640	3476	3318	3165	3018
58	5749	5486	5237	5002	4778	4566	4364	4171	3985	3808	3637	3473	3315	3163	3015
59	5745	5481	5233	4998	4775	4563	4361	4167	3982	3805	3635	3471	3313	3160	3013
60	5740	5477	5229	4994	4771	4559	4357	4164	3979	3802	3632	3468	3310	3158	3010

M.	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
S.	1800	1860	1920	1980	2040	2100	2160	2220	2280	2340	2400	2460	2520	2580	2640	2700	2760
0	3010	2868	2730	2596	2467	2341	2218	2099	1984	1871	1761	1654	1549	1447	1347	1249	1154
1	3008	2866	2728	2594	2465	2339	2216	2098	1982	1869	1759	1652	1547	1445	1345	1248	1152
2	3005	2863	2725	2592	2462	2337	2214	2096	1980	1867	1757	1650	1546	1443	1344	1246	1151
3	3003	2861	2723	2590	2460	2335	2212	2094	1978	1865	1755	1648	1544	1442	1342	1245	1149
4	3001	2859	2721	2588	2458	2333	2210	2092	1976	1863	1754	1647	1542	1440	1340	1243	1148
5	2998	2856	2719	2585	2456	2331	2208	2090	1974	1862	1752	1645	1540	1438	1339	1241	1146
6	2996	2854	2716	2583	2454	2328	2206	2088	1972	1860	1750	1643	1539	1437	1337	1240	1145
7	2993	2852	2714	2581	2452	2326	2204	2086	1970	1858	1748	1641	1537	1435	1335	1238	1143
8	2991	2849	2712	2579	2450	2324	2202	2084	1968	1856	1746	1640	1535	1433	1334	1237	1141
9	2989	2847	2710	2577	2448	2322	2200	2082	1967	1854	1745	1638	1534	1432	1332	1235	1140
10	2986	2845	2707	2574	2445	2320	2198	2080	1965	1852	1743	1636	1532	1430	1331	1233	1138
11	2984	2842	2705	2572	2443	2318	2196	2078	1963	1850	1741	1634	1530	1428	1329	1232	1137
12	2981	2840	2703	2570	2441	2316	2194	2076	1961	1849	1739	1633	1528	1427	1327	1230	1135
13	2979	2838	2701	2568	2439	2314	2192	2074	1959	1847	1737	1631	1527	1425	1326	1229	1134
14	2977	2835	2698	2566	2437	2312	2190	2072	1957	1845	1736	1629	1525	1423	1324	1227	1132
15	2974	2833	2696	2564	2435	2310	2188	2070	1955	1843	1734	1627	1523	1422	1322	1225	1130
16	2972	2831	2694	2561	2433	2308	2186	2068	1953	1841	1732	1626	1522	1420	1321	1224	1129
17	2969	2828	2692	2559	2431	2306	2184	2066	1951	1839	1730	1624	1520	1418	1319	1222	1127
18	2967	2826	2689	2557	2429	2304	2182	2064	1950	1838	1728	1622	1518	1417	1317	1221	1126
19	2965	2824	2687	2555	2426	2302	2180	2062	1948	1836	1727	1620	1516	1415	1316	1219	1124
20	2962	2821	2685	2553	2424	2300	2178	2061	1946	1834	1725	1619	1515	1413	1314	1217	1123
21	2960	2819	2683	2551	2422	2298	2176	2059	1944	1833	1723	1617	1513	1412	1313	1216	1121
22	2958	2817	2681	2548	2420	2296	2174	2057	1942	1830	1721	1615	1511	1410	1311	1214	1119
23	2955	2815	2678	2546	2418	2294	2172	2055	1940	1828	1719	1613	1510	1408	1309	1213	1118
24	2953	2812	2676	2544	2416	2292	2170	2053	1938	1827	1718	1612	1508	1407	1308	1211	1116
25	2950	2810	2674	2542	2414	2289	2169	2051	1936	1825	1716	1610	1506	1405	1306	1209	1115
26	2948	2808	2672	2540	2412	2287	2167	2049	1934	1823	1714	1608	1504	1403	1304	1208	1113
27	2946	2805	2669	2538	2410	2285	2165	2047	1933	1821	1712	1606	1503	1402	1303	1206	1112
28	2943	2803	2667	2535	2408	2283	2163	2045	1931	1819	1711	1605	1501	1400	1301	1205	1110
29	2941	2801	2665	2533	2405	2281	2161	2043	1929	1817	1709	1603	1499	1398	1300	1203	1109
30	2939	2798	2663	2531	2403	2279	2159	2041	1927	1816	1707	1601	1498	1397	1298	1201	1107
31	2936	2796	2660	2529	2401	2277	2157	2039	1925	1814	1705	1599	1496	1395	1296	1200	1105
32	2934	2794	2658	2527	2399	2275	2155	2037	1923	1812	1703	1598	1494	1393	1295	1198	1104
33	2931	2792	2656	2525	2397	2273	2153	2035	1921	1810	1702	1596	1493	1392	1293	1197	1102
34	2929	2789	2654	2522	2395	2271	2151	2033	1919	1808	1700	1594	1491	1390	1291	1195	1101
35	2927	2787	2652	2520	2393	2269	2149	2032	1918	1806	1698	1592	1489	1388	1290	1193	1099
36	2924	2785	2649	2518	2391	2267	2147	2030	1916	1805	1696	1591	1487	1387	1288	1192	1098
37	2922	2782	2647	2516	2389	2265	2145	2028	1914	1803	1694	1589	1486	1385	1287	1190	1096
38	2920	2780	2645	2514	2387	2263	2143	2026	1912	1801	1693	1587	1484	1383	1285	1189	1095
39	2917	2778	2643	2512	2384	2261	2141	2024	1910	1799	1691	1585	1482	1382	1283	1187	1093
40	2915	2775	2640	2510	2382	2259	2139	2022	1908	1797	1689	1584	1481	1380	1282	1186	1091
41	2912	2773	2638	2507	2380	2257	2137	2020	1906	1795	1687	1582	1479	1378	1280	1184	1090
42	2910	2771	2636	2505	2378	2255	2135	2018	1904	1794	1686	1580	1477	1377	1278	1182	1088
43	2908	2769	2634	2503	2376	2253	2133	2016	1903	1792	1684	1578	1476	1375	1277	1181	1087
44	2905	2766	2632	2501	2374	2251	2131	2014	1901	1790	1682	1577	1474	1373	1275	1179	1085
45	2903	2764	2629	2499	2372	2249	2129	2012	1899	1788	1680	1575	1472	1372	1274	1178	1084
46	2901	2762	2627	2497	2370	2247	2127	2010	1897	1786	1678	1573	1470	1370	1272	1176	1082
47	2898	2760	2625	2494	2368	2245	2125	2009	1895	1785	1677	1571	1469	1368	1270	1174	1081
48	2896	2757	2623	2492	2366	2243	2123	2007	1893	1783	1675	1570	1467	1367	1269	1173	1079
49	2894	2755	2621	2490	2364	2241	2121	2005	1891	1781	1673	1568	1465	1365	1267	1171	1078
50	2891	2753	2618	2488	2362	2239	2119	2003	1889	1779	1671	1566	1464	1363	1266	1170	1076
51	2889	2750	2616	2486	2359	2237	2117	2001	1888	1777	1670	1565	1462	1362	1264	1168	1074
52	2887	2748	2614	2484	2357	2235	2115	1999	1886	1775	1668	1563	1460	1360	1262	1167	1073
53	2884	2746	2612	2482	2355	2233	2113	1997	1884	1774	1666	1561	1459	1359	1261	1165	1071
54	2882	2744	2610	2480	2353	2231	2111	1995	1882	1772	1664	1559	1457	1357	1259	1163	1070
55	2880	2741	2607	2477	2351	2229	2109	1993	1880	1770	1663	1558	1455	1355	1257	1162	1068
56	2877	2739	2605	2475	2349	2227	2107	1991	1878	1768	1661	1556	1454	1354	1256	1160	1067
57	2875	2 :7	2603	2473	2347	2225	2105	1989	1876	1766	1659	1554	1452	1352	1254	1159	1065
58	2873	2735	2601	2471	2345	2223	2103	1987	1875	1765	1657	1552	1450	1350	1253	1157	1064
59	2870	2732	2599	2469	2343	2220	2101	1986	1873	1763	1655	1551	1449	1349	1251	1156	1062
60	2868	2730	2596	2467	2341	2218	2099	1984	1871	1761	1654	1549	1447	1347	1249	1154	1061

M.	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	M.
S.	2820	2880	2940	3000	3060	3120	3180	3240	3300	3360	3420	3480	3540	3600	3660	3720	S.
0	1061	0969	0880	0792	0706	0621	0539	0458	0378	0300	0223	0147	0073	0000	9928	9858	0
1	1059	0968	0878	0790	0704	0620	0537	0456	0377	0298	0221	0146	0072	9999	9927	9856	1
2	1057	0966	0877	0789	0703	0619	0536	0455	0375	0297	0220	0145	0071	9998	9926	9855	2
3	1056	0965	0875	0787	0702	0617	0535	0454	0374	0296	0219	0143	0069	9996	9925	9854	3
4	1054	0963	0874	0786	0700	0616	0533	0452	0373	0294	0218	0142	0068	9995	9923	9853	4
5	1053	0962	0872	0785	0699	0615	0532	0451	0371	0293	0216	0141	0067	9994	9922	9852	5
6	1051	0960	0871	0783	0697	0613	0531	0450	0370	0292	0215	0140	0066	9993	9921	9851	6
7	1050	0959	0869	0782	0696	0612	0529	0448	0369	0291	0214	0139	0064	9992	9920	9849	7
8	1048	0957	0868	0780	0694	0610	0528	0447	0367	0289	0213	0137	0063	9990	9919	9848	8
9	1047	0956	0866	0779	0693	0609	0526	0446	0366	0288	0211	0136	0062	9989	9918	9847	9
10	1045	0954	0865	0777	0692	0608	0525	0444	0365	0287	0210	0135	0061	9988	9916	9846	10
11	1044	0953	0863	0776	0690	0606	0524	0443	0363	0285	0209	0134	0060	9987	9915	9845	11
12	1042	0951	0862	0774	0689	0605	0522	0442	0362	0284	0208	0133	0058	9986	9914	9844	12
13	1041	0950	0860	0773	0687	0603	0521	0440	0361	0283	0206	0131	0057	9984	9913	9842	13
14	1039	0948	0859	0772	0686	0602	0520	0439	0359	0282	0205	0130	0056	9983	9912	9841	14
15	1037	0947	0857	0770	0685	0601	0518	0438	0358	0280	0204	0129	0055	9982	9910	9840	15
16	1036	0945	0856	0769	0683	0599	0517	0436	0357	0279	0202	0127	0053	9981	9909	9839	16
17	1034	0944	0855	0767	0682	0598	0516	0435	0356	0278	0201	0126	0052	9980	9908	9838	17
18	1033	0942	0853	0766	0680	0596	0514	0434	0354	0276	0200	0125	0051	9978	9907	9837	18
19	1031	0941	0852	0764	0679	0595	0513	0432	0353	0275	0199	0124	0050	9977	9906	9835	19
20	1030	0939	0850	0763	0678	0594	0512	0431	0352	0274	0197	0122	0049	9976	9905	9834	20
21	1028	0938	0849	0762	0676	0592	0510	0430	0350	0273	0196	0121	0047	9975	9903	9833	21
22	1027	0936	0847	0760	0675	0591	0509	0428	0349	0271	0195	0120	0046	9974	9902	9832	22
23	1025	0935	0846	0759	0673	0590	0507	0427	0348	0270	0194	0119	0045	9972	9901	9831	23
24	1024	0933	0844	0757	0672	0588	0506	0426	0346	0269	0192	0117	0044	9971	9900	9830	24
25	1022	0932	0843	0756	0670	0587	0505	0424	0345	0267	0191	0116	0042	9970	9899	9829	25
26	1021	0930	0841	0754	0669	0585	0503	0423	0344	0266	0190	0115	0041	9969	9897	9827	26
27	1019	0929	0840	0753	0668	0584	0502	0422	0342	0265	0189	0114	0040	9968	9896	9826	27
28	1018	0927	0838	0751	0666	0583	0501	0420	0341	0264	0187	0112	0039	9966	9895	9825	28
29	1016	0926	0837	0750	0665	0581	0499	0419	0340	0262	0186	0111	0038	9965	9894	9824	29
30	1015	0924	0835	0749	0663	0580	0498	0418	0339	0261	0185	0110	0036	9964	9893	9823	30
31	1013	0923	0834	0747	0662	0579	0497	0416	0337	0260	0184	0109	0035	9963	9892	9822	31
32	1012	0921	0833	0746	0661	0577	0495	0415	0336	0258	0182	0107	0034	9962	9890	9820	32
33	1010	0920	0831	0744	0659	0576	0494	0414	0335	0257	0181	0106	0033	9960	9889	9819	33
34	1008	0918	0830	0743	0658	0574	0493	0412	0333	0256	0180	0105	0031	9959	9888	9818	34
35	1007	0917	0828	0741	0656	0573	0491	0411	0332	0255	0179	0104	0030	9958	9887	9817	35
36	1005	0915	0827	0740	0655	0572	0490	0410	0331	0253	0177	0103	0029	9957	9886	9816	36
37	1004	0914	0825	0739	0654	0570	0489	0408	0329	0252	0176	0101	0028	9956	9885	9815	37
38	1002	0912	0824	0737	0652	0569	0487	0407	0328	0251	0175	0100	0027	9954	9883	9813	38
39	1001	0911	0822	0736	0651	0568	0486	0406	0327	0250	0174	0099	0025	9953	9882	9812	39
40	0999	0909	0821	0734	0649	0566	0484	0404	0326	0248	0172	0098	0024	9952	9881	9811	40
41	0998	0908	0819	0733	0648	0565	0483	0403	0324	0247	0171	0096	0023	9951	9880	9810	41
42	0996	0906	0818	0731	0647	0563	0482	0402	0323	0246	0170	0095	0022	9950	9879	9809	42
43	0995	0905	0816	0730	0645	0562	0480	0400	0322	0244	0169	0094	0021	9948	9877	9808	43
44	0993	0903	0815	0729	0644	0561	0479	0399	0320	0243	0167	0093	0019	9947	9876	9807	44
45	0992	0902	0814	0727	0642	0559	0478	0398	0319	0242	0166	0091	0018	9946	9875	9805	45
46	0990	0900	0812	0726	0641	0558	0476	0396	0318	0241	0165	0090	0017	9945	9874	9804	46
47	0989	0899	0811	0724	0640	0557	0475	0395	0316	0239	0163	0089	0016	9944	9873	9803	47
48	0987	0897	0809	0723	0638	0555	0474	0394	0315	0238	0162	0088	0015	9942	9872	9802	48
49	0986	0896	0808	0721	0637	0554	0472	0392	0314	0237	0161	0087	0013	9941	9870	9801	49
50	0984	0894	0806	0720	0635	0552	0471	0391	0313	0235	0160	0085	0012	9940	9869	9800	50
51	0983	0893	0805	0719	0634	0551	0470	0390	0311	0234	0158	0084	0011	9939	9868	9798	51
52	0981	0891	0803	0717	0633	0550	0468	0388	0310	0233	0157	0083	0010	9938	9867	9797	52
53	0980	0890	0802	0716	0631	0548	0467	0387	0309	0232	0156	0082	0008	9937	9866	9796	53
54	0978	0888	0801	0714	0630	0547	0466	0386	0307	0230	0155	0080	0007	9935	9865	9795	54
55	0977	0887	0799	0713	0628	0546	0464	0384	0306	0229	0153	0079	0006	9934	9863	9794	55
56	0975	0885	0798	0711	0627	0544	0463	0383	0305	0228	0152	0078	0005	9933	9862	9793	56
57	0974	0884	0796	0710	0626	0543	0462	0382	0304	0227	0151	0077	0004	9932	9861	9792	57
58	0972	0883	0795	0709	0624	0541	0460	0381	0302	0225	0150	0075	0002	9931	9860	9790	58
59	0971	0881	0793	0707	0623	0540	0459	0379	0301	0224	0148	0074	0001	9929	9859	9789	59
60	0969	0880	0792	0706	0621	0539	0458	0378	0300	0223	0147	0073	0000	9928	9858	9788	60

Usage des Logarithmes Logistiques, pour prendre les parties proportionnelles dans les Tables Astronomiques.

Le Logarithme Logistique d'un nombre quelconque donné de secondes, est la différence entre le Logarithme qu'on trouve dans les Tables vulgaires du nombre $3600'' = 60' \times 60$, & celui du nombre de secondes proposé.

On a introduit ces logarithmes pour prendre les parties proportionnelles dans les Tables Astronomiques, parce qu'ils sont plus commodes, & que l'opération est même un peu plus simple qu'en se servant de la Table du Roi Alphonse, dont les Calculateurs ont fait usage autrefois, & que l'on trouve imprimée dans le premier volume des Ephémérides d'Argolus.

I. Quand le second ou troisieme terme de la proportion n'excedent pas $60'$ ou $3600''$, les parties proportionnelles se découvrent par une simple addition. Exemple, on veut trouver dans le calcul du vrai Lieu de l'Apogée de la Lune, la partie proportionnelle qui répond à $24' 48''$, l'Argument annuel étant selon ce qui va être rapporté ci-après (pag. 630) de $0^s\ 24^o$: on fera si $60'$: $16' 46''$ * :: $24' 48''$? : R $6' 56''$.

* *Voyez la Table, pag. 167.*

On a donc (page 623) pour $16' 46''$ le logar. logistiq. 5537

2448	. . . . .	3837
6 56		La somme 9374.

II. Mais si le second ou troisieme terme excede $60'$ ou $3600''$, on mettra au-devant l'unité avec le signe négatif, & la somme donnera comme ci-dessus le quatrieme terme de la proportion.

III. Quand le premier terme de la proportion n'est pas le nombre $60'$, il peut arriver deux cas; car ou le premier terme est plus petit que $60'$, & en ce cas il faudra prendre dans la Table des Logarithmes Logistiques le Complément Arithmétique du premier terme, & mettre

au-devant l'unité avec le signe négatif, de sorte que le calcul s'achevera comme ci-dessus ; ou bien si le premier terme excede 60′, il faudra seulement prendre le complément Arithmétique de ce premier terme, & l'ajouter au second ou troisieme, pour avoir le quatrieme terme de la proportion. C'est ainsi que par la seule addition on pourra faire toutes les opérations nécessaires lorsqu'il est question de prendre les parties proportionnelles. Exemples.

Si 44′ 10″ : 60′ :: 8′ 15″ ? : ℞ 11′ 12″½	Si 61′ 56″ : 60′ :: 11′ 17″ ? :: ℞ 10′ 56″.
Compl. Arith. 1.8669 = 44′ 10″	0138....61′. 56
0000 = 60 00	0000....60. 00
8617 = 08 15	7257....11. 17
0.7286 = 11′ 12″½	7395....10. 56

Avertissemens pour le Calcul des Lieux du Soleil & de la Lune.

De l'addition & réduction des nombres, en signes, dégrés & minutes, lorsqu'on commence à prendre la somme des moyens mouvemens.

IL faut remarquer d'abord qu'en ajoutant les moyens mouvemens, lorsque la somme des minutes & secondes excede 60, on doit rejetter une unité dans la colonne des minutes ou des degrés vers la gauche : mais il faut bien prendre garde que si la somme des dégrés surpasse 30, c'est alors qu'il faut rejetter une unité dans la colonne des signes vers la gauche, parce qu'un signe ne contient que 30 degrés.

Les époques des Tables Astronomiques commencent au 31 Décembre à midi de tems moyen.

Les Tables des moyens mouvemens sont construites de maniere qu'elles doivent répondre à une durée ou tems égal & uniforme : ainsi les époques des pages 147 & 157, répondent au moment de Midi de tems moyen ; & parce qu'il est plus commode de commencer l'année au 31 Décembre, pour éviter l'embarras des Bissextiles pendant le reste des mois de l'année, il est évident que pour déterminer le Lieu moyen, soit du Soleil, soit de la Lune dans un tems donné quelconque pendant le cours de l'année, il faudra d'abord réduire le tems vrai ou ap-

parent en tems moyen, ce qui peut se faire de deux manieres, ou recommençant deux fois le calcul du lieu du Soleil, afin de corriger le tems, immédiatement après le premier calcul, par le moyen des deux Tables de la page 154; ou bien il faudra chercher dans quelques Almanachs ou Ephémérides, l'équation du tems en nombres ronds pour s'en servir d'abord dans le calcul du lieu du Soleil: ensuite on rectifiera ce tems moyen, sur lequel il seroit dangereux de se négliger dans le calcul du lieu de la Lune dont le mouvement est très-rapide.

On trouvera, page 187, la Table des moyens mouvemens de la Lune en heures, minutes & secondes, dont il est plus commode de prendre la somme à part pour l'ajouter ensuite à l'époque & au jour du mois, ce qu'on laisse néantmoins au choix du calculateur.

Le calcul de la 2e Table de l'Equation seconde du moyen mouvement de la Lune, a été fondé sur ce que ces Equations varient* comme les sinus des arcs doubles pour chaque degré de l'argument annuel.

** Voyez ce qui en a été dit pag. 166 & 189.*

Pour calculer l'Equation du centre du Soleil ou de la Lune, il faut soustraire du Lieu moyen corrigé celui de l'Apogée, ce qui fera connoître l'anomalie moyenne; mais il est à remarquer que l'Equation du centre du Soleil se découvre facilement en se servant de la Table page 152 & 153, en y employant selon la regle ordinaire, les parties proportionnelles, ce qui ne demande qu'une simple addition des logarithmes logistiques &c. car l'excentricité de l'orbite terrestre est constante & invariable.

Comment il faut calculer l'Equation du centre de la Lune.

Mais au contraire l'excentricité de l'orbite Lunaire étant sujette à de grands changemens, au lieu d'une seule & unique Table, il a fallu en composer plusieurs, ensorte que les Equations doivent être calculées par de triples parties proportionnelles.

Pour cet effet on a donné, page 170 & suivantes,

quatre Tables différentes, dont la premiere représente la plus grande Equation possible de 5° 0′, la seconde de 6° 0′, & la troisieme de 7° 0′; & enfin la quatrieme de 7° 39′½; d'où il est aisé de voir que dans les derniers cas, lorsque la plus grande Equation possible excédera 7° 0′, & qu'il faudra prendre la partie proportionnelle, on ne pourra plus y parvenir seulement par l'addition des logarithmes logistiques: mais il faudra de plus soustraire de la somme, le logarithme logistique de 39′ 30″, puisque la différence des deux dernieres colonnes des Tables d'Equations n'est plus de 60′, comme dans les premiers cas, c'est-à-dire, toutes les fois que l'on vient à tomber entre deux des trois premieres colonnes vers la gauche.

On y doit parvenir en y employant deux des quatre Tables qui ont été construites, en supposant les plus grandes équations possibles 5°. 6°. 7°. & 7° 39′½.

Au reste la variation de la Lune se doit calculer aussi autant de fois qu'il est nécessaire par de triples parties proportionnelles, ce qui ne souffre presque aucune difficulté, comme on le peut voir dans l'exemple suivant.

La variation de la Lune se calcule de même, c'est-à-dire en y employant aussi de triples parties proportionnelles.

Les Tables, page 180 & suivantes, ont été construites pour faciliter le calcul de la réduction à l'Ecliptique, & des latitudes de la Lune, principalement à ceux qui n'ont pas en main les Tables des logarithmes des sinus de 10 secondes en 10 secondes; car il est toujours plus simple (faute des Tables beaucoup plus détaillées où les parties proportionnelles se prendroient à vue) d'y employer la Trigonométrie, en faisant les deux Analogies rapportées dans les deux exemples qui suivent.

Il n'est pas nécessaire d'avoir égard dans le calcul des Eclipses tant du Soleil que de la Lune, à la septieme équation: mais pour obtenir une plus grand exactitude lorsqu'il s'agira de ces Eclipses, ou de quelques occultations d'Etoiles par la Lune dans les autres phases, & principalement au tems des quadratures; il seroit avantageux) si l'on néglige totalement cette derniere équation qui n'est pas encore assez connue) de découvrir l'erreur des Tables, en consultant l'Histoire des observations faites une ou plusieurs périodes auparavant. On connoîtra de cette maniere l'erreur des Tables, à laquelle il faudra avoir égard pour le tems de l'Eclipse qu'on s'est proposé de calculer.

La construction & l'usage de la derniere Table, a été expliquée à la fin du Chap. XII. Mais si l'on souhaite une plus grande exactitude, on traitera les Triangles comme sphériques, principalement si *la distance du nœud à la ligne des sisigies*, de la premiere ou derniere colonne, *pag.* 186. est de plusieurs degrés.

Calcul du Lieu du Soleil,

Pour le 4 Août 1739, *à* 3^h 35′ 35″ *de tems vrai, ou de tems moyen,* 3^h 41′ 10″.

1739 ☉	9s 09° 40′ 34″	Apo. 3s 08° 24′ 22″
4 Août	7 02 53 59	37½
3^h 41′ 10″	9 04½	3 08 24 59½
Long. moy.	4 12 43 37½	
Apog. à ôter	3 08 24 59½	
Anom. moy.	1 04 18 38	
Longit. moy.	4 12 43 37½	
Equat. du centre.	+1 04 26	
☉ Lieu vrai	4 11 39 11½	
Ou bien sa long. ☊	11 39 11½	

La Ire équat. du tems, page 154 { −4′ 17″ / +9 52

La seconde…

L'éq. du tems additiv. 5′ 35″.

Si 60′ : 1′ 40″ :: 18′ 38″ ?

15563 Logar. log. de 1′ 40″

5079 ……18 38

℞ 0′ 31″ 20642

L'éq. du centre pour 1s 04° est 1° 03′ 55″

Il faut y ajouter 31

& l'on aura l'équation du centre qui répond à 1s 4° 18′ 38″ d'anom. moy. 1° 04′ 26″

Calcul du vrai lieu de la Lune le 3 Août 1739, *à* 3^h 41′ 10″ *de tems moyen.*

☊ Rétrogr. ……4s 13° 01′ 25″

1739 ☾	5s 15° 30′ 56″	Apogée 2s 23° 20′ 34″
4 Août	10 26 06 05	0 24 03 52
3^h 41′ 10″	2 01 25½	● 1 01
Longit. moy.	4 13 38 26½	Somme…3 17 15 27
Ire équation	+6 32	−11 04
☾ 1° corrig.	4 13 44 58½	Apo. 1° cor. 3 17 14 23
Seconde équat.	−2 42½	Equa. de l'ap. +8 00 24
☾ 2° corrig.	4 13 42 06	Apog. corr. 3 25 14 47
3e équation	−16	☉ Apogée 3 08 24 59½
☾ 3° corrig.	4 13 41 50	Dist. des ap. 0 16 49 47½
Apogée	3 25 14 47	☾ − ☉ 11 29 54 24½
Anom. moy.	0 18 27 03	La som. 0 16 44
L'éq. du centre	−2 08 14	
☾ 4° corrig.	4 11 33 36	☾ vrai lieu 4s 11° 34′ 06″
Lieu du ☉	4 11 39 11½	☊ ……4 01 09 48½
☾ − ☉	11 29 54 24½	☾ − ☊ 0s 9° 24′ 17″½
La variat. de la ☾	−0 06½	ou Argum. de la latitude.
☾ 5° corrig.	4 11 33 29	
6e équation	+37	
☾ 6° corrig.	4 11 34 06	
7e équation	+00	
☾ vrai Lieu	4 11 34 06	
La réduction	−2 22	
☾ Longit. ☊	11 31 44	

La plus grande équation seconde du moy. mouv. page 166, est 3′ 34″½

☉ Lieu	4s 11° 39′ 11″½
☾ Apog.	3 17 14 23
Arg. ann.	0 24 24 48
☉ Lieu	4s 11° 39′ 11″½
☊	4 01 39 53½
☉ − ☊	0 09 59 18
Inclinaison	5° 16′ 58

La plus grande variation (page 166) 33′ 26″.

60 : 1′ 09″ :: 1′ 02″½

60 : 1 11 :: 54″ 24″½ ℞ 1 04½

17175 log. 17050

0425	0425
17600	17475

La variation ou différence du 2d au 4e terme, 0′ 6″½.

Diametre.	Parall. horiz.
29′ 47″½	53′ 47″.

Il en faut ôter ……11 26 17 / 0 00 30

Ou bien la somme……11 26 47

Lieu moyen du ☊	4 1 34 38
Premiere équation	+5 15½
☊ 1° corrigé	4 1 39 53½
Seconde équation	+29 55
Lieu du Nœud	4 2 09 48½

La plus grande équation du centre 7° 16′ 08″½

60′ : 6′ 31″ :: 27′ 03″ ? ℞ 2′ 56″

60 : 7 06 :: 3 12

9641 log. 9269 | 2° 0′ 53″ 2° 11 26″

3460 3460 | + 2 56 + 3 12

13101 12729 | 2 03 49 2 14 38

39′ 30″ : 10′ 49″ :: 16′ 08″½ : ℞ 4′ 25″

7441 log. logif. 10′ 49″

5702……16 08½

13143 somme

18161 logif. 39′ 30″ si à 2° 03′ 49″ / on ajou. 4 25

11327……4 25

L'équat. du centre sera….2° 8′ 14″

Rayon	10 0000000
Sin. de l'hip.	9.2132773. 9° 24′ 17″½
Sin. de l'incl.	8.9641242. 5 16 58
Sin. de la lat.	8.1774015. 0 51 43″⅓
Latitude boréale	0° 51′ 43⅓
Rayon	10 0000000
Tan. de l'hip.	9.2191549. 9° 24′ 17″½
Cos. de l'inc.	9.9981512. 8 43 02
Tang. de	9.2173061. 9 21 56
La réduction à l'éclipt.	0 2′ 21″½

Calcul du Lieu du Soleil le 4 Août 1739, à 5h 49′ 50″, ou de tems moyen 5h 55′ 24″½.

1739 ☉.... 5s 9° 40′ 34″	Apogée.....3s 8° 24′ 22″	La Ire Equat. du tems —4′ 18′′
4 Août..... 7 2 53 59	37½	La seconde.....+9 52½
5h 55′½.....14 36	Apogée.....3 8 24 59½	Equation du tems ....+5 34½
Longit. moy.4 12 49 09		
Aphélie. ...3 08 24 59½		
Anom. moy.1 04 24 09½		
Eq. du cent. — 1 04 35		
☉ Lieu vrai 4 11 44 34		
ou sa longit. ☊ 11 44 34		

Calcul du vrai lieu de la Lune à 5h 55′ 25″ de tems moyen.

1739 ☾... 5s 15° 30′ 56″	Apogée.... 2s 23° 20′ 34″	☊ Retrogr.... 4s 13° 01′ 25″
4 Août... 10 26 06 05	24 03 52	ôtez {11 26 17 / 0 47½}
5h 55′ 25″.....3 15 08	1 39½	ou la somme 11 27 04½
Longit. moy.4 14 52 09	Apogée.... 3 17 26 05½	Lieu moyen ☌ 4 01 34 20½
Ire Equation...+ 6 33	— 11 06½	+5 15½
☾ 1° Corr. 4 14 58 42	Apogée.... 3 17 14 59	☊.....4 01 39 36
2e Equation.... — 2 43	Equation....+8 01 44	Equation....+ 30 10
☾ 2° Corr..4 14 55 59	Apogée....3 25 16 43	Lieu du ☊.....4 02 09 46
3 Equation.... — 0 16	☉ Apogée. 3 08 24 59½	☾ Lieu 4 12 41 08
☾ 3° Corr. 4 14 55 43	Distance ...0 16 52	☾ — ☊..... 0 10 31 22
Apogée....3 25 16 43	☾ — ☉...0 00 55	
Anom. moy. 0 19 39 00	La somme ...0 17 47	
Eq. du centre — 2 16 16½		La plus grande Equation du centre 7° 16′ 00″.
☾ 4° Corr. 4 12 39 26½	La plus grande Equat. Seconde du moyen mouvement 3′ 34″½.	60′ : 39′ 00″ :: {6′ 30″ ? ℞ 4′ 13″ / 7 03 : ℞ 4 35}
☉ Lieu....4 11 44 34	☉ Lieu....4 11 44 34	1871...logar. 39′ 0″...1871
Variation.....+ 1 04	☾ Apog...3 17 14 59	9652 = 6′ 30″ 7′ 03″ = 9300
☾ — ☉...0 0 54 52½	Arg. Ann...0 24 29 35	11523 = 4′ 13″ 4′ 35″ = 11171
☾ 5° Corr. 4 12 40 30½		Equations 7° 7′ 24″...2° 18′ 32″
6e Equation.. + 0 39½	☉ Lieu....4 11 44 34	4 13 4 35
☾ 6° Corr. 4 12 41 10	☊ ...,....4 01 39 36	La som. 2 11 37....2 23 07
7e Equation ..... — 02	☉ — ☊...0 10 04 58	2 11 37
☾ Vrai Lieu 4 12 41 08	60′ : 2′ 52″ :: 4′ 58″ ? ℞ 0′ 14″	Différence 11 30
Réduct. à l'Eclip. — 2 37	10821.....2′ 52″ 29 56	Si 39′ 30″ : 11′ 30″ :: 16′ 00″ ℞ 4′ 39″½
☾ Longit. 4 12 38 31	13208.....4 58 30′ 10″	7175 log. 11′ 30″ 2 11 37
à 3h 41′ 10″ 4 11 31 44	24029.....0 14	5740 16 00 Eq. 2 16 16½
en 2 14 15 différence ou mouvement de la ☾ réduit à l'Ecliptique 01° 06′ 47″	Equation du ☊ 0° 30′ 10″	12915 somme.
Celui du ☉.....5′ 22″½	Incl. de l'orb. 5° 16′ 57″½	1816 log. 39′ 30″
Différence ...01 01 24½		11099 log. 4 39½.
Diametre. Parall. horiz.	60′ : 16′ 46″ :: 29′ 35″ ? ℞ 8′ 16″	9.2615636 sin. 10° 31′ 22″
29′ 47″½ 53′ 48″	5537.....16′ 46″ 7 53 28	8.9641127 sin. 5 16 57½
	3071.....29 35 8 01 44	8.2256763 sin. 0 57 48
	8608.....8′ 16″	Latitude boréale 0° 57′ 48″
	L'éq. de l'Apog. 8° 01′ 44″	9.2689295 T. 10° 31′ 22″
		9.9981514 sin. 83 44 02½
		℞ 9.2670809 T. 10 28 45
		Réduction a l'Eclipt...2′ 37″

Si du mouvement de la Lune réduit à l'Ecliptique dans l'espace de $2^h\ 14'\ 15''$ écoulées entre le commencement & la fin de l'Eclipse observée le 4 Août 1739, & qu'on trouve de $1°\ 6'\ 47''$, on ôte le mouvement vrai du Soleil pendant le même espace de tems, qui est de $5'\ 22''\frac{1}{2}$, la différence sera le mouvement de la Lune au Soleil, sçavoir $1°\ 1'\ 25''$. On fera donc si $61'\ 25'' : 2^h\ 14'\frac{1}{4} ::$ combien la différence $7'\ 27''\frac{1}{2}$ (qu'on a premierement trouvée entre le lieu du Soleil & le lieu de la Lune réduit à l'Ecliptique) doit-elle donner ? On aura au quatrieme terme $0^h\ 16'\ 18''\frac{1}{4}$, ce qui donneroit le tems de la conjonction des deux Luminaires à $3^h\ 57'\frac{1}{2}$.

Mais parce que le mouvement de la Lune n'a pas été uniforme dans l'espace de $2^h\ 14'\frac{1}{4}$, & que cette Planete allant de l'Apogée au Périgée, a dû accélérer son mouvement, il s'ensuit que la conjonction a dû arriver un peu plutôt. D'ailleurs si l'on a calculé le lieu du Soleil pour $3^h\ 58'\ 00''$, & le lieu de la Lune réduit à l'Ecliptique pour le même instant, on a le Soleil à $4^s\ 11°\ 39'\ 52''$, & le lieu de la Lune plus avancé d'environ $0'\ 25''\frac{1}{2}$.

On fera donc si $61'\ 25'' : 2^h\ 14'\frac{1}{4} :: 0'\ 25''\frac{1}{2}$; $R\!x\ 0^h\ 0'\ 55''\frac{1}{4}$
ou plutôt $7'\ 53'' : 16'\ 50'' ::$ $R\!x\ 0\ 0\ 54\frac{1}{2}$.
qu'il faut ôter de $3\ 58\ 00$.

Donc la ☌ à $3^h 57'\ 5''$: le lieu du ☉ étant au même instant ☋ $11°\ 39'\ 50''$.
& la Latitude boréale de la Lune $0°\ 52'\ 27''\frac{1}{2}$.

Ces Elémens semblent suffire pour calculer toutes les phases de l'Eclipse.

Les Tables du premier Satellite de Jupiter ont été construites de maniere que par la simple addition des nombres on détermine toujours le moment de la vraie conjonction au centre de l'ombre ; & c'est-là le point essentiel qui les rend si commodes : quant aux *Immersions* ou *Emersions*, qui sont les seules phases qu'il est possible d'observer, il est clair qu'il faudra toujours rabattre ou ajouter la demi-durée de l'Eclipse (qu'on trouvera page 313), du tems de la vraie conjonction qu'on aura déja déterminée.

En ajoutant à l'Epoque les mois, les jours, les heures, &c. qui doivent servir à déterminer la conjonction que l'on veut calculer, il faudra prendre aussi dans les colonnes latérales à droite les nombres *A* & *B*, qu'on aura soin d'additionner à part. On rejettera les unités chaque fois que ces nombres surpasseront 1000, c'est-à-dire une révolution entiere dans la circonférence du cercle.

PROBLEME.

PROBLEME.

PLANCHE IX. *Fig.* 22.

Ll est le mouvement de la Lune réduit à l'Ecliptique, pendant un intervalle de tems donné quelconque, comme de $2^h\ 14'\frac{1}{4}$ dans l'exemple précédent. *Ss* est le mouvement du Soleil dans le même intervalle de tems qu'on suppose aussi connu, de même que *LS* différence en longitude entre le lieu de la Lune réduit à l'Ecliptique, & celui du Soleil dans le premier instant. On demande quel est le point *M* où doit se faire la conjonction, en supposant le mouvement de ces deux astres égal & uniforme.

Faisant $Ll = a$, $Ss = b$, $LS = c$, & enfin $LM = x$, on aura $(Ll)\ a : (Ss)\ b :: (LM)\ x : \frac{bx}{a} = SM$. Partant $x - c = \frac{bx}{a}$; d'où l'on titre $x = \frac{ac}{a-b}$. C.Q.F.T.

Il faudra donc ajouter le logarithme du mouvement de la Lune réduit à l'Ecliptique dans l'espace de tems donné, au logarithme de la différence en longitude entre la Lune & le Soleil au premier instant, & retrancher de leur somme le logarithme de la différence des mouvemens du Soleil & de la Lune; le reste sera le logarithme de la distance *LM* que l'on cherche.

Calcul de l'immersion du premier Satellite, arrivée le 18 Août 1740, à $1^h\ 6'$ du matin à Paris.

Avertissement. Quand l'année est Bissextile, il faudra toujours écrire depuis le mois de Fevrier un jour de moins. On cherchera ensuite successivement les trois Equations par le moyen des nombres *A* & *B*.

	N. A.	*N. B.*
1740 Epoque où $10^h\ 50'\ 08''$	640	595
Août 17 01 57 55	53	571
I. Equation.....76 $30\frac{1}{2}$	693	±166
II. *Equat. de la Lum.*..12 $42\frac{1}{2}$		1
III. 2^c *Equat. de la Lum.* 1 $24\frac{1}{2}$	*B* corrigé	167
La conjonction. Août 18 14 18 $40\frac{1}{2}$		
Demi-durée de l'Eclipse...1 06 $15\frac{1}{2}$		
L'immersion à.....18 13 12 25 de tems moyen.		

Réduisant le tems moyen au tems vrai, on trouve que l'immersion du Satellite a dû arriver à Paris le 18 Août 1740, à $1^h\ 9'$ du matin, l'erreur des Tables étant alors de 3′ en excès.

Formules pour calculer les Aberrations des Etoiles fixes en déclinaison & en ascension droite, démontrées par M. Clairaut dans les Mém. de l'Académie des Sciences de l'année 1737.

POUR LA DECLINAISON DES ETOILES.

Si l'Etoile est dans les Signes ascendans.....la latitude septentrionale.
Ou Si l'Etoile est dans les Signes descendans.....la latitude méridionale.

L'arc conclu est plus petit qu'un droit: & l'Etoile est le plus loin du pole de même nom que sa latitude 3 Signes après le tems où le Soleil est dans le lieu où l'Aberration est nulle.

} L'Angle à l'Etoile aigu.

Si l'Etoile est dans les Signes descendans.....la latitude septentrionale.
Ou si l'Etoile est dans les Signes ascendans.....la latitude méridionale.

L'arc conclu est plus grand qu'un droit: & 3 Signes après le tems où le Soleil est dans le lieu où l'Aberration est nulle, l'Etoile est le plus près du pole de même dénomination que sa latitude.

L'Angle à l'Etoile obtus.

Si l'Etoile eſt dans le Ier quartier de l'Ecliptique.....la latitude ſeptentrionale
Ou Si l'Etoile eſt dans le troiſieme.....la latitude méridionale.

L'arc conclu eſt plus grand qu'un droit: & l'Etoile eſt le plus loin du pole 3 Signes après le tems où le Soleil eſt dans le lieu où l'Aberration eſt nulle.

Si l'Etoile eſt le ſecond quartier de l'Ecliptique.....la latitude ſeptentrionale.
Ou Si l'Etoile eſt dans le quatrieme.....la latitude méridionale.

L'arc conclu eſt plus petit qu'un droit: & l'Etoile eſt la plus près du pole, 3 Signes après le tems où le Soleil eſt dans le lieu où l'Aberration eſt nulle.

POUR L'ASCENSION DROITE DES ETOILES

L'Angle à l'Etoile aigu.

Si l'Etoile eſt dans les Signes aſcendans.....la latitude ſeptentrionale.
Ou ſi l'Etoile eſt dans les Signes deſcendans.....la latitude méridionale.

L'arc conclu eſt plus grand qu'un droit: & 3 Signes après le lieu où l'Aberration eſt nulle, l'aſcenſion droite eſt la plus petite.

Si l'Etoile eſt dans les Signes deſcendans.....la latitude ſeptentrionale.
Ou ſi l'Etoile eſt dans les Signes aſcendans.....la latitude méridionale.

L'arc conclu eſt plus petit qu'un droit: & 3 Signes après le lieu où l'Aberration eſt nulle, l'aſcenſion droite eſt la plus petite.

L'Angle à l'Etoile obtus.

Si l'Etoile eſt dans le premier quartier de l'Ecliptique..la latitude ſeptentrionale.
Ou ſi l'Etoile eſt dans le troiſieme quartier.....la latitude méridionale.

L'arc conclu eſt plus petit qu'un droit: & 3 Signes après le lieu où l'Aberration eſt nulle, l'aſcenſion droite eſt la plus grande.

Si l'Etoile eſt dans le ſecond quartier de l'Ecliptique..la latitude ſeptentrionale.
Ou ſi l'Etoile eſt dans le quatrieme quartier.....la latitude méridionale.

L'arc conclu eſt plus grand qu'un droit: & 3 Signes après le lieu où l'Aberration eſt nulle, l'aſcenſion droite eſt la plus grande.

Remarques.

Une Etoile ſituée au pole de l'Ecliptique ne doit jamais être vue dans ſon véritable lieu, mais elle paroîtra chaque année décrire autour de ce lieu un petit cercle, dont le diametre ſera de 40″, comme il a été prouvé page 96: quant à ce qui doit arriver aux autres Etoiles, il eſt aiſé de démontrer qu'elles paroîtront décrire des Ellipſes plus ou moins rétrécies, ſelon qu'elles ſont éloignées ou qu'elles ſeront plus proche de ce pole. Or le plus grand axe de ces Ellipſes qui doit être de 40″, ſera toujours au petit axe, comme le ſinus total, eſt au ſinus de la latitude de l'Etoile; enſorte qu'une Etoile ſituée dans le plan même de l'Ecliptique, ne paroîtra plus décrire qu'une ligne droite.

Au reſte lorſque ces mêmes Etoiles ſeront en conjonction ou en oppoſition avec le Soleil, leur longitude apparente différera le plus de la véritable; mais l'Aberration en latitude ſera nulle.

Au contraire, 3 ſignes avant ou après la conjonction, la longitude apparente des Etoiles ſera la même que la vraie, mais la latitude apparente différera le plus de la véritable.

FIN.

TABLE
DES MATIERES
Contenues en ce Volume.

A.

ABAISSEMENT d'une Etoile au-dessous de l'horison. 364
Aberration des Etoiles fixes. D'où elle dépend, 94
——— découverte par M. Bradlei. *ibid.*
——— fait décrire chaque année aux Etoiles fixes, des petits cercles ou Ellipses allongées, autour de leur véritable Lieu, *Ibid. & suiv.*
——— a fait connoître exactement la vitesse de la lumiere, ou le tems que la lumiere des Etoiles employe à parcourir le demi-diametre de l'orbe annuel, 301
——— Les formules de MM. Bradlei & Clairaut pour calculer l'Aberration en déclinaison & en ascension droite, 633
Absides, ou *Apsides*. 109
——— Maniere de trouver la position de la ligne des Apsides selon l'hypothese des Anciens, 472
——— En y employant la Théorie de Wardus, 512
——— Autres Méthodes plus exactes, 545, 547, & 574
Achronique { lever / coucher } d'une Etoile, 373
Aigle, Constellation, 59
Air. Contribue beaucoup à nous faire paroître le ciel éclairé, 399
——— La matiere répandue dans l'espace planetaire étant ramassée, occuperoit à peine un pouce d'air pris dans l'état où nous le respirons, 344
Aires Elliptiques parcourues dans un même tems par différentes Planetes, sont entre elles en raisons soudoublées des parametres de chaque Ellipse, 110 & 481
——— Sont toujours proportionnelles aux tems, *Ibid.*
Alfergan, Auteur Arabe traduit par Golius, 600
Alexandre (mort d') Ere ou Epoque, 604
Almamoun, Caliphe des Sarrazins, a fait travailler à la mesure de la Terre, 367
——— Obliquité de l'Ecliptique observée de son tems, 380
Almanach. Signification de ce mot, 508
Almicantarats. Ce que c'est, 363
Amphisciens ou *Asciens*. 362
Amplitude Orientale ou Occidentale d'un astre. 364
Andromede, Constellation, 59
Angle sous lequel on observeroit le Soleil s'il étoit transporté aussi loin que sont les Etoiles fixes à notre égard, 44
——— de commutation, 522
——— que fait l'Ecliptique avec l'Equateur, 358

Angle que fait l'Ecliptique avec le Méridien, 382
——que fait l'Ecliptique avec l'horison, 462
——que fait l'Ecliptique avec le cercle vertical, ou ce qui eſt la même choſe ——Parallactique. 463
Angle (meſure des) 5
—— Maniere d'en obſerver la grandeur, 7
Anneau de Saturne, 31
——Le lieu du nœud de l') eſt le même que celui de l'orbite du quatrieme Satellite de Saturne, 303
Année. Les Aſtronomes ſont enfin convenus de la commencer au 31 Décembre à midi de tems moyen, 548
——Anomaliſtique. Sa grandeur, 469
——Aſtronomique, 596
—— la grande) 103
——Biſſextile, 599
——grande) Caniculaire, 601
——Civile, *Ibid.* & 596
——Egyptienne, ou Solaire vague, 598 & 601
——Perſienne, 600 & 605
——Grégorienne, 600
——Julienne, 198
——Julienne un peu trop longue, 599
——Lunaire, 596
——Périodique. *Voyez* Anomaliſtique, 469
Années Lunaires vagues, 197
—— —— ſont encore en uſage parmi les Arabes, les Turcs & les Perſans qu'on nomme *Sunnis*, *Ibid.*
——Sidéréale, 601
——Tropique, 468
——Diſtribution des jours qui la compoſent, 606
Anomalie { moyenne / vraie } 111
—— de l'excentrique. Maniere de la réduire à l'anomalie vraie, 495
Antarctique (cercle polaire) 85 & 358
Antinoüs, Conſtellation, 59
Antipodes / *Antœciens* } 361
Aphélie de la Terre ou du Soleil, 109
—— des Planetes, 568 & 576
—— Mouvement de l') de Mercure ſelon M. Newton, 563
—— Inégalités dans le mouvement de l') de Saturne & de Jupiter, 566 & 571
Apogée de la Lune, 129
—— Sa Révolution moyenne, 130
—— Inégalité de ſon mouvement, 132
Apparent (diametre) du Soleil, 476
—— —— plus grand pendant notre hiver que dans l'Eté, 105
—— —— Maniere de le déterminer en ſe ſervant de l'horloge à pendule, 390
Apparition (cercles de perpétuelle) 371
Apſides ou *Abſides*, 109
—— Maniere d'en déterminer la poſition, 512
—— Autres méthodes, 547
Arcs diurnes de l'Equateur ne ſçauroient être égaux aux arcs diurnes & correſpondans de l'Ecliptique, 521
Arctique (cercle polaire) 85 & 358
Argos (le vaiſſeau d'), Conſtellation, 59
Argument de la latitude. Ce que c'eſt, 551
Ariſtarque. Sa méthode de déterminer la diſtance du Soleil, 450
Aſcenſion droite, 359
—— Méthode propoſée par Flamſteed pour trouver l') des Etoiles, 387
Aſcenſion droite des principales Etoiles, 397
Aſcenſion oblique, 370
Aſciens ou *Amphiſciens*, 362
Aſpect quadrat ou quadrature. Ce que c'eſt, 119
Atmoſphere. Ce que c'eſt. Les rayons du Soleil y éprouvent diverſes réfractions, 251 & 399
—— S'il étoit anéanti tout-à-coup, la lumiere du Ciel diſparoîtroit ſubitement au coucher du Soleil, 400
——Solaire doit contribuer à augmenter les crépuſcules, 401
—— — Sa hauteur peut être déterminée par la durée des crépuſcules, 402
—— Si la Lune en a un, 141
Aurores Boréales. On ſoupçonne qu'elles ſont produites par une matiere ſemblable à celle qui forme la queue des Cometes, & qui s'exhale de la Terre, 346
Autel, Conſtellations, 59
Axe de l'Ecliptique, 90 & 98
——du Soleil n'eſt point perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, 52
—— Sous quel angle eſt incliné celui de la Terre, 80

Azimuts ou cercles verticaux, 363
——— d'une Etoile, 364
——— Maniere de trouver les Azimuts, 413

B.

Balance (la) une des douze Constellations du Zodiaque, 59
Bandes paralleles qui traversent le disque de Jupiter, 54
Bartschius, auteur d'un Globe céleste, 63
Bayer, auteur d'une Uranométrie, 63
Belier, une des douze Constellations du Zodiaque, 59
Berenice (chevelure de) Constellation, 59
Bouillaud (Eloge de) 560
——— a corrigé l'hypothese de Wardus, 509
——— a publié les principaux Elémens du mouvement des Planetes, 566 *& suiv.*
——— La méthode dont il s'est servi pour découvrir les plus grandes Equations du centre, ou l'excentricité de leur orbites, 570
Bouvier (le) Constellation, 59

C.

Calendrier, ce que c'est, 606
Calcul du lieu géocentrique d'une Planete, 551
Cancer ou Ecrevisse, l'une des Constellations du Zodiaque, 59
Capricorne, autre Constellation du Zodiaque, *Ibid.*
Carte générale du cours des 24 Cometes calculées par M. Hallei, 353
Cassiopée, Constellation, *Ibid.*
Catalogues des positions des astres. Leur utilité en Astronomie, 65
——— (I) Le nombre des Etoiles connues du tems d'Hypparque, 61
——— à peu près le même que selon Ptolomée, 62
II. *Catalogue* d'Ulug-Beigh, *Ibid.*
——— III. de Tycho & de Kepler, 64
——— IV. d'Hévelius, 64
——— V. de Flamsteed, *Ibid.*
Catalogue des Etoiles australes, par M. Hallei, 64
——— Moyens pour en construire un, 395
Cercle, sa division en degrés, &c. 5
Cercles, (dans des) inégaux, les degrés qui contiennent des arcs égaux, sont entre eux réciproquement comme les rayons des cercles, 386
——— parallele, 354 & 372
——— Equinoctial, 78 & 357
——— polaire antarctique } 85 & 358
——— ——— arctique }
——— Azimutal, 363
——— qui termine les crépuscules, 404
——— de déclinaison, 359
——— de l'Ecliptique, 355
——— Excentrique, 109 & 472
——— de l'horison, 8, 78 & 363
——— qui sépare la lumiere de l'ombre, 80
——— grands, 354
——— petits, 358
——— de perpétuelle apparition, 371
——— de perpétuelle occultation, *ibid.*
——— polaires, 85 & 358
——— des tropiques, *ibid.*
——— vertical & premier vertical, 363
——— de vision, 118
Cercles de latitude ou Cercles secondaires. Ce que c'est, & pourquoi on leur a donné ce nom, 128 & 356
——— Horaires, 366
Chaud. Deux raisons pourquoi le plus grand chaud arrive lorsque le Soleil est le plus éloigné de notre terre, 112
——— Pourquoi il n'arrive pas aussi-tôt que le Soleil parvient au tropique, qui est le tems de sa plus grande hauteur sur l'horison, 114
Cheval (le petit) Constellation, 59
Chevelure de Bérénice, autre Constellation, *ibid.*
Chien { grand } Constellations, 59
{ petit }
Chrétienne (Ere) 602
Ciel étoilé distribué en trois régions principales, 58
——— La matiere fluide qui y est répandue, est prodigieusement rare, n'ayant aucune densité sensible, 344
——— La matiere des cieux n'est pas incorruptible, mais sujette aux changemens, 67
——— Milieu du) 365
Climats, 372
Colures, 82 & 359
——— des Solstices } 100 & 359
——— des Equinoxes }
Cometes, 321
——— Ce qu'en ont pensé les Anciens, 321 *& suiv.*

Cometes, il eſt aiſé de reconnoître qu'elles ne ſont point dans notre air, & même qu'elles ſont au-deſſus de la Lune, 324
—— Leur lieu vrai & apparent : leur parallaxe, 325
—— Maniere de découvrir la parallaxe de leur mouvement diurne, 326 & 327
—— Sont ſujettes à la parallaxe de l'orbe annuel, 328 & 334
—— Maniere de découvrir la diſtance d'une Comete, lorſqu'on l'obſerve vers le commencement ou vers la fin de ſon apparition, 329
—— Quand elles paroiſſent rétrogrades ou directes, lentes ou rapides, dans leurs mouvemens, 330
—— Peuvent deſcendre dans la région des Planetes, 331
—— Variétés dans leurs configurations apparentes, & leurs différentes grandeurs, 332
—— Sont emportées chaque jour par le mouvement diurne d'Orient en Occident, *ibid.*
—— Leur mouvement propre ou réel. Maniere d'en obſerver le cours, 333 & 335
—— Se meuvent toujours dans un plan qui paſſe par le Soleil, 335
—— Peuvent changer ſubitement de direction vers le tems de leur conjonction au Soleil, *ibid.*
—— Variétés ſurprenantes dans leur routes apparentes, 336
—— Vers la fin de leur apparition, elles ſemblent ſe détourner un peu de la circonférence du grand cercle qu'elles ont ſuivies, *ibid.*
—— Quelles ſont leurs véritables orbites. Hévélius s'eſt apperçu le premier que leur trajectoire ſe courboit un peu en s'approchant du Soleil, 337
—— Dans quels tems elles ſe montrent à nos yeux, & dans quels tems elles diſparoiſſent, 338
—— On peut ſuppoſer que les petites portions d'Ellipſes que nous leur voyons parcourir pendant quatre à cinq mois, ne different pas ſenſiblement d'une parabole, 340
—— Leur Théorie véritable, découverte par M. Newton, a anéanti tout-à-coup les hypotheſes des Aſtronomes, 341
Cometes, ſe meuvent ſouvent d'Orient en Occident, ou contre l'ordre des ſignes, 342
—— de 1742. Pourquoi cette Comete n'a été apperçue qu'après ſon paſſage par le Périhélie, 345*
—— à travers leurs queues, ſi épaiſſes qu'elles puiſſent être, on apperçoit les plus petites Etoiles fixes, *ibid.***
—— Leurs queues ſont toujours à l'oppoſite du Soleil, 446
—— —— participent au mouvement du corps de la Comete, *ibid.*
—— de 1680. Longueur de ſa queue : par qui cette Comete a été d'abord apperçue, 347
—— —— a été obſervée avant & après ſa conjonction au Soleil, 348
—— Irrégularités apparentes de ſon mouvement, *ibid.*
—— de 1744, 348
—— Comment on peut déterminer les trajectoires des Cometes par une méthode indirecte ou d'approximation, 350
—— Orbites des 24 Cometes calculées par M. Halley, 353
Commutation (angle de) 552
Cone de l'ombre. Méthode pour en meſurer l'angle, 201
—— de la Pénombre, 204
Conjonction de la Lune avec le Soleil, 120
—— véritable differe ſouvent très-ſenſiblement de l'apparente, 244
—— des Planetes inférieures avec le Soleil, peut être de deux ſortes, 258
—— déterminer le tems qui doit s'écouler entre deux conjonctions de même eſpece, 262
—— Probleme pour le lieu de la conjonction de deux Planetes, 633
Conſtellations, 56
—— Définition de ce mot, 57
—— déſignées par les Anciens, 59
—— quels noms ont été ajoutés par les Modernes, *ibid.*
—— ont changé bien ſenſiblement de place depuis les obſervations des plus anciens Aſtronomes, 102
Copernic, fameux Aſtronome du XVI. ſiecle, ſelon lui la Terre ſe meut, 62

Copernic, sa prédiction sur les phases de Venus & de Mercure, 267
Corps célestes. Ne sont pas incorruptibles, 67
Coucher d'un astre, } 373
—— Achronique, }
—— Cosmique, }
—— Héliaque, }
Coupe (la), Constellation, 59
Création du Monde (Epoques de la) 603
Crépuscule. Ce que c'est; sa cause, 400
—— l'Atmosphere Solaire doit contribuer à les augmenter, 401
—— d'hiver moins longs que ceux d'Eté, 402
—— Leur durée peut servir à déterminer la hauteur de l'air, *ibid.*
—— Plus courts dans la sphere droite que dans la sphere oblique, 403
—— Le cercle qui les termine, 404
—— Leurs différentes durées selon les saisons & les divers lieux, 405
—— Comment on détermine le plus court, 407
—— Maniere de déterminer l'heure du commencement ou de la fin, 409
Culmination. Ou la plus grande élevation d'une Etoile, 364
Cycle des indictions 619
—— Lunaire, le même que celui de Meton ou Nombre d'or, 611
—— Solaire. Son origine, son usage: comment on peut découvrir une année de ce cycle qui répond à une année quelconque de l'Ere Chrétienne, 609

D.

Déclinaison d'un astre. Ce que c'est, 359
—— du Soleil dans la Zone Torride. Maniere de la calculer, 381
Déclinaisons des principales Etoiles, 297
—— Cercle de) 359
Degré, 5
Denys le Petit (Ere de) 602
Diametres apparens. Moyens de les connoître par observation, 9
Diametres apparens des Etoiles fixes, 45
Diametre apparent du Soleil. Comment le calculer, 390
Diametres, ils augmentent à mesure qu'on s'en approche, 11
—— de l'ombre Lunaire vus de la Lune, 210
—— de la Pénombre, 211
Dichotome. Ce que signifie ce terme, 119
Différence ascensionnelle, 370
Diocletien (Ere de) 604
Disque de la Terre. Ce qu'on entend par ce mot, 215
—— Trouver quelle doit être sur le disque de la Terre la situation d'un lieu dans un instant donné d'une Eclipse, 232
—— Sa grandeur apparente, vu de de la Lune, 217
—— La Latitude de la Lune projettée sur le plan du) *ibid.*
Distance du Soleil & de la Lune fait disparoître leur convexité à nos yeux, 49
—— du Soleil à la Terre. Si on la peut connoître au juste, 446
—— moyenne, 109
—— Harmonie merveilleuse entre les) des Planetes au Soleil, & leurs tems périodiques, 39
—— de la Lune (la distance) au Soleil ou aux Etoiles: comment on peut l'observer en mer à une minute près, 320
—— Avantage de ces observations pour trouver le lieu apparent de la Lune, & par conséquent la longitude en mer, 396
—— Comment on calcule le lieu d'un astre, lorsqu'on a observé sa distance à deux Etoiles fixes, *ibid.*
Diurne (le mouvement) du Soleil, 470
—— le mouvement) moyen, 548
Dominicale (lettre) 607
Dorade (la) ou Xiphias, Constellation, *ibid.*
Dragon, autre Constellation, *ibid.*
—— { sa tête } voyez nœuds, 127
{ sa queue }

E.

Eclipses. Vraie signification de ce mot, 193
—— de Lune & de Soleil. Dans

quels tems elles arrivent, 195
Eclipſes. Elles n'arrivent pas tous les mois, 196
—— de Lune totales & centrales, 197
—— Circonſtances qui limitent les cas auxquels elles doivent arriver, 209
—— Maniere de les déterminer par les Parallaxes, 243
—— du Soleil (l'Eclipſe) ne paroit pas de la même maniere par toute la Terre, 195
—— devroit s'appeller plutôt Eclipſe de Terre, 198
—— Maniere de la conſiderer au tems des nouvelles Lunes, ſuivant l'idée de Kepler & Bouillaud, 215*
—— Dans quels cas il n'en doit point arriver, 218
Eclipſes partiales, 219
—— totales, *ibid.*
—— Maniere d'en déterminer le milieu & la demi-durée, 221
—— Quelle portion du Soleil la Lune doit nous cacher, 225
—— Meſurées (Eclipſes) en doigts ou douziemes parties, 226
—— Comment déterminer les phaſes pour un lieu de la Terre, à un inſtant déterminé, *ibid.*
—— Le commencement & la fin ne ſçauroient être déterminés de la même maniere dans tous les endroits du diſque, 229
—— Trouver le commencement pour un lieu déterminé, 236 & 238
—— Trouver l'inſtant de ſa plus grande quantité, *ibid.* & 240
—— La fin, 237 & 238
—— Servent à déterminer les longitudes tant ſur terre que ſur mer, 241
—— du quatrieme Satellite de Saturne obſervée en 1715, 314
Eclipſes des Satellites de Jupiter, 293
—— ont ſervi à faire découvrir la parallaxe de l'orbe annuel dans Jupiter, & par conſéquent ſa vraie diſtance, 294
—— employées merveilleuſement par Roemer pour démontrer le mouvement ſucceſſif de la lumiere, 296
—— on en a fait uſage pour trouver les longitudes ſur terre, 318
Eclipſes des Etoiles par la Lune) préférées aux autres méthodes pour déterminer la longitude, n'y ayant rien de plus précis que leurs immerſions & émerſions du diſque de cette Planete, qui ſont inſtantanées, 320
Ecliptique, 75 & 351
—— diviſé en douze ſignes, *ibid.*
—— Son axe, 90 & 98
—— Son obliquité à l'Equateur, 380
Elevation, ou hauteur d'une Etoile au-deſſus de l'horiſon, 364
—— du pole égale à la latitude d'un lieu, 367
Ellipſe. Deſcription de cette courbe. Ses foyers, 108
—— Maniere d'en décrire une dont on connoit un des foyers, & qui paſſe par trois points donnés, 545
Elongation d'une Planete au Soleil, 159
Emboliſmiques (mois) 597
Equateur Céleſte ou Equinoctial, 78 & 357
—— Cercles ſecondaires de l') 128 & 356
Equations & Proſthapheresé 485
—— Lieux auxquels arrivent les plus grandes, 486
—— La méthode dont ſe ſervent les Aſtronomes pour déterminer les plus grandes) 572
—— du tems (Equation du) 517
—— compoſée de deux parties ou élémens, 524 & 525
—— deux ſortes de Tables pour la meſurer 526
—— Table générale pour le même uſage, 527
—— du centre de la Lune, comment elle doit être calculée, 629
—— Dans quel tems de l'année arrivent les plus grandes, 529
Equinoxes (pourquoi les points retrogradent des) 100
—— Méthode pour obſerver le moment des) 466
—— Ces obſervations ſervent à trouver la grandeur de l'année Solaire, *ibid.*
Epoques ou racines des moyens mouvemens, 548
—— des Tables Aſtronomiques commencent au 31 Décembre à midi de tems moyen, 627
Ere, vient d'un mot Arabe qui ſignifie qu'on a fixé le tems: autre étymologie de ce mot, 602

Ere.

Ere, énumération des plus célébres, *ibid. & suiv.*
——Table de réduction des premieres années de chaque) aux années de la Période Julienne, à celles qui précédent ou suivent la Naissance de Jesus-Christ, 605
Eridan (l') Constellation, 59
Eté (notre) de huit jours plus long que n'est l'hiver, 104
Etoiles fixes. Sont des corps lumineux, 42 & 48
——Leur distance au Soleil est immense, 25
——Leur distance à la terre est presque infinie en comparaison de celle du Soleil à notre égard, 43
——ne paroissent en effet sous aucun diametre ni sous aucun angle sensible, 45
——L'angle que forment à notre œil celles de la premiere grandeur, n'est pas d'une seconde, *ibid.**
——ont été distribuées en plusieurs classes, comme étant de différentes grandeurs, 55
——doivent paroitre dans le même ordre & dans la même situation de quelques Planetes qu'on les regarde, 58
——Celles qu'on a nommées informes, 60
——Hypparque est le premier qui ait réussi à en construire un Catalogue général, 61
——Quels sont les autres Astronomes qui l'ont imité, 62 *& suiv.*
——Longitudes & latitudes de 777, observées & publiées par Tycho-Brahé, 62
——Positions de 400, observées par Guillaume, Prince de Hesse-Cassel, *ibid.*
—— Australes observées par M. Halley, 64
——Celles qu'on découvre à la vue simple, ne sont pas en si grand nombre qu'on s'imagine: mais le nombre de celles qu'on découvre avec les lunettes, est presque immense, 66
Etoiles qui paroissent & disparoissent alternativement, 68
——Si ce sont des taches qui causent ces vicissitudes, *ibid.*
——nouvelles (Etoiles) 69
Etoiles anciennes qui ont disparu, 71
——Quelle peut être la cause de cette disparition, 72
——Leur situation ou leur arrangement doit paroitre le même, vû du Soleil ou de la Terre, 74
——Si l'on peut déterminer leur distance par la parall. du grand orbe, 93
——leurs Aberrations, 94
——Ancienne méthode pour en déterminer les ascensions droites, & les déclinaisons, 383
——Différente maniere d'en calculer la longitude & latitude, 396
Etoiles, Tables de l'ascension & déclinaison des principales, ou de celles *de la premiere grandeur* 397
——Tables des longitudes & latitudes correspondantes, 398
Excentrique (cercle) 109 & 472
Excentricité, 109 & 472
—— de l'orbite de la terre, *ibid.*
—— de Mercure n'est pas assez connue, 566
—— des Planetes, 568 & 576
—— paroit variable dans les orbites de Jupiter & de Saturne, 566, 568 & 571
——de Jupiter. Inégalité qu'elle produit dans le retour des Satellites, 297
Excentricité (l') & la position de la ligne des absides de la Terre au Soleil, peuvent être calculées géométriquement selon l'hypothese des Anciens, 472
——de l'orbite de la Lune change à chaque instant, 131

F.

Festes mobiles. Voyez Pâques, 610
Fixes (Etoiles). Voyez Etoiles.
Fleche (la) Constellation, 59
Fondation de Rome. (Ere ou Epoque de la) 604
Foyers de l'Ellipse, 108

G.

Galaxie, ou voie lactée, 60
Gemeaux, Constellation, 59
Geocentrique (lieu) 536 & 551
—— (latitude) 273

Glaciales (Zones) 362
Grandeurs des Planetes, 558
Gravitation, eſt ſelon Newton la cauſe des inégalités du mouvement de la Lune, 132
—— des Planetes & des Cometes, 110, 111 & 352
Grégoire XIII. (le Pape) a réformé la grandeur de l'année, & rétabli l'Equinoxe au 21 Mars, 600
Grue, Conſtellation, 59
Guillaume, Prince de Heſſe, fait travailler & contribue à l'avancement de l'Aſtronomie, 62

H.

Harmonie merveilleuſe entre les diſtances des Planetes au Soleil, & leurs tems périodiques, 39
—— n'a plus lieu lorſqu'on vient à ſuppoſer le mouvement du Soleil autour de la Terre, 41
Hauteur ou élevation d'un aſtre. Ce que c'eſt, 8 & 364
—— Maniere de l'obſerver, 375
—— du cone d'ombre de la Terre, 205
—— —— de la Lune, *ibid.*
—— du pole eſt toujours égale à la latitude du lieu, 367
—— Comment on l'obſerve, 379
Hégire. Ere des Mahométans, 605
Héliaque { lever / coucher } d'un aſtre, 373
Héliocentrique (latitude) 272
Hémiſphere { ſeptentrional / boréal } 356
Héteroſciens, 362
Heures égales & inégales } 595
—— Planetaires ou *temporaneæ*. }
Hipparque a le premier donné un Catalogue général des Etoiles, 61
—— Son probleme pour trouver la parallaxe du Soleil, 447
Horaires (cercles) 36
Horiſon. Ce que c'eſt. Quel eſt ſon pole, 8, 78 & 363
—— déterminé ſur mer, *ibid.*
—— n'eſt pas ſi facilement déterminé ſur terre. Comment les Aſtronomes y parviennent, 9
—— ſenſible, 78 & 362
—— rationel, 78 & 363
—— eſt un cercle véritablement mobile, 365
Hypotheſe, doit être rejettée lorſqu'elle n'eſt fondée que ſur une fiction abſurde ou imaginaire, 34
—— de Wardus ne ſatisfait pas entiérement aux obſervations, 508
—— de Wardus. Iſmaël Bouillaud l'a corrigée, 509

I.

Jeſdagirde (Ere de) 605
Inclinaiſon du plan de l'orbite d'une Planete à l'Ecliptique, 539
—— les diverſes inclinaiſons, 566 & *ſuiv.* 619
Indiction, 619
Inégalité optique ou ſeconde. Ce que c'eſt, 14 & 292
—— Premiere) du retour des Satellites à l'ombre de Jupiter, 297
—— Seconde, 298
—— Calcul de la ſeconde inégalité propoſé par M. Halley, 299
—— En quoi celle-ci differe de l'autre, 298
—— de la Lune (inégalités) 132
—— dans le moyen mouvement de Saturne & de Jupiter, apperçues par Flamſteed, 567
Informes (Etoiles) 59
Jour, ce qui le conſtitue, 80
—— les plus longs de l'année, 86
—— les plus courts, *ibid.*
Jours Solaires. Pourquoi doivent être inégaux entre eux? 519 & 520
—— —— Cauſes de leur inégalité, 522
Jours moyens, comment on peut les déterminer, 523
—— —— Quatre différens cas où ils commencent à devenir plus longs que les moyens, 528
Jour naturel, ce que c'eſt, 593
—— —— Les différentes nations n'en comptent pas les premieres heures au même tems, 594
Jubilé. Quel eſpace de tems c'eſt, 601
Julienne (année).
Jupiter, Planete, 26 & 257
—— Son diametre apparent ſelon MM. Pound & Newton, 29 & 30
—— Son applatiſſement par qui premierement apperçu, 69
—— a quatre Satellites, 29

Jupiter (Satellites de) Galilée a été le premier qui les ait apperçus, 30*
—— surpasse (Jupiter) en grosseur toutes les autres Planetes prises ensemble, 558
—— Ses taches, sa rotation autour de son axe, 53
—— Ses bandes paralleles, 54
—— Recherches sur l'inclinaison de son orbite au plan de l'Ecliptique, 569
—— Grande différence dans le lieu de son nœud entre Kepler & Bouillaud, *ibid.*
—— Ses nœuds dans l'espace de 83 ans, n'ont pas été sensiblement mobiles à l'égard du ciel étoilé, 170
—— La méthode dont se servent les Astronomes pour découvrir la plus grande Equation, tant de Jupiter que des autres Planetes, 582
—— Flamsteed a remarqué que son mouvement moyen s'étoit accéléré, 567
—— Inégalités dans les mouvemens de son Aphélie & de son nœud, 570
—— Son excentricité variable, 571
—— Sa moyenne distance au Soleil selon Newton, 553
selon Kepler, 571
—— Agit sur Saturne au tems de leur conjonction, 572

L.

Latitude d'un astre, 91 & 356
—— Maniere de la déterminer, 291 & 392
Latitudes des Etoiles fixes, qu'on avoit crues invariables, changent un peu & en différens sens, 395
Latitude d'un lieu sur la Terre, 91 & 360
—— égale à la hauteur du pole, 367
—— Maniere de la déterminer, 376
—— de la Lune. Ce que c'est, 128
—— est plus grande de 18′ si les nœuds sont dans les sisigies, 129 & 168
—— Maniere de découvrir la plus grande, 442
—— Héliocentrique, 272
—— Géocentrique, 273
Lemme pour les dimensions du cône d'ombre ou de la Pénombre dans les Eclipses, 201
—— Pour les Projections des lignes & des figures, 214 & 530
Lemme de M. Hallei pour les stations des Planetes, 580 & 587
Lettres Dominicales, 607
—— Table qui fait voir quelle est celle qui répond à chacune des années du cycle Solaire, 609
Lever d'un astre { Achronique / Cosmique / Héliaque } 373
Libration de la Lune. Ce que c'est, 133
Lieu d'une Etoile déterminé relativement à l'Ecliptique, 356
—— donné sur la surface de la Terre, déterminé dans un instant proposé quelconque des Eclipses du Soleil, 232
—— d'une Planete dans son orbite. Comment on le peut découvrir, 111
—— Géocentrique & Héliocentrique d'une Planete supérieure, sont dans un seul & même plan au tems de son opposition au Soleil, 536
—— Géocentrique d'une Planete, comment on le calcule, 551
Ligne des absides. Ce que c'est, 109 & 512
—— Deux diverses méthodes pour en déterminer la position, 547
Ligne des nœuds, 127 & 211
—— C'est de sa position que dépend tout le calcul des Eclipses, 197
—— Diverses méthodes pour trouver la position de la ligne des) 538
—— Sa position étant connue, on découvre par une seule observation le lieu héliocentrique d'une Planete dans ses diverses élongations au Soleil, 541
Limites de la Lune, 128
—— de Venus, 272
—— Les observations du lieu des Planetes faites proche les) font découvrir l'inclinaison de leurs orbites, 539
Lion (le) une des douze Constellations du Zodiaque, 59
Logarithmes de Street (Table des) 622
—— Leur usage pour prendre les parties proportionnelles dans les Tables Astronomiques, 626
Longitude d'un astre, 91 & 356
—— Maniere de la déterminer, 391 & 392
—— des Etoiles augmentent de

près d'une minute chaque année, 295
Longitudes Géographiques ou d'un lieu sur la Terre, 360
——— On peut les déterminer par les Eclipses du Soleil, 241
——— se peuvent découvrir par les distances de la Lune aux Etoiles, 320 & 396
——— par les Eclipses des Satellites, 318
Loup (le) Constellation, 59
Lumiere. N'est point instantanée, comme les Cartésiens l'ont prétendu, 295
——Les deux démonstrations ingénieuses qu'ont donné du mouvement successif de la lumiere MM. Roëmer & Bradley, 297
——Calcul de la viteſſe de la) 301
——Secondaire de la Lune, ce que c'eſt, 123
——— nous fait appercevoir le diſque entier de la Lune dans le tems du Croiſſant, 124
Lune (la) eſt un Satellite de la Terre, 29 & 115
——— De tous les corps céleſtes, eſt celui qui nous éclaire le plus en l'abſence du Soleil, 115
——doit être conſidérée comme un corps céleſte aſſujetti aux loix de la gravitation, 116
——eſt un corps opaque, rond, & aſſez ſemblable à la Terre,
——Cauſes des variétés dans ſes phaſes, *ibid.*
——Son mouvement d'Occident en Orient, 118
——Pleine Lune,
——altérée dans ſa circonférence,
——Dichotome,
——en Croiſſant, } 119
——Nouvelle, 120
——Son élongation au Soleil, *ibid.*
——l'Elongation de la) étant donnée, maniere de décrire chacune de ſes phaſes, 121
——déterminer ſa portion éclairée, 122
——eſt encore éclairée par la lumiere de la Terre, 123
——s'écarte au Nord & au Midi du plan de l'Ecliptique, 126
——Angle ſous lequel on voit ſon diametre quand elle eſt périgée, 129*
——quand elle eſt apogée, *ibid.*
Lune. Révolution moyenne de ſes nœuds, 128
——— révolution moyenne de ſon apogée, 130
——— Différentes inégalités dans ſon mouvement, *ibid.*
——— La variation, ou troiſieme inégalité dans ſon mouvement, 131
——— Son orbite paroit preſque continuellement changer de figure, *ibid.*
——— Périgée au 1er & 3e quartier, paroit ſous un angle d'environ une minute plus petit que lorſqu'elle eſt nouvelle, ou pleine & périgée, 131*
——— Inégalités dans le mouvement de ſon Apogée, 132
——— Inégalités dans le mouvement de ſes nœuds, *ibid.*
——— La gravitation ſelon Newton, eſt la cauſe de ſes inégalités, *ibid.*
——— Tourne uniformément autour de ſon axe, 133
——— Sa libration, *ibid.*
——— Sa ſurface eſt inégale & raboteuſe, 135
——— couverte de taches, & prodigieuſement variée, 139
——— Il s'y trouve de très-hautes montagnes, 136
——— Il s'y trouve de très-grandes cavernes, 137
——— Il s'y trouve vraiſemblablement des mers, 140
——— S'il y a des nuages, *ibid.*
——— Si elle a un atmoſphere, 141
——— Quels ſont les Sélénographes qui ont tâché de repréſenter ſa figure & ſes phaſes, 141
——— Les phaſes de Peireſc & Gaſſendi, ſont des premieres, & ſont des plus reſſemblantes, 141*
——— Les Cartes d'Hévélius & des PP. Grimaldi & Riccioli, 142
——— La Pleine Lune Apogée ou Périgée, publiée par M. Caſſini, *ibid.*
——— Son moyen mouvement pris d'une maniere vague, 142
——— Equat. du moyen mouv.) 143
——— Table de ſes mouvemens, 166 & *ſuiv.*
——— Ses inégalités au tems des Siſigies, 188
——— Son orbite étant variable, comment on la ramene à différentes Elipſes, 190

Lune. Sa seconde variation encore inconnue. Maniere de la calculer par approximation, 192
Lune. Son diametre n'est qu'environ le quart de celui de la Terre, 194
—— Sa route apparente à l'égard du Soleil, 211
—— Sa parallaxe, 245, 441 & 461
Lyre (la) Constellation, 59

M.

Mars, Planete, 257
—— Son orbite, comme celle des autres Planetes, entoure le Soleil, la Terre n'étant point au centre de cette orbite, 37
Mars. On observe dans Jupiter & dans Saturne à peu près les mêmes Phénomenes que dans cette Planete, 38
—— Sa parallaxe deux fois plus grande que celle du Soleil, 440 & 456
—— Difficultés au sujet de sa parallaxe, 435 & 459*
—— Elémens qui ont pu servir à construire les Tables de ses mouvemens, 572
—— La plus grande équation de son centre, 573
—— On ignore si son nœud est fixe dans le Ciel étoilé, 574
Matiere du Ciel, corruptible, 67
—— fluide répandue dans les Cieux, est si rare qu'elle n'a pas la moindre densité sensible, 344
Mercure, Planete, 257
—— Son passage dans le Soleil étant donné, déterminer son orbite, 252 & 253
—— Le lieu de sa conjonction au Soleil étant donné par les Tables, déterminer sa route sur le disque, 254
—— Observé soigneusement par Gassendi dans sa conjonction inférieure, & dans ses grandes élongations, 561
—— Elémens de sa Théorie, 562
—— Pourquoi son excentricité n'est pas encore bien connue, 564
—— Comment on a déterminé l'inclinaison de son orbite, 566
—— Réflexions sur les meilleurs moyens d'observer son vrai lieu, *ibid.*
—— Mouvement de son Aphélie selon M. Newton, *ibid.*
Mercure, mouvement de son nœud, 363
—— Difficultés au sujet de sa plus grande équation, *ibid.*
Méridien d'un lieu, 360
—— C'est dans ce cercle que s'observe la plus grande élévation des Etoiles, 364
—— Est un cercle véritablement mobile, 365
—— Premier Méridien Géographique, a été fixé depuis la Déclaration de Louis XIII. à la partie occidentale de l'Isle de Fer, 317
—— universel, 365
—— Position de celui qui passe par le Soleil, 223
Méridiens (différence des) comment on les peut découvrir, 317 & 318
Méridienne (ligne) Maniere de la tracer, 377
—— Sa correction, 378
Mesure des angles, 5
Meton (Cycle de) ou de 19 ans, 611
—— Ce Cycle contient 235 Lunaisons, 614
—— Les Anciens ignoroient qu'il s'en falloit une heure & demie que 235 Lunaisons ne répondissent à 19 années Juliennes, *ibid.*
—— L'erreur qui en a résulté dans le Calendrier Ecclésiastique, *ibid.*
—— Ce Cycle ne doit pas être confondu avec le *Saros* ou Période Caldaïque de 223 Lunaisons, *ibid.*
Milieu du Ciel, 365
Mois Lunaires, 596
—— Périodiques, 124
—— Synodiques, 124
—— Emboliſmiques, 597
—— Epagomenes, 596
—— Pourquoi on les suppose alternativement de 29 & 30 jours, 613
Monde. Eres de sa création, 603
Montagnes dans la Lune, 137
—— Maniere d'en mesurer la hauteur, 138
Mouvement des corps en général, 1
—— est la mesure du tems, c'est-à-dire, du tems qui est uniforme, 517
—— Méthode pour le mesurer, 5
—— Comment l'œil en peut juger, 3
—— égal ou uniforme en certains cas, pourroit paroître irrégulier & inégal, 13

Mouvement par rapport à un Observateur qui change de lieu, 15
—— du vaisseau n'est point apperçu quand la mer est presque calme, *ibid.*
—— d'un boulet qui tombe du haut d'un mât, 17
—— d'une balle jettée de la proue vers la poupe, 18
—— d'une Planete en longitude. Ce qu'on entend par ce mouvement, 111
—— diurne de la Lune au Soleil, 126
—— du Soleil & de la Lune ont été regardés jusqu'ici comme les mesures du tems les plus naturelles, 518
Mouvement Moyen, 111
—— Comment on en construit les Tables, 548
Mouvement apparent du Soleil, 75
——des Cometes, 333 & 335
——de la lumiere, 297
——d'une Planete en longitude, 111
——rétrograde des nœuds de la Lune, 128
——des Planetes autour de leur axe, 53
——progressif de Venus, 275
—— —— —— retrograde, 276
—— Epoques ou racines des moyens) semblables à celles des Chronologistes, 548 & 601
—— Construction des Tables du moyen) des Planetes, 559
Moyenne (distance) 109

N.

Nabonassar (Ere de) 604
Nadir, ou l'opposé au Zénit, 363
Newton a expliqué le premier la cause physique de la regle de Kepler, 40
——a découvert la vraie origine du mouvement annuel apparent des Etoiles ou Précession des Equinoxes, 103
—— Sa méthode de déterminer la distance d'une Comete à la Terre par les observations de son lieu apparent vers le commencement ou la fin de son apparition, 328
——a prouvé que les orbites des Cometes étoient des portions d'Ellipses ou de Paraboles, ce qui lui a fait découvrir la vraie Théorie de ces astres qu'on ignoroit totalement, 341
Newton, dans quel tems & à quelle occasion il a decouvert cette Théorie, 348
Nœuds de la Lune, 127
—— Leur mouvement est rétrograde, 128
—— Leur Période s'acheve en combien de jours, *ibid.*
——de Venus, 271
——Celui du quatrieme Satellite de Jupiter, doit rétrograder selon Newton, de 8° 29′ en 100 ans, 314**
Nœuds de l'orbite des Cometes, comment on les détermine, 352*
—— des Planetes, maniere d'en déterminer la position, 538
Nombres donnés par les Tables, leur addition & réduction en signes, degrés, minutes, &c. 627
Nombre d'or, ou Cycle de Meton, 611
—— Comment il répond aux jours du Calendrier, 612
—— Il ne le faut pas confondre avec la Période ou *Saros* Caldaïque, 614*
—— l'Eglise Anglicane en a conservé l'usage, 615
—— Comment on le peut calculer pour une année proposée, *ibid.*
Nonagésime ou nonantieme degré, 364
Nouvelle Lune, ou Néomenie, 120
Nuit, 80

O.

Oblique (ascension) 370
Obliquité de l'Ecliptique, 380
—— Il n'est pas possible de la déterminer assez exactement avec les gnomons, *ibid.*
—— Il est incertain si elle diminue ou si elle est constante, 381
Observateur (un seul) ne sçauroit guères déterminer les lieux des Planetes, qu'en recherchant leurs ascensions droites & leurs déclinaisons, 394
Occultation des Etoiles & des Planetes, improprement dites, 374
——Cercle de perpétuelle) 371
——des Etoiles par la Lune & les Eclipses des Satellites de Jupiter, ont été employées à découvrir les longitudes, 318
Oclans. Ce que c'est, 6
Oie d'Amérique, Constellation, 59
Oiseau du Paradis, autre Constellation, *ibid.*

Olympiade. Quel espace de tems c'étoit, 601
——Quand a commencé la premiere, 603
Ombres que jettent les corps opaques, 193
——Leurs différentes figures, 194
——Méthode pour mesurer celle de la Terre, 201 & 208
——Hauteur du cône d') de la Terre, 205
——— —— de la Lune, *ibid.*
—— ——— Quelle quantité de la Terre peut y être plongée, 206
——Diametre apparent de l') de la Terre vu de la Lune, 208
——Maniere de déterminer le lieu de la Terre où l') commencera à paroître dans un instant donné d'une Eclipse, 224
Oppositions de la Lune au Soleil, 118
——des Planetes au Soleil: de quelle importance il est pour l'Astronomie de les bien observer, 280
Orbe annuel. Sa parallaxe, 289
Orbites des Planetes sont des Ellipses, 107 & 277
——de Mercure & de Venus sont les plus proches du Soleil, 257
Orion (Constellation d') 59
Orthographique (projection) 214
Ourses, grande & petite, 59

P.

Paon, Constellation, 59
Pâque. Comment déterminer le tems auquel elle se doit célébrer, 610
Parallaxe, 419 & 421
——Plus un astre est éloigné de la Terre, moins elle devient sensible, 410
Parallaxes diminuent dans le rapport des sinus de la distance apparente de l'astre au Zénit, 421
——font varier à chaque instant la distance d'un astre aux Etoiles fixes qui l'environnent, 422
—— Différentes especes de) 424
——de hauteur, 424
——Comment on les détermine, 438
——de Déclinaison, 426
——Premiere Méthode pour découvrir les) *ibid.*
—— II. Méthode, 427
—— III. 428
—— IV. 430
—— V. 434
—— VI. 437
Parallaxe, maniere de la calculer lorsque l'astre a un mouvement propre, 439
——de la Lune, 208, 245, 441 & 461
——Méthode proposée par Ptolomée pour la déterminer, 441
—— Autre Méthode nouvelle, 446
—— Maniere de calculer la) pour un tems donné quelconque, 461
——de hauteur, *ibid.*
——de latitude, } 247 & 424
——de longitude, }
Parallaxe horizontale du Soleil selon l'opinion d'Horoxius & de M. Huygens, 446
——Méthode imaginée par Hipparque pour la découvrir, 447
——— Elle est insuffisante, 449
——— Méthode d'Aristarque, 450
—— — Pourquoi on l'a abandonnée, 452
——— Méthode plus exacte que les deux précédentes, 456
—— La différence de celle du Soleil & de Venus doit faire paroître, selon les divers lieux de la Terre que l'on occupera, la durée ou la corde du passage de Venus sur le Soleil, plus ou moins longue, 457
—— On pourra déterminer à $\frac{1}{500}$ près celle du Soleil au tems du passage de Venus sur son disque en 1761, *ibid.*
——Divers moyens de déterminer la parallaxe du Soleil, *ibid.*
Parallaxe de l'orbe annuel, 289
——une fois connue dans chaque Planete, on a dès-lors leurs distances relatives à l'égard du Soleil, 291
—— On ne la doit pas supposer de même que l'ont fait Flamsteed & Wiston, de 42", comme l'avoit remarqué M. Picard, 93*
——n'est pas même d'une seconde, *ibid.*
——En vain a-t-on tenté de déterminer par cette voie la distances des Etoiles fixes, 93
——doit etre distinguée de deux sortes dans les Cometes, comme dans

les Planetes ; 327
Parallaxe. Quelle eſt celle dont on ſe ſert le plus commodément pour découvrir la diſtance des Cometes, 329
Paralleles (cercles) 354 & 572
——— Sphere) 371
Parallélisme de l'axe de la Terre, 81
Paſſage de Venus ſur le Soleil, 76
——La grandeur & la poſition de la corde du) étant donnée ſur le diſque du Soleil, déterminer le nœud & l'inclinaiſon de l'orbite de Mercure ou de Venus, 252 & 253
Pégaſe, Conſtellation, 59
Pénombre, 202
——Comment on peut en connoître les dimenſions, 204
——Son demi-diametre eſt égal à la ſomme des demi-diametres apparens du Soleil & de la Lune, *ibid.*
——Quelle quantité de la ſurface de la Terre peut y être enveloppée, 207
——Détermination du lieu de la Terre où elle doit commencer à paroître, 223
——Trouver le centre de la) ſur le diſque de la Terre pour un moment donné quelconque, 234
Périgée de la Lune, 129
Périhélie, 109
——des Cometes, comment on le détermine, 351
Période des Planetes ; 27, 253
——— de la Lune, 29, 125
——— des Satellites, 29, 31 & 302
Période de Denys le Petit, autrement nommée grand Cycle Paſchal, 615
——Trouver l'année de cette Période correſpondante à une année quelconque de l'Ere Chrétienne, 616
——Trouver l'année de cette Période, les années des Cycles Solaire & Lunaire étant données, *ibid.*
——Regle générale pour trouver l'année, 619
Période Julienne, 605 & 619
——En trouver l'année qui répond à une année donnée de l'Ere Chrét. 620
Période, ou *Saros* Caldaïque, 614*
——— Uſage qu'en a fait M. Halley pour les longitudes, 320
——Sotiacale. Son étymologie, 601
Periæciens, 361
Periſciens, 362
Perſée, Conſtellation ; 59
Phaſes { de la Lune, 615 / de Venus, 266
Phœnix, Conſtellation, 59
Picard s'eſt apperçu le premier de l'applatiſſement de Jupiter, 69
——a découvert les mouvemens de l'Etoile polaire, & a fait voir qu'on ne pouvoit les expliquer par les réfractions ni par la parallaxe de l'orbe annuel, 93
——a découvert l'inégalité des diametres de la Lune périgée au tems des Siſigies & des Quadratures, 131
——Diverſes méthodes qu'il a propoſées pour le paſſage de Mercure, ou de Venus ſur le Soleil & pour les Eclipſes, 252 & *ſuiv.*
Planetes, 25
——Leurs grandeurs, 558
——Font leurs révolutions autour du Soleil, & ſe meuvent d'Occident en Orient, 26
——Vues de la Terre, leur cours paroit inégal & irrégulier, 23
——Leur ſituation, ſoit entre elles, ſoit à l'égard du Soleil, 27
——Différences très-ſenſibles dans la chaleur qu'elles reçoivent du Soleil, 285
——Sont des corps ſphériques opaques, 53
——Secondaires. *Voyez* Satellites, 29 & 292
——Le Soleil eſt renfermé dans leur orbite, 35
——Leurs orbites ſont des Ellipſes : 107
——Comment découvertes par Kepler, & la cauſe phyſique démontrée par Newton, 110*
——Comment elles ſe meuvent dans des Ellipſes, 110
——inférieures (Planetes) 257
——— ſupérieures, 279
——La Théorie de ces dernieres eſt encore fort imparfaite, 565
Planetes, méthode de déterminer le tems qu'elles doivent employer depuis une conjonction juſqu'à l'autre, 280
——doivent être principalement obſervées au tems de leur oppoſition au Soleil, 280*
——Les plans de leurs orbites ſont un peu

peu inclinés à celui de l'Ecliptique, 282
Planetes, le disque des Planetes supérieures n'est jamais sensiblement altéré dans sa rondeur, si ce n'est quelquefois celui de Mars. 284
—— supérieures paroissent bien plus grandes au tems de leur opposition, que vers leur conjonction, 285
—— Leur mouvement vu de la Terre est tout-à-fait irrégulier, 286
—— Quand est-ce qu'elles sont directes, & que leur mouvement est accéleré? 287
—— Quand doivent-elles paroitre stationnaires? 288
—— A quelle Planete conviennent les plus grands arcs de rétrogradation? 291
—— Leur inégalité optique ou seconde, 292
—— Les quarrés de leurs tems périodiques sont entre eux comme les cubes de leurs moyennes distances au Soleil, 40
—— Lieu de l'orbite où leur viteſſe est la plus petite, 486
—— Où elle est égale à la viteſſe moyenne, 487
—— Deux méthodes pour déterminer les tems de leurs révolutions périodiques, 537
—— Par la seconde méthode on détermine aussi la position des nœuds, 538
—— Ce qui fournit encore un moyen de connoitre l'inclinaison de leurs orbites au plan de l'Ecliptique, 539
Planetes, maniere d'en déterminer le lieu héliocentrique lorsqu'on les observe au tems de leur opposition, 540
—— Comment on peut connoitre la longitude héliocentrique, lors même que la Planete n'est pas achronique, 542
—— Table de leurs périodes & de leurs distances moyennes, 553
—— Construction des Tables des moyens mouvemens, 559
Planetes inférieures, ne sont pas stationnaires lorsque nous les voyons dans la ligne droite qui est tangente à leurs orbes, 577
—— supérieures ne sont jamais stationnaires quand elles se trouvent dans la tangente tirée à l'orbe terreſtre, *ibid.*
Planetes, l'unique cas auquel elles doivent paroître stationnaires, 578
—— Quand est-ce qu'une Planete est directe, 276 & 287
—— stationnaire, 276 & 288
—— rétrograde, 277 & 288
—— En quelle proportion leurs distances sont avec leurs périodes, 39 & 552
—— Leurs mouvemens apparens, 275 & 286
Pleine-Lune, 119
Points Solstitiaux & Equinoctiaux, 465
—— des stations des Planetes déterminés par une construction Géométrique, 582
Poiſſons, Signe du Zodiaque 59
Poiſſon méridional, *ibid.*
Polaires { arctique & antarctique } 85 & 358
Poles du monde, 78
—— de l'Ecliptique, 90
—— de l'horiſon, 8 & 363
Précesſion des Solstices & des Equinoxes, 101 *& ſuiv.*
—— est causée par le mouvement de la Terre autour du Soleil, l'applatiſſement du sphéroïde, & la grande inclinaiſon de l'axe terreſtre au plan de l'Ecliptique, *ibid.*
—— conſéquences faciles à déduire de ce mouvement quant aux positions ou apparence du lieu des Etoiles fixes, 103
—— La figure de la Terre en est une des principales causes, *ibid.*
Problemes de Kepler, 488
—— Solution donnée par Newton, 497
—— énoncé d'une maniere inverſe, n'est plus si difficile à réſoudre, 491
—— sur les véritables trajectoires des Cometes,
—— Solution donnée par Newton, 348
Projection, 213
—— Orthographique, 214
—— de l'ombre sur le disque de la Terre, 215
Proſthapherese, ou Equation du centre. Ce que c'est, 475

Q.

Quadrature, ou aſpect quadrat, 119

Quadratures (la plus grande inégalité de la Lune au tems des) 155
Quantité ou grandeur de l'année Tropique, 468
—— de l'année anomaliſtique, 469
Quart-de-Cercle. En combien de degrés il eſt diviſé, 6
—— Comment on obſerve les angles avec cet inſtrument, 7
—— Ses différens uſages, 374 & *ſuiv.*
Queues des Cometes, 345
—— Conjectures ſur la maniere dont elles ſe forment, 346
—— ſont toujours à l'oppoſite du Soleil, *ibid.*
—— participent au mouvement du corps de la Comete, *ibid.*
—— Longueur de celle de la Comete de 1680, 347

R.

Racine ou Epoque des moyens mouvemens, 548
Racine dont ſe ſervent les Chronologiſtes, 601
Rayons ſont toujours entre eux comme les circonférences des cercles, 387
Réapparition ou Occultation, 374
Réduction à l'Ecliptique, 356 & 552
Réfraction, 410
—— des rayons du Soleil dans notre atmoſphere, 251, 399 & 409
—— des Aſtres, 410
—— par le moyen des) on apperçoit l'Eclipſe horiſontale de Lune, c'eſt-à-dire, lorſque cette Planete eſt encore ſous l'horiſon, 411
—— celle entiérement au Zénit, *ibid.*
Réfraction horiſontale, par qui découverte, & ſa quantité ſelon Tycho, 415 & 416
—— La plus grande ſe fait à l'horiſon, *ibid.*
—— eſt encore d'une minute à 45 degrés de hauteur, *ibid.*
—— La preuve en eſt fondée ſur la Regle de Deſcartes, & ſur les obſervations de feu M. Caſſini, *ibid.*
Réfractions ſont les mêmes pour tous les Aſtres qui ſont à hauteurs égales, 412
—— Maniere de trouver celle d'une Etoile, *ibid.*
Réfractions ſont variables du chaud au froid, 417
—— ſont plus petites dans la Zone Torride qu'en France, *ibid.*
—— Table des) pour le niveau de la mer dans la Zone torride, 417
—— —— de M. Newton, 418
Réfractions d'hiver aux moindres degrés de hauteur, 416
—— d'Eté aux mêmes degrés de hauteur, ſont plus petites, 418
—— des plus grandes chaleurs d'Eté, *ibid.*
Régiomontanus, fameux Aſtronome du XV. ſiecle, 62
—— La Comete qu'il a obſervée en 1472, a décrit 40° en un jour, 342
Réticule. Sa conſtruction, 384
—— Autre plus ſimple, 386
Rétrogradation des Planetes, 276 & 288
—— Argument qu'on en tire pour prouver que les Planetes tournent autour du Soleil, & non pas autour de la Terre, 38
Riccioli (le Pere) Aſtronome, a augmenté de quelques Etoiles le Catalogue des Etoiles de Kepler, 63
—— Sa Sélénographie, 141
Rome (Ere de la fondation de) 604
Rotation de la Terre autour de ſon axe, 73 & 77
—— eſt l'unique cauſe du mouvement apparent de tous les aſtres d'Orient en Occident, 79
Route apparente de la Lune à l'égard du Soleil, 211 & 255
—— projettée ſur le plan du diſque de la Terre, 217

S.

Sagittaire. Conſtellation, 59
Saros Caldaïque, ou Période de 223 Lunaiſons, 320
Satellites. Ce que c'eſt, 29
—— M. Pound a déterminé avec la plus grande exactitude leurs élongations, *ibid.* *
—— de Jupiter ſont au nombre de quatre, 29
—— —— s'approchent & s'éloignent alternativement de leur Planete principale, 293
—— Premiere utilité qu'on peut retirer de leurs Eclipſes, 294

Satellites. MM. Roëmer & Halleï les ont auſſi employés pour démontrer le mouvement ſucceſſif de la lumiere, 295 *& ſuiv.*
——Leurs Eclipſes ſervent à découvrir les longitudes ſur Terre, 315
——de Saturne ſont au nombre de cinq, 30 *&* 292
——Leurs révolutions périodiques, 31*
Satellites, (Théorie générale des) 302
——Les cercles qu'ils décrivent autour de leur Planete ne ſont pas ſenſiblement excentriques, *ibid.*
—— Tables de leurs mouvemens, 304 *& ſuiv.*
——L'Equation du mouvement ſucceſſif de la lumiere eſt de deux ſortes, & ſuppoſe néceſſairement deux différentes Tables, 312 *&* 313
——Il eſt certain par les obſervations que les Satellites agiſſent les uns ſur les autres; enſorte que leur Théorie eſt la plus imparfaite, & des plus difficiles à découvrir, 314
——Les inégalités de leurs mouvemens ſont remarquables, principalement dans le ſecond Satellite de Jupiter, 314*
——Les époques & les moyens mouvemens des Satellites de Saturne & de Jupiter nouvellement reſtituées, en comparant les anciennes obſervations aux plus récentes qui aient été faites en France & en Angleterre, 315
Saturne, Planete, 25, 281 *&* 553
—— Son anneau, 31
——Son diametre & celui de ſon anneau ſelon M. Pound, 554
——Inclinaiſon du plan de l'anneau & de l'orbite du quatrieme Satellite au plan de l'Ecliptique, 304 *&* 305
Saturne, ſa moyenne diſtance à la Terre, 552
——L'excentricité de ſon orbite eſt variable 565
——Son moyen mouvement paroit s'être rallenti à chaque ſiecle, 567
——Le mouvement moyen de ſon aphélie & de ſon nœud n'eſt pas encore bien connu, 567
——L'inclinaiſon de ſon orbite n'eſt pas la même ſelon divers Auteurs, 568
Saturne, la plus grande Equation du centre de ſon orbite, *ibid.*
——La Théorie de cette Planete eſt la plus imparfaite, 569
——Grandes différences dans les époques de ſes moyens mouvemens entre les ſucceſſeurs de Tycho & les Aſtronomes modernes, *ibid.*
Scorpion (le) Conſtellation du Zodiaque, 59
Secondaires (Cercles) 356
Sélénographies, ou repréſentations de la figure de la Lune ſelon Hévélius & Riccioli, 141
——Celle de Gaſſendi & Peireſc les a précédées, 141*
Semaine, 596
Serpentaire. Conſtellation, 59
Sextans. Ce que c'eſt. Combien il contient de degrés, 6
Siecle. Quelle eſt ſa durée, 601
Signes du Zodiaque, en quoi different des Conſtellations du Zodiaque, 102
Siſigies. Ce que c'eſt, 130
Soleil eſt renfermé dans l'orbite des Planetes, 35
——n'eſt point un corps opaque, 42
——Sous quel angle on l'obſerveroit s'il étoit tranſporté auſſi loin de nous que ſont les Etoiles fixes, 44
——Les taches qu'on découvre quelquefois ſur ſon diſque, nous ont fait connoître qu'il tournoit autour de ſon axe dans l'eſpace d'environ 27 jours, 50
——Sous quel angle ſon axe eſt incliné au plan de l'Ecliptique, 52
——eſt placé au centre de notre ſyſteme planétaire, 73
—— Son mouvement vu de la Terre, 75.
——comme auſſi de chacune des Planetes, 77
——paroit s'avancer chaque jour vers des Etoiles plus orientales, 76
——s'approche plus dans un tems de l'année que dans l'autre, du Zénit des habitans ſitués par-delà les Tropiques, & de combien, 88
——Expérience qu'on peut faire à ce ſujet, 89
Soleil, ſon diametre apparent eſt plus grand pendant notre Hiver qu'en Eté, 105

——Raiſon que les Anciens en apportoient, *ibid.*
——Leur hypotheſe, 106
Soleil, Tables de ſes moyens mouvemens, 145 & *ſuiv.*
——Etant beaucoup plus grand que la Terre & la Lune, leur cone d'ombre doit aller en diminuant dans les Eclipſes, 194
——On ſuppoſe paralleles deux lignes tirées de ſon centre, à deux différens points de la ſurface de la Terre, 199
——Comme auſſi de ſon centre à la Lune & à la Terre dans les Eclipſes, 200
——Maniere de découvrir ſon aſcenſion droite, ſa longitude, ſa déclinaiſon & l'angle que forme l'Ecliptique avec le Méridien, 382
——La durée de ſon paſſage au Méridien, doit toujours paroître un peu trop longue, 391
——étant près de l'horiſon, ſes rayons font bien plus de chemin dans notre atmoſphere que vers le Zénit, 414
——Pourquoi ſa lumiere eſt bien moins vive à ſon lever ou à ſon coucher, qu'à l'heure de ſon paſſage au Méridien, 415
——Son mouvement dans l'Ecliptique ne paroît ſujet qu'à une ſeule inégalité, 469
——Maniere de conſtruire la Table de ſes moyens mouvemens, *ibid.*
——Comment on peut trouver par obſervation ſon mouvement diurne, 470
——Maniere de trouver ſon lieu moyen, 506
——Table qui exprime les rapports de ſon diametre avec celui des autres Planetes, 558
Solſtices. Pourquoi les points des) rétrogradent, 100
Spectateur. Eſt toujours placé au centre des objets auxquels ſa vue peut s'étendre, 23
——placé dans le Soleil, 24
——peut toujours être ſuppoſé au centre du Ciel Etoilé, 353
Sphere, 353
——Ses grands & petits cercles, 354
——Leurs poles, *ibid.*
——Quelques-uns ſont mobiles, d'autres immobiles, 355
Sphere droite. Ce que c'eſt, 368
——oblique, 369
——parallele, 371
Stationnaire. Trouver le lieu de la Terre d'où une Planete vue dans un point donné de ſon orbite, paroîtra ſtationnaire, 588
Stations des Planetes, 577
——Quand arrivent celles des Planetes inférieures & celles des ſupérieures, *ibid.* 578 & 583
——dans le tems des) l'augmentation & la diminution des angles faits à la Terre & à la Planete, ſont réciproquement comme les tems périodiques, 579
——Leurs points déterminés par une conſtruction Géométrique, 582, 585 & 589*
——Exemple du calcul des) 593

T.

Tables Aſtronomiques, contiennent pour la plupart une Table générale de l'Equation du tems 527**
Tables des moyens mouvemens du Soleil, 146
——pour les jours de l'année, 148 & 150
——du diametre du Soleil, de ſon mouvement horaire & de ſa Parallaxe, 151
——de l'Equation du centre du Soleil, 152
——Premiere & ſeconde de l'Equation du tems, 154
——La maniere de conſtruire ces deux Tables, 526 & *ſuiv.*
Tables de la Lune. Epoques de ſes moyens mouvemens, 156 & 157
——pour les jours de l'année, 158 & 163
——de ſon apogée & de ſon nœud, *ibid.*
——De ſes moyens mouvemens pour les heures, minutes & ſecondes, 187
——Des équations annuelles, de ſes moyens mouvemens, de ſon Apogée & de ſon nœud, 164 & 165
——Des ſecondes & troiſiemes Equations de ſon moyen mouvement, 166

Tables de l'Equation de son apogée, 167
—— de l'Equation de son nœud, & de l'inclinaison de son orbite, 168
—— des plus grandes Equations qui répondent aux différentes excentricités de son orbite, 169
—— de l'Equation du centre, 170 & 175
—— de la variation, 176 & 178
—— de la sixième & septieme Equation, 179
—— de la réduction de ses lieux au plan de l'Ecliptique, 180
—— de la latitude, 181 & 183
—— des demi-diametres, 184
—— des Parallaxes horisontales, 185
—— de la correction du demi-diametre, &c. } 186
—— de l'augmentation du demi-diametre horisontal, }
Tables des Satellites. Des moyens mouvemens du quatrieme Satellite de Saturne, 304
—— Epoques des conjonctions moyennes du premier Satellite de Jupiter au Méridien de Paris, 305
— au Méridien de Londres, 306
—— des révolutions du premier Satellite de Jupiter, 307 & 309
—— de la premiere équation des conjonctions du premier Satellite de Jupiter, 310 & 211
—— de la seconde Equation, &c. 312
—— de la troisieme Equation, &c. 313
—— de la demi-durée des Eclipses du premier Satellite de Jupiter, *ibid.*
—— Epoques corrigées des moyens mouvemens des Satellites de Saturne pour servir à calculer leurs situations, 315
—— Autres époques nouvellement restituées des moyens mouvemens des Satellites de Jupiter, *ibid.*
Tables de l'ascension & de la déclinaison des principales Etoiles, 397
—— de leurs longitudes & latitudes, 398
—— des Réfractions de M. Bouguer, pour la Zone Torride, 417
— des réfractions de M. Newton, 418
—— Comment on doit calculer la Table de l'Equation du centre des Planetes, 479 & 500**
Tables Caroline de Street, ont été calculées en se servant de l'Approximation, ou méthode de Wardus corrigée par Bouillaud, 510
Tables. Comment doivent être construites les Tables des moyens mouvemens, 548
—— des Périodes & des distances moyennes des six Planetes, 553
—— qui exprime les rapports du diametre du Soleil à celui des autres Planetes, 578
Tables, avantage des) de Kepler, de Bouillaud & de Street, 559, 566 & 576
—— Les moyens mouvemens selon ces trois Auteurs, représentent autant qu'il est possible, les observations anciennes comparées à celles de Tycho, *ibid.*
—— Elemens des) de Mercure nouvellement restituées, 561
—— des Logarithmes logistiques de Street, 612
Taches sur la surface du Soleil ont fait connoitre que le Soleil tourne autour de son axe. Ne retournent ordinairement au même point où elles ont commencé à paroitre qu'au bout de 27 jours, 50
—— sont à la surface, & non pas à une plus grande distance, 51
—— Souvent semblent se dissoudre & disparoissent : souvent aussi elles se ramassent plusieurs en une seule masse, 52
—— Ont été vraisemblablement la cause de la pâleur du Soleil pendant plusieurs années, *ibid.*
—— Celles qu'on découvre aussi sur les Planetes servent à faire connoitre le tems de leur rotation autour de leur axe, 53
—— Sur la surface de la Lune, 140
Taureau, signe du Zodiaque, 59
Telescopes. Utilité de ces sortes de Lunettes, 11
Tempérées (Zones) 362
Tems. Son équation, sa mesure, 517
—— Comment on le peut convertir en degrés, minutes, &c. 429
—— vrai ou apparent, } 518
—— moyen, }
—— Dans quel cas le vrai suit le moyen, 525
—— Les parties du) 593
—— Périodiques, 553

Terme de la lumiere & de l'ombre sur la Terre, 80
——— Sur le globe Lunaire, 118
——— Où se borne notre vue à la surface de la Lune, *ibid.*
——— Ecliptiques. Ce que c'est, 210 & 219
Terre, doit être regardée comme une vraie Planete, 157
——— se meut aussi dans son orbite autour du Soleil, 38
——— a outre le mouvement annuel, un mouvement de Rotation autour de son axe, 73 & 77
——— Son mouvement vu du Soleil, 74
——— Son axe n'est point perpendiculaire au plan de l'Ecliptique, 80
——— On le suppose toujours parallele à lui-même pendant qu'elle parcourt son orbite, 81
——— à cause de la figure de la) l'axe ne conserve pas perpétuellement son parallélisme, 97 & 103
Terre, est de même que Jupiter, un sphéroïde applati vers les poles, & rehaussé vers l'Equateur, 103
——— Ce que l'on doit observer lorsqu'elle est en ♎, & le Soleil vu en ♈, 83
——— lorsqu'elle est en ♈, & le Soleil en ♑, 84
——— lorsque le Soleil paroit au point Equinoctial de l'Automne, & lorsqu'il paroit au ♈, 87
——— Son axe doit répondre dans chaque saison de l'année à différentes Etoiles, 92
——— Pourquoi cet axe paroit répondre dans toutes les saisons de l'année sensiblement au même point du Ciel, 93*
——— & pourquoi il peut répondre néantmoins à différentes Etoiles, 94
Terre, son mouvement autour du Soleil n'est point égal ni uniforme, 104
——— Son mouvement dans un cercle excentrique, 105
——— Trouver le point sur sa surface qui est à plomb au-dessous du Soleil à tel instant donné qu'on voudra, 221
——— Maniere de connoitre la grandeur de la circonférence de la) 367
——— Son ancienne division en climats, 371
Terre. Hypothese des Anciens pour expliquer l'inégalité de son mouvement, 471
——— Son orbite est une Ellipse, 478
——— Recherche sur la figure de son orbite, 510
Théoremes proposés par M. de Moivre, leurs usages, 483, 484 & 582
Théorie du mouvement de la Terre, 464
——— doit être premierement connue pour parvenir à celle des autres Planetes, 135
——— de Wardus, 506
——— donne par approximation la figure & la position de l'orbite de la Terre, 512
——— du mouvement des Planetes, 464
——— Elle dépend aussi de la Théorie de la Terre, *ibid.*
Torride (Zone) 361
Tourbillons imaginés par Descartes, n'existent point, 343
Trajectoires des Cometes. Comment on peut tenter de les déterminer, & connoitre enfin la vraie Trajectoire, 350
Triangle, Constellation, 85
Tropiques du Cancer & du Capricorne, 59
——— Etymologie de ce mot, 358

V.

Variation de la Lune, comment elle se calcule, 629
Venus, 257
——— Si l'on peut espérer de découvrir la parallaxe du Soleil à une cinq-centieme partie près, lorsque cette Planete passera sur son disque, 457 & *suiv.*
——— Les mouvemens qu'on observe à l'égard de cette Planete, sont assez conformes à ceux que l'on remarque dans la Planete de Mercure, 36
——— Quand est-ce qu'elle doit être vue sur le Soleil, 36 & 457
——— Son diametre vu du Soleil, 460
——— Son diametre apparent vu de la Terre, 555*
——— Son passage dans le Soleil étant donné, déterminer les nœuds & l'inclinaison de son orbite, 253

Venus, sa distance & sa position à l'égard de la terre doit faire changer continuellement ses phases, 264, 266 & 268
— Copernic avoit prédit ce qu'on a observé depuis à ce sujet, 267
— Sa lumiere n'est pas la plus éclatante lorsqu'elle est pleine, 269
— Quand est-ce que sa lumiere est la plus vive ? 270
— Le plan de son orbite n'est pas le même que celui de l'Ecliptique, 271
— Ses mouvemens apperçus dans le Zodiaque, 275
— Son mouvement progressif & accéléré, *ibid.*
— Rétrograde, — Stationnaire, } 276
— Quand paroit-elle directe, quand rétrograde ? 277
— Tems auquel on pourra déterminer la position de son nœud & son vrai mouvement, 566
— Sa moyenne distance au Soleil, & sa révolution périodique, 553
— Ses nœuds, 271 & 574
— Difficultés sur leur mouvement, 575
Vertical (Cercle) ou Azimut ; ce que c'est, 8 & 363
— premier, 363
Vision, maniere dont elle se fait, 2
— Cercle de) 118
Ulugh-Beigh, petit-fils du grand Tamerlan, a publié le second Catalogue général des Etoiles, 62
Voie lactée, ce que c'est, 60
— On doute s'il y a plus d'Etoiles dans cette région du Ciel, que dans les autres, *ibid.*
Vuide, nécessité de l'admettre, 345

W.

Wardus, sa Théorie, 506
— Sa Méthode corrigée par Bouillaud, 507

X.

Xiphias, ou la Dorade, Constellation, 59

Z.

Zenit, sa définition, 8 & 36
Zodiaque, ce que c'est, 274 & 356
— Distinction qu'il faut faire entre les Signes & les Constellations de ce cercle, 102
Zones (les cinq) 361

Fin de la Table des Matieres.

Extrait des Registres de l'Académie Royale des Sciences.

Du 5. Septembre 1744

M. Clairaut & moi qui avions été nommés pour examiner une Traduction des Leçons d'Astronomie de Keill, avec des Additions sous le titre d'*Institutions Astronomiques*, en ayant fait notre rapport, la Compagnie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression : en foi dequoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris ce 18. Mars 1746.

GRANDJEAN DE FOUCHI, *Secr. perp. de l'Acad. Royale des Sciences.*

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers, qu'il appartiendra, SALUT. Notre ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES Nous a très-humblement fait exposer, que depuis qu'il Nous a plû lui donner par un Réglement nouveau de nouvelles marques de notre affection, Elle s'est appliquée avec plus de soin à cultiver les Sciences, qui sont l'objet de ses exercices ; ensorte qu'outre les Ouvrages qu'elle a déja donnés au Public, Elle seroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaisoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilége, attendu que celles que Nous lui avons accordées en date du six Avril 1693. n'ayant point eu de tems limité, ont été déclarées nulles par un Arrêt de notre

Conseil d'Etat du 13. Août 1704. celles de 1713. & celles de 1717. étant aussi expirées; & désirant donner à notredite Académie en corps, & en particulier à chacun de ceux qui la composent, toutes les facilités & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leurs travaux utiles au Public, Nous avons permis & permettons par ces présentes à notredite Académie, de faire vendre ou débiter dans tous les lieux de notre obéissance, par tel Imprimeur ou Libraire qu'elle voudra choisir, *Toutes les Recherches ou Observations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les assemblées de notredite Académie Royale des Sciences; comme aussi les Ouvrages, Mémoires, ou Traités de chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & jugé qu'ils sont dignes de l'impression*; & ce pendant le tems & espace de quinze années consécutives, à compter du jour de la date desdites Présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance: comme aussi à tous Imprimeurs Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucun desdits Ouvrages ci-dessus spécifiés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre, feuilles même séparées, ou autrement, sans la permission expresse & par écrit de notredite Académie, ou de ceux qui auront droit d'Elle, & ses ayans cause, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & intérêts: à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que notredite Académie se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1723. & qu'avant que de les exposer en vente, les Manuscrits ou Imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis dans le même état, avec les Approbations & Certificats qui en auront été donnés, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur Chauvelin: & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Présentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir notredite Académie, ou ceux qui auront droit d'Elle & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la Copie desdites Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huissier, ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau le douziéme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil sept cent trente-quatre, & de notre Regne le vingtiéme. Par le Roi en son Conseil. *Signé*, SAINSON.

Regiſtré ſur le Regiſtre VIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris. Num. 792. fol. 775. conformément aux Réglemens de 1723. qui font défenſes, art. IV. à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire diſtribuer aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, ſoit qu'ils s'en diſent les Auteurs ou autrement; à la charge de fournir les Exemplaires preſcrits par l'art. VIII. du même Réglement. A Paris 15. Novembre 1734. G. MARTIN, Syndic.

Orbites de quatre des principales Cometes de ce Siecle.

L'Orbite de la Comete de 1744* calculée par le P. Chriſtophe Maire pour le Méridien de Rome (lequel eſt plus méridional que Paris de 40' 30") ſe trouve par les obſervations faites depuis le 21 Janvier juſqu'au 3 Mars au matin, comme il ſuit... Tems du paſſage par le Périhélie le 1 Mars à 8^h 49' 30" de tems vrai, la diſtance de la Comete au Soleil étant alors $\frac{22+156}{100+000}$ de la moyenne diſtance du Soleil à la Terre, le lieu du Périhélie ♎ 17° 17' 30", celui du ☊ ♉ 15° 51' 00" & l'inclinaiſon de l'orbite 47° 18' 00".

* *Voyez ci-devant p.* 344.

En l'année 1729 il a paru une Comete qu'on a obſervée fort long-tems, comme il eſt rapporté dans les Mém. de l'Ac. de la même année. M. De Liſle m'ayant communiqué le travail qu'il vient de faire ſur cette Comete, avec une Table générale où il compare chaque jour depuis le 31 Aouſt 1729, juſqu'au 18 Janvier de l'année ſuivante, les lieux obſervés & calculés, j'en rapporterai ici les élémens tels que M. De Liſle me les a envoyés pour le Méridien de Paris.... Tems du paſſage par le Périhélie le 25 Juin à 9^h 21' de tems moyen, la diſtance de la Comete étant alors $\frac{403+164}{1000+000}$, le lieu du Périhélie ♒ 22° 37' 03", celui du ☊ ♒ 10° 32' 55", & l'inclinaiſon de l'orbite 77° 1'.

M. Bradlei a donné dans les Tranſactions le calcul des orbites de deux autres Cometes de ce ſiecle, dont l'une a paſſé par ſon périhélie le 27 Septembre 1723 à 16^h 0' de tems moyen; ſa diſtance au Soleil étant alors $\frac{99+692}{1000+000}$, le lieu du Périhélie ♉ 12° 15' 20", celui du ☊ ♈ 14° 16', & l'inclinaiſon de l'orbite 49° 59'. Celle de 1737 a paſſé par le Périhélie le 30 Janvier à 8^h 10' de tems moyen (réduit au Méridien de Paris) ſa diſtance au Soleil étant alors $\frac{22+281}{100+000}$, le lieu du Périhélie ♒ 25° 55', celui du Nœud Deſcendant ♉ 16° 22', & l'inclinaiſon de ſon orbite 18° 20' 45".

Trois de ces Cometes ont été Directes, c'eſt-à-dire, que leur mouvements 'eſt fait d'Occident en Orient: *celles de* 1723 *&* 1742 *ont été retrogrades.*

Toutes ces orbites, de même que les vingt-quatre que M. Hallei avoit calculées depuis le tems de Nicephore Gregoras & de Regiomontanus juſqu'au commencement de ce ſiecle, ont été déterminées dans la ſuppoſition que leur Trajectoire étoit parabolique, en ſe ſervant de la Table générale de la Cométographie ou de la ſuivante, laquelle eſt auſſi de M. Hallei; & c'eſt ainſi qu'on doit toujours commencer le calcul pour déterminer les Trajectoires des Cometes. Mais pour connoître à peu-près le tems de leurs révolutions périodiques, comme auſſi l'excentricité de leur orbite, il ſeroit néceſſaire d'entrer dans un examen de toutes les Obſervations, de les corriger en y employant des poſitions d'Etoiles plus exactes que celles dont on s'eſt ſervi, & d'avoir égard à l'Aberration tant de ces Etoiles, que de la Comete, ce qui exige un fort long travail. C'eſt ainſi que j'ai déja calculé la plus grande partie des obſervations de la Comete de 1744, dont nous ne pouvions eſpérer que par ce moyen, de connoître enfin la vraie Trajectoire, & partant à quelques années près le tems de la révolution périodique.

Pour le Calcul de l'Aberration en Déclinaiſon.

Comme le ſinus de la Latitude, eſt au Rayon, ainſi la Tangente de l'angle à la Planete, ou à l'Etoile *E*, à la Tangente d'un autre angle *A* qu'il faut toujours retrancher de la longitude de l'Etoile, pour avoir le lieu de l'Ecliptique où doit paroître le Soleil, lorſque l'Aberration en déclinaiſon eſt nulle. On ſera enſuite: Sin *A*: Sin *E*:: 20": à la plus grande Aberr. en Déclinaiſon.

Pour l'Aberration en Aſcenſion droite.

Comme le Sin. de la Latitude, eſt au Rayon, Ainſi la Cotang. de l'angle *E*, à la Tangente d'un autre angle *M*; qu'il faut toujours retrancher de la Longitude de l'Etoile, pour avoir le lieu de l'Ecliptique où doit paroître le Soleil, lorſque l'Aberration en Aſcenſion droite eſt nulle. Enſuite on ſera:

Coſin. Déclin. × Sin. *M*: Coſin. *E* × *R*:: 20"; à la plus gr. Aberr. en Aſc. dr.

La plus grande Aberration étant une fois connue, elle doit varier chaque jour comme le ſinus de l'Elongation du Soleil au point où elle paroiſſoit nulle.

TABLE GENERALE

POUR SERVIR A CALCULER LE MOUVEMENT des Cometes dans un orbe Parabolique.

Moyen mouvement.	Anomal. vraye.	Différences.	Logarith. pour la distance au Soleil.
	D. M. S.	D.M.S.	
1	1.31 40	1.31.35	0.000077
2	3. 3.15	1.31.28	0.000309
3	4.34.43	1.31.17	0.000694
4	6. 6. 0	1.31.01	0.001231
5	7.37. 1	1.30.43	0.001921
6	9. 7.44	1.30.18	0.002759
7	10.38. 2	1.29.52	0.003745
8	12. 7.54	1.29.23	0.004876
9	13.37.17	1.28.50	0.006151
10	15. 6. 7	1.28.13	0.007564
11	16.34.20	1.27.34	0.009115
12	18. 1.54	1.26.53	0.010798
13	19.28.47	1.26.07	0.012609
14	20.54.54	1 25.20	0 014550
15	22.20.14	1.24.30	0.016607
16	23.44.44	1.23.38	0.018783
17	25. 8.22	1.22.46	0 021072
18	26.31. 8	1.21.48	0.023470
19	27.52.56	1.20.51	0.025969
20	29.13.47	1.19.53	0.028570
21	30.33.40	1.18.52	0.031263
22	31.52.32	1.17.51	0.034045
23	33.10.23	1.16.49	0.036916
24	34.27.12	1.15.47	0.039864
25	35.42.59	1.14.42	0 042892
26	36.57.41	1.13.39	0.045989
27	38.11.20	1.12.36	0.049154
28	39 23.56	1.11.30	0.052382
29	40.35.26	1.10.23	0.055668
30	41.45.49	1.09 17	0.059009
31	42.55 06	1.08.12	0.062400
32	44. 3.18	1.07.08	0.065838
33	45.10.26	1.06.09	0 069319
34	46.16.35	1.05.01	0.072839
35	47.21.36	1.03.57	0.076396
36	48.25.33	1.02.55	0.079984
37	49.28.28	1.01.55	0.083600
38	50.30.23	1 00.48	0.087244
39	51.31.11	0.59.44	0.090910
40	52.30.55		0 094596

Moyen mouvement.	Anomal. vraye.	Différences.	Logarith. pour la distance au Soleil.
	D. M. S.	M. S.	
41	53.29.42	57. 50	0.098300
42	54.27.32	56 49	0.102019
43	55.24.21	55. 51	0.105752
44	56.20.12	54. 54	0.109490
45	57.15. 6	53. 56	0.113240
46	58. 9. 2	53. 02	0.116995
47	59. 2. 4	52. 09	0.120756
48	59.54.13	51. 12	0.124518
49	60.45.25	50. 20	0.128278
50	61.35.45	49. 29	0.132035
51	62.25.14	48. 36	0 135792
52	63.13.50	47. 50	0.139544
53	64. 1 40	46. 58	0.143291
54	64.48.38	46. 12	0.147029
55	65.34.50	45. 23	0.150762
56	66.20.13	44. 37	0.154482
57	67. 4.50	43. 52	0.158192
58	67.48.42	43. 08	0.161890
59	68 31.50	42. 20	0.165578
60	69.14.16	41. 42	0.169254
61	69.55.58	40. 58	0.172914
62	70.36.56	40. 20	0.176557
63	71.17.16	39. 40	0.180188
64	71.56.56	39. 01	0.183803
65	72 35.57	38. 18	0.187404
66	73 14 15	37. 41	0.190978
67	73.51.59	37. 07	0.194540
68	74.29. 6	36. 32	0.198085
69	75. 5.38	35. 57	0.201614
70	75.41.35	35. 21	0.205122
71	76.16.56	34. 47	0.208612
72	76.51.43	34. 14	0.212080
73	77.25.57	33. 44	0.215529
74	77.59.41	33. 12	0.218963
75	78.32.54	32. 42	0.222378
76	79. 5.35	32. 10	0.225769
77	79.37.45	31. 38	0.229142
78	80. 9.23	31. 11	0.232488
79	80.40.34	30. 42	0.235809
80	81.11.16		0.239127

Moyen mouvement.	Anomal. vraye.	Différences	Logarith. pour la distance au Soleil.
	D. M. S.	M. S.	
81	81.41.31	29. 48	0 242476
82	82.11.19	29. 21	0.245684
83	82.40.40	28. 54	0.248933
84	83. 9.34	28. 30	0.252159
85	83.38. 4	28. 04	0.255366
86	84. 6. 8	27. 41	0.258552
87	84.33.49	27. 16	0 261720
88	85. 1. 5	26. 53	0.264865
89	85.27.58	26. 29	0.267989
90	85.54.27	26. 07	0.271092
91	86.20.34	25. 46	0.274176
92	86.46.20	25. 23	0.277239
93	87.11.43	25. 02	0.280284
94	87.36.45	24. 42	0 283306
95	88. 1.27	24. 22	0.286308
96	88.25.49	23. 59	0.289293
97	88 49.48	23. 44	0.292252
98	89.13.32	23. 22	0.295201
99	89 36 54	23. 06	0.298122
100	90.00.00		0.301030
101	90.45.14	44. 14	0.306782
102	91.29.18	44. 04	0.312469
103	92.12.14	42. 54	0.318060
104	92.54. 4	41. 50	0.323587
105	93.34.52	40. 48	0.329042
106	94.14.40	39. 48	0.334424
107	94.53.30	38. 50	0.339736
108	95.31 22	37. 52	0.344979
109	96 8.22	37. 00	0.350153
110	96.44 30	36. 08	0.355262
112	97.19.48	35. 18	0.360306
114	97 54.17	34. 29	0.365284
116	98.28.00	33. 43	0.370200
118	99.00.57	32. 57	0.375052
120	99.33.11	32. 14	0.379842
122	100. 4.43	31. 32	0.384576
124	100.35.45	31. 02	0.389252
126	101. 5.48	30. 03	0.393868
128	101.35.22	29. 34	0 398428
130	102. 4.19	28. 57	0.402930

Ajoutant le complément Arithmétique (du logarithme ſesquialtere de la diſtance Périhélie de la Comete au Soleil) aux logarithmes du tems écoulé depuis le paſſage par le Périhélie, & à celui d'un jour 9.960128, la ſomme ſera le logarithme du moyen mouvement, lequel moyen mouvement fera connoître l'anomalie vraye.

TABLE GENERALE

POUR SERVIR A CALCULER LE MOUVEMENT des Cometes dans un orbe Parabolique.

Moyen mouvement.	Anomal. vraye.	Différences.	Logarith. pour la distance au Soleil.
	D. M. S.	M. S.	
142	102.32.41	27. 50	0.407380
144	103.00.31	27. 16	0.421784
146	103 27.47	26. 44	0.416132
148	103.54.31	26. 12	0.420430
150	104.20.43	25. 35	0.424676
152	104 46.22	25. 11	0.428866
154	105.11.33	24. 43	0.433012
156	105.36.16	24. 16	0.437110
158	106.00 32	23. 51	0.441164
160	106.24.23	23. 24	0.445178
162	106.47.47	22. 57	0.449144
164	107.10.44	22. 33	0.453060
166	107.33.17	22. 10	0.456936
168	107.55.27	21. 57	0.460772
170	108.17.14	21. 13	0.464208
172	108.38.37	21. 02	0.468318
174	108.59.39	20. 41	0.472030
176	109.20.20	20. 20	0.475705
178	109.40.40	20. 00	0.479340
180	110.00.40	19. 40	0.482937
182	110.20.20	19. 21	0.486498
184	110.39.41	19. 03	0.490022
186	110.58.44	18. 44	0.493512
188	111.17.28	18. 27	0.496965
190	111.35.55	18. 10	0.500384
192	111.54.05	17. 53	0.503769
194	112.11.58	17. 36	0.507121
196	112.29.34	17. 21	0.510441
198	112 46.55	17. 05	0.513729
200	113. 4.00		0.516984
204	113.37.25	33. 25	0.523406
208	114. 9.52	32. 27	0.529705
212	114.41.23	31. 31	0.535886
216	115.12.02	30. 39	0.541958
220	115.41.51	29. 49	0.547922
224	116.10.52	29. 01	0.553782
228	116 39. 7	28. 15	0.559538
232	117. 6.38	27. 31	0.565199
236	117.33.27	26. 49	0.570762
240	117.59.35	26. 08	0.576233

Moyen mouvement.	Anomal. vraye.	Différences.	Logarith pour la distance au Soleil.
	D. M. S.	M. S.	
244	118.25. 5	24. 52	0.581816
248	118.49.57	24 17	0.586912
252	119.14.14	23. 42	0.591922
256	119.37.56	23. 10	0.597852
260	120. 1. 6	22. 38	0.603701
264	120 23.44	22 08	0.607474
268	120.45.52	21. 38	0.612174
272	121. 7.30	21. 09	0.616798
276	121.28.39	20. 43	0.621750
280	121.49.22	20. 16	0.626438
284	122. 9.38	19. 50	0.631056
288	122.29.28	19. 26	0.635608
292	122.48.54	19. 03	0.640098
296	123. 7.57	18. 39	0.644525
300	123.26.36	45. 04	0.648893
310	124.11.40	42. 56	0.659555
320	124.54.36	40. 58	0.669880
330	125.35.34	39. 10	0.679876
340	126.14.44	37. 28	0.689568
350	126.52.12	35. 54	0.698970
360	127.28. 6	34. 27	0.708104
370	128. 2.33	33. 05	0.716976
380	128.35.38	31. 49	0.725606
390	129. 7.27	30. 37	0.734006
400	129.38. 4	29. 30	0.742186
410	130. 7.34	28. 28	0.750100
420	130.36. 2	27. 28	0.757930
430	131. 3.30	26. 32	0.765516
440	131.30. 2	25. 39	0.772918
450	131.55.41	24. 49	0.780148
460	132.20.30	24. 02	0.787216
470	132.44.32	23. 22	0.794122
480	133. 7.50	22. 35	0.800882
490	133.30.25	21. 55	0.807494
500	133.52.20	41. 58	0.813969
520	134.34.18	39. 42	0.826522
540	135.14. 0	37. 28	0.838600
560	135.51.28	35. 38	0.850187
580	136.27. 6	33. 51	0.861369
600	137.00.57		0.872155

Moyen mouvement.	Anomal. vraye.	Différences.	Logarith. pour la distance au Soleil.
	D. M. S.	D.M.S.	
620	137.33.13	0.30.45	0.882575
640	138. 3.58	0.29.21	0.892649
660	138.33.21	0.28.08	0.902401
680	139. 1.29	0.26.56	0.911866
700	139.28.25	0.25.51	0.921012
720	139.54.16	0.24.49	0.929507
740	140.19. 5	0.23.51	0.938,49
760	140.42.56	0.22.55	0.946951
780	141.05.55	0.22.08	0.955124
800	141.28. 3	0.21.21	0.963082
820	141.49.24	0.20.36	0.970836
840	142.10 00	0.19.56	0.978397
860	142.29.56	0.19.14	0.985771
880	142.49.10	0 18.38	0.9929 0
900	143. 7.48	0.17.03	1 000000
920	143.25.51	0.17.30	1.006871
940	143.43.21	0.16.57	1.013586
960	144.00.18	0.16.28	1.020155
980	144.16.46	0.16.00	1.026583
1000	144.32.46	4.53.22	1.032876
1500	149.26. 8	3.00.07	1.158188
2000	152.26.15	2.06.05	1.246058
2500	154.32.20	1.35.07	1.313703
3000	156. 7.27	1.15 22	1.368678
3500	157.22.49	1.01.47	1.414974
4000	158.24.36	0.52 00	1.454950
4500	159.16.36	0.44.36	1.490125
5000	160. 1.12	0.38.53	1.521521
5500	160.40. 5	0.34.19	1.549874
6000	161.14.24	0.30.36	1.575718
6500	161.45.00	0.27.34	1.599460
7000	162.12.34	0.25.00	1.621417
7500	162.37.34	0.22.49	1.64183
8000	163.00.23	0.20 57	1.660922
8500	163.21.20	0.19.22	1.678834
9000	163 40.42	0.17.58	1.695708
9500	163.58.38	0.16.42	1.711662
10000	164 15.20		1.726784
10000	170.52. 0	6.36.40	2.197960
100000	172.45.44	2.53.44	2.396655

Le logarithme ſesquialtere eſt déterminé, puiſqu'il eſt toujours à celui de la diſtance Périhélie, comme 3 eſt à 2. Mais ſi l'on ajoute enſemble les trois logarithmes ſuivans, celui de la diſtance Périhélie, le logarithme pour la diſtance, & celui du coſinus de la latitude, la ſomme ſera le logarithme de la diſtance accourcie.

AVERTISSEMENT.

LA Figure de la Lune de 1692, donne la Libration moyenne selon qu'il en a été averti dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1703 ; mais il vaut mieux se servir de celle d'Hévélius, qui nous a paru s'accorder assez bien aux observations, toutes les fois que la Lune a paru dans ses librations moyennes. Hévélius avoit songé aussi à établir vers le haut de sa figure, le point du Disque qui répond au 90e degré, à compter depuis le plan de l'Ecliptique, & il a trouvé que la Lune étant au ☊ & ♑, ce point répondoit dans la circonférence du Disque à 31° & 37° ; d'où il suit qu'il a dû répondre à 34°, cet Astre étant dans ses plus grandes Latitudes. C'est ce qu'il étoit important de sçavoir, lorsqu'il a imaginé de déterminer par les occultations des Etoiles ou des Planetes, le lieu de la Lune, & par conséquent les Longitudes sur Terre.

On ne s'est déterminé à faire ces dernieres Additions, que parce qu'on les a cru avantageuses au Lecteur. Voici encore quelques fautes ou négligences, qu'on prie de vouloir bien corriger.

Page 433, *ligne* 1, & une fois, *lisez* & deux fois.
Page 488, *lig.* 23, *lis.* soit toujours ..... réciproquement.
Page 499, *lig.* 29, si l'on prend, *lis.* si l'on a pris.
Page 500, *lig.* 1, mais si, *lis.* après quoi si.
lig. 32, *ajoutez* .... complément Arithmétique du.
lig. 38, *ajoutez encore* complément Arithmétique du.
ligne 43, *lis.* du nombre 0°. 0846947 1.

Pour connoître le lieu du Soleil encore plus exactement que par les Tables de Flamsteed, on retranchera 50″ de la plus grande Equation du centre, laquelle se réduit par-là à 1° 55′ 30″.

FIN.

ACCADEMIA R. DELLE SCIENZE DI TORINO